



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2369/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2369/A




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2369/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
2369/A





J. v. For
2369/A 1^{re} édition





Ex Libris Vallot 8.
654530
PETRI FORESTI

ALCMARIANI

OBSERVATIONVM,

ET CVRATIONVM

MEDICINALIVM

Liber vigesimus-octauus,

DE MVLIERVVM MORBIS.

Vnâ cum SCHOLIIS.



Ex Officinâ Plantiniana,

APVD CHRISTOPHORVM RAPHELENGIVM,

Academiæ Lugduno-Bat. Typographum.

CIO. 12. IC.

PETRI FORSTII
ALUMNI
GEBIRKAVATION
MT. CARRATON
MT. OLIMPI
P. 100



Viris ornatissimis,

D. CORNELIO PYNACKER


I. V. D. in Lugdunensi Batauor.

Academia Antecessori,

D. ANTONIO BRVNONI,

apud Hornanos Doctori Medico,

*Amicis meis veteribus summa obser-
uantia colendus.*



A VCIS antè die-
bus, viri amicissimi,
quàm è viuis pa-
truus meus D. Pe-
trus Forestus dece-
deret, Obseruatio-
num suarum librum Vicesimum
octauum, qui est de Morbis & Affe-
ctibus mulierum, extrema manu
imposita absoluendum, & in publi-
cum emissendum statuerat, multisq.
artis Medicæ cultoribus certâ spem
de Obseruationum suarum colo-
phone

phone publicando spem fecerat . At
posteaquam inopina morte opti-
mus & vigilantissimus senex maxi-
mo patriæ nostræ luctu præventus
fuiſſet, innumeros promiſſorum ex-
ſpectatione fruſtraſſe videbatur: niſi
ego, cū ſcirem boni heredis eſſe
etiam fidem & promiſſa defuncti
teſtatoris , quoad fieri poteſt , præ-
ſtare, viri clariffimi & optimi patru
mei deſiderio , multorumque peti-
tionibus vna opera ſatisfaciendum
eſſe duxiſſem: quāquam ob aſſiduas
& multifarias in hoc meo reipub.
munere occupationes, tardiùs quàm
aut ego ipſe vellem, & fortasſe mul-
ti deſiderabant. Licet enim hæc iam
publicis vſibus deſtinata eſſent , ali-
qua tamen in iis opus cura à mea cu-
ra & labore, quem duabus de cauſis
potiſſimū lubenti animo ſuſcepi.
Vna ne patriæ meæ & tot viris ami-
cis ſymmifſtis vtilitatem huius ope-
ris

ris tam longo usu obseruati & dili-
genti experientia firmati inuidisse vi-
deri possem. Altera quod vos viri
amicissimi præter ceteros sæpe ab-
sentem me litteris, præsertim graui
& potenti suadela ad patruī mei po-
stuma scripta non solum hæc præ-
sentia sed reliqua omnia recensenda
redigenda & publicanda, perpetui
hortatores fueritis. Quarum postre-
ma tantum apud me ponderis, tan-
tum momenti habuit, vt cogitaue-
rim nimis me excordem officiique
immemorem habendum fuisse, si
hunc librum nulli, aut non potius
vobis consecrassem. illud namque
temeritatis, hoc ingrati hominis vi-
tio adscribendum. Quotus enim
quisque est qui non putasset me te-
mere ausum, si hunc fœtum postu-
mum & orbem, omni tutela pror-
sus destitutum, in luminis oras, in
hominum manus & adspectum edi-
dissem.

*

3

dissem.

dissem. Quis me non ingrati merito
accusasset, si alios quàm vos spectate
fidei meos, & patru mei amicos
huius postumi tutores & suscepto-
res eligendos animo meo cogitas-
sem. Quocirca hac in re nihil anti-
quius putavi quàm hunc librum ve-
stri nominis notis insigniendo ami-
citiae & gratitudinis publicum mo-
numentum affigere. Vos ergo pro-
pitios huius susceptores præstate, ve-
stra tutelari præsentia eum cohone-
state. Quod si feceritis ad reliquas
patru mei Observationes studiosè
redigendas & quamprimùm publi-
cæ utilitati consecrandas magnum
animum addideritis. Valete Viri Or-
natissimi. Alcinariæ, ipsis Kalendis
Martii, anno 1599.

Vestri studiosiss.

ADAMVS FORESTVS.

MEM.
PETRI FORESTI
MED. ARTIS OPERIBVS
CLARISSIMI.

NORIS ut hospes, ossa quanti marmore
Sub hoc reposita sint viri, sic accipe.
Sunt illa PETRI, è gente quem FORESTIA
Cali benignior, bono mortalium,
Magni beârat aura mente Hippocratis.
Hac, artis usu fontibusq; Iatrîcæ
Orbi relictis, ceu perenni lumine,
Iam maior annis septuagenario,
Nil mente fractus, hos ut artus exiit:
Desiderat lugetq; ciuem patria,
Æther recepit, quo fide retenderat,
Famâ relictâ posteris industria.
Nunc hospes i, quò fata te vocant tua,
Sua gratulatus optumo FORESTIO.

Præceptori & amico vet.

Petrus Hogerb. Med.
mœrens B.M.P.

* 4 EIVS.

EIVSDEM
IN HAS
OBSERVATIONES

A D
ADAMVM FORESTVM

professione & amicitia sibi
coniunctissimum,

Epigramma.

PROTVLIT in lucem vigilans ut cura
FORESTI

*Artis & ingenij clara trophaea sui:
Et, velut euicto stabuli squalore, retexit
Paonias aui nobilioris opes;
Ars ne longa, brevis ne vita sit artis ab usu,
Praestitit hic magno vix minor Hippocrate.
Pars opere è tanto nostros ne desit in usus,
Progenio ingenuè promiss, Adame, tuo,
Viq; malis norint muliebribus arte mederi
Solertem incautus praefacis ire ducem.
Hâc petitur, quæ stat benefactis gloria. macte,
Ingenio patrui, macte FORESTE tuo.*

IN

IN LAVDEM

CL. V.

PETRI FORESTI,

Parodicum Carmen è Propertio.

MOENIA facundo si debent Graia Galeno,
Si debet Celso maxima Roma suo:
Debet & immensum Batavum bona fama
FORESTO,

Illius aeternum nobilis à calamo.

Qui nunc egregias medicandi suscitât artes,
Nataq; Latœ munera numinibus.

Cedite Romani scriptores, cedite Grai.

Nescio quid maius nascitur Hippocrate.

Tu canis egroti subter praeordia flammis,
Phthisin, & attritis hydropa visceribus,
Viq; mali possint corrumpere corpora succi,
Haustus & infectis spiritus aëribus.

Felix, qui tristes herbis medicare dolores,

His licet in vanum saepe sua ira manet.

Felix ille, cui tentat legibus ager,

Crudelis morbi carpere nequitiâs.

Quamvis ille malo lassus superante recumbat,

Curatur facili non minus auxilio.

Tu reuocas Coe veteris praecepta senectæ,

Quæq; iuuet radix, quæq; sit herba nocens.

Tale teris docto medicamen pollice, quale

Cynthius ipse suis temperet articulis.

*

5

Te se-

*Te sequitur Latia dulcis facundia linguae,
Seu iuuat hanc scripto, seu fluere eloquio.
Attica nec desit, ut tu omni à parte valeres
E Medicâ tristem tollere barbariem.
Quod facis, & factò astringis tibi secula
cuncta,
Ne possint laudes vlla tacere tuas.*

T. Velius Med. Horn.

MEM.

PETRI FORESTI

medici nostræ ætatis ce-
leberrimi.

Duo vltimi versus annum obitus denotant.

HEV! nimiam patriæ fatis ereptus iniquis,
Occubuit, medicâ celeberrimus arte,
FORESTVS:

*Insignis pietate senex, quæ Phæbus, & omnes
A Phæbo Musæ sacris fouere sub antris
Vnguibus à teneris; & donec vita manebat,
Certandi inter se studio, sua dona tulerunt.
Quæis tantum semper, geniû comitâte labore,
Claruit ante alios, quantû inter cætera Phæbe
Sydera, fraternis per cælum lucida flammis.*

Tuna

Tum grauitate valens, qualem sese ore ferebat
Inter tot, tantosq; viros, quos aula potentes
Vsdit, & ipse suis toties ad posse reduxit
Artibus, attracto dū Mors nigra cornua neruo
Lunat, in aduersos vibrans sua spicula vultus,
Quae mox auertit, vacuasq; retorsit in auras.
O Libitina, ferā monstrum crudelius hydrā!
Quantum erat ut sineres, alios cōtenta tulisse,
Hoc saltem superesse caput, quo vindice tuos
Vidimus, ad motis ferē quēis sua praeuit alis
Pharmaca, diuersā querens ratione salutem.
Nec sumus ingrati, tibi nos debere fatemur
Quod datus est nobis, & adhuc iuuenile va-
gantem

Inuida ad argentes non retro traxeris umbras.
Nunc Morbi reuocate animos, mæstumq; ti-
morem

Mittite, non equidem vobis infestior alter
Hippocrates Batavus nascetur origine quisquā.
Ecce iacet tumulo, quem formidare soletis,
Et vaga quem dederat cursum fortuna peregit
Ægrorum luctu, factog; hīc sine quieuit.
Sed taMen IngenII post sæCVLa Longa
Vigore
VIVet, & eVeCiVs CapVt InternVbILa
Condet.

I. Rietwijck Alemar.
Iuris candidat.

O L E

ODE

AD N. V.


AD AMVM FORESTVM.

IACTABAT olim natus Apolline
 Templum perenni marmore nobile,
 Videbat extructasque ad aras
 Thura suas redolere fumo:
 Castum quòd herbis Hippolytum sacris,
 Nouerca mendax quem dederat neci,
 Extorset Orco, spiritumque
 In laceros reuocasset artus.
 At tu patrimæ Virginis artibus,
 Forestiorum floscule nobilis
 ADAME, dum disiecta magni
 Scripta voluminibus FORESTI
 Componis, atque in luminis aureas
 Depromis oras, dum patrui cics
 Manes, videbunt rariores
 Regna feri tenebrofa Ditis.
 Namque ille auari nauigium senis
 Doctis morari nos docet artibus,
 Prædamque cogit iam relictæ
 Protinus exposuisse ripæ.
 Quid ergo dignum promeritis tuis
 ADAME ponet posteritas tibi,
 Pro laude qua vincis Deorum
 Templaque, marmoreosque vultus?
 Sed nil superbo Pyramidum situ,
 Rubiginoso nil chalybe est opus:
 Sibi ipsa sat ponit perennes
 Pyramidas, statuasque VIRTVS.

Philippus Pynacker.

AD

A D
LECTOREM REI MEDICÆ
STVDIOSVM
PRÆFATIO.

VM superioribus annis, bene-
uole Lector, libris De penis,
virgæ ac scroti morbis finem
imposuerimus, ordinis ratio
nos monet, ut libros de morbis
muliebribus hætenus desideratos in lucem
edamus: sed ut ingressus commodior & aptior
sit ad eosdem intelligendos, breuem uteri ana-
tomen, sine cuius cognitione curatio sæpe fru-
stranea, imò nulla est, prius huc adferemus.
Anatomen enim ducem ad Dei cognitionem
rectè Galenus appellauit: nec immeritò, quan-
doquidem nonnulla occurrant, quæ nos in ipso
cursu remorantur, quorum actionem scire
nullo pacto possumus, nisi ope & adminiculo
anatomiae. & quandoque ad viuam sectionem
deueniendum, non hominis quidem, ut veteres
facitauerunt, quod nefas imò Christiano me-
dico indignum, sed brutorum: cum præsertim
animaduertere liceat, ob viuam humani cor-
poris anatomen, quæ prisci medici utebantur,
adeò malè eos audiuisse, ut nec viuos homi-
nes

Galenus cur
non secuerit
homines.

nes secare; sed ne hominis quidem cadaver li-
ceret. & hanc ob causam Galenum adductum
puto, ut ab humani corporis anatome abstinere-
ret, quod principum lege vetitum erat. Sed
hodie cum ob communem viuorum utilitatem
concedant reges & imperatores quotannis
in academiis anatomias publicas, merito
medicina studiosi huic actioni sese accingent,
nec laborem & operam recusabunt in hac me-
dicina parte addiscenda suscipere: cum &
hec incipientibus sit necessaria. quandoqui-
dem omnium medicina partium is est con-
sensus & connexio, ut altera ab altera dis-
iungi sine artis dispendio non possit. imò sine
huius adminiculo, ars manca & mutila erit:
nam in hac admirabile fabricam, nec non di-
uini numinis opus conspiciere licet; ut non im-
merito philosophi hominem Μικροκοσμον vo-
cauerint. quod & in uteri historia videre est.
Ad cuius affectiones antequam accedam, &
quales & quot sint qui ipsum infestant recen-
seam, paucis uteri situm eiusq; compositionem
accipe, & primū de nomine hoc habe. Tribus
dicitur nominibus. Primo matrix ab eo quod
mulieres partu suo matres efficiantur. Secun-
do Græcis ὤστρεον appellata est, hoc est, nonissi-
ma: aut quod nouissima omnibus intestinis ia-
cet: aut quod annis quatuordecim vacua sit
apud

Nomen.

puā virgines, & nouissimè post mutationem
tatis effectus suos per partus mulieribus re-
sistent. Tertiò verò δελφὺς dicta est, quod
patres efficiat omnes qui ex una nascuntur.
Quoad situm posita est inter duas coxas, inter Situs vteri.
vesicam & rectum intestinum; subiacet verò
vesicae, & longanoni. Incumbit uterus ante-
riore parte ab osse pubis, posteriore ab osse sa-
cro; à lateribus ab ossibus ilium tanquam fir-
missimis ac tutissimis vallibus circumdatur, ex
quibus sacro osi & pubi connectitur, ita ta-
men ut aliquo modo tendi ac in se concidere
possit, intertextis nimirum membranis carneis
& laxis, quarum interuentu uterus voluntariè
non nihil mouetur. Figura vteri tum rotunda, Figura.
tum oblonga est; supra deprimitur magis quàm
infra. fundi tamen figura, ut inquit Vesalius,
non prorsus rotunda existit; verum anteriùs
posteriùsq; depressa; superiùs obtusa, & duos
(vtriq; scilicet unum) reufos ostendens an-
gulos, qui vitulorum fronti cornua productura
assimilantur. quae tamen non in utero humano,
sed bruto videre est, ut vult Reald. Columb.
Magnitudo non equalis, ut testatur Gal. lib. De
vulvae dissectione, in omnibus existit, multo si-
quidem minor est eius quae peperit, quàm præ-
gnantis, illius quae nunquam peperit minor:
nec non etatum ratione, quibus nondum ve-
neri

Galenus cur
non fecerit
homines.

nes secare; sed ne hominis quidem cadaver li-
ceret. & hanc ob causam Galenum adductum
puto, ut ab humani corporis anatome abstinere-
ret, quod principum lege vetitum erat. Sed
hodie cum ob communem viuorum utilitatem
concedant reges & imperatores quotannis
in academiis anatomias publicas, merito
medicina studiosi huic actioni sese accingent,
nec laborem & operam recusabunt in hac me-
dicina parte addiscenda suscipere: cum &
hec incipientibus sit necessaria. quandoqui-
dem omnium medicine partium is est con-
sensus & connexio, ut altera ab altera dis-
iungi sine artis dispendio non possit. imò sine
huius adminiculo, ars manca & mutila erit:
nam in hac admirabilem fabricam, nec non di-
uini numinis opus conspici licet; ut non im-
merito philosophi hominem Μικρότερον οὐρανὸν vo-
cauerint. quod & in uteri historia videre est.
Ad cuius affectiones antequam accedam, &
quales & quot sint qui ipsum infestant recen-
seam, paucis uteri situm eiusque compositionem
accipe, & primum de nomine hoc habe. Tribus
dicitur nominibus. Primo matrix ab eo quod
mulieres partu suo matres efficiantur. Secun-
do Græcis ὤστρεον appellata est, hoc est, nonissi-
ma: aut quod nouissima omnibus intestinis ia-
cet: aut quod annis quatuordecim vacua sit
apud

Nomen.

puā virgines, & nouissimè post mutationem
tatis effectus suos per partus mulieribus re-
sistent. Tertiò verò $\delta\epsilon\lambda\phi\upsilon\varsigma$ dicta est, quod
patres efficiat omnes qui ex una nascuntur.
Quoad situm posita est inter duas coxas, inter ^{Situs vteri.}
vesicam & rectum intestinum; subiacet verò
vesicae, & longanoni. Incumbit uterus ante-
riore parte ab osse pubis, posteriore ab osse sa-
cro, à lateribus ab ossibus ilium tanquam fir-
missimis ac tutissimis vallis circumdatur, ex
quibus sacro ossi & pubi connectitur, ita ta-
men ut aliquo modo tendi ac in se concidere
possit, intertextis nimirum membranis carneis
& laxis, quarum interuentu uterus voluntariè
non nihil mouetur. Figura vteri tum rotunda, ^{Figura.}
tum oblonga est; supra deprimitur magis quàm
infra. fundi tamen figura, ut inquit Vesalius,
non prorsus rotunda existit; verum anteriùs
posteriùsq; depressa; superiùs obtusa, & duos
(vtrinq; scilicet unum) retusos ostendens an-
gulos, qui vitulorum fronti cornua productura
assimilantur. quae tamen non in utero humano,
sed bruto videre est, ut vult Reald. Columb.
Magnitudo non equalis, ut testatur Gal. lib. De
vulue dissectione, in omnibus existit, multo si-
quidem minor est eius quae peperit, quàm prae-
gnantis, illius quae nunquam peperit minor:
nec non etatum ratione, quibus nondum ve-
nerè

neri indulgere tempus permittit. Etenim minor etiam alio est iis qui nondum coierunt. In infantibus minor quam vesica est; in virginibus verò quæ ætatem florentem agunt, vesica est æqualis in iis partibus quæ suprà sunt sita quæ verò ætate progressa & venerem expertæ sunt, ac multo magis quæ iam pepererunt, in illa est maior, ita ut plerisque ad finem coli intestinum conquiescat. Ceterum postquam editus est fœtus, contrahitur quidem, sed ita ut maior sit quam ante partum. Figura eius in mulieribus non est circumuoluta, ut in animalibus quæ rationis expertia sunt, sed est cucurbitæ quæ medici utuntur ad similes; ut ait Soranus: rotundi enim ac lato fixe, qui ad fundum est incipiens ad proportionem in angustum oscillum redigitur, (osculum namque appellant primam & prominentem eius partem) quod sequitur cololum dicitur, quod remanet cervix: in hanc mentulæ tanquàm in vaginam demittitur, cuius longitudo ea est, quantum undecim apicibus digiti metiri possumus; rugosa est & membranosa, non cartilaginea; ut Herophilo placuit: ab his rugis attritio fit, ex qua miram voluptatem amantes coeundo percipiunt. Substantiam crassam uteri carneam & nerueam quoque natura voluit esse mixtam, ut dum fœtum continet, facilius extendi & dilatari possit.

possit. Tribus generibus fibrarum intertextis
 constat, ut Gal. optimè docuit, rectis inquam,
 obliquis & transuersis, ut semen pro fœtue ef-
 fingendo attraheret, contineret, statoque tem-
 pore excerneret. Interna uteri cavitates una
 est, in qua tamen, licet una sit & exigua, iu-
 xta immissi seminis qualitatem, non modò fœ-
 tus unus, sed gemini, tres, imò trecenti & 64.
 ut notant annales Hollandiæ: qui deinde non
 cellulis, sed propriis membranis inter se distin-
 guuntur. Neque adhibenda Mundino Anato-
 mico fides, qui septem cellulas in utero reperi-
 ri vult, cum experientia & ocularis inspectio
 aliter nos doceant. Rei veritas hæc est, mulie-
 ris uterum unice cavitatem præditum esse, quæ
 intus satis levis conspicitur; quamvis nonnulla
 foramina adsint, quæ nihil aliud sunt quàm
 venarum & arteriarum capita, quæ Anatomi-
 acetabula vocant, quoniam concavæ partes
 sunt, quibus semen adheret, tunc arterie arte-
 rias, venæ venas producant. In cervicis uteri
 finibus vulvam versus nonnullæ carunculae
 prominent, à quibus voluptas ac delectatio
 in cœundo non parum augetur: sub hisce vul-
 vae labellis duæ adsunt à lateribus late mem-
 branae, nymphae à veteribus dictæ, quarum
 utilitas est, ut à pulvere, frigore, & aëre ute-
 rum tueantur: sub nymphis in nonnullis virgi-
 nibus

Acetabulo-
 rum uteri
 usus.

Nympharum
 usus & finis.

* *

Vnde men-
ses fluunt.

Vasa semi-
naria mulie-
rum, in quo
differant à
viris.

Vteri con-
nexio.

nibus (non omnibus) alia membrana cernitur,
Hymen dicta à veteribus, quæ cum adest, raro
tamen adest, obstat quominus penis in uterum
immittatur: nam crassa est valde, supra vesi-
cam versus foramine donatur, per quod menses
fluunt. Uterus humanus eiusq. cervix, præter tu-
micam sibi propriam peculiarémq. à peritoneo in-
uoluitur. Vasis quoq. seminariis prædita est ma-
trix quemadmodum in viris: hoc uno tamen dif-
fert, quod in mulieribus breuiora sunt. Testibus
quoq. non destituuntur, qui superiori in parte
nonnihil depressi videntur, apud quos sita sunt
duæ latæ particule membranæ, nonnullis car-
neis fibris donatæ, quas membranas Vesalius
musculum vocavit: in harum summitate à testi-
bus, hoc est, præparatibus vasis deferentia pro-
ficiuntur, quæ in femellis non minus anfra-
ctuosa sunt, quam in viris ipsis & in meatus
cauum terminantur. Auxilio vasorum semina-
lium, illiusq. membranæ quam Vesalius pro mu-
sculo describit, sacro ossi uterus appædet. in fine
verò una cum ceruice, ossibus pubis, & coxen-
dici. A matricis lateribus bina constituuntur,
quæ duo oblonga ligamenta videntur esse, ner-
uea cauâq. ligamenti etiam munere fungi cre-
duntur: & ad summum os pubis minimè perue-
niant, ut Vesalius existimavit; sed per ea fora-
mina transeunt, quæ in nervosis tenuitatibus
muscu-

musculorum obliquorum descendentiū, ascen-
 dentium, & transversorum sita sunt, sicut in
 viris, per quæ vasis seminariis aditus patet:
 etenim feminis hi tendines perforati cernun-
 tur quamvis Vesalius id inficietur. Processus hi
 ab utero exorti prope id foramen, quod os ma-
 tricis vocatur, extra abdomen exeunt, supra
 pubem ascendunt: desinunt autem in parti-
 culam quandam excelsam in vulvæ apice cir-
 cumvolutam supra id foramen unde lotium
 exit. & hac est præcipuè sedes illa delectationis
 mulierum dum venerem exercent, quam non
 modo si mentula confricabis, sed vel minimo
 digito attrectabis, ocius aura semen hâc atq̃ il-
 lac præ voluptate vel illis inuitis profluet. Hanc
 eandem partem uteri dum venerem appetunt mu-
 lieres, & tanquam æstro percitæ virum appe-
 tunt ad libidinē concitæ, si attinges, duriuscu-
 lam & oblongam redditam esse cōperies, adeo
 ut nescio quam virilis mentulæ speciem præ se
 ferat. Hos processus, atq̃ eorundem usum primum
 animadvertit Reald. Columb. Anatom. ut te-
 statur lib. xi. cap. de utero. A venis arteriisq̃
 seminalibus tum venæ tum arteriæ ad matri-
 cis corpus tendentes deciduntur; non ut per has
 menstruus sanguis expurgetur, ut communis
 est sententia, sed ut laudabili sanguine tum il-
 la, tum cōceptus fœtus ali commodè possit. Non
 enim

Quo pacto
 cogere po-
 teris mulie-
 rem semen
 emittere.

Menstruus
 sanguis non
 expurgatur
 per venas
 uteri.

Uterus uteri.

Lotium non
exiit per cer-
vicem uteri.

animi haec sunt vene quarum ope menses fluunt
mulieribus : sed illa à vena caua diuisione
exortæ, quæ in uteri cervicem ad ipsius later
inseruntur. Vtero duo nervorum genera dona
ta sunt, à sexto scilicet pari, & à spinali me
dulla uterus in eum finem à natura factus est
ut semen utriusque sexus ad statutum tempus
contineret, & pariendi tempore infantem in
lucem produceret. Hoc huic historiae de utero
addendum est, ad eius cervicis extremitate
vesicae cervicem desinere, ubi foraminulum ad
est immediatè sub pubis osse: non enim hac in
parte articularum audienda est sententia existi
mantium per uteri cervicem lotium exire. In fe
minis ad vesicae collum non adsunt illae glandu
lae parastatae, veluti in maribus, quod vesicae
collum in feminis, tum brevius, tum latius est
quàm in viris. Verùm cum de omnibus his va
riè variè scripserint, & ne Lectorem diu mal
tumq; nostra praefatione detineamus, ipsum ad
Galenum & alios Anatomicos qui de hac re
ex professo scripserunt relegamus, haecq; in
praesentiarum sufficere arbitratur: & ad
ipsam rem (quod promisimus) accedamus.
Vale amice Lector, & nostris hisce fruiere ac
utere laboribus.

OBSER-

mitatem, plurimum gignatur. Hinc prouida natura
 viam quandam inuenit, qua corpus se se exoneraret
 statu quibusdam temporibus, id est, lunaris cursus spa-
 tio: sapius verò ipsa decrefcente, vt annotauit Aristo-
 teles. Sed vt solet natura, cum excrementa purgat,
 etiam in aliquam vtilitatem interim abuti; sic &
 vterus interim eo sanguine nutritur, quicquid in eo
 alimenti est hauriendo, reliquum verò pellendo. Rur-
 sus & ad conceptionem vitur. Hinc enim alterum
 principium habetur, vnde concipitur fœtus, augetur &
 alitur dum est in vtero. Ex quibus fit, vt si hac purga-
 tio præter naturam sistatur, mulieri multa mala cuc-
 niant; testante Hyppocrate 5. Aph. 57. cum scribit:
 Mulieri si menstrua defecerint, mala insequuntur.
 Sunt autem hæc, primum vterò propria, mox & com-
 munita vniuerso corpori. Eueniunt autem non modò
 si supprimantur, sed etiam si minuantur plurimum.
 Ac primum destituitur conceptione: hæc enim vna est
 è causis sterilitatis maxima Vnde quibus per ætatem,
 aut non adhuc accedunt, aut defiere, non concipiunt.
 Dum autem fluunt, quantum ex hac parte, semper
 possunt concipere. Aristoteles tamen voluit, mulieres
 quasdam esse quæ concipiant, etiam si non fluant men-
 ses; vt quibus non plus sit sanguinis quàm aliis restet à
 purgatione. Sed haud scio an id ex principiis Galeni
 admitti queat. Constat tamen multas concepisse an-
 tequam passa essent menstrua. Præterea vteri stran-
 gulatione vexantur, vt de causis eius dicemus; & scir-
 rhoso tumore, & cancro, & erysipelatis; & aquosi-
 tate replentur; & flatibus & vlceribus prauis gracile-
 scunt; & quadam præter modum; vt mulier illa de
 qua Gal. scribit 6. Epid. 3. 29. mutantur in viros fe-

Quando
menses flue-
re incipiunt,
& quando
desinant.

mina. Adde partes quæ in consensum veniunt: capu-
primū, 6. Epid. 1. aph. & oculi, & ventriculus ma-
affectus; demum & iecur, vnde & hydrops aliquand
consequitur. Sed de his suo loco latius. Fluere autem
incipiunt mulierum plurimis menses circa decimum
quartum annum, iuxta Aëtij & Pauli sententiam
paucis verò ante decimum tertium, aut duodecimum
plerisque autem post decimum quartum erumpunt
ex eiusdem Pauli testimonio. quo etiam tempore &
pubescunt mulieres, & mammae ipsis intumescunt
Et sic mensis purgatio est naturalis; (nisi vel quanti-
tate excedat, vel præter statas periodos effluat) &
stato tempore incipiunt & desinunt secundum na-
turam. In aliis, vt dixi, citius erumpunt 12. 13
vel 14. anno; alii rursus non ante 20. ob pituitam &
sanguinis paucitatem. Aliquibus nunquam, vt Aristot
meminit. Desinunt verò 40. aut paulo post; idq; in
aliquibus. In aliis non ante 60. & hoc pro copia ve
defectu sanguinis. Quæ enim multo sanguine & ca-
lido abundant, citius frequentiusq; purgantur. Quæ
verò crassum, vel lentum, vel paucum habent
sanguinem, tardius & parcius purgantur. Iam quo-
que maiorem copiam efficiunt ratio vitæ plenior,
otium, temperamentum frigidius, tenuitas sanguinis,
vel acrimonia, amplitudo vasorum, quæ plurima &
maxima ad vterum perueniunt. Aliis singulis men-
sibus, nonnullis vno aut plurimis mensibus intermissis,
quibusdam sapius vno mense redit purgatio. Non ta-
men cunctis eodem tempore, eademq; mensura, &
per totidem dies prodeunt. Nam multis ad duos tréve
dies, non paucis vsque ad quintum profluunt: alii
etiam vsque ad septimum: rara verò ad duodecimum
purgata

dictamnum adiunxit ; vnde mulieri toto quinquennio non purgatæ , ac sterili , purgationem euocauit ; vt & deinde conceperit.

SCHOLIA.

HACTENVS de membris genitalibus maris dictum est , & de eorum symptomatis & affectibus : nunc verò de membris generationis in feminis disserendum est , deq³ vteri symptomatis & morbis. Habet enim & sortitur vterus varia symptomata , quæ eidem propria sunt . vt , mensium suppressio , profluvium , stillicidium ; albus fluor vterinus ; gonorrhœa duplex ; vteri stragulus , ascensus , descensus , prolapsio , & conuulsio ; hinc furor , dolor : adhac quoque sterilitas , abortus , aliq³ vterum gestantis incommoda . Iam quoque varij alij morbi vterum obsident ; mola , inflatio , hydrops , calculus : & in ceruice rhagades , condylomata , & hæmorrhoides . Frequentissimum malum est cum menses subsidunt , aut intempestiuè abundant . Album quoque profluvium crebrò eas consumit , aut saltem odiosas reddit . Omnium periculosissima sunt vuluæ dolores , inflammationes , vlceres , carcinomata , vomica , atque epiphora : conuersiones letiferae sunt , quas strangulationes vocant , & quotidiana tormenta . Vulua interdum contrahitur , vel concitata miserè procidit , vulneratur eadem interdum . quæ omnia ex mala serè membri habitudine contingunt . De iis omnibus in hoc libro dicemus ; & omnium primò de mensium suppressione . Ceterùm vterus , idem Mater ab Aëcio dicitur , & Hystera . mater quidem , quod omnia animalia inde tanquam à matre oriantur : hy-

Vteri symptomata , & varij affectus ac morbi.

Quare vterus matrix vel mater dicatur.

Vide Aëtium
lib. 16. cap. 1.
de situ, ma-
gnitudine,
ac reliqua
uteri for-
matione.

Vnde men-
strua.

Hæra autem, quod omnibus visceribus hystera, id est posterior, sita sit. iacet enim uterus inter membranam peritoneum vocatam & vesicam, rectumque intestinum. Sed hæc ad anatomen pertinent, tum situs eius ac figura, tum reliqua quæ ad totum uterum pertinent. Vide Galenum De usu partium, & quæ Aëtius breuiter recenset. Uterus ad concipiendum, ad usum venereorum, ad semen recipiendum retinendumque, sætu incrementum, atque perfecti enixum, oportune ventri subiectus fuit: ut ad longum legere possimus apud Galen. 14. De usu partium. Et quia mulier viro frigidior, idcirco easdem partes ad generis instaurationem intus habet, quæ in viris extra sunt fabricatæ. At excrementa quæ in ipsis mulieribus redundant, seu redundans sanguis, ad omnium infirmissimas partes (quæ genitales sunt) feruntur. Mittuntur namque menses in venas quæ utero committuntur, & non attrahuntur: nimirum cum uterus ad delationem eorum nihil conferat, ut 5 De simpl. medic. facult. testatur Gal. Qui quidem sanguis femininû ipsis antequam concipiant singulis mensibus purgatione salubri eicitur: ubi verò iam concepere, alimentum foetibus accommodatum euadit. Diximus paulo antè quod mulierum natura frigida & humida præ virorum esse debuit: hoc certè ita ad generationem cōducebat; ut vnde alterum principium quod maxime pro materia est, decidit. Sed & in societate maris & femina alterum foris, hoc est, marem, negotiari oportuit; alterum domi, hoc est, feminam, liberos alere & rem familiarem seruare. Ob has igitur causas facillè femina copiam crudi sanguinis & excrementosi acernant; ut qui per exercitationes non absuratur, & per naturam, ob caloris infirmitatem,

hoc medicamento sequenti: & dicatholici ʒvj.
elect. indi maioris ʒiij. syr. capill. ven. de artemi-
sia, añ. ʒβ. cum ʒiij. decocti melissæ, pulegij, ar-
temisiæ, fiat potio sumēdamanē hora quarta ma-
tutina: qua & aluum copiosē deposuit. Post ge-
minam purgationem, consului vt altero die le-
quenti balneo se lauaret: & artemisiæ, foliorum
lauri, conyzæ, origani, maioranæ, melissæ, nepi-
tæ, chamæd. chamæpit. thymi, pseudonardi, seu
lauendulæ, rorismarini, añ. iij. florū chamæmeli,
meliloti, flor. rorismarini, sambuci, añ. p. ij. bac-
carum iuniperi, lauri, añ. p. j. seminis lini, fœnu-
græci, añ. ʒj. coquantur in aqua q. s. pro balneo;
in quo sedeat, & aliquam portionem herbarum,
tum reliquiarum dictarum, ponat in sacculum,
quem supra ventrem intra umbilicum & pecti-
nem detineat. illudque balneum continuetur
manē per quatuor aut quinq. dies; & in eo mo-
retur optimē calfacto, si potest, per horā vnam.
Et cum ex eo egredietur, vngantur venter infra
umbilicum, inguina & pæden, parsque poste-
rior ei opposita, & renes, calido hoc vnguento:
& olei lilior. amygd. dul. butyri recentis, medullæ
cruris vituli, añ. ʒj. olei irini, amygd. amaran.
muccag. althææ, sem. lini, fœnugræci, añ. ʒij. succi
rutæ, artemisiæ, añ. ʒβ. ceræ q. s. fiat vng. molle.
quo vngantur partes dictæ, seque mox in lecto
componat; ac sumat rursus tunc theriacæ veteris
ʒj. cum iure cicerum. At cum illa se à lotionē in
balneo excusaret, imperavi vt saltē dicti decocti
fumum per infundibulum reciperet. His per-
actis, appetente tempore eruptionis, nempe pri-

mo quadrato lunæ, consului vt venam in tal
 incideret. Obseruatum enim est, ex quadrato
 lunæ motu feminas pro ætate purgari: prima
 purgationes quadrato primo ex adolescentia
 vltimas ex quadrato vltimo, desinentibus men
 sibus; reliqua media ætate pari modo ex secundo
 & tertio expediri menstruas purgationes. E
 quibus naturalis collectio excipitur, iuuenibu
 nouilunio missio sanguinis utilis est; senibus veri
 senescente luna conuenit. At cùm hæc mulie
 albidior ac carnosior esset, venæ non apparebāt
 ideo vt infra femora adhiberentur cucurbitula
 cum scarificatione, iussi. Vbi frigidi abundan
 succi, & frigida sit corporis intemperies, cum
 crassis & frigidis humoribus; post præparationē
 & purgationem, etiam hîc sanguinem emittere
 ex malleolis conuenit. non tamen in multa co
 pia, vena incisa, vel adhibitis malleolorum sca
 rificationibus; potissimùm si mulieres albidio
 res ac carnosiores fuerint. eæ enim paruas in cru
 ribus venas habent, & sanguinem asseruare te
 nuem solent; iuxta Galeni sententiam lib. De
 curat. rat. per venæ sect. Post adhibitas illas cu
 curbitulas, aliis iam dictis remediis præcedenti
 bus, menses aperti fuere. Ego in his quæ albæ
 sunt & pauci sanguinis, quoties inciderunt in
 eam obstructionem vt suppressi vel imminuti
 sint menses, vtor scarificatione crurum, & corni
 culis trahentibus: nec parum conferre vidi. Si
 hîc non iuuisset, deuenissem ad decoctum ligni
 Indici, admiscendo dictamnum. Sic aliàs lac
 chinus doctissimus lignum Indicum coxit, &
 dictam-

OBSERVATIONVM
ET CVRATIONVM
MEDICINALIVM

Liber vigesimus octavus:

DE MVLIERV M MORBIS
ET AFFECTIBVS:

PETRO FORESTO *Alcmariano;*
Reip. Alcmariana Medico, auctore.

OBSERVATIO I.

*De mensibus, seu menstruis purgatio-
nibus, retentis.*

MATRONÆ nobili annorum 25.
cū longo tempore menstruæ
purgationes essent retentæ, cor-
poris grauitas superuenit, ac
nausea & cibi fastidium: quæ
cū somnolentia euaderet, & ad
omnem motum segnis, à pituita copiosa & ve-
narum ora obstruente conieci, menses iam dudū
constitisse. nam colore candida apparebat; sub-
inde & plumbei coloris; pituitam assiduè excrea-
bat; & vt ab eadem intellexi, etiam eandem ali-
quando euomebat; vrina insuper erat aquosa.
Hæc cū in ea animaduertterem, & consilium à
me peteret, vt consuetō more fluere possent, cū
iam tribus annis eas ipsas non experta esset; &

A

ad

2 DE MULIERVM MORBIS,
 ad cachexiam inclinata esset, temperamento natu-
 rali etiam pituitosa, curationem hoc modo
 institui à pharmaco materiam pituitosam mi-
 nuente: R. pilul. de hiera simplici, pilul. masti-
 chinar. de agarico, añ. ʒ j. excipiantur aqua artemi-
 siæ, & fiant pilulæ vij. quæ circa noctis dimi-
 dium sumebantur. Deinde bis in die capiebat e
 hoc clareto: R. rad. petros. fœniculi, apij macera-
 in vino albo (acetum nocet vtero) añ. ʒ j. rad. ru-
 biæ tinctorû, seu erythrodani, valerianæ, añ. ʒ j.
 rad. præoniæ ʒ iij. artemisiæ, pulegij, chamæ-
 chamæpit. melissæ, calaminthæ, añ m. j. thymi n.
 ʒ. florû rosimarini p. j. sem. anisi, dauci, fœnicul.
 añ. ʒ j. ʒ. seminis carthami ʒ ʒ. polypodij querc. ʒ
 coquantur in aqua communi pro lib j. ʒ. colatura
 adde syrupi de artemisia, de byzantiis sine aceto
 de eupatorio, añ. ʒ j. adiecto saccharo albiss. pr.
 sapore delectabiliore, aromatizetur ʒ iij. cinna-
 momi selecti, & fiat clareti instar. cuius agrotan-
 bis in die capiebat cyathos duos, vnum manè, &
 meridie hora quarta alterû. Deinde illam purgau-
 cum pharmaco sequenti, quo magis se delectat
 dicebat, quâ pilulis: R. benedictæ laxat. elect. hie-
 ræ picræ, diaphœnici, añ. ʒ ij. agarici trochis. ʒ ʒ
 dissolue cum decocto artemisiæ, pulegij, ad ʒ iij
 addēdo syr. de artemisia ʒ j. misce. Sumpsit sum-
 mo diluculo, & septies aliu excreuit. Die sequēt
 in diluculo exhibita fuit ʒ j. theriacæ veteris cum
 ʒ ij. vini albi. manè, inquam, sex horis ante ci-
 bum. Cùm humor ille vnica purgatione expur-
 gari non posset, rursus mense proximo sequenti
 claretum repetiuimus, ac eandem purgauimus
 hoc

& Gradus ac Gatenaria testantur) ʒ. j. folior.
 lenæ ʒ. vj. agarici feminini albi leuis ʒ ij. zin-
 zib. albi ʒ ʒ. glycyrr. raf. ʒ ʒ. vuar. pass. ab arillis re-
 purg. ʒ j. fiat omnium decoctio in aqua commu-
 ni pro ʒ viij. stent infusa per noctem: manè for-
 tiss. expressioni adde, syr. de artemisia, de quin-
 que rad. añ. ʒ j. misce pro ij. dosibus. Deinde im-
 peraui, vt hoc modo purgaretur: & pilul. sc̃ti-
 da. aggreg. añ. ʒ j. agarici trochis. pilul. mastich.
 añ. ʒ ʒ. cum syr. de artemis. fiant pilulæ vij. den-
 tur post mediam noctem. Gregiè enim confe-
 runt semel in hebdomada eiusmodi pilulæ ma-
 stichinæ cum agar. vel de hiera simpl. cum aga-
 ric. Istis enim diuertitur materia ad intestina, ne
 amplius ad vterum confluant, aut in eo coacer-
 uentur. Deinde paulo ante tempus mensiū iussu
 vt sanguis extraheretur ad vncias tres quatuor-
 ve, vel paulo plus, ex saphena seu talo, cum in
 poplite nostri chirurgi non soliti sint venam se-
 care. Sumta etiam ʒ j. pul. dominarū, adiecto ʒ j.
 pul. sabinæ cum vino Rhenano, mensibusq. ita
 apertis, rectè se habuit. Pulueris dominarū hæc
 erat descriptio, qua tunc utebamur: & in officina
 nostra Delphis apud Theodorum Clotium, qui
 cognatā vxoris meæ duxerat, parata habebatur:
 & seselios, cumini, marathri, añ. ʒ ij. ʒ. curcumæ
 ʒ iij. nucis muscatæ, calami aromatici, añ. ʒ ʒ. ga-
 langæ, zedoariæ, cassiæ lignæ, macis, caryophyl.
 anthos, añ. ʒ ij. cinnamomi ʒ ʒ. croci ʒ j. misce.
 Sed & hoc modo ab aliis paratur: & cinnamomi
 electi, curcumæ, sacchari, añ. ʒ ij. zinziberis, ca-
 ryophyl. macis, nucis muscatæ, añ. ʒ ʒ. baccarū
 iuniperi,

iuniperi, lauri, galangæ, añ. ʒ ij. sem. zedoariæ croci, añ. ʒ j. misce. fiat pul. Alius pul. dominarum: & rhab. ʒ ij. β. galangæ ʒ j. rad. zedoariæ, sem. fileris montani, cinnamomi, nucis muscatæ, añ. ʒ vj. macis ʒ β. caryophyl. ʒ ij. cumini, fceniculi, calami arom. gran. iuniperi, baccharum lauri, anisi, añ. ʒ β. sacchari candi ʒ ij. fiat pul. Amsteldami apud quosdam in vsu erat huius ultimus. Sed primus mihi magis placet, quod commodè frequenter vsus sum.

SCHOLIA.

Quæ pars
afficiatur
in mensium
suppressione.

Quis affe-
ctus præter
naturam sit
mensium
suppressio.

Causæ.

Ex parte
uteri.

SEMPER sanè ipsi utero tribuenda affectio videtur, eo vel primariè, vel secundariè & per consensum affecto; etiam si totius corporis vitio fiat: rectè enim dicemus, uterum ipsum affici, cum non perveniant ad eum ea, quæ antea, cum secundum naturam se haberet, venire solebant. Quòd verò hoc vitium sit symptoma in genere retentorum immodicè, liquet apud Gal. lib. De differ. & 3. De causis sympt. Cum igitur inutiles suppressiones curare volumus, à quibus de malo metus est, inuestigabimus causas omnes, quibus supprimantur vel minuantur. porro minutio est, ut vel periodi rara sint; vel si in tempore, ut exiguum sit quod profluit. Causa igitur alia sunt ex ipso utero, alia ex totius affectu. Ex ipso quidem utero, vel quia sanguinem non suscipit; vel, si suscipiat, non expellit. Ex toto verò, quoniam sanguis ad uterum non pellitur. quòd verò non pellatur, aut penuria est, aut crassities eius, aut auersio in alias partes; adde & rectricis naturam opus destituere, quoniam occupatur animi

impropriè loqui intendimus, quæ præter naturam existit
ex quâpiam præternaturali causa orta, vel totius cor-
poris vitio, vel vteri & partium eius proprio; ut exem-
plis etiam subsequenribus ostendemus.

OBSERVATIO II.

De menstrua purgatione subito retenta.

ANNO 1581. Margareta Godefridi, Del-
phis, cum sororis eius filius, quatuor
aut quinque annorum, in aquam incidisset,
& viri adstantes statim puerum non extrahe-
rent, ipsa in aquam saltavit, & ferè cum puero
aqua obruta ac suffocata fuit, nisi duo viri tam
illam quàm puerum extraxissent. Ad hanc euo-
catus sub noctem 14. Maij, cum ipsa circa præ-
cordia valde afficeretur; (nam & menses ei pro-
fluebant dum in aquam saltaret; atque illi tunc
subito restricti præcordia valde infestabant)
statim, ut sudor prouocaretur, decoctum sequens
propinaui: & decoctionis aquæ florum cha-
mæmeli ℥ iij. oxymellis simplicis ℥ j. misc. calidè
cum ebibisset, in lecto vestibis bene cooperta
ègregiè per totam ferè noctem sudavit, & unam men-
ses suppressi statim debitè fluxerunt; ita ut dein-
de aliis remediis opus non fuerit. At famula
cuiusdam zythepse, seu cereuisiarij, paulo plus
quàm annos viginti nata, cum consuetas purga-
tiones menstruas haberet, & nudis pedibus pa-
uimentum aqua detergeret, tum scopis purga-
ret (ut hinc sæpe fieri assolet, quia nostræ Batauræ
mulier-

mulierculæ valde munditie intentæ sunt, & curiosæ vt omnia niteant;) subitò menses eide retracti fuere, & longo deinde tempore confusis periodis non fluxere: vnde & nauseabundus cibos fastidiebat; & circa lumbos tandem, tum scapularum capitisque & totius corporis dolorum gravitate corripiebatur. Hæc cum lotio consultandi causa me accessit, quod crudum erat & ideo de inappetentia, & nausea, ac cibi fastidio, tum dolore circa ventriculum iudicavi. Secunda causa ab eadem intellecta, quod menstrua purgatio hoc modo retenta esset, neque aliquot periodis fluxisset; cùm viderem famulam hanc nequaquam opulentam esse, vt sumptus ferre posset, atque Galenus nos docuerit 6. De medicamentis compos. quod secundum ægrotantis possitatem, opulentiam, aut pauperiem, medicamenta pretiosa vel parui valoris à Medico sint præscribenda; ideo potius decoctum mihi præscribendum proposui longum, quod simul digerere præpararet materiam pituitosam (cùm talis esset obstructione in illa coaceruata esset; atque adeo pituitosa ipsa erat) & expurgaret, in quo omnes scopi curandi continerentur, & subtiliandi, & digerendi ac euacuandi simul: nam hoc modo ferè aperiuntur menses. Tale itaque decoctum præscripsi: & rad. apij, petros. valerianæ, fœniculi, añ. ʒj. melissæ, artemisiæ, calaminthæ, pulegiæ, matricariæ, añ. m. j. sabinæ m. ʒ. florum chamæmeli, roris marini, añ. p. j. sem. anisi, carui, dauci añ. ʒj. ʒ. seminis nigellæ (egregiè menses educit) vt & eius farina in panno ligata, & supposita; v

verò ratio est ex his quæ ab initio posuimus, quòd illæ plurimum sanguinis acervant, & cum eo plurimas ruditates; hæ verò minimum. Et quidem ita fieri videtur, ut viragines & calidæ mulieres quam minimū purgētur, præsertim si multo utantur exercitio: contra verò humida, siquidem omnia secundum naturam esse habeant. Quod addo, quoniam calida sicca, ut etiam Iacchinus doctissimus dicebat, si bili multa abundent, & ita cacochymia teneātur, ob sanguinis acuitatē & tenuitatem plurimum purgantur: quoniam non absumitur in corporis alimentum: contra verò humidis sæpe venæ obstruuntur; itaque aut non aut agere purgantur. Subdit Hippocrates: Et nisi crebriò profluant, intumescant. Sic clarior legitur, Iacchino teste, quàm, celerrimi: volens significare, unum ex morbis, qui his naturis succedunt, esse hydropē, ut supra explicauimus. Tam & pinguidibus per naturam exigua purgatio fit, quia angustas habent venas, & pauci sanguinis, unde & non contempnant. Sed cur, dices, ante 14. non fiunt? Quare ante 14. annum purgatio mentitua non fiat.

Cur non post quinquagesimum annum ut plurimum non fiant, causa est caloris diminutio, ob quam & sanguis non adeò abundat in venis; & si abundet, non est ea vis natura, ut per longinquas paries possit expurgare, & per venas angustiores intrudere, earumq; ora aperire. Vnde quibusdam ad sedem effluit, quibusdam ad aliam partem, si forte per naturam

Supprimun-
tur menses
quibusdam
secundum
naturam.

turam redundet: & sunt ea via faciliores. Cùm in-
que mulieres menstrua purgatione omnino care-
vel naturale est, vel præter naturam. Naturale qu-
dem, quantum ad ætatem attinet (vt diximus) si vel i-
fra 14. vel vltra 50. annum. Tum & aliis modis
nam prægnantibus secundum naturam menses supp-
rimuntur, quoniam absumitur in fœtus alimentum
omnis sanguis qui abundat. Quamobrem & men-
tunc effluere præter naturam est, & debilitas fœtus
significatur, & abortus; vt Hippocrates 5. aphor. i.
statuitur. Quamuis quibusdam sæpe sanguis sine no-
effluat, vt si abundet: nec obstat, os vteri eo tempo-
prorsus esse occlusum. Id memini evenisse vxori D-
mini Præsidi Hollandia Cornelij Susij, quæ tam-
non est passa abortum: potest enim ex vteri ceruice
effluere. Aliud tempus cessationis est à partu. Mul-
enim duas vel tres periodos intermittunt: quod acc-
dit ex multa purgatione in partu facta, vnde corpus
est copia inanitum. Nam & mulieribus lactantibus
supprimuntur menses, citra noxam aliquam. Simil-
ter & cantatrices & saltatrices, quoniam quicquid i-
eis superfluum est, nimia exercitij vehementia con-
sumit, non purgantur: & in summa (vt inquit Aë-
rius) mulieres calidioris naturæ & temperaturæ, &
fortibus exercitijs vtentes, & agrestes, parum pur-
gantur. Supprimuntur etiam secundum rationem, v-
extenuatæ, longam incediam passæ, longosq; morbos
Hi ergo non est quod temeremus prouocationem. Atq;
facile cognoscimus an secundum naturam menses sup-
primantur; quoniam mulier nulla inde molestia ve-
totius corporis, vel vteri, afficitur, vt inquit Aërius
Atqui non de hac, sed de ea mensium suppressione no-
propri-

rgata sunt. Quae plus habent sanguinis, ad quinque
septem dies purgantur. Plerisque etiam minus dua-
m heminarum mensura quatuor dierum spatio, in-
positis duobus viginti diebus, aut ad summum tri-
ata, singulis mensibus deferuntur. Sana igitur mu-
ri (inquit Hipp. 1. De morb. mulierum) sanguis men-
uus exit victima iugulata sanguini similis, rubens.
Fuit autem duarum heminarum Atticarum men-
ura. Quae non, ut Fuchsius Aph. 30. lib. 5. olei men-
ura aestimanda est, sed sanguini; ut redeat circiter ad
et semisextariolos Luterianos; ut refert Hollerij in-
pres: natura tamen, aetate, & similibus perpensis,
q³ diebus iam dictis. initio vero & fine pauciores &
enuiores sunt purgationes; intermedia purgatione
lures & crassiores, praesertim ubi multa fluunt.
Aristoteles cap. 2. 7. De Histor. animalium, moueri scri-
it decremento lunae; & hac crescente colligi: unde ca-
illo sexum femineum lunae tribuunt. Aliter tamen
ape experimur. Iunioribus vero, ut alij volunt, ad lunae
lenilunia; aliis ferè decresciente. Hinc versus:

Luna vetus veteres, iuuenes noua luna requirit.

Solent autem erumpere plurimis cum ybera ad duos
digitos prominent, & vox in grauiorem mutatur; quo

tempore ad usum veneris maximè incitantur: sunt
enim per id aetatis nobiles; nempe 14. anno, aut 11.

vel 12. ut diximus. Sed haec sunt vita breuiores; ut qui-
bus erumpunt tardius, viuunt diutius. Testatur ta-

men Siluius se ex Iohanne Capella, seniore Medico
Francisci Regis. vnde quaque doctissimo, intellexisse,

visam ab illo puellam annorum nouem vterum ge-
stasse simile etiam affirmat Saucnarola. At iuxta Pau-
lum & Aetium 14. anno primum fluere, antea dictum

Quando in-
cipit primo
occurrere
purgatio
menstrua.

Quando
durant.

IO DE MULIERVM MORBIS,

est. Porro, inquam, desinunt menses plerisque anti-
quingagesimo: pauci verò vsque ad sexagesimu
durant: nonnullis, praesertim obesis, à trigésim
quinto anno menses cessare incipiunt; ut eisdem aut
ribus visum est. Ceterum sanguis qui profluit cop
paulatim vsque ad vigorem aetatis augebit: deinde
aliquandiu aequalitatem seruans, paululum penitus
crescit, aut minuitur. At ubi ad finem tendit, paulu-
tim rursus minuitur, donec in totum desinat; eode-
m ratio teste. Dicimus itaque, praeter naturam sisti, at
imminui, quoties primum extra statuta tempora ha-
ec accidit: quae tamen terminos certos non habent; sed
pro naturarum varietate euariant. Sed postremo
terminus cessationis est, annus quinquagesimus: vnde
& in ea aliqua etiam nostra aetate pepererunt. Bre-
uiter, aliis aliter naturalis purgatio cessat, 40. 45. 50.
aut 60. aetatis anno; pro copia videlicet, ut dictum est
vel defectu sanguinis. Quod si vel post 14. incipiant
vel ante annum 45. cessent, ex aliqua causa prae-
naturam id fieri censendum est. Fit verò etiam varietas
multa non in celeritate apparēdi solum & duratione
sed & in copia effluuii maiore, vel minore: idq; ex na-
turarum diuersitate. Dicebat enim Hippoc. 6. Epid. 1.
aph. 7. aquosius mulieribus diu menses durare; & n-
crebro fluant, intumescere: per aquosius mulieres in-
telligens praehumida praeter naturam corpora; quae se-
penumero frigidiora etiam sunt. His igitur inquit di-
purgationem hanc durare; seu intelligas per multam
aetatem fluere, seu quod singula periodi multum tem-
poris occupant. His ergo cum secundū naturam fiant
abundantiores, colligendum est, quod contrario mod-
affectis, id est, calidis & siccis, pauciores fiunt. Horum

ver

nimi vel corporis morbo. Sic multis ob mororem in-
 centem, & tumorem suppressi sunt menses: sic ob dolo-
 rem aliquem corporis abortum. Ex parte autem vteri, Ex parte
vteri.
 quod sanguinem non suscipiat, venarum affectio est,
 et siue frigido desentur, siue sicco squaleant & canni-
 ceant. Quod vero non pellat vterus, obstructio in cau-
 a est, siue a crasso & viscidis fiat, siue tumore prater
 naturam, siue cicatrice obducta post vlcus, siue sua de-
 litate, ex intemperie frigida aborta, aut pinguitu-
 line. Fit & obstruatio contorsione oris vteri. Vnus
 usque & precipuus vteri affectus retentionis men-
 suum causa, eius densitas atque duritia existit; siue a
 natura corpus eius tale conditum fuerit; siue certo tem-
 pore vterum occupauerit: angustia item venarum
 vteri statim a principio congenita; ubi scilicet hac par-
 te semina male est formata, aut eorumdem vasorum
 compressio, ex his quae circum iacent facta est, cum
 videlicet corpus immodice pinguescit. Nec non &
 eiusdem vteri intemperies, ut paulo ante diximus,
 quaedam tum natura, tum sub quibusdam affectibus
 orta, suppressionis mensium causa existit. Interdum Ex vitio
sanguinis.
 quoque menses retinentur ipsius sanguinis occasione,
 quotiens quod vacuatur vel crassum est, vel glutino-
 sum. Quin etiam si ipse sanguis menstruus sine vitio
 sit, sed ipsius potius inopia fiat retentio, & menstrua
 opprimantur, aut quia aliò auersa copia vacuatur,
 nihil inde mali suspicandum est euenire. proinde neque
 hac ratione curam ciendorum mensium suscipimus.
 nisi quia concipere nequeunt, ideo tamquam sterilitatis
 causam tollentes, menses euocamus. Ceterum in vasis, Ex vitio va-
sorum.
 quae ad vterum pertinent, si obstructio quadam, vel
 obstruatio prius facta sit, sic quoque menstruum reti-
 nebitur;

B

nebitur;

nebitur; vt Gal. testatur 3. De causis sympt. & Comment. aph. 28. lib. 5. Vitio itaque vel propria substantia ipsius vteri, vel vasorum, quæ ad ipsum pertinent aut eiusdemmet sanguinis, qui ad ipsum deuenit, contingit menses supprimi. Nos autem cum Donato Altomari cunctas has causas vteri vitio provenire sciremur: quemadmodum etiam si ob robur vasorum eiusdem vteri sanguine ipso ad alias particulas delatæ contingat menstruum detineri, eidem vtero vitium tribuimus. Sic si ob inflammationes, seu eius cervicis distorsiones, aut peruersiones, seu callos, aut carni excrecentias istic exortas, aut pinguedinis copiam, mensium purgatio prohibeatur, ad vteri vitium referendæ erit: nec minus si pellicula aut circa collum, aut osiculum vteri fuerit adhaesita: quemadmodum his accidunt quæ imperforata appellantur. Sive etiam vlcerum cicatrices, quæ vasorum oscula in vtero excatant (vt cicatrix obducta post abortum, ob quem vteri fuerit exulceratum) menses detinebunt, etiam vteri occasione id fiet. At totius etiam corporis culpa aliquando prorsus, vt diximus, non purgabitur seminaturn propter plura exercitia, tum propter tenuen victus rationem, tum propter succorum ad alias particulas inclinationem: & cum hæc ipsa mediocria sunt, minus quàm pro naturæ debito purgabitur, vt eodem 2. De caus. sympt. à Gal. scriptum est. Nos verò cunctas tum externas tum internas suppressionis mensium causas totius corporis culpa dinumerabimus, ab externis orientes. Assidua igitur cura, immodicus timor, ac mæror ingens, menses supprimunt (Aëtio teste) item alimenta vel infra vel supra modum ingesta: nam modicum alimentum statim transpirat; multum verò meatu

Ex parte totius corporis causæ.

Externæ causæ.

neatui obchurat, & excretionem intercipit. Cibi quoque frigidi & crassi, & potus aquae frigidae, intrassant sanguinem, & calorem naturalem hebetiorem reddunt. Et sicuti nimius calor exterior exsiccat menses, ita & frigus constringit. Nimia quoque exercitij vehementia (quoniam quicquid superfluum est consumit) menses suppressere valet. item quemadmodum magnus labor, & exercitium continuū; ita & plurima euacuatio, praecipue sanguinis narium & haemorrhoidum, menses suppressit, hinc mulieres agricolarum & laboratorum parcius purgantur. Contra rursus nimia tranquillitas, & vita supra modum otiosa, & exercitij omnino dimissio sanguinem intrassant, & calorem naturalem extinguunt: hinc minus per venas uteri sanguis fluit. Internae vero causae sunt, calidio-

Internae.

res aut frigidiores totius corporis temperatura: calidiores siquidem hoc excrementum discutiant ac consumunt, frigidiores vero crassiorem ac tenaciorem sanguinem gignunt, vasa uteri obstruunt. Habitus quoque graciles, aut obesi nimium: graciles, inquam, quoniam nihil penitus superflui sanguinis habent: obesi vero, seu pingues, propterea quod reliquis magis exsanguis sunt, minimasque venulas habent. Nam sanguis qui in ipsis est paucissimus, ferè in pinguedinem transit: & propterea tales minimè omnium concipiunt, inquit Aëtius, auctoritate Ruffi & Aspasiae. Obdiuturnū etiam aliquem morbum (ut & prius dictum est) feminae extenuatae non purgatur; vel propter praecedentem per nares aut sedem, aut quampiam aliam partem, sanguinis euacuationem: etiam per venae sectionem immodicè factam. potissimum ex cubiti venis, ut quodam exemplo post ostendemus. Hac enim

Lib. 16. cap.
52. De men-
sum reten-
tione, ex
Ruffo &
Aspasia.

B 2

sangu-

sanguinem ad superiores corporis partes retrahere
menstruas purgationes comprimit; Gal. auctore
cur. ratione per vena sectionem: Nec minus & reli-
qua excretionum genera; velut est multus dolor, ass-
iduus vomitus, alui profluvia, pustularum omne geni-
per cutem erumpens, morbiq; acuti & magni; men-
ses suppressere possunt, ut liquet ex eodem Aëcio. Qui-
dam etiam (ut ipse inquit) ob plenitudinem non pur-
gantur. Hactenus de causis: iam de signis, hoc pri-
interposito exemplo, agemus.

OBSERVATIO III.

*De mensium suppressione, sanguine ad
alias partes delato.*

PVELLA rustica tonsoré adiuit mense Maio
ut ex consuetudine quadam, sed peruersa
(ut apud nostros fieri solet) sanguis ex brachii
dextri vena ipsi extraheretur, cum flores suo
haberet vel tempora. Vulgares enim suo idio-
mate menstruas purgationes vocant tempora
quod statis quidem temporibus prodeant, ita &
flores appellant: quoniam, inquiunt, ut flos fru-
ctum antecedit, sic mulieres non concipiunt an-
tequam menses fluxerint. Copioso itaque san-
guine ex vena detracto, menses ilicò retracti
fuere, & substituerunt: & semper cum periodus
rediret, neque menstrua purgatio subsequeretur
in brachio eodem tempore palpitationem quan-
dam, eamque satis molestam sentiebat: cumque
id ter quaterve contigisset eo tempore cum mē-
ses redire solebant, tandem consilij causa me ac-
cessit

bonum.

essit, & quomodo menses ex venæ sectione illi
 restricti essent narrauit, symptomate illo, nempe
 altus & palpitatiois, singulis mensibus eam
 manifestante. Imperaui vt mense sequenti cum il-
 lam palpitationem persentiret, venam in talo,
 saphenam vocant) incidere iuberet, & sangui-
 nem ad vncias quinque vel plures effluere sine-
 ret; cum rustica & satis robusta esset. Ea sectio-
 ne peracta, menses statim fluere cæperunt, sym-
 tomate illo ablato; singulisque periodis exinde
 edierunt more solito, & rectè curata fuit. Eo-
 dem modo & Monacha illa seu Sororcula apud
 liuam Vrsulam, de qua egimus De vomitu san-
 guineo, cum singulis mensibus & staturis perio-
 dis sanguinem, seu menstruas purgationes san-
 guineas euomeret, sanguine ex talo seu saphena
 detracto, à fœdo hoc malo liberata est, & singu-
 lis periodis optimè menstruæ euacuationes re-
 dierunt. quæ quidem cum hac rursus colligo,
 anno 1589. adhuc viuit, & liberratè hîc orta, vi-
 rum deinde duxit, prolesq. ex eo numero quin-
 que excepit. At alteri puellæ, quæ Delphis apud
 factorem habitabat, & per nares statuto tempo-
 re, menstruis purgationibus restrictis sanguis
 effûdebat. Verùm & huic cum nostro consilio
 saphena secta esset, menses deinde debito suo
 tempore fluxere, & probè sanitati restituta fuit.

SCHOLIA.

CAUSÆ cum sint varia, variantur curationes;
 vt postea aliis exemplis quoque docebimus. Ve-

Signa de-
moltatiua.

DE MULIERVM MORBIS,
rūm cū causas iam omnes dinumerauimus, signa b
quoque prius explicauimus, anequam ad methodu
curacionis ueniamus. Signa uero agnitūis sui
per se manifesta, cū matrona uel puella plangunt &
conquerantur se flores non habere. Nupte quoque
mulieres cū purgationes ordinarias aliquando ha
buerint, si restricta sint, id quoque aperiunt, & quod
non possint concipere. Quibusdam interea, cū insta
periodus, exiguum ualde signum menstrui albi u
rubri exeuntis quādoque apparet: tamen post tres u
duos dies agrotant, plangunt ac conqueruntur d
uentre, capite, pectore, & sequuntur symptomata.
Galeno 6. De loc. affect. enarrata. Iam & haec sign
occurrunt, ut habetur de harmonia gynaeciorum, gra
uedo cum tensione lumborum & dolore, & sup
pedineq; & inguen, capitis etiam & ceruicis; cui &
bas oculorum consensunt: frequenter & anorexia
ei succurrit, sonitus aurium, feruor cum rubore vul
tus, inamillitum etiam inflatio, partiamq; mulie
brum siccitas: quae omnia occurrunt diebus purgatio
nis. Et si diu suppressi sunt menses, si a Medico non
pingentur, tumor aliquibus in ilibus, & phyma in ex
trema illius parte exaruit, quā tumor supparatus
longo tempore uix sanatur. Indicio autem est ex in
terius partibus quātipiam esse inflammatam. Non nul
lis etiam in extrema illius parte paullus excitatur, ut
liquet ex Gal. lib. 16. De loc. aff. Quod igitur prater
naturam menses detenti sunt, ex pluribus indicis di
gnosce valebis: primum autem ad maximū est Hip
poc. 34. Aph. 5. lib. cū dixit: Si mulier quae neque
gravidū est, neque peperit, lac habet, huic menstrua
defecerunt. At nulla apparente in mammis lacte, ut
refert

refert Gal. 6. Dodoc. affect. hac indicia aderunt: gra-
uitas totum corpus molestat; fastidia cibi incidunt;
terror inaequalis cum febre quandoque: & si vteri os
laudatur, cum quadam id eris duritie; propter quod
litterunt ab his quae coeperunt: quibusdam dolor cum
grauitate in vteri regione accidit, modò in vna, quan-
doque in altera parte. quinetiam in coxam dolor tran-
sit, ac crus ipsum, quod è regione est, per incessum clau-
dicat: praeterea lumborum, colli, & sinapitis dolor (ut
paulo antè diximus) qui etiam oculorum fundamen-
ta infestat, sequi solet: item febres ardentes, & vri-
nae nigricantes cum rubra quadam sanie, perinde ac
si aquae, ex qua nupex mactata carnes abluta fuerint,
fuliginem quis misceisset: quemadmodum refert Do-
natus ab Alto mari, sapius se in illustrissima Domina
Maria Sanseuerina, Comitissa Nola, talem urinam
inspexisse. Quibusdam etiam vrina aut difficulter red-
ditur, aut omnino supprimitur. Signa verò specierum
& causarum, tam totius, quàm ipsius vte. i propria, ex
propriis earundem indicis, agrotantium sermonibus,
corporum habitibus, ac ex precedenti victus ratione,
haud agrè dignosci queunt. Primum exmittentibus
etiam signa quibus causae distinguuntur capiemus, &
debilitatem eorum coniciemus: eo quòd excrementis
scatent, & morbus aliquis toti communis adest, ut in-
temperies: & priuatione aliorum, ut quia sanguis
adhuc mediocris est quāritate & qualitate, neque ob-
structionis nota adsunt, aut alterius mali vtero pro-
prij. Aversio verò & penuria sanguinis signa habent
euidencia, tum ex praesentibus, tum his quae praesse-
runt circa agram. Ita facile cognouimus in istis tribus
puellis quòd reterii essent menses, cum aliò sanguis flue-

Signa spe-
cierum.

Coniecturae
artificiales.

ut; vni scilicet per naves, alteri per vomitum, & pri-
 vix sanguine. vix ex vena sectione farsam purgatione r apex. Sangu-
 nis verò qualitas, id est, crassities & lentor, coniectu-
 ratur, primam vitam præcunte, qui contrarius ex-
 remanti fuit, cum in cibo & potu, tum in exerciti-
 tionibus vel animi, vel corporis. Sic puella quædam an-
 no 1589. cum ætus ingens esset, dum menstruas pur-
 gationes experiebat, in maxima copia bibit aquam
 frigidissimam. vnde non solum menses restricti fuer-
 sed mox symptomatis grauioribus eandem apprehen-
 dentibus, totum planè restrictum fuit, & incidit i-
 syncopen tanquam ex sanguine concreta, ita vt null-
 remedia, quantum apta, a me adhibita profuerint, a
 ipsa, vix quatuor aut quinque diebus superuivens
 extincta fuerit. Hac decumbebat apud ceruistarian
 viduam, in cuius capis malleus pro insigni erat. Ali-
 coniectura ex his, quæ in corpore apparent, & sunt pi-
 tuitosi sanguinis soboles: de colore albo, vel plumbeo
 de tactu frigido, de mole corporis subruuida, somni
 profundis, pigris, fastidio cibi. Rursus quod & se-
 riùs incipit purgatio, & cum multo labore vix quic-
 quam proficit. Sed hæc communia magna ex parte
 sunt affectui proprio uteri, id est, obstructioni, quæ
 crassis & viscidis: & sæpius hi affectus coincidunt; vt
 scilicet & totius sanguis talis sit: vt & si grauitas &
 tensio circa dorsum & pubem sentiat; & si quia
 excernitur, pituita potius attinet colore & consisten-
 tia. Quibusdam harum & perpetuò aliquid pituito-
 sum educitur: appellant album fluorem. Sed de eo pro-
 prio capite agemus. Sic igitur frigidiores temperatu-
 ras dignoscemus, iuxta Aërium lib. 16. cap. 55. somno-
 lentiores sunt, ad omnemq; motum segniores; colore
 candi-

Ex multo
 a sua potu
 poli illime
 menses re-
 stricti & in-
 di mors
 subsequuta.

vix quæ
 in corpore
 apparent
 sunt pi-
 tuitosi

Ex tempera-
 tura frigida.

adidiōres, seu plumbeæ; venulis subnigrescentibus,
 tio aquoso; pituitam iugiter excreant; interdum &
 tuitosos humores euomunt. Si corpora ob immen- Ex calida.
 m calorem exarescunt, calida temperatura, tales
 mulieres, eodem Aëtio teste, lib. citato cap. 52. sunt om-
 mo viriles, colore fusca, compacta neruis, robusta, ve-
 sa, lumbos & nates ampliores habent, pectore &
 umeris latioribus, & pilosis: talis ut virago nihil pror-
 u, vel paucissimè expurgatur. Pinguiores autem fa-
 le cognoscuntur ex habitudine. Alij verò affectus ob-
 ruentes noti esse debent ex proprijs signis, ut pingue-
 o vteri ex totius pinguedine: durities sentitur tactu,
 & oedema, & phlegmone: erysipelas vehementem
 usert calorem: conuersio ad latus, obstetricis digitis
 entitur, & propria signa habet. Signa à causis pri-
 mitiuis vel externis per inquisitionē faciliè habentur,
 sue in aëre vel aqua versata fuerit mulier: ita quoq.
 si percussa fuerit, vel vulnus ei sit inflatum, aut vlcus
 in vtero, ipsamet enarrabit. Refert Tharantanus, do-
 minam quandam, cum sepem transires, palo seu sti-
 pite per ipsam vuluam in matrice vulneratam fuisse,
 plurimumq; inde sanguinis promanasse: sed, vulnere
 curato, ob relictam indidem cicatricem menses restri-
 ctos, ut vix postea quid suis temporibus egresserit, ne-
 que deinde imprægnata fuerit. Et sic de alijs casibus
 potest fieri interrogatio, nunquid sustinuerit multos
 labores, vel tenui victu vsa fuerit, vel morbi præcesse-
 rint, aut aliæ euacuationes: quæ omnia ex relatione
 agræ, tum diligentis Medici inquisitione cognoscun-
 tur. Ita & causæ internæ. Si humores calidi biliosi
 abundant, vrina est intensa, paucæ quantitatæ, pul-
 susq; velox, mulier macilenta, biliosa, iracunda, velox

Affectus ob-
 struentes alijs
 quomodo
 cognos-
 cantur.

Causæ ex-
 ternæ quo-
 modo di-
 gnoscantur.

Causæ in-
 ternæ quo-
 modo co-
 gnoscantur.

B 5

in

in motu, coitus appetens, sitibunda, & agilis in su-
actionibus: apparent labia fissa, magis si coniunatur sic-
citas, estq; colorata. In frigidis omnia contraria, di-
colorata, somnolenta, vrina remissa, sitis nulla, cru-
ditas & grauitas in stomacho, egestiones & super-
fluitates pituitosa, mulier phlegmatica, pinguis, non
appetens coitum. Quae ratione vteri sunt, vel sangui-
nis, vel vasorum, aut totius corporis, iam diximus.

Signa pro-
gnostica.

Quod ad prognostica attinet, etiam haec adiungemus.
Quod igitur mulieribus, quae non purgantur consueti-
more, sanguinis reiectionis ac siderationis pericu-
lum imminet, seu apoplexia, testatur Aëcius cap. 52
lib. 16. Et quaedam in melancholicum atra bilis mor-
bum aut insaniam delabuntur. Talem aliquando no-
puellam prae manibus habuimus, quae in insaniam inci-
dit ex mensibus suppressis; quae tamen à nobis fuit cu-
rata vena sectione ex talo: eius historiam posuimus
cum de cerebri & capitis affectibus ageremus. Qua-
propter proroganda euacuatio eis non est, quippe
cum menstruorum oppressio offendat, maximè si à
partu supprimantur. nam non abundantiam modò,
sed insignem etiam humorum pariunt prauitatem; vt
3. De morbo vulgar. testatur Gal. Quibus autem vlce-
rum cicatrices oscula vasorum in utero excacauerunt,
& propterea menses fuerint detenti, penitus incur-
biles sunt: quemadmodum curari quoque non possunt,
vbi pellicula quaedam circa collum statim à principio,
aut osculum vteri, fuerit adnata, nisi illa perforetur,
aut refecetur; vt liquet ex eodem Aëcio. Graue ma-
lum est si diu retineantur, & haec symptomata subse-
quuntur: priuatio prolis, mania, epilepsia, vteri suf-
focatio ex materia coacta & corrupta; tensio,
vteri

teri tortuositas, uteri inflammationes, apostemata, dolores intolerabiles in uteri regione, grauitas totius corporis, mala coctio, appetitus deiectio, nausea, ructus, assus, difficultas anhelitus, hydrops, vrina & secū re-
 mio, anxietas ac tristitia, cephalalgia, dolor oculorū
 & colligantiam, & febres ob oppilationem, podagra,
 dolor sedus, imperigines, furunculi, vertigo, cum alia
 nēdicta Scholio primæ Observationis huius libri; tan-
 tem mors. Mulieri verò sanguinem euimenti men-
 truis erumpentibus solatium sit. Menstruus deficienti-
 us, sanguis ex naribus fluens bonum. Mulieri menses
 leucolores, nec per idem tempus semper venientes, pur-
 rationem indicant esse necessariam. Si menstrua plura
 iunt, accidunt morbi; & si non fiant, ex utero morbi
 contingunt. Vrina lactis modo alba & densa, aut ob-
 scura liuensq; mensium suppressorum, aut locellorum
 affectorum, argumentum est. Vrina albescentis ruffe-
 scensq; cum squamosis resolutionibus nigris, nigrisq;
 eadem arguit, modò mensium suppressorum reliquæ
 adfint notæ. Quibusdam ex mensibus diu suppressis,
 accedit syncope, tremor cordis, & subita mors. Si
 coitu afficere, eo non utatur, suffocata aliquando mi-
 sera muliercule pereunt. Virginibus quoque barba in-
 nascitur, forma corrumpuntur: & si curationem non
 admittunt, vel recipiunt, moriuntur. Ideo his omni-
 bus tempestiuè succurrendum est.

s. aph. 3 d.

aph. 36.

et 39.

OBSERVATIO IIII.

De Suppressione mensium, plenitudi-
 nis ratione.

CENITRVR Bartholdi, mulieri Alcma-
 riana, si quæ altera boni habitus, vidua,
 sed

sed valde formosæ, facie admodum honesta cum rubore decenti, temperatura sanguinis, tempore quo menses fluere consuevit moras foras profectæ, cum tempestas valida oborta esset, & tempus admodum ventosum ac pluuiosum, subito menstrua purgatio restricta fuit. eo tempore melancholia hypochondriaca laborauit, & sæpe capitis dolore, cum faciei rubore alioqui bonæ habitudinis; nec postea plenitudinis causa purgabatur. congruo autem menstruum tempore (vt talibus fieri assolet, ex Aëtio lib. 16. cap. 59. De curatione earum quæ plenitudinis ratione non purgantur) magis grauabatur dolorisque circa lumbos & lumen percipiebatur, flatuque replebatur; quem & saltus, distensiones, horroresque totius corporis necessariò subsequerebantur; plethora verò hoc malum augebat & huius causa potissimum existerat: quod præcipuè cognoui ex insigni venarum tumore. Haec cum mea cognata esset, & me vocasset, vt hoc malo liberari posset, & iterum debito tempore purgari; cumque aluum non redderet, ventum prius subducto ex bolo sequenti: & cassiæ recens extractæ ʒ j. elect. hieræ picræ ʒ j. fiat bolus; altero die secta fuit vena basilica in brachio dextro vsque ad vncias octo. Eiusmodi enim copiosa sanguinis missione sanantur, iuxta Aëtium (cubiti, inquit, ac malleoli venas secare oportet; tum ipsa optimè ferebat, & consueta erat venæ sectioni: de qua latius in Scholio. Postea & hoc decocto loco syr. preparantis & incidentis, & ad melancholiam hypochondriacam & mensis facientis

cientis, vt vteretur consului: & rad. petros.
eniculi, apij, valerianæ, añ. ℥j. radicis buglos-
(ob melancholiam hypochond.) ℥β. pulegij,
ulaminthæ, melissæ, fumariz, artemisiæ, verbe-
æ, summitatum lupul. matricariæ, betonicæ,
quia sæpe dolebat capite) añ. m. j. florū chama-
neli, rorismarini, añ. p. j. sem. anisi, ammi, apij,
eseli, añ. ℥j. β. polypodij quercini ℥j. fiat decoctio
in aqua communi pro lib. j. β. col^æ adde syr. de
quinque rad. de artemisia, syr. de epithymo, añ. ℥j.
syr. de fumar. ℥β. clarificetur & arom^{at} cum ℥iij.
innamomi selecti, & fiat ad modū clareti, quo
bis in die vtebatur. Postea huic decocto addidi
folior. senæ ℥j. agarici feminini electi albi ℥j. β.
epithymi ℥ij. rhab. selectissimi ℥j. schœnathi ℥j.
& fiebat decoctio pro ℥ix. & imperavi vt per
noctem relinqueretur in infusione, & manè ex-
pressioni forti adderent syr. ex infus. ros. & de
epithymo, añ. ℥j. pro iij. dosibus matutinis. ca-
piebat omni mane, vel secundo quoq. die, prout
alius mouebatur. Deinde redibam ad decoctū
præparans primò præscriptum; eoq. finito il-
lam rursus purgavi, in ℥v. eiusdem decocti in-
fundendo folior. senæ ℥iij. sem. anisi ℥j. epithy-
mi ℥ij. semel ebulliendo manè, forti expressio-
ni addendo confectionis hamech, diacatholici,
añ. ℥ij. agarici trochis. ℥j. syr. de epithymo ℥β.
misce. & detur in diluculo: quo plusquā septies
aluum deposuit. Deinde cū tempus instaret
mensium, imperavi vt rursus ex talo vena ape-
riretur, extrahēdo circiter vncias quatuor. Tem-
pus autem secandi venam non erit multum ante
statum

statū mensiū tempus, sed tribus quatuorve diebus consuetos mulieri circuitus anteuertens; Galenus inquit. Deinde dedi ꝓ pulueris domnarū cum vino Rhenano: & aperti sunt mense. Hoc modo hic pul. in officina paratus Alemari habebatur: & sem. seselios, ammeos, cinnamom. añ. ꝓ ij. ꝓ. cumini ꝓ iij. sem. fœniculi, apij. caru. nucis muscatae, calamī aromatici, galāgæ, añ. ꝓ ꝓ. zinz. macis, caryophyl. añ. ꝓ j. croci ꝓ iij. ꝓ. fi. pul. Hæc sequentia magna cum laude quondam exhibita fuere Dominae Bredenrodianæ, ꝓ vniuersalia medicamenta ad menstruas purgationes prouocandas, in dolore splenis & vteri obstructione: & corticum tamarisci ꝓ j. ꝓ. rad. petros. apij, fœniculi, añ. ꝓ ij. agrimon. end. ci. chorij, betonicae, artemisiae, matricariae, mercurialis, costi vulgaris, absinthij, abrotani, saluia. menthae, hyssopi, añ. m. j. capill. ven. recent. m. i. polytrichi m. j. baccarum lauri, iuniperi, añ. ꝓ ij. sem. petros. anisi, fœniculi, añ. ꝓ ꝓ. ammeos, caru. seselios, añ. ꝓ ij. aristolochiae longæ ꝓ iij. rad. iree. ꝓ j. sauinæ m. j. ꝓ. cum vini pintis quatuor, mellis despumati ꝓ vj. sacchi ꝓ viij. fiat potio. Erit delicatior si addatur cinnamomum, & in modum clareti componatur.

SCHOLIA.

CVM suppressorum mensium cause tot sint, ꝓ earum diuersitate curationem quoque varia contingit. Et ita cū hac mulier ob plenitudinem non purgaretur, licet subitò prius fuerint menstrua purgationes restricta, iamq; quatuor periodi præterissen quò

ad menses non fluxissent, & tunc prius consilium
 teret; tamen cum viderem plenitudinem in causa
 se (erat enim boni habitus) ideo, aliis consentientibus,
 iuxta Aërium, tum cubiti primò, deinde tali venam
 cundò aperire iussi. Hanc eandem sanguinis detra-
 ctionem Amatus quoque approbat cent. 1. curat. 41.
 & Matthæo de Grado & Nicolo Florentino; ut qui in
 muliere, cui prius secta fuerat vena basilica, cum hie-
 re ad eam accitus esset, sanguinem ex saphena misit.
 i. censur. 1. curat. 15. in virgine illa decem annorum
 & octo misit sanguinem in brachio ex vena commu-
 ni: neque Galeno ita adstrictus fuit, (qui venas in
 cubito, lib. De curat. per venæ sectionem, hic non ad-
 mittit, sed in poplitibus aut malleolis, cum reuellere
 urgationem assolent) quin Pauli sententiam & Aërij
 equius sit, qui in plethoricis primò ex cubito, deinceps
 ex talo sanguinem mittunt: quos postea Auicenna
 imitatus est, & deinde ceteri practici. nec enim neces-
 sarium est in verba Galeni iurare, vel ipsius exemplo,
 qui in libello De libris propriis, seruos eos vocat, qui-
 unque se vel Hippocraticos, vel Praxagóricos, vel alios
 alterius sectæ appellari volunt. Quicumque igitur siue
 Romanus, siue Græcus, vel Arabs, aut Iudeus optimè
 loquutus fuerit, illi quoque fides adhibenda est. Et ideo
 nos quoque, ratione Practicorum excellentium moti,
 in hac nostra cognata, plethora laborante, prius san-
 guinem in cubito, deinde ex talo demisimus. Possunt
 tamen conciliari iuxta Donatum ab Alto mari. Nam
 Aërij magnam supposuit plenitudinem, quæ cum co-
 piofa euacuatione indigeret, vires, aut reliqua haud-
 quaquam permitterent: quapropter cubiti venas
 primò, deinceps eas quæ in talo secari iussit, ut ex
 ritisque.

Si ob pleni-
 tudinem
 menses sup-
 primantur,
 curatio.

Venæ sectio.

Conciliatur
 Aërij cum
 Galeno De
 venæ se-
 ctione.

virisque simul tanta possit sanguinis copia euacu-
 quantam vnica sectione plenitudo requirebat. Galienus
 verò non admodum magnam plenitudinem inspiciens, &
 aduerso vires robustas in mulieribus plenitudine
 laborantibus supponens, eandem in poplitibus, seu
 vena sectionem fieri, decretum reliquit. Et
 dixit quod secta in cubito vena mulierum reuel-
 purgationem assolent, ac purgationes menstruas co-
 primunt, ad superiores corporis partes sanguinem
 trahentes, tamquam verum admittendum, vbi
 eas poplitibus seu tali vena non incidantur. At vbi
 ex plenitudine laborant, tunc sufficit sola incisio
 tali vena, quemadmodum fecimus Obs. 2. precede-
 in famula Zythepse. Sic etiam fecimus Obs. 3. in
 tribus puellis, quæ ex mensium suppressione laboraba-
 sanguine ad alias partes delato. In his etenim, à qu-
 cunque parte fluxerit, sanguis est reprimendus,
 ad vulua iter congruis præsidio reuocandus, ne fo-
 inde repulsus ad aliquod nobile membrum (teste Aë-
 lib. 16. cap. 42.) vertatur. Ideo vena sectio in talo pu-
 fuit puella tempore mensium restrictorum sanguis
 euomente; & illi quæ ex naribus sanguinem profu-
 debat, ac alteri puellæ cui per vena sectionem in cubi-
 menses retracti erant. Iubet idem Aëlius in his & si-
 doribus, vomitu, reliquisq; huiusmodi excretionibus
 corpus euacuari. At vomitus minus conuenisset Si-
 rorcula, quæ vltro sanguinem tempore menstruorum
 euomebat. Sic igitur si auersione (si quidem ad se-
 perna) suppressi sunt menses, erit vtendum eisdem fi-
 ctionibus, cucurbitula pubi affixa, & coxis, vena ta-
 secta, quo ad vterum materia retrahatur. & hæc e-
 cura earum, quæ sanguinem vomunt, vel excreant

Quibus sola
 incisio tali
 vena suffi-
 cit.

Quibus san-
 guinis eua-
 cuatio alio
 itinere auer-
 titur, quo-
 modo suc-
 curatur.

St

ed si per sedem aueritur, difficillimum erit; ut si per
 amorrhoides. Siue enim trahentibus utatur, ea & ad
 dem trahunt: siue ad sedem astringentibus cohibeas,
 a vicinitate cohibent & qua feruntur per vterum.
 Quamobrem ubi illis qua trahunt vsus fueris, locali-
 us ad vterum erit vtendum; de quibus priuatim paulo
 ost dicetur. Sed in iis qua ob sanguinis copiam id pa-
 untur, qui non transfluit, sed ad alia loca versitur,
 opia minuetur ex vena tali, & fiet auersio ad vteru.
 Ia menses ciens, superiores vero potius cohibent. Il-
 ud vero noscendum (ut dicebat Aëtius) haud multo
 effici nocumento qua ob tales causas non purgantur;
 nec nec ob alimenti penuriam, vel ob laborum ex-
 essum. Concipere tamen nequeunt, cum vteri pur-
 ationes defecerint. Sic Sororcula cum graue esset
 malum quod singulis periodis sanguinem quasi men-
 truum per superiora euomeret, secta vena tali, men-
 trua purgatio retracta ad vterum, eaq; postea suis pe-
 odis fluente & purgata, deinde ubi viro nupsit, non
 emel, sed pluries concepit, ut antea dictum est. Verum
 ti & prius admonuimus, non perpetuo venam scin-
 lere mulieribus necesse est; sed quibusdam malleoloru
 scarificationes, vel crurum satis esse queunt eua-
 uanda superfluitati; ut mulieribus albidioribus, ac car-
 nosis, quibus parua sunt vena, & qua sanguinem re-
 uem aceruare solent. Sic ego in Obser. prima, & nu-
 er in puella carnosissima pingui, in qua vena non appare-
 ant, circa talum, & alteri inter femora commodè
 ucurbitulas cum scarificatione apposui: & pariter in
 aliis quoque albidioribus. Rectè autem illi (ut retuli-
 mus) qui tali venam malunt quàm poplitu secare.
 paucis enim mulieribus sub poplite apparet, nostriq;
 C chirurgi

Non fem-
 per vena
 secanda.

De quanti-
tate sangui-
nis educēdi.

chirurgi raro eam incidunt. Ideo circa talum eligen-
da erit quæ maior, quæq; pedem perreptat, & facil-
tunditur. Debent autem euitari loca tendinum; & op-
timè vtemur in hoc casu (monente Iacchino) phlebo-
tomo, non lanceola. De tempore secandi venam dixi-
mus Obs. precedenti. Quantitatem autem nedum ple-
nitudinis quantitas, sed virium robur metietur: Et
vbi quippiam non vrgeat, eandem sectionem vena in-
rare tutius erit, quam semel vniuersim vacuare; au-
in eodem crure, vel in altero, vt videbitur. Conduc-
etiam nedum istis diebus, in quibus sanguinem vacua-
verum & ante eos quatuor aut quinque, vt exte-
nuantem victum procures; eodem Gal. teste. tenui-
inquam, victus eisdem exhibeatur, veluti est ptisan-
succus cum aceto preparatus, & olera ad hunc etiam
vsum idonea. Erit enim exercitiorum, victus, reliquo-
rumq; ratio omnis ad copiae diminutionem facien-
Sanguine verò euacuato, medicamenta quæ menses
promocare possunt adhiberi debent: de quibus postea
etiam iuxta Aëtium potiones & somenta (de quibus
suo loco dicturi sumus) adhibendo: & cucurbita pui-
& inguinibus affigenda sunt: siquidem menses euo-
cant; vt liquet 13. Meth. medendi. Vbi verò menses
effluere inceperint, mulieri, inquit Aëtius, omnimoda
quies imperanda est, & in lectulo continenda: ac pr-
mo quidem die à balneis & cibis arcenda; proximo au-
tem ptisana cremor cum anetho paratus pro cibo ex-
hibendus; deinde olerum, quæ huic vsui idonea vide-
buntur portiuncula. Tertio die lauanda, ac consuet-
victus ratione regenda erit. Hæc Aëtius: quamuis præ-
stabit à balneo abstinere cum menses fluunt, nisi for-
tè calido vii velit ad promotionem. Et ita curat-
earum

arum quæ plenitudinis ratione non purgantur,
abunde ex his industriò lectori constare poterit.

OBSERVATIO V.

*De Medico imperito, qui menses nitebatur
euocare in puella planè extenuata.*

EMPIRICVS quidam in puella extenuata,
ex longo morbo, cum valetudinaria per-
maneret, mensesque deficerent, nitebatur fru-
stra consuetas ante morbum purgationes, nunc
in extenuata retentas, prouocare cum calidiori-
bus, etiam venam pertundendo in isto, licet
sanguis non efflueret. Hæc cum ad nos consul-
tandi causâ accessit, atque ubi illam planè ari-
dam & exsanguem vidi, venit mihi in mentem
historia illa quam refert Gateneria, quam hîc re-
ferre libet: Quando, inquit, in corpore mulieris
non est sanguis superfluous, tunc si per men-
strua non emittatur, non est mirandum: quia
natura intendit corpus restaurare, ut multoties
accidit in mulieribus cum patiuntur diuturnas
agritudines, vel febres diu perdurantes: quia
tunc natura intendit sanguinem retinere pro
corporis conseruatione & restauratione: & ita
tunc sanguis non superfluit, nec per menstrua
emittitur: vnde tunc prouocari non potest; sicut
accidit (idem inquit) cuidam scholari nouiter
practicali; cum vellet menstrua prouocare in
quadam muliere extenuata ex quartana, quam
longo tempore passa fuerat; vnde nunquam po-

tuit : quare misit ad me mulierem , qui eam
dens, dixi, nunquam posse prouocari, donec mu-
lier esset bene restaurata. Quare & ego huic
stræ puellæ consului , vt vberioribus cibis re-
ceretur. Nam quæcunque (vt ait Aëtius lib. 1.
cap. 40. De curatione earum) ob innutriti-
nem non purgantur , vel gracilitatem , siue
morbo, siue id alia ratione contigerit, eas prin-
reficere oportet , & corpori carnē congruo ex-
citio moderatoque labore , ac vberioribus cibis
restituere. Si enim carnosæ euaserint , maxime
inde spes erit, menses sponte erupturos . quod
non euenerit, tunc eos commodius potionibus
& pessulis prouocabimus . Ideo huic puellæ
tenuatæ consulimus vt cibis restaurantibus
vteretur , & vbi magis carnosæ euasisset , si tunc
debito more menses non fluere, rursus me
cederet, vt tunc cōmoda remedia adhiberem.

S C H O L I A.

Error mul-
torum.

CVM autem varias causas esse suppressionis præ-
dixerimus , licet curatio earundem suppressio-
nismensum in remotione causarum easdem inferentia
constet cum contrarietate; tamen in hoc saepe con-
git error, tam in regimine vitæ (vt vocant) quàm
ipsis medicamentis menstruas purgationes cohiben-
bus vel restringentibus : nam calescientia , & sub-
liantia, & aperientia, causam aliquando augent ;
ita victus ratio calida exiccans & extenuans. His i-
tur cognitis , videndum quomodo menses suppre-
moueas . Cauendum imprimis , ne his tentes euoca-
qui

ibus non debes, vel quibus est impossibile. Nam con-
t, in vanum laborari in his quæ omnino extenuata
nt. & ita frustra eas mulieres cruciant, quæ post
ngam sanguinis euacuationem factam per nares aut
as regiones, qui menses prouocare volunt, aut post
uturnum longumque morbum, ad quem sequuta
am sit atrophia, vel extrema extenuatio. Et ita
on omni retentio statim indicat sui ablationem &
ouocationem: nam à causa naturali, (vt diximus)
prægnante, in anicula, in puella nondum ad ætatem
flam deuenta, in saltatricibus, viragine, (quæ omnes
olestia non afficiuntur) neq. extenuatis à longis mor-
bus, menses prouocandi sunt. Ex quibus quoque sequi-
tur, in vanum laborare qui ante vel post tempus purga-
tionis, menses volunt prouocare. Sicut etiam in his, quæ
scurum habent sanguinis ob cachexiam, quæ veram &
perfectam sanguinis generationem impedit. Et ideo neq.
quibusdam etiam, licet fiant à causa non naturali, vt
b extenuatione humorum paucitate cibi, & sanguinis
toto vel in utero, quæcunque causa fuerit, in his,
quam, non debent irritari, sed solum regimen re-
umptiuum præscribi; vt apud probatos auctores videre
cet. In cachexia videlicet malum illum habitum
morigendo, vt multus ac bonus sanguis generetur. Sic
in atrophia, & sanguinis penuria, alimenta, quæ
multum sanguinis generant, danda sunt. Interea quæ
b penuriam sanguinis sit, si ex formatione euenerit,
in frigidis siccisq., curam non habet. Si verò ex tem-
peramento calido & sicco, curam habet per contraria,
refrigerantia scilicet & humectantia: semper in me-
moriam habenda, quomodo temperamenta sensim
mutentur, idq. victus ratione maxime in omnibus sex

Quando
frustra pro-
uocantur
menses.

Si ob ca-
chexiam vel
atrophiam
veniat, quo-
modo cu-
randa.
Ex sanguinis
penuria.

Cautio.

Si ob nimiam
caliditatem
menfes sup-
primantur,
curatio.

Si ob frigi-
dam corpo-
ris intempe-
riem menfes
supprimantur,
tunc curatio.

generibus; quod sanè fieri ob conceptionem requiramus. Rectius, inquit Aëtius auctoritate Ruffi, quidem foret ad integram sanitatis tutelam, victus ratione excogitare, à qua ita mulieris corpus desiccaretur, menstrua purgationis non indigeret: sed hoc conceptioni prorsus aduersaretur. Causa ergo cōcipiendi, quoniam omnes ferè mulieres incōsultò victitant, purgationes sunt necessariae: propterea congruit curatio quoq. subscribere, qua menses intercepti euocantur. Calidiores itaq. & plurimum exercitatas mulieres quàm maximè humectare oportet, dulcium aquarum balneis, vberiori humidioresq. cibo ac potu; quales ptisanae & chondri sorbitiones sunt, & quae ex lacte preparantur & ex oleribus, lactuca, cucurbita, & huiusmodi. Et carnibus, agni, hœdi, ac nouelli sues, praesertim cicures, & feminae: è piscibus, quicunq. teneras carnes habent: & auibus altilis: è fructibus, ficus recētes, vuae matura, pepones, cucumeres: è potionibus, vinum tenue, candidum non adeò antiquum, & dilutum. Tales itaque maximè humectabimus, quacunq. ratione calidiores fuerint, siue ex naturali temperamento, siue ab exercitiorum excessu aëremq. humidum eligemus ac paulo ad frigidum vergentem, somnoq. longiori utemur: quietem imperabimus, & iubebimus ut exercitiū vitent: & immodico affectus, iram, maestitiam, timorem; & ut supradicti utantur; cremore ptisanae, ex lacte parato: & praeterea dicta, carnibus gallinarum, caponum, & pullorum, & iure carminum, lacte, & recentibus ouis gallinarum, & summam dicā, reuolutoria victus ratione. Talia & extenuatis conueniunt. Si ob frigidam corporis intemperiem menses non profluant, oppositam curationē instituemus. Nam calidioribus cum cibo, cum medicamentis utemur

emur & fortioribus exercitiis, ac pluribus laboribus,
 iuxta eundem Aërium; vino item fuluo, odorato, vere-
 ac minimè dulci. Inter medicamenta verò ea eli-
 mus, eodem Aërio autore, quæ calore suo sanguinē
 solvant; veluti est thymum, pulegium, culamintha,
 Camnnum, abrotanum, & alia huiusmodi multa
 iuxta eundem descripta. Ita & curabimus illas quæ
 in otio non purgantur, iuxta eundem, quas labo-
 ribus addicemus: labores verò qui mulieribus maximè
 congruunt, deambulationes sunt, & à iamentis gesta-
 ones aliquanto vehementiores. In ceteris verò tan-
 quam frigida & pituitosa curabuntur; atque omnino,
 ut Hippocrates ait, opposita dabimus iis quæ sanguinis
 elationem impediunt. Ac si conveniat ut aqua frigida
 & cruda bibita offendant, aliam optimam perquiremus,
 quam cum vino albo & tenui commiscebimus; tibi-
 aq; pro frigidis, calida; pro crassis, attenuantia offe-
 remus. Pinguiores autem mulieres victus ratione re-
 gemus; quæ summæ (inquit Aërius) attenuandi vi-
 es habet: atque ea adhibebimus quæ idem lib. 3. De
 alimentorum facultatibus scripsit, & De macie cor-
 pori reddenda. Neque tamen interim fomenta & po-
 tiones prætermitemus. Si enim materia inferius de-
 linabit, haud agrè euacuabuntur, & corpus gracilius
 faciet: & quamvis per inferiorem alvum purgatio
 non admodum tuta sit, cum inde corpus labefiat, mu-
 lieri tamen ita se habenti hæc quoque adhibenda est.
 Sæpe enim sola purgantis medicamenti portio mensuris
 evocandis sufficit. Cathartica acerrima, qualia ab
 Aërio referantur, pinguibus idonea fuerint, & suppo-
 sitoria, tum fomenta & epithemata qualia scripsit ad
 temperaturas frigidiores conferre. Contra in graci-

Lib. 16. cap.
 43 & 55.

Aërius lib.
 16. cap. 53.

Curatio earum quæ ob
 nimiam pin-
 guedinem
 non pur-
 gantur.

Curat.

In gracili-
bus & exte-
nuatis cu-
ratio.

Ex paucita-
te sanguinis.

Ex copia.

Ex qualitate
sanguinis fri-
gida, crassa,
& viscida.

Ex obstru-
ctione ve-
narum ma-
tricis.

libus & extenuatis (vt etiam antea diximus) contra-
rio modo instituenda curatio, siue ex fortibus exerci-
tiis, vel morbo procedente, vel ex fame aut ieiunio
aut aliis euacuationibus magnis originē habeat: vten-
dum enim cibis multum nutrientibus & humectanti-
bus; tum iis quæ auctores præscribunt ad corpus gra-
cile restaurandum. Et ita quoque ex paucitate san-
guinis, vt paulo antè admonuimus, præcipua curatio
consistit in victure sumptiuo, humectante, & sangui-
nem multiplicante. Si verò ex copia sanguinis, ha-
 ipsa copia minuenda erit venæ sectione, vt Scholio præ-
cedente docuimus; exercitiis & cibis tenuibus, & re-
liqua victus ratione omni ad copię diminutionem fa-
ciente. Quæ verò ob qualitatem sanguinis frigidam
crassam, viscidam; hæc corrigenda erit contrariis. Sc-
 quia communis est curatio his quæ ex obstructione
venarum matricis id patiuntur, ideo simul hæc tra-
ctanda. Quæ igitur obstructions in venis his patiun-
tur, quas etiam solas docet curare Gal. in lib. De venæ
sect. sic tractantur ab eo. Incipit antea per dies decem
corpus totum parare, & obstructions tum eius tum
vteri tollere. hoc autem est (teste Iacchino) corpus
fluxile reddere. Id primū victus ratione extenuant
facit, id est, quæ tenues succos, fluxilesq; efficiat: in
qualitate ciborum, & potionum fit: & prætere-
condimentis, quæ sale, aromatis & herbis acris pa-
rantur, cuiusmodi est origanum, satureia, thymum
cuminum, anethum: tum exercitationibus fortio-
ribus, & vigilia. Hoc posito, medicamentis rem aggre-
ditur, & primū quæ humorum copiam crudorum
extenuant per totum corpus, & parant, vt purgari
possint: vt oxymel & simplex & scilliticum cum de-
cocto

To betonica, vel thymi, vel alterius incidentis, & tenuantis & incidentis. A qua portione, picra potius propinat. Inest autem picra vis primum purgandi venas à pituita, extenuando & extergendo: est & vis tollendi obstructions, per incidentia medicamenta, quæ longè penetrare possunt. Eligit autem maximè purgantem, ut est hiera plurimum aloës repleta: nam variis modis paratur. Hoc ergo medicamento uteris 10. diebus illis bis aut ter. Interim medicamenta exhibenda quæ menses ducunt, ut sabina, dictamnium, pulegium, &c. modus exhibendi, in mestrato à balneo statim cum adhuc calent. Intentio igitur est obstructions tollere: id quod, primum facit humores respiciendo, parando, purgando, vacuando. præparatio per extenuantia, calida, sicca, acris, amara, fit, modo fortiora, modo debiliora. Tempus præfigit decem dierum; quod accipit Paulus. Sed hoc ridiculum, cum pro varietate humorum, variare vim medicamentorum oporteat: quibusdam ergo vix quindecim aut viginti sat erunt. Purgationem per hieram facit: non negat tamen, quin & aliis, maximè agarico: quoniam vis inest illi extenuans, & admiscetur aromatis. Sed & diaphœnicon ad hoc facit, & hiera ex colocynthide, & Archigenis. Vltimò adhibet venæ sectionem in poplite, vel potius in talo, id quod, per duos dies, parum trahendo quotidie, quo à supernis ad inferna maior attractio fiat; vel ut sanguis obstruens, iteratis tractionibus melius deriuetur à parte. Vult fieri vtrinque cathexin, si fortè in vno magis obstructio sit. Sed cur postponit venæ sectionem? An quia non potest vacuari sanguis obstruens è venis uteri, nisi dissectus & paratus sit, & imminuta ex parte obstructio? Hoc igitur

C 5

facit

facit postremò : quoniam vena sectio paratiorem sanguinem exigit, ut possit educere à loco: quoniam non fortiter, sed solùm vacui ratione. Verùm de vena sectione, de cucurbitulis, & scarificatione, satis prindictum est. De remediis verò quæ bibuntur, quæ Galenus scribit, experta sunt eo modo quo scribit. Rhasi trochisf. de myrrha multam vini habet: potio item ex herbis in vino insolatis: rectè vitimur & aqua portetana. omnia methodo inuenta remedia, experientia comprobata. Expedit autè & localibus uti; quam partem Galenus omisit: ut sunt sessiones in balneis, quibus vis insit dissolucere & extenuare crassa, ac vena dilatare; qualia sunt sulphurea, & quæ arte parantur ex stœchade, chamamelo, anetho. De his superius quoque egimus. Mox & pessus & suffusus. nam iuxta Hipp. lib. 5. aph. 28. muliebria educunt, id est, menses. Causam ponit Gal. extenuationem, quæ sit ab eo fumo. Vsus est, per sellulam perforatâ obducta omni perspiratione per vestes. Nos trochiscis ex galia vitimur. Similiter conueniunt pessi ex ladano & aliis, ut postea dicemus: pro diuitibus moschum & Libettum adiungimus. Hac autem exemplis subsequèntibus clariora euadent.

OBSERVATIO VI.

De puella ex sola refrigeratione, vel nuda in-temperie frigida, menses restrictos habente, & de altera muliere, mensium suppressione laborante, à succo pituitoso venarum uterina obstruente.

PUPELLÆ annos octodecim natæ, cùm in hyeme, aëre frigido, linteamina lora extra urbem

bem in pascuis (vt fieri solet) exposita aëri,
 rsum inde ablueret, menses restricti fuere ex
 igiditate & nuda tantum intemperie, absque
 umore. Vrina inspecta quæ alba erat, & cum
 sa in vteri fundo manifestam frigiditatē sine
 ondere aut grauitate sentiret: statim imperaui
 t vinum generosum biberet, & vt hoc decocto
 teretur eo tempore quo menses solebant fluere:
 dictamni cretici, pulegij, matricariæ, artemi-
 iæ, sabinæ, añ. m. j. florum chamæmeli p. j. cice-
 um rub. ℥ j. melissæ m. β. coquatur in vino Rhe-
 mano pro lib. i. dulcoretur parū saccharo, arom^e
 um ℥ β. cinnamomi selecti, & fiat claretum. &
 nentes optimè fluxere. Accessit ad me, consul-
 andi causa, & altera mulier pituitosa, quæ ex pi-
 uita copiosa, & succo crudo ac frigido, men-
 struas purgationes vltra dimidium annum non
 viderat. Imperaui, vt victu extenuante vteretur
 & humores incidente, eo modo, quo paulo antè
 diximus Scholio præcedente. Deinde cum sco-
 pus huius curationis esset subtiliare, digerere, &
 demum euacuare, & tandem menses euocare;
 omnium primò ad materiæ minorationem præ-
 scripsi id quod sequitur: ℞ elect. lenitiui ℥ j. dia-
 phœnici ℥ ij. cum ℥ iij. decoct. pulegij, artemisiæ,
 betonicæ, fiat potio; capiat in aurora, & dormiat
 per horā; postea surgat & ambulet. Die sequenti
 sumet hūc syr. & syr. de artemisia, de duabus rad.
 oxymelitis simplicis, añ. ℥ j. aquæ decoct. beto-
 nicæ, artemisiæ, pulegij, ℥ vj. misce, pro ij. vici-
 bus: capiat manè hora vna ante auroram dimi-
 dium calidè; & super id dormiat ad lubitum. ho-
 ra quar-

vrinæ
 alba n.

ra quarta pomeridiana sumat alteram dosim.
 Diebus sequentibus capiat hunc syrupum: R
 syr. de eupatorio, de duabus rad. syr. de artemisi-
 añ. ℥ j. & aquæ decoctionis hyssopi, pulegij, cala-
 minthæ, origani, artemisiæ, ℥ ix. fiat syr. pro iij
 dosibus. Istis syrupis finitis, denuo purgetur: i
 electuarij lenitiui ℥ β. diaphœnici ℥ ij. electuar-
 ind. maioris ℥ iij. dissolue cum decoct. artemi-
 siæ, capill. ven. sem. anisi, fœniculi & pass. ℥ ii
 mellis ros. colati ℥ j. detur calidè hora ante diem
 tamen cùm incipiet operari, non amplius dor-
 miat. Post quatuor horas à sumto pharmaco ca-
 piat hoc lauatiuum: R iuris cicerum rub. ℥ v
 sacch. rub. ℥ j. β. Deinde vno atque altero die in-
 termisso, cùm pilulis delectaretur, etiã has pilu-
 las præscripsimus: R pilul. scetid. aggregat. aga-
 rici trochis. añ. ℥ j. cum syr. artemisiæ fiant pilula
 vij. habuit inde vij. sedes copiosas. Deinde accessit
 ad illa quæ menses prouocarēt. Ideo iussi vt tem-
 pore congruo cùm menses fluere solebant, san-
 guinis missio fieret ex vena in dextro pede, ve
 sinistro, secundum quòd magis vena apparere
 & tumentior in vno pede quàm in alio esset. E-
 si vena in nullo pede appareret, vt poneret su-
 per ipsam duas vel tres sanguisugas, ℥ iij. extra-
 hendo. Hoc enim tempore iuuant illa quæ san-
 guinem circa vterum trahunt; vt sunt dolorifica
 ligaturæ in coxis factæ, vel frictiones sanguinem
 ad partem trahentes. Vtile quoque est partes il-
 las prius fouere aqua tepida, vel decocto malua-
 rum vel liliorum, vt partes illæ relaxentur; ob
 quod sanguis ille facilius descendit. Ista etiam
 conue-

ueniunt si multus sanguis sit in corpore, aut
stus, aut ob venarum obstructionem vterive
ensationem suppressus; adhibitis nihilo minus
mediis quæ obstructionem tollunt. Interim,
quam, & illa apponenda quæ sanguinem ad
uterum trahunt: qualia etiam conuenire dixi-
mus in iis quibus multus sanguis ad partes su-
periores fluit, & per nares vel per sputum, aut
vomitu reicitur. nam vbi præcesserint reme-
dia iam dicta, etiam hoc tempore vtile erit fre-
quenti cucurbitularū appositione supra emun-
ctoria sanguinem circa uterum trahere. Appo-
nuntur sine scarificatione his quibus non est ni-
sius sanguis: in quibus autem est multus, sca-
rificatio facienda est. Nam cum sanguini patet
exitus, facilius ad illam partem fluit; sed multus
non est trahendus. euacuatio enim sanguinis co-
piosa aliam euacuationem impedit. Aufertur
copia propter quam expultrix illum sanguinem
expellit, vt supra monstratum est. Verum in hac
muliere consulimus vt sanguis paulatim dedu-
ceretur ad uterum cum ligaturis & frictionibus,
& sectione malleoli seu tali. Sed hæc non fa-
cienda (vt etiam antea admonuimus) nisi quo
tempore solebāt menses fluere; aut quibus num-
quam fluxerunt, ad finem mensis; vel in princi-
pio quibusdam iunioribus. In qua parte humo-
res liquefacti aut rarefacti videntur aucti, lini-
menta ex modicè calfacientibus & relaxantibus
sunt adhibenda. Ideo etiam imperaui vt vnge-
rentur partes inferiores ventris, inguinum, & re-
num, post fotum. & axungia gallinæ, anseris, &
anatis,

46 DE MULIERVM MORBIS,
 anatis, añ. ʒ j. olei amygdul. chamæmel. liliorum
 ʒ j. ʒ aristol. vtriusque, iridis, asari añ. ʒ j. ceræ n
 uæ q. s. fiat vnguentum. Infessus non parau
 mus, cū in hyeme essemus, sed ʒ j. huius pu
 ueris dominarum exhibuimus cum vino Rh
 nano albo: & cumini ʒ j. curcumæ ʒ ij. cinn
 momi, nucis moschatae, granorum paradisi, cal
 mi arom. galangæ, zedoariæ, sem. fœniculi, leu
 stici, apij, carui, aristol. rotundæ, baccarum laui
 sem. nigellæ, añ. ʒ j. fiat pul. Paratur diuerso mo
 do isti pulueres, cū magistrales sint; qualis
 hic est: & cinnamomi ʒ vj. cumini, anisi, leuist
 ci, carui, añ. ʒ ʒ. myrrhæ, rad. dictamni, curcum.
 añ. ʒ ʒ. lupinor. apij & nigellæ, añ. ʒ iij. calar
 aromatici, pulegij, aristol. longæ, añ. ʒ ij. croci ʒ
 asari ʒ ij. sabinæ ʒ ʒ. misce. fiat puluis. Si mense
 nō fuissent aperti, dedissē ʒ j. trochis. de myrrh
 quibus in robustioribus feliciter sæpe vsus sum

SCHOLIA.

Vbi frigidi
 redundarint
 succi, cu
 ratio.

VBI cum frigida corporis intemperie, crassorum
 ac frigidorum adsit redundantia succorum, qui
 sanguini admixti mensium purgationem impediunt
 ut in hac muliere secunda contingebat; ipsas prius de
 centi medicamento purgare conuenit, donec concoctæ
 & preparati fuerint: deinde quæ menses prouocare
 possunt, adhibenda sunt. Parentur autem (ut ante
 quoque diximus) cum extenuanti victus ratione, cibis
 semper ac potibus aliquid odoratum admiscendo; tum
 etiam extenuantibus ac incidentibus medicamentis; v
 melle ros. & oxymelite; modò uterus aut quapiam
 ali

neruosa pars affecta non sint, propter acetū. Valent
rupi de tribus, aut duabus rad. de hyssopo, cum deco-
hyssopi, pulegij, calamint hæ, orig. abrotani, & simi-
m. Concoctis iam humoribus ac preparatis, purgatio
hibenda cum hiera, agar. in pilulis. Quando multa pi-
ta in corpore collecta est, ubi partes inferiores quoq.
m vnguentis sint preparata, vt in Obs. precedente
tendimus, tunc dabimus pilul. de hiera. & aromati-
ventriculū & intestina purgant, humores atte-
uat, & preparant corpus ad assumptionē syruporum
erientium, aut acrium medicamentorum. Duabus
et tribus horis dande sunt ante pastum, vt in exitu
lecto. Deinde syrupi incidentes & attenuantes san-
guinem, aut humores mixtos cum sanguine, dandi
unt; vt syr. de rad. de artemisia, & alij antedicti.
antur cum decoct. herbarum iam paulo antè dicta-
um, vel iringiorum, aut quinque rad. aperientium,
el cum decocto sabina, aut artemisia, aut leucoi. Si
multa pituita in corpore collecta fuerit, euacuanda
et multum ante tempus purgationis mensium, & id
niter, ne redundantia humorum auferatur. Sed suf-
cit dare pilulas supra dictas, addito agarico, vel asa-
o, aut carthamo: vel pilulas benedictæ; vel bolum
abimus cum hiera vel diaphœniconē. In robustiori-
us pilulas scetidæ, de sagapeno, aggregariuas, aut de
garico. A purgatione sanguinem ex malleolis mittere
onuenit, vt diximus; aut scarificationes adhibende, si
ene non appareant. Deinde medicamēta, quæ deten-
os menses euocant conscribenda sunt: & primò fa-
ilibus, postea mediocribus, vltimò fortibus vtendum.
Verū cum plures circa medicamenta menses prouo-
cantia hesitent, sæpeq; audiamus ab auctoribus, & sæ-
pius

Menses edu-
centia quo-
modo diffe-
rant à diure-
ticis & uri-
natiuis.

Dubium.

Aliud du-
bium.

Arguitur
Galenus de
insufficiētia.

Responsio.

pissimè à Galeno, mentionem fieri medicamentorum
menses educentium; idèd quarendum est quæ ea sit
& quomodo id operentur. Igitur quinto De simpl.
scribit, ea quæ menses mouent in hoc ab urinatiuis
stare, quòd cum utrumque genus calidum sit, quæ
men vrinas mouent longè sint sicciora, id est, quæ p
uatim nomen diureticorum meruere. Nam men
ducentia calida sunt, sed modicè siccant. Causa e
quoniam quæ siccant, crassiorem sanguinem reddunt
vnde & purgationē non facilem. Dubitatur circa ha
Nam non videtur hac esse differentia: siquidem ea quæ
valentiſsimè vrinam cient, vim etiam habent men
ducendi, vt exemplo particularis materia patere po
test: Sabina, pulegium, asarum, cinnamomum, cal
mintha. Ea sunt Gal. exempla. Rursus certum est, ha
sicca tertio ordine esse: ergo non hoc distabunt, quæ
magis siccant quæ vrinas ducunt. Dubitatur iterum
Hac vrinam cient, ergo menses non mouent. nam quæ
ad vias vrina deducunt, deriuant ab vtero: quare e
profluuium per vterum imminunt. Sic in profluui
vt dicemus, ad sistendum vtimur urinatiuis. Argu
tur etiam eo loco Galenus (teste Iacchino) de insuffi
cientia. Quomodo enim vult, calida hæc & sicca men
ses mouere, quasi semper ex vna causa supprimantur
vt ex crassitie? Hic enim solùm conferre possunt. I
scimus aliis nocere; vt si ex penuria: item si ex phleg
mone, vel scirrho, vel ex plurimo calore naturali ten
peramenti. Respondetur primùm ad id quod postrem
est obiectum, non esse mentem Galeni illam solùm es
causam; sed illam respicit maximè, quoniam & ma
ximè euenit. Est enim frequentissima ex obstructione
quæ ex humoribus. vnde & ab huius curatione men
is

ducentia nominavit. Ad id verò quod prius quæ-
 ritur, dicimus, menses ducentia, etiam quæ propriè di-
 cuntur, respectu scilicet huius generis causarum, esse im-
 plici differentia. Vel enim solum sanguinem crassio-
 rem & frigidiorē liquant, & fundunt, & erunt
 modicè calida & sicca; vel præterea obstructions tol-
 lere possunt, quæ impediunt. Primum genus diminui-
 s iuuat, augendo sanguinis motum nonnihil: secun-
 dum genus oblesos, & prorsus defectos. Ea igitur quæ
 sanguinē fundunt solum, propriè menses ducentia di-
 cuntur: quia per se naturā in opere mistendi iuuant ea
 ratione. (Facilius enim pellitur quod tenuius.) At reli-
 qua, quodāmodo ex accidenti magis, quatenus iuuant
 minus obstructions tollēdo, propter quas detinebatur
 sanguis. Dices, Nonne ipsa quoq. fundunt & liquant?
 Respondeo: Quæ vehementer talia siccando cogunt,
 non liquant: ideo quod ad hanc rationem attinet, es-
 sunt incommoda, sed iuuant propter obstructions. Sic
 igitur ad obiecta respondetur, non dici ea quæ vehe-
 menter cient vrinam, menses ducentia, propterea quod
 coactant & cogunt; nisi fortè ex accidenti hoc faciant.
 Quod si Galenus exempla eorum posuit, transiit à
 mensibus ducentibus verè dictis, ad ea quæ obstructions
 tollunt. Quod verò dicitur, vrinam ducentia auertere
 ab utero ad vesicam, concedimus, si propriè talia sint,
 id est, vehementer calida & sicca: sed si moderata,
 tunc utrumque faciunt preparando sanguinem. na-
 tura verò eo beneficio pro exigentia in utraque parte
 utitur: ad vrinam renum attractione; ad uterum pul-
 sione, quam procurat & commodi gratia in hoc cor-
 pore, & propagationis ratione. Alia verò immodica
 auabunt modico usu, aperiendo & extenuando. Sed

Propriè
 menses du-
 centia quæ
 dicantur.

D

hac

Per accidens
mensis pro-
uocantia.

hæc cogunt sanguinem, inquit Gal. Respondetur, quis multis utatur, non si modicè. Eadem ferè habet Montanus, cum dicat, quadam per accidens prouocant menses: ut si paucitas sanguinis in causa sit, alere corpus que sanguinem generant: si humores crassi ratione caliditatis adurentis, frigida & humida: qua ratione Diosc. lactucam menses prouocare dixit, plurimam ambiguitatem legentibus afferens, cum id improperè dixerit. Iam si sanguis crassus, viscidus, cum multa pituita, eget incidentibus & calefacientibus, quæ potius sunt diuretica; tamen in hoc casu inuant ad prouocationem mensium. At si ob meatus & orificia obstructa, tunc verè menstrua prouocari dicuntur. Arabes tres ordines horum medicamentorum ponunt: Primum faciliorem, ut decoct. phaseolorum, cicerum, rulsæ, apij, caulium, methi, chamæmel, asparag. melissa. Mediocrum secundum, menthastrum aquaticum, cuminum, stæchas, ammi, satureia, flores schoenanthi, spica absinth. petroselinum, leuisticum. Tercium denique fortius, ut rubia tinctorum, iuniperus, sabina, nigella, myrrha, paonia, castorium, cassia lignea, euphorbium, & similia. Quedam insuper sunt simplicia, alia composita: (vide Plinium, Paulum, Aetium atque Gal. & Neotericos) ut sunt trochisci de myrrha, alijque pastilli & pulueres dominarum. præter alia, localia remedia, ut exemplum sequens latius docebit.

OBSERVATIO VII.

De vidua longo tempore menses suppressos habente ex pituitosiore sanguine.

MARIA Gerardi, vidua Alcmariana, annorum 36. minus quidem pituitosa, cum purga-

purgationes menstruas longo tempore non ha-
 uisset, in inguine tum coxa valde afficiebatur:
 amque muliercularum tentasset remedia, sed
 frustra, & dolor in coxa & inguine accresceret,
 & metueret apostema; anno 1557. mense De-
 cembri, cum ingenti ex suppressa menstrua pur-
 gatione dolore affecta, de nocte me vocauit.
 Cum feces non deponeret, clysterem libenter in-
 ecissem, sed non admittebat. balano igitur alius
 oluta ex pul. hieræ ℥ ij. & diag. colocynth. añ.
 r. iij. mellis crud. ℥ j. & talis parum. Bis excreuit,
 entositatibus emissis, cum iuuamento aliquo,
 & referebat. Ad materiæ præparationem hoc
 pozema descriptum est: & cont. rad. fœniculi,
 p. ij, petros. rad. dictamni albi, valerianæ, añ ℥ ss.
 grimonix, cassiæ, capill. ven. artemisiæ, florum
 chamæmeli, añ. m. j. sem. anisi, sileris montani,
 mmi, fœniculi, añ. ℥ j ss. cicerum rub. p. j. coquā-
 tur in aqua communi pro lib. i ss. col^x adde syr.
 de artemisia ℥ ij. syr. de scolopend. de cicchor. cum
 hab. (aderat enim obstructio quædam in he-
 pate & liene) añ. ℥ j. misce. Sumebat manè hora
 vij. cyathū unum, & hora quarta pomeridiana.
 Hec quarto Decemb. die præscripta fuere. Sexto
 vero quod sequitur: & cassiæ mundatæ ℥ vj. dia-
 phœnici, confectionis hamech, añ. ℥ j. aquæ ar-
 temisiæ ℥ iij. syr. de artemisia ℥ ss. misce. Quin-
 quies aluum deposuit, & caput dolor mitigari.
 Deinde & hoc apozema descriptum est: & rad.
 fœniculi, ireos, asparagi, añ. ℥ ss. rad. cappar. ta-
 maris. añ. ℥ ij. sabinae, artemisiæ, menthæ, nepi-
 tæ, calamint hæ, florum chamæmeli, centaurij mi-
 noris,

52 DE MULIERVM MORBIS,
 noris, pulegij, satureiæ, prassij, melissæ, verbenæ
 añ. m. j. sem. anisi ʒ ij. cumini præparati ʒ j. fi
 omnium decoct. in duplici vase in aqua artem
 lilior. albor. & vino Rhenensi, pro lib. i. ʒ. aron
 cum ʒ ʒ. cinnamomi, & dulcoretur cū saccharo
 & sabinæ exiccata ʒ j. ʒ. caryophyll. nucis mo
 schata, añ. ʒ j. ligentur in nodulo, & pendeant
 dicta decoctione, & exprimatur dum potio su
 matur. Deinde 13. Decemb. ita illam purgavi:
 pilul. de hermod. ʒ ʒ. pilul. mastich. ʒ. j. aga
 trochis. ʒ ʒ. pul. rhab. gr. iiij. diag. gr. j. fiant pilu
 læ vij. cum aqua artemisiæ: dentur in diluculo
 Septem sedes inde habuit: deinde extractus e
 sanguis ad ʒ iiij. in pede dextro ex saphena. I
 17. Decemb. hoc decoctum rursus præscriptum
 est: & rad. fœniculi, ireos, rubiæ tinct. añ. ʒ ʒ. m
 lissæ, verbenæ, absinth. florum chamæmeli, cha
 mæpit. sabinæ, maluæ, prassij, añ m. j. sem. fœ
 nugr. anisi, añ. ʒ iiij. folior. senæ ʒ j. ʒ. prun. dama
 num. ix. ficuū ping. num. iiij. coquatur in duplici
 vase in aqua artemis. & vino Rhenensi, pro lib.
 saccharo dulcoretur, & cinnamomo condiatu
 nodulo sequenti in eadem decoct. pendente: i
 trochis. de myrrha ʒ j. Bis in die sumeat, au
 semel, iuxta medicamenti operationem. Pro do
 lore inguinis, manè & vesperti inungebatur ca
 lidè vnguento sequenti: & olei cheirini, chamæ
 mel. anethini, lilior. alb. añ. ʒ ʒ. misce. Deind
 statim instante mensium tempore accepit pu
 sequentis ʒ j. cum cyatho vno decoctionis sabin
 næ & artemisiæ: & pul. dominarum descrip
 Obs. 6. præcedente ʒ ij. trochis. de myrrha ʒ j.
 misce

isce. Sumpsit calidè; & aperti sunt menses, ac
 dolor coxæ etiam cessauit; remanente tamen du-
 ræ quadam in inguine dextro; & illa parte
 feri duritiem adhuc sentiebat. Iussi itaque vt in-
 gegeret sequenti vng. & olei lilior. alb. cheirini,
 ʒ. β. butyri recentis, olei amygd. dul. axungia
 allinæ, pinguedinis vituli, emplastri de meliloto,
 althææ, añ. ʒ. ij. mucilag. althææ, fœnug. añ. ʒ. iiij.
 ammoniaci in aceto dissoluti ʒ. ij. vng. alabastr.
 ei anethini, chamæmelini, añ. ʒ. iiij. aliptæ mo-
 chata ʒ. j. pul. sem. dauci, cinnamomi, añ. ʒ. ij. β.
 eræ q. s. fiat vng. molle. Et cùm menses tardius
 parcius fluerent, præcepi quoque vt ex hoc
 clareto biberet: & rad. galangæ, rubiæ tinctoriæ,
 æonia, añ. ʒ. iiij. capill. ven. sabina, iux artheti-
 æ, añ. m. β. sem. pæonia, iuniperi, ammeos, ani-
 , leuistici, cumini, añ. ʒ. β. rad. dictamni albi,
 lattæ byzantiæ, cubeb. cassiæ lignæ, rasuræ la-
 idis dactylorum, añ. ʒ. ij. croci orientalis ʒ. β.
 em. althææ, lini, fœnugr. añ. ʒ. j. trochis. de myr-
 ha ʒ. j. seminis dauci, iuniperi, añ. ʒ. β. bulliant
 in vini Rhenensis lib. iiij. & saccharo optimo q. s.
 dulcoretur, & arom. cum ʒ. j. cinnamomi select.
 Capiebat omni mane cyathum vnum; & in-
 tensius more consueti, ac largius fluxere: & bellè
 fuit curata. Post hoc tempus reliqui Alcmariam,
 & Delphensiū stipendio decoratus, praxim ibi-
 dem exercui. & cùm hæc rursus recolligerem,
 triginta octo annis reipublicæ Delphensium
 Medicus ac Physicus fueram.

SCHO-

SCHOLIA.

Medica-
menta quæ
menses euo-
cant.

MATERIA pituitosa preparata, & demum
expurgata, ut iam diximus, exemplūq; iam
supra scriptū ostendimus, & vena in talo secta, vel cu
carbūculis adhibitis, ea exhibenda sunt medicament
quæ menses euocant. Eiusmodi autem sunt, quæ ex
calfaciunt, non tamen valenter desiccant, ut testatur
Gal. 5. De simpl. medic. facult. Cuius farinae sunt (v
ir scilicet inquit,) pulegium, calamintha, sabina, anethum
dictamnium, asarum, costus, casta, cinnamomum, an
stolochia, iris, & eius generis reliqua. Hæc enim (ut re
fert) absolutas vteri purgationum retentiones sonant
At lib. De curand. ratione per vena sectionem, menses
abunde prouocare asserit nepitam & pulegium, si in
melicrato cocto exhibeantur; aut confusa arida, in
brog; subtili disiecta, at rursus trita vsque dum pol
linem tenuitate referant, & inde in melicrato insper
sa. Conuenientissimum autem tempus sumendi est
balneo inuolutis adhuc linteis. Verum hæc, eiusdem au
toritate, mitia sunt. Hi autem violentiora existunt
sabina & dictamnium, quorum vsus sit antedictis simi
lis: quod etiam tempore medicamentum datur quo
propter amarum appellatur. Confert namq; multo
his quæ non probè purgantur, si 3 j. exhibeatur cum
aque calida cyathis tribus, ut eidem Gal. visum est 2
De compos. med. secund. loc. & lib. De cur. per vena se
ctionem. Duo autem tempora commoda sunt ad tali
medicamenta accipienda, ut refert Aëtius: alterum
appropinquante purgationis tempore, alterum, ut post
venerit sumentaq; ac balneum, statim bibant co
medantq;

edantq; cuncta suprà à nobis commemorata. Ac in-
 per conueniunt decoctiones thymi, rad. asphodeli,
 rricum rad. mori, mercurialis, carpesia, floris iunci
 orati, spica nardi, ac celtica, simuliter acori, in vino
 bo veteri, quod excolatum calidum exhibeatur; &
 e suprà pro his quæ frigidam temperaturam hà-
 nt. Probè item facit opopanacis, sagapeni, myrrhae,
 castorii, ʒj. si exhibeatur. Idem quoque possunt
 mini, fœniculi, oreosclini, dauci, anmeos, & cice-
 um decocta; vt idem auctor refert. Paulus præter
 ec helenij rad. decoctum, artemisia, saluia, absinthij,
 m. apij, seseli, approbat, quæ omnia non solum in vi-
 o (vt inquit Aëtius,) aut aqua mulsa, ex Gal. aucto-
 rate; verùm etiam in aqua decoqui possunt, prout
 magis vel minus mulieres fuerint natura frigidi-
 ores. Quæ etiam ratione habita, magis vel minus calefaci-
 a medicamenta eligi possunt, tum eorū quæ hîc con-
 ripsimus, tum aliorum, quæ ab alijs commemoran-
 ur; quorum copia magna est; adeò vt si quis omnia
 auxilia in hunc vsum commodare cõsere velit, ei multo
 opus fuerit, vt Aëtius inquit. Commendantur pa-
 illi è myrrha ad ʒj. cum aqua mulsa; & pulueres
 ominarum, de quibus suprà egimus. His adiungenda Topica.
 opica, vt in seffus, balnea mineralia, quale in Italia
 puteolis repertum, Syluiana balneum appellatū. Nos
 rificiale conficiemus; vel hanc in seffum, quo Betius
 lim in Italia Bononiæ utebatur: R. satureia, sabina,
 rtemisia pulegij, rad. aristoloch. rotunda, ireos, cucu-
 neris asinini, cyclaminis, ruta, lauri, añ m. ij. coquan-
 ur in aqua pro balneo. Fiunt quoque suffitus, vt pau-
 o antiè dictum est, ex aromatibus, quæ & muliebria
 lucunt, auctore Hippoc. lib. 5. aph. 28. ex casta lignea,
 D 4 cinna-

cinnamomo, rubia tinctorum, & gallia moschata, in puluerem redactis, & carbonibus inspersis, & fumum per emboram (vt medicè loquar) suscipientes. Si fiunt & sacculi ex herbis iam dictis, qui calefacti in latere irrorati, ex paucò vino applicentur, partesq; circa vterũ foueantur. De vnctionibus iam quoq. dictum est. Pessus quoq. vtendum vbi opus est, primò mitioribus, ex anserino seu gallinaceo adipe, saccharo rubeo, & paucò croco, adiectis herbis contusis, mercurial ruta, artemisia, vel sabina & pulegio. Si validioribus vtendũ, ex succi mercurial. ℥ iij. adiect. puluere genti. nae, nigella, & colocynthide, vel sumẽdo myrrham, galbanum, styracem, aristolochiam, rubiam tinctorũ, abrotanum, calamintum, sabinam, pulegiam, resina terebinthinam: ac reliqua eiusmodi adicienda sunt eisdem prius contusis, ac linteo serico, aut lineo tenui ad formam digiti humani inuolutis; oleoq; irino aut liliaceo prius infusis, mulieris pudendo immittantur adeò vt os vteri attingant. ligentur tamen ad crura vt promptius, vbi opus fuerit, auferri valeant. Plurimas formulas vide apud Rondeletium cap. 61. De merisibus retentis.

OBSERVATIO VIII.

De muliere utcumque biliosa, ex bilioso sanguine menses detentos habente.

MULIERI annos viginti octo habenti, utcumque biliosæ, menstrua purgatio restricta erat. sentiebat circa vterum duritiem quandam cum siccitate ac calore, & dolorem purgentem

ntem: coitum valde appetebat, & eo plurimū
lectabatur, quamuis non conciperet, ob men-
s restrictos: erat autem rubra. Hæc quidem
igna menstruam purgationē retentam ex san-
guine bilioso, seu materia biliosa, notabant. Qua-
propterea consilium petenti consulimus ut victus ra-
tione vteretur qualem Scholio Obs. 5. præceden-
s conferre diximus. Nam quia non concipie-
bat eo quòd non purgaretur, ideo cibo ac potu
umidiore & vberiore humectanda erat. Deinde
venam cubiti dextri internam ut incideret
mandauimus ad vncias tres vel quatuor tan-
tū. Postea hunc syrupum pro materiæ præpa-
ratione præscripsimus: & acetosi simplicis ℥ ij.
oxymel. simpl. ℥ j. β. syr. capill. ven. ℥ j. aquar. ci-
chorij, artemisiæ, buglossi, añ ℥ iij. misce. Per tri-
dium ieiuna in diluculo bibebat, vnā sumendo
℥ ij. diarod. abb. in tabul. Deinde præscriptum ut
hoc leniente medicamento vteretur: & cassiæ re-
cens extractæ ℥ j. aquæ artemisiæ ℥ iij. syr. viol. ℥
β. misce. Mox & hoc vel simile apozema: & rad.
cichorij, dentis leonis, graminis, fœniculi, pe-
tros. macerat. in aceto, añ. ℥ β. rad. valerianæ ℥ j.
artemisiæ, chamæd. chamæpit. capill. ven. folior.
salicis, cichorij, acetosæ, melissæ, summitatum
lupul. añ in j. sem. petros. apij, dauci, añ ℥ ij. sem.
quat. frig. maior. añ. ℥ j. β. flor. sambuci, trium flo-
rum cordial. añ. p. j. hordei mundati p. j. vuar. ab-
arill. repurg. ℥ j. coquatur in aqua communi pro
lib. i. β. colat^r adde syr. viol. ex succo cichorij, de
byzantiis, añ. ℥ j. sacchari, ad dulcedinem indu-
cendam, q. s. depuretur, & cum ℥ ij. cinnamomi

D 5

selecti,

58 DE MULIERVM MORBIS,
selecti, & ʒ j. pul. specierum diatod. abb. iucun-
diore odore & sapore reddatur. Rursus & hanc
purgationem ebibendam proposuimus: & dia-
cath. ʒ vj. elect. de succo ros ʒ ij. confect. hamecl
ʒ j. syr. viol. ʒ ʒ. cum ʒ iij. decocti supra scripti
fiat potio in diluculo sumenda. Deinde consu-
luimus ut omni mane acciperet cochlear vnum
atque alterum ex syrupo sequenti: & syr. de ar-
temisia ʒ iij. syr. viol. syr. capill. ven. añ ʒ j. misce
Denuo ut ad has pilulas deveniret, præcepit &
pilul. aggreg. ʒ j. cum aqua cichor. fiant pilulæ v.
& circa noctis dimidium sumantur. Et post tres
dies hoc balneo vel simili, si vellent, lauaretur suavis
& artemisia, matricaria, nepita, pleudonardi, fo-
liorū lauri, thymi, añ. m. vj. folior. cichorij, folior.
salicis, añ. m. ij. folior. malua, mercurialis, me-
lissa, añ. m. j. rad. valeriana ʒ ij. rad. apij, petro-
selini, foeniculi, añ. ʒ ij. flor. sambuci p. iij. florū
chamaemeli p. j. coquantur in s. q. aquæ, & fiat
balneum, seu infusus, atq. bis sese lauet, manè &
vesperi ante pastum, & ponat super pectinem
sacculum artemisia repletum; sedeatque in di-
cto balneo super sacculum iis omnibus quæ deco-
cta sunt plenum. Præcepit autem ut per tres vel
quatuor dies continuaret, & cum ex balneo egre-
deretur, ut venter inter umbilicū & pectinem,
& pars posterior ex aduerso, tum renum regio,
sequenti vng. inungeretur: & mucaginis althææ,
sem. malua, lini, foenugræci, extractæ cum aquæ
malua, añ. ʒ ij. olei amygd. dul. medullæ cruris
vituli, butyri recentis, axungia gallina, anseris,
añ. ʒ j. ʒ. adiecta cera fiat vng. partesq. dictæ ca-
lidè

de eo inungantur. Consului quoque ut eodem tempore sumeret trypherae magnae sine opio & conseruae flor. cichorii & capill. ven. veri, añ. 3 s. commista cum iure cicerum rubior. ex balneo egressae exhibeantur. Et quidem cum tem-
 pus adesset quo menses habere solebat, haec age-
 ntur praecepti. & ut mox die sequenti ex saphe-
 ra ambabus incis, altera post alteram, vno die
 interposito, tantum ʒ ij. sanguinis vel ad summū
 res dmitteret. Quibus praesidiis menstrua pur-
 gatio si non subsequeretur, commendabam pes-
 cam ex descriptione Aërii lib. 16. cap. 38. quem
 d. biliosas mulieres valere scripsit, ex elaterio
 cum carica pingui, aut cyclamine cum vino
 aratum.

SCHOLIA.

Si ex temperie calida menses supprimantur, aut
 etiam ex bile, cum non ea ratione laedantur, ut di-
 ctum est prius, conceptionis tantum gratia prouocan-
 tur. Qualia autem haec quae ex nuda temperie laborant,
 conseruant, & qualis victus ratio, superius quoque dixi-
 mus. Eadem etiam conserunt si bilis in causa fuerit
 una cum intemperie biliosa. Interea tamen humor
 biliosus abundans commodis medicamentis purgandus,
 ut manna, rhab. infuso, syr. ex pluribus infusis ros. viol.
 & similibus, praecedentibus tamen syrupis etiam qui-
 busdam digerentibus, & decoctis, ut in Obs. praecedentibus
 ostendimus; quales etiam sunt viol. ros. & succo ci-
 chorij, & boraginis, atque ubi talis quis pluries fuerit
 exhibitus, purgatio adhibenda. Eo humore expurga-

Si bilis in
 causa sit,
 eiusdem cu-
 ratio.

to, pubi & inguinibus etiam quidā cucurbitulas affi-
gunt, vincula infernis partibus, tum cruribus ac ribiis
adhibent; quæq; sanguinem ac vicrū alterare possunt
medicamenta tum intus suscipiunt, tum foris impo-
nunt, Aetio etiam iubente; balneum etiam laudani
aqua dulcis, & infessum ex herbis iam dictis, malua
viol. althææ foliis, hordeo, chamameli floribus. pubem
ac inguina vnguentis inungunt, qualia in Obser. pra-
cedente diximus, vel hoc aut simili: R. olei amygd. dul.
& amar. añ. ℥ j. olei viol. de cucurbita, añ ℥. β. adipi
anferis, butyri recentis, añ. ℥ β. ladani ℥ η. fiat vng.
Pessi quoque conficiuntur ex confusis malua & al-
thææ rad. mercuriali, hordeo decocto, saccharo ru-
beo, adipe anferis, gallina, & similibus omnibus contri-
tis ac simul permixtis, & serico linceo veteri inuolu-
tis: prius tamen antè quàm immittantur, oleis iam
dictis intingunt. Eodem tempore & cremorem sem. 4.
frig. maior. cum hordei aqua vnà cum corticibus pa-
rata, aut aqua capill. ven. vel glycyrr. exhibent. tum &
pastillos ex iisdem sem. adiectis aliis parum calidiori-
bus. Ista si non sufficiunt, ad ea progrediendum qua
menses euocant: de quibus, tum etiam aliis topicis me-
dicamentis, superius plusquam satis dictum est.

OBSERVATIO IX.

De menstrua purgatione retenta ex
melancholia

VIDVA quædā ex mariti obitu ita tota mœ-
sta & melancholica enaserat, vt in ma-
niam ferè inciderit; adeoque vt sanguis crassus
multus melancholicus, ob crassitiem humoris
eiusdem,

eiusdem, non solum vteri vasa obstruxerit, quo minus menses fluere; verum etiam in toto corpore abundare coeperit; lienis obstructione accedente: quod & dolor in hypochondrio sinistro perceptus indicabat; maximè quod tempore autumnali ad me consultum veniret; quo videlicet tempore humor ille magis abundare consuevit. Ideo ut rectè illam curaremus, præcepimus ut totius vitæ institutio ac victus ratio ad calidum & humidum inclinaret; magis tamen ad humidum: cum & hic humor magis cum siccis, quam frigidis participaret. Deinde hanc potionem minoratim, ad feces communes expellendas, quæ & vterum quoque respiceret, præscripsi: & cassiæ recens tractæ ℥ j. confectio-
nis hamech ℥ ij. cum ℥ iij. aquæ artemisiæ, syr. de pomis ℥ β. fiat potio. Deinde cum animaduert-
terem sanguinem melancholicum illum in toto abundare, etiam splene obstructo, in cubito si-
nistro ex vena lienari iussi ut vnciæ quinque san-
guinis, vel paulo plus, extraherentur: qui san-
guis valde crassus & niger erat. Deinde mate-
riam ipsam præparavi decocto sequenti: & su-
maria, summitatum lupulorum, melissæ, arte-
misiæ, borag. bugloss. ceterach, chamæpit. cha-
mæd. capill. ven. polytrichi, añ. m j. rad. cappar.
tamarisci, añ. ℥ β. vuar. passab. arill. repurg. ℥ j.
florum cordial. p. j. polypodij quercini ℥ j. epi-
thymi ℥ β. glycyrr. ras. ℥ iij. sem. fœniculi, petros.
añ. ℥ j. sem. citri ℥ β. fiat omnium decoct. in aqua
communi, pro lib. j. β. col* adde syr. de pomis, de
epithymo, de bugloss. añ. ℥ j. syr. de byzantiis
cum

cum aceto $\overline{3}$ β . misce. Bis in die ex eo sumat; manè in diluculo, & hora quarta pomeridiana: R diamoschi dul. $\overline{3}$ j capiat $\overline{3}$ ij. cū decoct. iam dicto. Si mulieres simul laborant morbo vterino, à diamoscho abstinendū. Deinde vt hanc purgationem sumeret iussi: R diacatholici $\overline{3}$ vj. confectionis hamech $\overline{3}$ ij. β syr. de bugloss. $\overline{3}$ β . dissolue cum $\overline{3}$ ij. β . decocti communis, adiectis epithymi $\overline{3}$ j. β . folliculor. senæ $\overline{3}$ ij. fiat potio: sumatur hora matutina. Die subsequenti à purgatione dedi $\overline{3}$ j. theriacæ cum vino Rhenano exiguo. Mox descriptis iisdem balneis, biliosis convenientibus, & vnguentis iam supra dictis; etiam adhibitis prius frictionibus, vinculis, ligaturis dolorificis in extremitatibus inferioribus; vt tali quoque venam in pede sinistro aperiret præcepimus, at paucò extracto sanguine: adhibitis præterea etiam potionibus menses cientibus, cum puluere aliquo dominarum: de quibus in præcedentibus Scholiis cum Observationibus egimus. Istis si nonilum menses fluerent, consulimus vt & cucurbitulas quoque feminibus & poplitibus cum scarificatu affigeret, & metenchryta vteretur ex decocto balnei superscripti in uterum injecta; hoc etiam pessio: R typhera magnæ sine opio $\overline{3}$ j. myrrhæ $\overline{3}$ ij. galbani, ammoniaci, añ. $\overline{3}$ j. excipiantur succo parietariæ vel mercenialis, aut artemisiæ; fingaturque pessus ex panno lineo raro, qui filo coxæ alligatus demittatur in uterum. Talis enim utilis est non solum retentis mensibus à melancholia, sed & à bile.

S C H O -

SCHOLIA.

Si menstrua purgatio ex melancholico succo retineatur, prout melancholia naturalis, vel magis adusta sit, ea erit purganda. Preparato itaque prius humore peccante pluries assumto syr. de pomis, de succo borag. aut fumariae, aut etiam de epithymo; deueniendum demum ad epithymi ac senae decoctum, in quo misceatur ℥j. castiae fistulae, vel ℥vj. vel plures electuarij lenitius, vel ℥vij. diacatholici, aut ℥ij. confect. hamech. Nec etiam, iuxta quosdam, inconuenit ℥j. agarici in praedicto decocto adicere. Vel prius dentur oxymelitis simplicis ℥ij. syr. acetos. de rad. añ. ℥j. aquae asparagi, florum sambuci, pimpinell. añ. ℥ij. pro ij. vicibus; cinnamomo adiecto, pro sapore delectabiliore; repetatur donec materia digesta sit. Purgetur deinde ut supra. Quidam in purgationibus infundunt myrobalanos: sed quia stipticitatem relinquunt, praestat mea sententia superioribus vii; vel etiam syr. ex insus. ros. cum solius senae; quo & ego vtor. Humore expurgato, possemus & congruo tempore venam in malleolis incidere; potissimum vbi graciliores ac nigriores mulieres fuerint; ac magis si magnas habere venas appareant. Haec enim crassiorem sanguinem, ac magis melancholicum colligunt; ut liquet apud Gal. De curat. per venae sectionem. Post haec medicamenta quae de lentos menses euocant, topica adhibenda erunt. de quibus in precedentibus plus satis; ut non opus sit ea rursus repetere. Quod si diminute fluant, easdem causas habent cum retentione, sed imbecilliores aut pauciores. proin eadem postulant, sed remissiora remedia, & clementi-

Si melancholia aut atra bilis redundarit, curatio.

mentiora: de quibus quoque suprà dictum est. Sic Iusta Teylingia, cognata mea, apud me habitans, valde venusta, cum in minuta quantitate purgationes consue-
tas haberet, & circa praeordia doleret, appetitu de-
iecto, tanquam hypochondriaco malo affecta, praesum-
tis pilulis mastichinis, eo tempore cum menses fluere-
nt hoc decocto largius fluxere, quo factum est ut bene dein-
de haberet: R. artemisia, melissa, flor. chamamel. añ.
m. j. infundantur per noctem in lib. j. vini Rhenani,
facta prius leni ebull. addendo cinnamomi & sacchari
q. s. pro sapore, claretum fiebat. Altera luatione ad-
didi aliquid pulegij, & bellè deinde habuit. At filia
Gertrudis, in coruo nigro Delphis, octodecim annorū,
cum motus epilepticos aliquādo pateretur ex mēstruis
suppressis, quamvis eidem nunquam fluxerant; aperta
vena circa malleolum, & purgatione debite adhibita,
alijsq; remedijs aptis, licet melius habere videretur,
nondum tamen mēstrua purgationes procedebant.
Quare consului ut ex hoc decocto quinque cochlea-
ria omni vespere sumeret, etiam manè: R. sabina, car-
dai benedicti, borag. buglossa, ruta, abrotani, absin-
thij communis, añ. m. j. fiat decoctio in vino Rhenensi.
Hoc remedio tandem menses aperti sunt, nec amplius
passa motus epilepticos, probè conualuit. Utebatur
verò quotidie hoc solo remedio ad tres menses vel
quatuor. Verum cum saepe consillas inflammatas ha-
beret, imperavi ne continuè, sed potius per intervalla,
hoc remedio supradicto satis calido uteretur; & ut
idem apozema decoqueret non in vino, sed in cereui-
sia communi. Qua deinde bona valetudine usa, post
aliquot annos nupta, nunc mater multarum prolium
est. Verum his absolutis, nunc tempestivum erit ut ad
immo-

*immodicas vteri purgationes curandas accedamus,
ab Observatione, more solito, initium sumentes.*

OBSERVATIO X.

*De muliere ex longo mensium profluvio
laborante.*

CUM ex Italia reuersus, Parisiis aliquot mensibus medicinam facerem, antequam Pithueras accederem, mulier quædam quatuor mensibus in lecto detenta, continuo menstruo profluvio ad Pontem diui Michaëlis laborabat. Sicuti clinicus Medicus, qui curat medicamentis, dictus à lectis ægrotantium, quos frequenter frequentare solet, quasi lectularius: (sic filiam Clinici, id est, Medici Martialis appellat) Ita & Clinici dicuntur qui tantopere morbo affecti sunt, ut surgere è lecto non possint. Sic Petronella clinica apud diuum Petrum dicta, cum grabato decumberet, quem Græci *κλινικόν* vocant. Hoc modo & hæc mulier ex lecto surgere non potuit. Ad hanc ab hospita mea, cuius affinis erat, deductus, præscripsi victus rationem conuenientem, quæ restauraret, & simul alia, quæ ad menses sistendos facerent. Turturæ quoque accepi moderatè pinguem, ab intestinis & fecibus repurgatam, eum deplumatum lauari iussi in vino rubro constringente & aqua ros. Deinde vnciam vnā mastiches in ventre ponebam ac assuebam ne elabi posset; atque ita veru ad ignem rotabam, & inter assandum, loco
E butyri,

butyri, aceto rosaceo aspergebam, pinguedinemque ex eo defluentem colligebam, & vsui re-
 seruabam. Post perfectam assationem, turturem
 ab igne ac veru depositum, in ollam nouam vi-
 treatam coniciebam, luto philosophico obthu-
 ratam, & in furnum calidum demittendo, vt
 turtur perfecte exiccati posset, vnà cum ossibus
 & carne in pollinem tenuissimum redigebam.
 Huius pulueris magno comodo dabam omni
 mane cochlear vnum, modò cum aqua planta-
 ginis, modò cum alio decocto constringente: &
 pinguedine reseruata inter rotandum extillata,
 imum ventrem, tum pectinem, inguina, & re-
 gionem renū quotidie vt inungerent, mandauī.
 Erat hoc vnū ex arcanis præceptoris mei Elidei,
 apud Bononienses practici clarissimi. Puluere
 hoc eum vti vidi felicissimè in multis matronis
 nobilibus; omnem enim diarrhœam sanat, ven-
 tris diuturna profluvia, omnemque humiditatē
 consumit, album tum rubrum fluxum mensium
 restringit, sedat matricis dolorem. Venit & tunc
 mihi in mentem illius mulieris Romanæ, quæ
 in Nosocomio Mariæ consolationis longo tem-
 pore ex eodem malo decubuerat: nec sanari po-
 tuerat, donec tandem, consilio vetulæ, nouem vi-
 cibus 3 j. pul. ossium humanorum ex vino rubro
 assumpta, sanata est. Id medicamentū à Cornelio
 Roterodamo Medico habui, qui ante me Romæ
 huic Nosocomio, quod apud Capitolium situm,
 inseruierat. Post hunc enim ipse Romam veni, &
 eodē præceptore, nempe Gisberto Horstio, huius
 Nosocomij protomedico, familiariter vsus sum.

S E H O -

SCHOLIA.

NVNC de immodico fluxu menſtruorum dicturi ſumus. Proprius hic quoque vteri affectus eſt, ſicuti retentio, de qua paulo ante egimus: qua quidem affectiones, cauſa etiam multarum aliarum affectionum exiſtunt. Moderati ſunt menſes in omni muliere ſi ſana ſit, vt duarum heminarum Atticarum menſura (vt antea quoque diximus) ſecedant, aut paulo plures, vel pauciores; atque hoc ad duos aut tres dies, Hipp. auctore lib. De morbis muliebribus: longius autē tempus, vel breuius morboſum & ſterile eſt. Albi & molliſſimis mulieribus, quod multus tenuisq; ſanguis in eis colligatur, diutius permanent, (quod ad ætatem & dies attinet;) nigris verò, duris, ac gracilibus contrarium euenit, ex Gal. ſententia 6. De morb. vulg. Cùm itaque ſolito ſunt menſes plures ac copioſiores, tunc nimiam eorum purgationem appellamus, Græci *ὑπερκατάργον* ſeu *αἰμορροαγίλην ὑσέπας* vocant. Profluunt verò immoderate menſes, modò quidem vno impetu plurimo ſanguine euacuato: nunc verò ſenſim profluente, ſed diutius quàm oportet, nec tempore menſtruo obſeruato. Verumq; enim fieri videtur. Sed & in partu modum aliquando purgatio excedit, qua ſecundum naturam fiebat. Tunc verò menſes immodicè profluere dicimus, quando ſanguis profluit. Si enim alij ſint humores à ſanguine, alias habent appellationes, vt vteri fluores: qui quidem etiam colorum diuerſitate euariant, vt modò albi ſint, modò virides, modò tenuem ſanictam ſeroſam referentes, nunc pituitam: de quibus poſtea. nūc de immoderato ſanguinis profluſio per vte-

Profluunt
menſium
duobus mo-
dis euenire
potelt.

rum agimus. Id trifariam fieri volunt, vel collatione habita ad priores circuitus, ita ut sanguis copiosior, quàm consueverit, & per plures dies prodeat, vel à partu, vel etiam ab abortu, ad quos plurimus sanguis insequatur: quanquam in hoc veluti & in reliquis naturalibus excretionibus non quantitas duntaxat pro scopo proponenda est, vel qualitas, aut genus substantiæ, ut lib. De differ. sympt. cap. ult. scriptum est: sed si tempestiuè, vel intempestiuè fiant, ad animalis commodum, vel incommodum. Quapropter tunc nimiam vel immodicam dicemus (ut & Donatus annotauit) propriè mensium purgationem, cum ea amplius non tempestiuè, neque ad animalis commodum fiat; sed potius intempestiuè, & noxa ac nocumentum ex ea mulieribus consequatur. Nam quandoque plus in slo purgabuntur absque earum læsione, propter longam desidiam, & victum liberaliorem. Tamen si vltra modum fluat in partu, abortu, vel sine his, collatione habita ad priores circuitus, ut diximus, etiam lædit. Et sic menses dicentur quoque redundantes, quando purgatio naturalem modum excedit, & euacuatur multus & optimus sanguis, vel post abortum, vel post partum naturalem, vel post vsum medicamentorum aperientium orificia venarum, & post pessaria acris & corroderia, & alias causas, (de quibus postea) quæ sanguinem mouere possunt. Ita & Fernelius: Immoderata autem, inquit, mensium purgatio vltra naturæ vitæq; modum est, quæ aut copiosior sanguis, quàm pro multitudine, aut diutius profluit, aut crebrior, aut non statò circuitu redit. Quòd verò in hac affectione vterus oblesus sit, nemini in dubium venit. Nam mittuntur in venas, quæ vtero committuntur menses,

(vs

Quid per
immodicā
mensium
purgatio-
nem intelli-
gendum sit.

Pars quæ
afficitur.

(ut prius de retentione mensium dictum est) tanquam ad omnium infirmissimas partes, qui eisdem mulieribus valentibus existētib, antequam concipiant, salubres sunt purgationes. Qua de re si immodicè profluant, ipsum vterum affectum esse indicabunt, aut per se solum, vel simul cum toto corpore, vel aliquibus partibus eius. Affectus verò symptoma est in genere excretorum immodicè; non tamen toto genere præter naturam, veluti reliqua sanguinis profluvia. Nam præter eam quæ mulieribus per vterum erumpit, cetera sanguinis pluscula vacuationes toto genere præter naturam sunt: illa verò sola multitudinis seu quantitate, ut liquet ex Gal. 3, De caus. sympt. Fernellius duas differentias constituit, immoderatam, vel crebriorem purgationem. illam ἀπεργον κένωση τῶν κατὰ μὲνίον; hanc ἀτακτον καὶ συχρότερον καὶ ἀσθεν. Alij aliam constituunt naturalem commodam & utilem, etiam si consuetæ purgatione sit maior, ob cibum & potum largiorem, sed quia non lædit, ideo neque restringendam: Aliam verò superfluam & ledentem. Atque hæc rursus in diuturna, aut recens; ante periodum veniens, vel diutius durans, vires deiciens; vel post evacuationes, sanguinis narium fluxum, aut hæmorrhoides, superæniens, magisq; debilitans; vel sine vlla harum ægritudinum præcedente. Alia quoque differentia ex parte sanguinis: qui vel purus, laudabilis, niger, feculentus, fuscus, albus, aut citrinus existit: & ex parte substantiæ crassus, viscosus, subtilis, liquidus, mediocris, aut coagulatus. Hæc sanè atque alia ad curationem prosunt, vti & causæ ipsæ. quæ licet varie esse possint, sunt tamen eiusdem generis cum sanguinis mictu & reliquis sanguinis profluviiis. Erit enim

Quis præter naturam affectus sit mensium profluvium.

Differentiæ.

Causæ.

Anastomo-
fis.

Anastomosis dicta, cum maiora vasa aperiuntur: vel Diapedesis, cum minora: vel Diuresis cum soluitur continuum. Ita & Galenus: Fluit sanguis e venis (inquit) ob earum corrosionem, vel propter osculorum apertionem, aut resudationem: diapedesin vocant. Anastomosis easdem habet causas, quas & per naturam habet: nempe expultricem vim pruritatis. At pruritatur molestia quanti, vel qualis. Sed in eo quod praeter naturam, non solet sola quantitas urgere, ut Iacchinus quoque dicebat; at maximè qualitas, salsa, nitrosa, acris. Huiusmodi enim sanguinem vitiosum aliqua natura congregant, ut in lib. De atra bile Gal. scribit, & experientia monstratur, cum sanguis vene sectione extrahitur. Sic ergo gracilibus & biliosis mulieribus fieri aliquando istas fluxiones videmus. sic & in partu eueniunt. Quod si dicas, Si vitio vel quantitate irritatur natura; debuit igitur cum primum purgatum est vitium, aut imminuta quantitas, sponte sua cessare: quod si fieret, nihil haberet praeter naturam, vel morbosum, sed utile: purgante scilicet natura excrementa vnde cacochymum corpus reddi posset; & tollente multitudinem vnde mala multa eueniunt: Cur est ergo ut superfluat? Respondet Iacchinus: Ut in superpurgatione vel superpurgantibus contingit, ut irritata natura non pellat modò excrementa propriorum humorum, quae à medicamento trahuntur; sed praeterea & utilia simul: sic & hic euenit, ut incipiat quidem expurgare inutile; sed ex pruritione quasi furibunda opere expellendi excedat. Sic igitur naturale opus symptoma euadit. Quod si Anastomosis à causa procatactica fiat, ut à medicamento venarum ora reserante, non veniet hic fluxus ad immoderationem

nem
Li. 7.

nem talem . poterit tamen & hac causa addi , quasi profluuium præter naturam faciat, id est, extra tẽpus & ordinem natura, & medicamentis egebit apertionem corrigẽtibz. Diapedesis verò fit ex apertis minoribus vasis, vnde resudare sanguis dicitur, id est, sensim stillare, non vt in anastomosi confertur . Accidit & incontinentia, vnde facillẽ ea venæ onerantur , & repleti respuunt: sed sensim remittunt, nec continent. Accidit & ipsius sanguinis tenuitate, ob quam resudat ab venarum osculis. In diarexi, vel in solutione continui, causa est prima protatarctica, vt venas dirumpens, seu dilacerans , quod in partu difficili solet euenire. Fit & ex corporea causa excedente, vt ex vlcere, & erosione vel arrosione. Arrosio venæ, fit nonnũquam per pessaria acria, vel alia medicamenta caustica & acria, quæ vlcerationem aut excoꝛiationem excitauerant: quod deprehendetur, si antea vsa fuerint acerrimis medicamentis . Fit aliquando & arrosio à causa interna ; à bile quoque aut sanguine acri , aut pituita salsa . Eroduntur denique à succo vitioso & mordaci, sanguine corrupto , aut aliis humoribus misto. Rumpuntur sanguinis copia , aut onere aliquo leuato, à fœtu grandiore, partu difficili, aut abortu. Vasa vulnerantur imperita manu obstetricis , aut chirurgi fœtum mortuum extrahentis . Contunduntur sepe percussione & casu. Referuntur hæc ipsa ad causas externas quoque aut internas . Externæ verò sunt, seu primitiue dictæ, vt percussio, casus, obuiatio rei duræ, vulnus, cursus, saltus, chorea longa ac violenta . Ita Domine cuidam apud Valescum , ex pedestri itinere, venæ ruptæ fuere; nec potuit restringi fluxus mēstruorum, vt inde mortua fuerit. Huc referuntur vsus diu-

Diapedesis.

Diarexi.

Arrosioq.

Ruptio.

Causæ externæ.

Causa interna.

turnior ciborum acrium, aromatatum, vini albi, & medicamentorum, ac omnium eorum qua sanguinem tenuiorem gignunt. Causa interna seu antecedentes, ut locorum calor exuberans, sanguinis redundantia, facultas expultrix valens, retentrice imbecilla, uteri intemperies sanguinea, humores acres, subtiles, falsi, biliosi, sanguisq; subtilis, humorum abundantia, parvus ineptus, multitudo aut fetus magnitudo, exitus inconueniens, uteri apostema, vlcus. Gordonius ad tres causas eas refert, ad virtutem, membra, humores. Ut virtus expulsiua fortis, contentiua debilis: membrum rarum, molle, laxum, latum, apertum: humores quantitate vel qualitate, calidus, subtilis, acutus, falsus, mordax, putridus, venenosus, aquosus, frigidus. Hac & similia exemplis subsequenribus illustriora fient: cum causa varia varias curationes quoque postulent.

OBSERVATIO XI.

De superfluo mensium profluvio, cum insigni virtutis debilitate.

CORNELIA Iohannis, mulier si quæ altera pulcherrima, cum duobus mensibus integris continuò superflua mensium purgatione laborasset, admodum debilis euasit: ita ut ex virtutis debilitate hunc fluxum fieri coniectarem. Hac erat prius rubicunda facie; nunc ob fluxum pallidi & mali erat coloris, hepate quoque debili existente; pigra erat, & parum aut nihil remittebatur fluxus: nam etsi ex debilitate contentiuae virtutis guttatim quidē & paulatim inordinatē

ordinate flueret, tamen quod id incessanter fieret, macilenta plurimum euasit; verum inter exeundum ardorem nullum vel puncturam, aut dolorem, aut aliquam adustionem percipiebat. Hæc cum animaduertissem, & cum ad eam, annum 39. agentem, Alcmariæ in via Prætoria dicta, anno 1549. mense Octobri accessissem, quod ex virtute debili contentiua hunc fluxum pateretur, omnibus modis studui hunc fluxum constringere, præscribendo confectionem hanc in rotulis: ꝛ trochis. de carabe ꝑ ij. flor. ros. rub. exsiccat. balauft. seminis myrtill. plantag. sem. sanguinariæ nostræ vulgaris, añ. ꝑ ꝑ. pul. marg. perforat. & non perfor. fragmentorum omnium lapidum preciosor. añ. grana iij. redigantur omnia in pollinem, & dissoluantur cum aqua menthæ, ros. q. s. adiecto sacchº, fiat confectio in rotulis ponderantibus ꝑ ij. Iis utebatur bis aut ter in die, supersorbendo cochlear vnum ex syr. infra scriptis: ꝛ syr. myrtini, cotoneorum, rob de ribes, añ. ꝑ ij. syr. menthacei ꝑ j. misce. pectine, inguinibus & regione renum inunctis cum oleis mox sequentibus. Aliquo modo restringebatur fluxus. Verum cum aliquando quasi sanguis congelatus & trumbosus exiret, has tabulas denuo præscripsimus: ꝛ seminis agni casti, sem. coriandri præparati, añ ꝑ j. trochis. de carabe, cinnamomi optimi (ob sanguinem trumbosum) nucis molchatar, añ. ꝑ ꝑ. in pollinem redacta, & in decoct. aquæ plantag. & melissæ soluta q. s. adiecto saccharo fiat confectio in tabulis, vt artis est, qua ad libitum utebatur. Verum cum pro-

E 5

fluui-

fluuium magis vrgeret, hoc sequens conditum
 præscripsimus: & confer. ros. antiquæ ʒ iij. pul.
 ros. rub. carabes (dicitur enim sanguinem dissol-
 uere & constringere) trochis. de spodio cum sem.
 acetosæ, añ. ʒ j. cum syr. myrtino q. s. fiat condi-
 tum. Capiebat ad magnitudinem castanæ ter
 quaterve, vel pluries in die. Si aluum non redde-
 ret, glande sola irritabamus, & hoc ceratum su-
 pra ventrem inferiorē apposuiamus: & vnguenti
 comitissæ ʒ β. vel ʒ j. mastiches, ros. rubrar. ex-
 sicc. acaciæ, balaust. coralli rub. cornu cerui vsti,
 añ. ʒ j. in puluerem redacta cum oleo ros. q. s. &
 cera, ac parum ladani, simul vniantur, & fiat ce-
 ratum secundum artem supra corium, seu alu-
 tam, ut vocant; & supra ventrem inferiorem,
 tum dorso, applicetur, iis prius inunctis cum
 vng. comitissæ. Fiat in duplici forma, vna pro
 ventre inferiore, altera pro dorso, ac renibus.
 Verum omnibus istis supradictis menses non
 sunt restricti; & quia plus æquo fluerent, & me-
 tus esset de syncope ac morte, id quod sequitur
 dedi vnica vice & vnico hantū cum vino rubro
 stiptico: & boli arm. veræ ʒ ij. trochis. de terra
 sigillata ʒ β. pul. carabes, lapid. hæmatitidis, fra-
 gmentorum omnium lapidum preciosor. añ.
 gran. iij. redigantur in pollinem: & cum sum-
 plisset, menstrua purgatio cessauit. At paucis
 diebus aluus restricta manebat; vnde etiam do-
 lor capitis aliquantulū cum vigilia eandem in-
 festabat. sed sumpto diaprūno simplici in bolo
 ad ʒ vj. tantum, paucō saccharo adiecto, aluum
 bis deposuit. Fronti epithema admouit ex aquæ
 plan-

plantag. ℥ ij. aquæ flor. chamæmel. ros. añ. ℥ j. aceti parum & olei ros. deinde inunxit vnguento alabastrino; & pro vigiliis & siti cepit ex mixtura sequenti: ℞ syr. viol. pap. añ. ℥ ij. syr. de succo acetosæ ℥ j. rob de ribes, & ex manu Christi perlata (vt vocant) pro vitium roboratione. Ita hæc accidentia omnia cessarunt, & mensibus non amplius fluentibus, hæc, Dei optimo nutu, sanata est.

SCHOLIA.

NON solum causa diligenter sunt perscrutanda, sed & signa ipsa, antequam curationem rectè incipiamus. Ita exemplo præcedente ostendimus, cum fluxus hic esset sine dolore ex virtute contentrice imbecilla, vnde cum diu durasset hæc purgatio menstrua, statim illam restringere oportebat. Sed quod ad signa attinet, cum illa varia quoque sint, præfagientia imprimis perlustranda, quæ ad præuisionem & imminentem affectum quoque vtilia sunt: atque hoc generale & proprium habent, quod causa præuisiua, seu præcætica dictæ, plures, vel saltem aliqua præcedant: ita mulieribus choreas ducentibus tempore mensium, prædicere poterimus superfluam purgationem subsequuturam. Sic iuueniculis imprægnatis vix 14. annum excedentibus, ex partu difficili, aut fœtu maiore, vel abortu, ruptis cotyledonibus, fluxus maior subsequi solet: & his quibus vrina nigrior apparet in multa quantitate, cum sedimine nigro, menses mox fluxuri sunt. Sic istis diebus in vxore cercuisiarij cum talis vrina appareret, & circa pectinem valde doleret, abortum
Signa præfagientia.
N.
futurum

futurum prædixi, & quod magnus fluxus consequeretur; vii euenit: quamuis hæc ipsa à nobis curata fuit.

Signa demonstratiua.

Quantum ad signa demonstratiua, licet hæc ex relatione mulieris cognoscantur; statim etiam laboranti, ex 1. lib. Cleopatra & Mosch. sequitur lassitudo corporis, & tenuitas, sædus pallidusq; color, & fastidium, & iuxta Sylium, pedum mollis tumor, virium corporis prostratio, coctio vitata, & ciborum cupiditas; atque in totum omnia quotquot immoderatam sanguinis euacuationem, siue ex hæmorrhoidæ, siue alio quopiam sanguinis fluore eueniente, sequi consueverunt; ut hydrops & conuulsio, qualia & Galenus ait feminas infestare accidentia. lib. 6. De loc. aff. cap. 5. & 2. De facult. natur. Alij addunt, adesse & dolorem pectinis, vel subsequi, anchorum quoque, & grauedinem crurum & coxarum. Ut autem rite (quod præcipuum est) diuersa causa huius immodicæ excretionis inuestigetur, primum considerata est erumpentis sanguinis multitudo, & delationis modus. Ex

Quæ animaduertenda sunt pro causarum cognitione.

Signa, si sit ex anastomosi.

11.

his namq; perdisces, num ex vasorum ruptura, reseratione, aut erosione fiat. Nam amplioribus vasis ruptis, aut apertis, magna sanguinis copia confertim profluit: minoribus verò, vice versa, ut inquit Aërius. Ita anastomosis copia exitus confertim facti: & eo magis, si in corpore affectus præcesserint, cacochymia soboles. Idem coniiciendum, si signa cacochymia sanguinis adsunt, vel morbus præcesserit, qui per crisin sic finiatur: quanquam de profluvio dictum est De feb. sapius. si enim critica illa purgatio fuerit, modò non sit superflua, ut ibidem sapius diximus, non est inutilis, nec constringenda. Ex his iam dictis scimus, si cum copia & confertim fertur, cerè anastomosim esse.

esse. In diapedesi verò sensim excernitur sine dolore, & sanguis tenuis ac dilutus est. At erosione factus fluxus dolorem habet adiunctum, virusq; & sanies una emittuntur. Fit hoc vel circa ceruicē, vel in ipsa vteri cavitāte. Iam quoque si ea quæ præcesserunt, consideres, nam ex ruptura, vel apertione vasorum sanguis profluat, promptè perdisces. Nam eis disruptis, aut vehemens frigus, aut vehemens motus, vel sanguinis abundantia præcessit; ut nunc diximus; aderitq; interim aliquis dolor. apertionem autem eorum non frigida, sed è contrario calidæ dispositiones præcedunt; veluti si multis, eisdemq; calidis balneis mulier usa fuerit, atque terram seu regionem inhabitet calidam, fueritq; antecedens tempus eiusmodi; similiter quoque alimenta, & potiones; nullusq; dolor aderit. Ab erosione si sanguinis profluvium prodeat, dignosces ex supradictis; quod non confertim quoque, sed modicus ac paulatim, & cum maximo dolore defertur, Aëtio quoque teste lib. 16. cap. 64. Quod si erosionis causa redundantes in toto corpore vitiosi succi fuerint, biliosi, inquam, aut pituitosi salsi; tum ex reliquis eorundem humorum propriis indicis, tum etiam ex colore eiusdem qui profluit sanguinis menstrui percipies, iuxta Hippoc. sententiam lib. De morbis muliebribus. Ita ex parte materiae: nam si sit fluxus sanguineus, vel sanguis in toto corpore prædominetur, totius habitus erit carnosus, eritq; mulier rubicunda, nequaquam male colorata; nec ita debilitabitur; urina erit quoque rubra & crassa: præcessit otium, vita quieta, ususq; ciborum sanguinem multiplicantium. talis non est restringendus, nisi abundet. Si à putrefactione, sanguis fluens erit corruptus, mali coloris, foetidus, & subinde exiens

Si ex diapedesi. N.

Ab erosione N.

A diruptione vel apertione signa.

Signa erosionis quomodo cognoscuntur.

Signa ex materia desumpta.

exiens cum punctione & dolore. Ex sanguine bilioso maiorem ardorem, dum exit, sentiet mulier in labiis vulua, eritq; ea ipsa macilenta, citrina, & plurimum debilitatur; vrina verò est subtilis, citrina: vsus aromaticum præcessit, synapis, allij, piperis; cibi quoque ac medicamenta acris; labor quoque cum exercitia vehementia præcesserunt: in exitu sentitur caliditas, ardor, & velociter emanat, at in parua quantitate: sitibunda erit, & labia ob calorem quandoq. findentur. Si sit sanguis pituitosus, mulier quoque pituitosa erit, & humida habitudine, mollis, pallida, malè digerit, & venter humilitate superflua abundat, & omnia illa adsunt quæ pituitam notant & eam adaugent. Ex colore sanguinis, ut ex Hipp. paulo antè diximus, etiam notæ habentur. Sic panni linei intincti sanguine, & demum exiccati in vmbra, ex quo humore fiat, nobis declarant, etiam teste Rhase ac aliis Medicis. Albus pituitosus, citrinus biliosus, liuidus melancholicus, purus sanguineus. Ex parte membri: Si à ruptura venarum vteri, multus est & subito eueniens: ex profundo niger, quod quidem verum si à materia adusta: tunc enim denigratur: minus niger magis profundatur in matrice, idq; ob corrosionem; vbi corrosio diuturna, etiam foetet. At si arteria corrodat, subtilior est, & clarior, & calidior, exiens cum maiori impetu, & minore interuallo quàm ex venis. Fit autem magis trumbosus ob calorem, perueniens ad partes frigidiores. Si erosio sit in collo, tactu percipitur sæpe. Si sit ex corrosione venarum vteri, paulatim cum dolore exit. Causa verò externa & primitiua facile habentur ex relatu ægri, si casus, saltus, & alia præcesserint. Interna verò, ut iam constat ex iis quæ diximus, diligentiori

Signa ex
parte co-
loris.

Ex parte
membri.

Causæ ex-
ternæ facile
cognoscun-
tur.

gentiori animaduersione egent. Si sit ex virtute forti, in toto repletionis signa aderunt, totiusq; corporis aggravatio: talis ferè criticus est. Si verò ex debilitate virtutis, ea aderunt quæ in Obser. precedente diximus. At qualis sit materia & humor ex prædeterminio, diligentiore examine, tum ex colore, ut nunc paulo antè recensuimus, inuenietur. Siue autem in collo, siue in profundo vteri hæreat malum, ex dolore etiam percipietur. Hæc omnia ad curationem faciunt. quod & exempla adhuc dicenda manifestabunt. Sed antequàm ad prognostica signa seriò veniamus, exemplum hic de muliere interseremus, quæ ex abortu purgatione nimia subitò syncopem incurrens, non diu post mortua est.

Causæ internæ difficiliter cognoscuntur.

OBSERVATIO XII.

De ingenti & lethali menstrua purgatione ex abortu.

QVOD ex abortu mulieres maximè periclitentur hoc nimio profluvio, in causa est, quòd abortus violenter separat chorion membranam à venarum osculis, & abrumpit. Itaque eadem causa, quæ violenter agit, etiam impetum facit in pellendo sanguinem: quia verò violenter separat, ora aperit vasorū, vnde sanguis cum tanto impetu fluit, ut statim vires dissoluat. Ita euenit mulieri in parte septentrionali prope ædem diui Georgij Delphis, cui ex abortu adeò subsequēbatur sanguinis menstrui purgatio, ut in syncopem incideret: à qua licet nostra industria euaserit; subsequente tamen febre, remediis, & ad fluxum aptis, nullo modo inhi-

80 DE MULIERVM MORBIS,
inhiberi aut sanari potuit, vt tandem, viribus
deficientibus, occubuerit. Aliae nihilominus non
paucae, simili malo laborantes, à nobis curatae
fuerunt.

SCHOLIA.

Signa pro-
gnostica.

TALES quidem serè omnes cum difficultate cu-
rantur: quamuis multas etiam post abortum cu-
ratas vidimus. Ideo qualiscunque fuerit menstruae
purgationis immodica vacuatio, haudquaquam sper-
nenda est. Nam etiam si subito non moriantur, tamen
nonnullae, cum vteri nimio sanguinis profluvio labora-
runt, hydropem accersuerunt, vt antea quoque dixi-
mus, Galeno auctore 2. De natural. facult. Id quod
etiam timendum diximus in omni menstruae purga-
tionis cessatione, vt idem inquit, cum vtrumque ad
extremam frigiditatem mulierem ducat. Quae verò
mensuum profluvia grauiiores partus consequuntur,
haud ita periculum minantur; quinimmo etiam ple-
rumque sua sponte cessant, vt inquit Paulus cap. 62.
lib. 3. At si abortiui foetus causa fiant, repentinum ple-
rumque periculum inducunt, vt liquet tam ex Aëtio
quàm Paulo. Vti & in hac euenit. Verùm ex quacun-
que tandem causa fiat mensuum profluvium, vbi fue-
rit immodicum, animi deliquium minatur & synco-
pen, vt patet 1. De art. ad Glauc. quare etiam quam-
uis naturalem partum consequatur, mortem infert
nonnumquam, velut in reliquis accidit immoderatis
sanguinis profusionibus. Magna quoque cum difficul-
tate curatur, praesertim si ab vlcere, & si diuturnum
sit

sit profluuium: quamuis & nos tales aliquando etiam
 curatas vidimus. Sed & illud quoque aduertendum,
 quod Hippocrates ait: Si pragnanti fluunt menses,
 non posse sœtum sanum esse: hoc enim Galenus 6. De
 loc. aff. verificat: si multus effluat ex venis vteri. Solu-
 tis enim acetabulis id fieri necesse est. Sed euenit ali-
 quando ex venis ceruicis, idq; exiguum; vnde nihil no-
 cet: quemadmodum contigit nobilissimæ Matronæ
 Schoonhouia vxori Domini Cornelij Zuzij Prasidis
 Hollandiæ. Interea tamen menses immoderati non so-
 lum dierum numero, vt si continenter fluant ultra
 dies quatuor, quinque, sex, septemve consuetos mu-
 lieri, sunt æstimandi; sed potius vacuati sanguinis
 quantitas tibi (inquit Syluius) obseruanda ex mulie-
 ris plenitudine, habitu, viribus, tolerantia, colore. Nam
 si talia & tanta euacuentur, qualia & quanta va-
 cuari oportet, confert, & leuiter ferunt mulieres: nec
 antè est cohibendus hic fluor, quàm vires collabi in-
 cipiant, & color viuidus perdat, symptomataq; eius
 alia leuiora impendeant; grauiora enim ne expectes. Si
 namque menstrua (teste Hipp. aph. 58. lib. 5.) plura
 fiunt, accidunt morbi; scilicet appetantia prostrata,
 coctio omnis imbecilla, virium omnium deiectio, to-
 tius refrigeratio, decoloratio, emaciatio, ex morbo se-
 nium, sterilitas, pedum inflatio, hydrops, bilis feruor,
 febres biliosæ, hæcticæ, cachexia, lipothymia, syncope,
 mors senibus repentina, iunioribus tandem superue-
 niens. Vide Rocheum. Mulieri quoque (iuxta Hip-
 poc. aph. 39. lib. 5.) menses desolores, per idem semper
 tempus venientes, purgationem indicant esse necessa-
 riam. Mensium fluor redundans iuuenibus molestissi-
 mus, senibus autem vt plurimum lethalis. Si longo
 F tempore

tempore durant, tandem aquas cutem subeuntes inducunt, & animam subinde agere cogunt. In fluxu enim muliebri si conuulsio & animi defectus aduenierit, malum. Non confestim sanguinis impetum localibus remedijs reprimere conandum (hac etiam ad curationem faciunt): nam multa sequerentur incommoda, nempe hydrops, neruorum aut oris ventriculi, aut capitis, parthemia. Si per eclipsim solis aut luna fluant menses, sisti non possunt, ut visum Apuleio Platonico; neque si iam diu fluxerunt, quia vasorum ora occalluerunt: id quod saepe accidit propter mulierum verecundiã, maximè si cacochyma, aut potius cachectica fuerint, ac etiam vetula & excrementosa, nisi saepe purgentur, & victu euchymo succi malignitatẽ emendent. Fluor mensium criticus, aut corpus plethoricum expurgans, non sistendus, donec sit quantitate præter naturam. Si magis exuberat in fine veris & æstatis tempore, nempe in principio æstatis, ob sanguinem sit prædominantem: in fine æstatis & autumni principio, ratione bilis: in fine autumni & hyemis principio, ob melancholiã adustam: in fine hyemis & principio veris, ob pituitã. quamuis tamen quouis tempore euenire possunt. In corpore sanguineo, iuxta quosdam, non subito restringendus, ob plethoram: liberat enim egram à suffocatione vteri, lepra, phthisi, feb. putrida & apostematibus perniciosis. At mulieri sanguinem euomens, iuxta Hippoc. mensibus erumpentibus, solutio: & post hemorrhoides in sana muliere euenientes, virtute constante, bonum. In die critico non perdurantes, vitiles, & in iis quæ synochum patiuntur aut feb. sanguineam putridam, ut in nostris Observationibus De feb. multis exemplis ostensum

sum est. Signa mala sunt si symptomata superius enumerata succedant. Nunc ad curationem ascedamus, prius hoc sequenti exemplo in medium producto.

OBSERVATIO XIII.

*De superflua menstrua purgatione
ex anastomosi.*

MULIERI cuidam cum impetu sanguis menstruus copiosè & confertim emanabat, venis magnis apertis, ex anastomosi. Ad hanc cum venissemus, victum ei instituímus, qui nihil commoueret, sed quietem faceret: & primùm cum satis robusta esset, in ediam quantam ipsa ferre posset imperavimus; sed quia hæc non ita ieiunium ferre consuetæ sunt, insinimus, ut actu frigidū ac potestate esset quod sumeret, & ut cibus eligeretur quantitate moderatus, & qualitate astringens, bonique succi, similisque potus. Sic enim Aëtius circa initia micæ panis ex posca exhibebat, ubi præsertim ieiunium tolerare nequirent; aut oryzam ex posca, aut ouū sorbile, molle, frigidum; in quem usum etiam simlagine, amylo cum posca ut vteretur concessimus, atque omnia actu frigida & potestate frigida enim densant & immobile faciunt. Ut à vino omnino abstineret præcepi: Nam, ut Paulus admonet, vinum omnino pro potu vitandum est. Sed aqua pluuiali secundum eundem utendum, in qua etiam ignitum ferrum fuerit extinctum; aut aqua in qua oxalidis, polygoni, seu plantaginis folia fuerint decocta, aut myrti fructus, seu cydonia: ipsa item posca pro potu

84 DE MULIERVM MORBIS,
vti conuenit, non quidem frigida, sed tepida, vt
Aëtio visum est. Ego iuleb rosatum cum aqua
pluuia commodè admisi: & pro cibo etiam pos-
tea carnes siluestres potius, quàm domesticas;
quibus, vbi opus esset, magis assis vteretur, quàm
elixis; vt phasianorum, sternarum, perdicum,
merularum, turdorum, aliarumque paruarum
auium montanarum; è quadrupedum genere,
leporum, cuniculorum, seu capreolorum, si re-
perirentur. Cùm eisdem assis vteretur, in earum
iure polygoni, plantaginis, aut oxalidis folia de-
coqueret, aut etiam fructus astringentes, vt
myrti, seu cydonia. Præterea imperaui vt aërem
eligeret temperatum, aut parum ad siccum fri-
gidumque vergentem; & vt somno temperato
vteretur, vel etiam longiore; cùm omnibus mo-
dis prouocandus sit, si quæ minus dormire pos-
set. Præterea consulimus, vt omnibus modis
caueret à motu, atque exercitio, & vt animi af-
fectus immodicos vitaret, præsertim iram; &
quietem amplecteretur. Nam si motus vitandus,
ne humorum impetus augeatur, quanto magis
dolor, qui valde humores commouet in eas par-
tes, quæ laborant? Quod ad reliqua præsidia at-
tinet, cùm adhuc satis valida foret, statim ex
vena basilica dextri brachij vt sanguis euacuare-
tur, nobis vtile visum fuit. altero die sequenti
eadem quoque fuit sectio iterata, at pauco ta-
men sanguine extracto. de qua venæ sectione in
Scholio latius. Pro purgatione exhibui quod se-
quitur: ꝛ myrobal. citrinarum ꝓ ij. infunde per
noctem, facta leui ebullitione in aqua plantag.
manè

manè vbi tepuerit, manibus confricetur, & sumantur huius express. \mathfrak{z} iij. adde rhab. optimi parum tolli \mathfrak{z} j. pulpæ tamarind. diaprunis lenitiui, añ. \mathfrak{z} ij. syr. de ribes \mathfrak{z} β . misce. Bene excreuit, quia facilis solutionis erat. Altero die dedi syr. sequentem: & syr. de ribes, syr. granat. syr. cotton. añ. \mathfrak{z} j. aquæ acetosæ, plantag. bursæ pastoris, añ. \mathfrak{z} ij. misce pro ij. dosibus. Præterea ad auersionem, cùm adhuc cum impetu flueret, & magis debilitaretur, adhibuimus frictiones partium superiorum, & brachiis vincula rectè inieci-
mus. Paulatim venimus ad astringentia, & dedimus terræ lemnia veræ \mathfrak{z} j. cum decocti plantag. & polygoni \mathfrak{z} iij. Egregiè iuuabat. Quicquid enim citra mordacitatem resiccat, & glutinosum quid habet, veluti est terra lemnia, sphragis appellata, & samius aster (Gal. auctore 7. De compos. medic. secundum locos) quæ veluti ad sanguinis spuitiones vndecunque natas conferunt, eadem vi sanguinis ex vtero profluuia, & vocatum fluxum muliebrem iuuant; vt liquet ex eodem auctore 9. De simpl. medic. facult. Postea adhibui \mathfrak{z} j. trochis. de carabe cum \mathfrak{z} iij. aquæ plantag. & syr. myrtini; lumbos ac ventrè inferiorem, pectinem, inguina, & dorsum inungendo cum vng. comitissæ, adiecto pauco vng. ros. sine opio. Et cùm videretur postea paulo debili-
or, concessi vinum rubrum stipticum cum aqua plantaginis destillata in balneo, & non in plumbo. Atque ita cùm menses vltra tres ferè septimanas fluxissent, commodè hæc curata fuit; vtens subinde & condito concinnato

86 DE MULIERVM MORBIS,
ex conf. ros. antiqua, diacotoneo, pul. trochis.
de carabe & spodio, cum semine acetosæ, ad-
iecto etiam syr. myrtino.

SCHOLIA.

HÆC curatio pertinebat ad anastomosim; in qua,
sicuti & in aliis menstruis superfluis curandis,
semper causa ipsa consideranda est, num hic fluxus
statim sit reprimendus, nec ne: nam is qui criticus est,
corpusq; plethoricum expurgat, non est sistendus,
nisi vires planè deiciantur, nec mulier ultra tolerare
possit: tunc enim sicuti omnis fluxus superfluus (ut &
paulo antè meminimus) restringendus est. Neq; is con-
stringendus statim, qui ex repletione abundante, &
sanguine in toto existente, nisi metuatur virium de-
fectio, & sensibilis debilitas: & qui venit per viam
menstruationis, ut vocant, ob repletionem nimiam,
cum bona tolerantia, constringi non debet. Aliquando
enim causam respicimus, quæ prius abscindenda est.
Et si fiat ex repletionem vel abundantia sanguinis,
eandem venæ sectione & renai victu remouemus; in-
hibendo vinum, ova, carnes, & similia quæcunque
sanguinem augent. Aliàs respicimus fluxum, ut eun-
dem, ubi vires deicit, & reprimamus, & constringa-
mus. etiam ad symptomata quæ obruere possunt, ut est
syncope, tum alia quæ fluxum excedentem sequi so-
lent. In anastomosi itaque, cuius nunc exemplum pro-
tulimus, ubi reliqua non prohibuerint, venæ sectio, re-
uulsionis gratia in cubito facta confert, præsertim in-
terne, exiguaq; sanguinis quantitas auferatur, & si
plus sit reiteretur. Aversio enim impetum humorum
retardat, & fluxuros in aliam partem conuertit. Sed
dices,

dices, De vena sectione non meminerunt nec Paulus nec Aërius. At in lib. De vena sectione, videtur ea Gal. sed in varium profluvio. At eadem est ratio, inquit Iacchimus doctissimus: consulit autem ibi, ut non expectetur usque quo vires multum debilitatae sint; sed dum adhuc perstant, & impetus profluentis sanguinis adhuc persistit. Quamobrem venam secare opus erit superiorē, sicut ad hemorrhoidas plus iusto fluentes Gal. facit in libro De vena sectione. Sic Benedictus Fauentinus, praeceptor meus, etiam in vena perrupta, in principio secat venam basilicam lateris dextri. alij parum, & secundo die iterum exiguum, ut nos fecimus. Praeceptor in sua Empirica tribus continuis diebus, sed parum mitti vult. Sicut nos in quodam Consiliario sanguinem expuente, una cum Nieuenio Medico Hagano, & Cornelio Ericio, meo collega, egimus. Verum licet Aërius non faciat mentionem lib. 16. cap. 66. attamen cap. 68. illius meminit. Mulierem (inquit) rubro fluore vexatam curaturi, primo ad sanguinis missionem vertemur, quae non tantum materiae ad uterum confluenti aduersatur, sed detentionem, constrictionemque tutam efficit: nam multa sequerentur incommoda, si repente sanguinis vel cuiusque defluxus impetum localibus praesidiis reprimeremus; ita ut quidam inde in hydropem, alij in nervorum morbos, aut oris ventriculi, vel capitis improbos affectus inciderint. Igitur si nihil obliterit, id est, si quae obstant non valde fuerint insignia, sanguis mittendus est; praecipue si aetas vena sectionem non prohibeat. Sed paulo supra docuimus iuniores saepe rubro fluore vexari: ablationem vero sicut in iis, qui sanguinem excreant, parti oportebit, ut paulatim prolixiore tempore re-

uulsio perseveret: dilataq; vena cubiti sectione, à fronte, vel à naribus, vel à scapulis sanguinem trahemus. Hac Aëtius. Idem præceptor meus Benedictus Victorius quod vena narium incisa menses retrahunt & diuertunt, dicebat. Iam quoque auertuntur, si supernas partes ligemus; quas & fricare non inconuenit. nam, ut habetur 5. Methodi, frictio contra opposita partis, iuuat. quamobrem etiam consulit Hippoc. ad retentionem, sub mammis cucurbitulam affigere. 5. aph. 50. Sunt enim pectori ad genitalia vena communes. Habent nimirum magnam colligantiam cum utero, per q; eas demandantur menses in mamillis prægnantium, ut conuertantur in lac, & per ventosas iisdem applicatas ab utero fit diuersio. Verum oportet sint magnæ, & diu debent adfixæ esse cum multo igne, ut vehementior fiat attractio: nam, ut referebat Auicenna, retinent sanguinem in hora vna. Ponuntur autem ad radices mammillarum, vel in pectore, eleuatis mamillis. Hinc & Gradus: Mamillis appone, vel sub iisdem, eas eleuando antequam apponantur ventosæ. Alij scapulis vel spatulis apponunt; nonnulli & hepatis ac lieni: sed non diu retinenda, ne phlegmonem pariant. Quod verò suadet Paulus inguina vinciri, id est, crura ea parte (ut interpretatur Iacchinus,) quem in omnibus sectatur Aëtius, dubium habet; nam hoc menses euocat. Sed potius vincula superius artubus iniicienda, donec dolorem cieant, idq; saepe renouando. Inguina igitur vinciritutum non esse arbitratur, cum est magnus impetus; sed in diapedesi, ubi sensim fluat, & longo tempore, non ita inconuenire putat. Atamen præceptor meus iubeat sanguinem deriuare ad partem vteri propinquam;

Vincula;
ligaturæ;
frictiones.

Cucurbitula
sub
mammis.

Ventosa.

Vtrum vin-
cula ingui-
nibus ini-
cienda.

quam; nempe hamorrhoides prouocando appositus sanguisugis: hoc enim menstruam purgationem restringere affirmabat. Ita & hic alij laudant vomitum, sed leuem, in paratis & facile vomentibus, ad diuersionem quoque: sed talis adhibendus, iuxta eosdem, qui violentia sua humores non commoueat. At fluxus sanguinis narium si irritetur, vel sponte veniat, utilis habetur. Auicenna commendat urinam quoque & sudoris prouocationem in tenui & aquoso sanguine. Id tamen aliis non placet, etiam materia licet immunita; cum subtiliando humores magis moueant. Secta itaque vena, etiam aliis auersionibus adhibitis, prout res postulabit, utilis est. Deinde verò etiam si ob vasorum apertionem sanguis profluat, per ea quæ obthurant, curare oportet: quemadmodum si ex eorum vasorum ruptura contingat, quæ conglutinant adhibenda sunt. Atqui obthurat osculum dilatarum per astringentia: conglutinatur autem ruptum per eadem, & quæcunque ipsis (ut dictum quoque est prius) in compositione miscentur citra mordacitatem resiccantia, & glutinosum quoddam habentia, ut de terra lemnia diximus. Inter medicamenta sistentia Rhases vititur trochis. de carabe. Fiunt & hi sine opio. aliqui vtuntur cum opio: nam somnus maximè has excretiones sistit; quoniam pruritum & molestiam omnem tollit, & velut immobilitat: quare in magno metu illi vtuntur cum decocto astringente. Ante hæc verò medicamenta in potu etiam illa exhiberi possunt, quæ in mictu sanguinis sunt dicta, id est, plantag. & polygoni succus. Reliqua omnis curatio partem affectam respicit. Sed primò Paulus & Aëtius in potu dant balaustium ex posca, aut hypocisthidis

Hamorrhoidum prouocatio quomodo iuuat.

Alia auertentia num conueniant.

Medicamenta quæ adhibenda & sistentia & conglutinantia.

Quæ in potu præbenda sunt.

vel acacie succum, siue lycium, vel etiam vna acerba
 succum siccum. Sesamum quoque posca maceratum
 & mollesactum edendum præbent; aut loti ramenta,
 & eorundem decoctum, & corallorum ꝓ ij. (vt Aë-
 tius refert) & succum polygoni, aut plantaginis, etiam
 ex posca, & ꝓ j. cornu cerui vsti, vel tantundem co-
 rall. rab. lapidūq; hamatidis ꝓ j. cum posca. vel
 ꝓ j. vel ij. radice symphyti cum eadem posca, quæ
 semper tepida exhibenda. & vbi hac non suffecerint,
 ꝓ j. trochis. de spodio, aut de succino vel carabe, vel è
 terra lemnia cum posca. Curatio partem affectam
 respiciens topicis medicamentis perficitur: primum
 medicamentis sistentibus lumbis appositis & pubi;
 cuiusmodi est quod ex cyrino, ex galla, hypocisthide,
 ex colla, quæ ex pelle bouis posca dissoluta: secundo in-
 sestionibus, quas etiam in dysenteria diximus confer-
 re, quibus & in hoc casu multa utilitate vtimur ex
 foliorum myrti, ros. plantag. polygoni, symphyti, vir-
 gultorum rubi, ac lentisci, decocto: etiam prius in-
 guinibus, & pectine, & regione renum, inunctis
 vnguento comitisse, aut alio adstringente. Viuntur
 & pessus ex astringentibus confectus, vt ex punici pu-
 ramine, & galli, & thure, liquore stiptico exceptis.
 Etiam succos supradictos clystere infundunt, sicut
 Galenus docuit s. Methodi, & se liberasse casum dif-
 ficilem ea ratione dicit. Interea antequam illa adhi-
 beantur, causa ratio adhibenda est, etiam si malum
 pausat, ne paulo post reuertatur. Et sic vbi cacochy-
 mia causa est, ea ipsa erit prius tollenda; si sero acris,
 vel salso, plenus sit sanguis, vnde tenuis & acris ap-
 pareat in corpore abundare, tum medicamentis bilem
 ducentibus vtendum erit, quæ etiam aqueosos humo-
 res

terra lem.
 troch. cavall.
 aqu. plant.
 It 1^o 4^o

Topica.

Causa con-
 sideranda
 antequam
 topica ad-
 hibeantur,
 vel etiam
 mentes con-
 stringantur.

res purgent; ut est elect. de psyllio cum turbitib; tamen cum cautione; vel rhab. & agaricum, vel myrobalani genera contrita, & infusa. si exusta sanies, confect. hamech cum myrobal. indus & fumaria, victu q ratio adhibenda, quæ dulces succos efficiat & temperet: quod etiam portionibus medicis fiat, ut decocto cichorij, lupul. acerosæ, tum aliis, ut subsequencia exempla docebunt. Hæc de anastomosi.

OBSERVATIO XIII.

*De mensîrâis superflue fluentibus ex
apertione vasorum.*

Vxorimeæ Eux Teylingiæ, mihi admodum charæ, ex nobilissima & antiquissima familia Teylingiorum ortæ, ora vasorum uteri aperta fuere, anno 1553. mense Septembris, cum sese in horto, amicis colludentibus & inuicem aqua aspergentibus, nonnihil fatigasset. Cum impetu quoque mensibus apertis, subsequuta est fluxio, non tamen adeo vehemens, ut mulieri de qua mox diximus Observatione præcedenti. tamen ipsa fluxio tribus mensibus perduravit, antequam magna nostra diligentia sisteretur. & conualuit istis prælidiis subsequentibus, victuq. conuenienti. Venam in valde meticulosa non secumimus; cum & sanguis biliosus esset, & postea etiâ cum minori impetu fluens: in fine nigrior effluebat, & quasi trumbosus: nam hæc subinde tristis melancholiâ aliquam ex longo fluxu perdurante cōtrahebat. Primò exhibuimus huc syr. & syr. ros. ex ros. sicc. myrtini, añ. ʒj. aquæ lupul. plātag. acerosæ, añ ʒij. misce, fiat iuleb

iuleb pro ij. dosibus. Purgauimus autem leuiter cum infuso rhabarb. myrobal. citrinar. cum decocto folior. acetosæ, lupul. plantag. Deinde ut ex sequenti condito vteretur mandauimus: & conseruæ ros. antiquæ ʒ ij. diacydonii, sine speciebus ʒ β. myrobal. citrinarum parum tostatarum & puluerisatarum, & indarum, añ. ʒ j. addendo rob de ribes, syr. menthacei, añ. q. l. fiat conditum. Capiebat ad magnitudinem castaneæ. Reines autē inunximus hoc vng. vel simili: & vng. ros. olei myrtini, cotoneor. añ ʒ j. succi plantag. ʒ ij. coquantur ad consumptionem succorum; adde coralli rubei, semin. plantag. myrtill. añ. ʒ j. hypocisthid. boli arm. añ ʒ ij. ceræ q. l. fiat vng. quo inungebatur, adiecto aceto ros. subinde etiam adiecto vng. comitissæ. Cū autem quotidie debiliior euaderet, etiam hoc clareto vtebatur: & flor. ros. rubear. p. ij. santali rubri pul^{ti} ʒ ij. spec. arom. ros. sine molcho (nam debilem stomachum habebat) spec. diarod. abb. añ. ʒ β. cinnamomi electi ʒ iiij. β. (ut etiam trombi aliquo modo dissoluerentur) cum aqua plantaginis fiat claretum ad circiter lib. i. β. adiecto pauco saccharo ad saporem. Postea idem claretum ad libram vnā cum vino rubro stiptico conficiebatur, tribus tantū drachmis cinnamomi adiectis. eo delectabatur. Interea etiam sumebat subinde ex mixtura sequenti: & conseruæ ros. antiquæ ʒ ij. boli armenæ veræ, mastiches, eboris, sanguinis draconis, omnium subtilissimè puluerisatorum, añ. ʒ j. trochis. de spodio cum semine acetosæ, trochis. de carabe, puluerisa-

uerisatorum, añ. 3ß. fragmentorum lapidum
preciosorum omnium in pollinem redact. 3 ij.
cum syr. menthaceo & myrtino fiat conditum.
fuitque hoc conditum adhuc semel reiteratum.
Et cum nondum fluxus constringeretur, istis pi-
lulis assumptis tandem menses restricti sunt: re-
mastiches, trochis. de carabe, añ. 3ß. trochis. de
spodio cum sem. acetosæ 3 ij. scobis eboris, my-
robal indarum pul^{tarum}, añ. gran. vj. coralli rub.
flor. ros. rub. añ. gran. v. in pollinem redigantur,
& cum syr. menthaceo fiant pilulæ ix. Sub
noctem tres capiebat; & his præsidiiis bellè cu-
rata fuit.

S C H O L I A.

Hic quoque oscula vasorum vteri aperta erant
per anastomosim, quamuis non tanto impetu ut
ut in alia muliere, de qua Obs. 13. diximus. In princi-
pio licet venam non secimus, eo quod vxor mea me-
ticulosa esset: vinculis tamen statim ab initio brachiis
inieciturum frictionibus vti fuimus. & post infusum
rhabar. & myrobalan. ad astringentia deuenimus, quæ
& sanguinem incrassarent, & eiusdem acrimoniam
obtunderent. Talia etiam intus exhibita profunt; ut
album oui fortiter agitaturn, & calfactum, & per se
tantum assumptum, vel cum puluere gummi tragac.
aut arabici. mucilago cotoneor. dissoluta in aqua pe-
culi ros. vel plantag. Valet & syr. de pap. iuuibinus,
& de ros. siccis. Hæc enim sanguinis acrimoniam ex-
tinguunt, & fluxum retinent à quacunque causa. Su-
pra partem emplastica frigida cum astringentibus po-
sta iuuant; ut bolus arm. rubrica fabrilis, terra sigil-
lata,

N.

Topica.

lata, ac albumine oui excipiuntur & apponuntur. Vel succi herbarum astringentium & refrigerantium excepti farina tritici, vel amylo, inspissatiq; & parti appositi, fluxum sanguinis retinent: quibus si adiungantur astringentia, fortius repellunt, & sanguinis impetum sistunt. Hæc si non prosunt, Rondeletius sterco porcino caput reductum ad formam cataplasmatidis, addendo pul. ros. ut fætor minuatur. Præter vnguenta, è quibus exemplum posuimus Obs. præcedente, etiam extrinsecus loca vteri perfunduntur seu fouentur tepida posca, aut oleo rosaceo, melino, seu myrteo, pauco vino admixto. Item prosunt cataplasmata ex hordei fabarumq; farina, symphyti radice, polygoni, ac plantaginis foliis, acacia, alumine, & hypocisthide ex posca composita: aut ex palmulis, malis cydoniis, malicorio, balaustris, alumine, gallis, acacia, & hypocisthide, teneris rubi seu lentisci virgultis, cum eadem posca cataplasma fiat. Vel ceratum ex vng. comitissa, pauco adiecto aceto. Efficaciter quoque prodest taurocolla aceto macerata, donec dissoluatur, deinde valido linteolo inducta lumbis, agglutinetur, ex decreto Pauli & Aëtij. Huc pertinent infessus, de quibus diximus Scholio præcedente, & pessuli: nam pessulorum vsus haudquaquam cōtemnendus est, qui ex foliis plantaginis, seu polygoni succo, aut myrtillorum symphytiq; rad. contusis pauca addita manna, thure, hypocisthide, ac balaustris, cum eiusdem plantaginis, seu polygoni succo conficiuntur. interim gallarum puluis, ac aluminis scissi, nec non acacia succus cum ouorum rostorum luteis adiici poterunt; & quandoque cupressi folia, aut rubi, pariterq; & cytini. Cū verò vsus exigat (ut et tiam Donatus admonet) linteo serico, aut li-

nea

Fetus.

Cataplas-
mata.

Pessuli.

neo tenui excipiantur, & ad formam humani digiti
 redacti in rosaceum intingantur ac subdantur. Infun-
 duntur quoq. (vt paulo ante diximus) per instrumen-
 ta ad hunc vsum parata in vterum, quæ *Μυτρηχού-
 ras* Græci vocant, plantagini, polygoni, seu solani succi.
 similiter acacia, vel hypocisthidos; vel decoctū in aqua
 pluuiali malicorij, gallarum, balauſtiorū, hypocisthidis,
 ac foliorū lentisci, cum polygoni seu plantag. succo, aut
 etiam acacia. Sic Galenus ex vtero sanguinis profluvij,
 quaternis iam diebus profluens, cum nullo alio potuisset
 sisti remedio, plantagini succo vtens prorsus sanauit.

Quæ per in-
 strumenta
 infunduntur

OBSERVATIO XV.

*De purgatione mēstrua ultra 9. menses perdi-
 rante ac lethali ex reſeratione vasorū vteri.*

VXOR doctissimi illius viri Magistri Adria-
 ni Leonini, Pensionarij Delphensis, incidit
 in mensium profluvium ex reſeratione vasorum
 vteri, eo tempore cum maritus hectica febre la-
 boraret, à qua etiam mortuus est, cuius mentio-
 nem fecimus lib. 4. Obser. nostratum De febre
 hectica. Nam ipsa sæpe noctu surgens, fatigata
 stillatim mensibus fluentibus, in continuo serui-
 tio mariti ægrotantis, mulier admodum curiosa,
 satisq. biliosa, & viro admodum obsequiosa, flu-
 xum hunc parui faciebat. Admonita insuper sæ-
 pius per Henricum Vergerium, Medicum do-
 ctissimum, vt remedia apta adhiberentur, & vi-
 ctu constringente vteretur, suæ sanitatis negli-
 gens; per me quoque postea admonita, nulla
 adhibuit medicamenta: tandem post mul-
 tos menses hoc profluvio laborans extremè
 debi-

96 DE MVLIERV M MORBIS,
 debilitata, marcere quasi confecta, etiam in he-
 cticam incidit. tunc demum acciuit Cornelium
 Medicū seniore quendam Delphensem, cū
 eodem tempore ipse ærotarem. Hic senex apud
 templum nouum habitabat, & huic nobilissimæ
 matronæ commendatus erat, quod felicissimè
 mēstrua fluentia curaret, & bellè cohibere sciret.
 Verū cū hic nihil proficeret, eius pertæsa
 tonsorem quendam Haganum seniore ad se
 vocat, qui eidem pollicebatur quadam quinta
 essentia, se illam perfectè sanaturum. At aliter
 euenit: nam hecticæ feбри mox & putrida ac acu-
 ta febris accessit, simulque aphthæ obortæ sunt
 fauces quasi præoccludentes, vt iam suffocari
 videretur. Accitus tunc est Cornelius Ericius col-
 lega meus, cū iam vltra nouem vel plures
 menses hoc fædo affectu ad extremam maciem
 euasisset. Postea cū ego à morbo cōualuissem,
 vnà fui vocatus; atque vnà ingressi inuenimus
 illam extremè debilitatam, vt nulla spes salutis
 superesset, neque vlla restaurantia, aut medica-
 menta commoda illam iuuarent. Atque ita ab
 hectica, tum fluxu illo mēstruo exstillante, pla-
 nè consumpta, & quasi cadauerosa, etiam ante
 maritum proba admodum matrona & pia obiit.

SCHOLIA.

HÆC erat diapedesis, quia sensim stillabat san-
 guis, vasis minoribus apertis. Quamuis autem
 prima fronte non ita hæc superflua purgatio mēstrua
 videbatur periculosa, tamen cū nulla remedia adhi-
 berentur,

berentur, in muliere biliosa cōtinuè per multos menses stillante, ob tenuitatem sanguinis, vires sunt deiecta. deinde in hecticam incidit: & quod eiusmodi calidus vteretur, nec victum obseruaret, tandem & quintam essentiam illam calidissimam sumeret, putrida febris, eaq³ satis acuta hectica superuenit, ac non diu post ipsa è vita discessit. Si enim hac in principio remedia adhibuisset, procul dubio (nec enim erat anastomosis, in qua cum impetu sanguis fluit copiosus; neque sanè tam diu sustinuisset illum fluxum) facile sanitatem consequuta fuisset; cum à diapedesi subitus timor non sit, & ideo leuiora remedia exigat. Et quia hac erat biliosa, & sic etiam ex vitio sanguinis biliosi tenuis affecta; si corpus prius leni purgatione fuisset euacuatum, mox astringentibus malum facilius cessasset, additis etiam iis quæ acrimoniam sanguinis obtundunt, incrassant, & constringunt: qualia Scholio precedente valere diximus. Sic enim humores illi biliosi erant contemperandi & purgandi leniter rhab. & myrobal. vel tamarindis, & aliis; prius quoque sanguinis fluxionem inhibendo, si paulo magis fluat. Si verò sanguis per diapedesim fluat, ob eius tenuitatem, & seri copiam; oportet (inquit Rondeletius) iisdem medicamentis euacuare, quibus si ob bilem euenerit; quibusdam additis aquas vacuantibus, vt brassica marina, sena orientali, decocto fumarie, succo ros. & aliis purgantibus sine magna calfactione. Victus ratio incrassans & inspissans hic quoque iuuat, & vtendum pedibus animalium, alica, vel amylo, iusculis coctis: omnia, quæ ex farina non fermentata parantur, sunt in hoc casu ex usu. Medicamenta etiam hic conferant astringentia superius dicta, tum topica ipsa

Curatio
diapedesis;

Si ob tenuē
sanguinem,
curatio.

Ob venarū
raritatem li-
brat, curatio.

ipsa. Ita quoque si ob venarum raritatem fiat, tunc
astringentia & condensantia conuenient, qualia sunt,
quæ ex aquâ myrtill. peculiros. parantur, & aliis astring-
gentibus, ut bolo arm. terra leuonia, ut diximus, rad.
bistoria, spongie hedeg. & similibus. Infusiones faci-
mus, cum vena intus latitat. Si commodè remedia
possent extrâ adhiberi, pulueres inspissati albumine,
supra partem effectam ponantur. Eadem etiam curât
anastomosim: cum ius quæ ad anastomosim recensui-
mus, etiam hic vti possumus. Puluis ossis sepiæ cum
vino datus fluxum sanguinis retinet. Item carabe, tro-
chisci eorum, de spod. sang. draconis appositus aut as-
sumptus sanguinem erumpentem à quacunque parte
retinet. Conser. ros. symphyti, cydon. caro, & aliorū
fructuum astringentium conditorum ad id usurpan-
tur. Fiuntq; ex his opiata vel condita. ut hoc modo: R.
conser. ros. antiq. ℥ss. conser. symphyti ℥j. trochis. de
carabe, aut terra sigill. ℥j. boli arm. ℥ij. sang. drac. ℥ss.
syr. de ros. siccus vel myrtill q. s. fiat opiata. Vel R. sym-
phyti, & carnis cydon. condit. saccharo. añ. ℥j. conser.
ros. antiquæ ℥ss. pul. ossis sepiæ ℥ij. trochis. de spod.
& de terra sigill. añ. ℥j. pul. diamar. frig. & diapap.
añ. ℥j. syr. cydon. q. s. fiat opiata. Capiat ad quanti-
tatem auellana, superbibendo aquam bursa pastoris.
Si his non addantur syrupi, sed ex conser. & saccha-
ro parentur, tunc condita esse volunt, ut Rondeletius.

OBSERVATIO XVI.

De mensium proflauio venis uteri perru-
ptis ex graui pondere subleuato.

MULIERI ex graui pondere subleuato, ve-
nis uteri perruptis, menses largiter fluxe-
runt;

runt; ad quam accitus, cum ingentem dolorē in
lumbis haberet, & nūc tribus quatuorve diebus
durasset, vt vena basilica in brachio tunderetur,
nempe dextro, iussi: (nam in dextra quoque par-
te vteri dolorem tum in lumbis sentiebat) ad vni-
cias quatuor. Deinde imperavi vt dorsum ac
pubem inungeret oleo myrtino, puluere quo-
que myrti & ros. rub. insperso. Deinde hunc pul-
uisculum quoque propinaui: ℞ rhab. pulv. ℥ ij.
℥. mummiæ ℥ ℥. & exhibui cum ℥ ij. ℥. aquæ plā-
taginis. Deinde aliis constringentibus & gluti-
nantibus per os assumptis, & intra vterum in-
iectis per obstertricem, curata fuit. Quod si non
iuuisset, adhibuissem illud experimentum quo
matrona quædam à Guainerio fuit curata, quæ
ob eleuationem grauis oneris diu talem fluxum
patiebatur. Dabat enim ℥ j. tribus vicibus sto-
macho vacuo ac ieiuno cineris stercoreis caprarū
cum aqua pluuiali, & fuit curata, etiam vetula
quingenta annorū, atque sanata permansit.
Alteram etiam curauit asinino stercore, quod à
proprietas sanguinem stringere scribit. succum
ex eo recens excreto exprimebat, & dabat cum
syr. myrtino & aqua plantaginis aliquot vicibus.

SCHOLIA.

IN solutione continui, si ex casu vel leuato pondere, Curatio, si
statim viribus adhuc valentibus vena sectio conue- ex solutio-
nit; & vincula brachiis iniecta, & frictiones, & cu- ne continui
curbita in spatulis. & si non restringatur, etiam mani- aut ruptura
ma dextra vel sinistra, prout dolor magis in vna parte venarum.

Quæ valent
in fluxu
enormi post
partum vel
abortum.

quàm altera infestet. Postea viamur remediis iam dictis in anastomosi, quod ad conglutinantia & astringentia attinet. Vel si in causa fuerit ruptura venarum, procedimus cum iisdem quæ valent in fluxu ab acuitate sanguinis, in frigidando sanguinem, & inspissando, & constringendo meatus. Sic etiam in solutione continui, quæ fit à partu, vel abortu, iisdem remediis utemur, ubi rem vigere videamus: nam temere cohiberi non expedit. Vbi tamen vires deiecit, & syncope subsequatur, tunc cohibendus est. Sic anno 1588. sexto Iulij die ad puerperam ex violento profluvio sanguinis ab utero laborantem de nocte accitus, cum in syncope valde diuturnam prolapsa esset, & pro mortua haberetur, adhibitis frictionibus brachiorum & vinculis iniectis, ubi ad se redisset, ut continuè ex sequenti mixtura sumeret ad libitum, præcepi: R. cons. ros. veteris ℥ j. diacydenij sine speciebus ℥ ij. rob. de ribes ℥ ss. pul. fragmentorum lapidum pretiosorum ꝑ j. manus Christi cum perlis ℥. ij. syr. de ribes, fiat mixtura. quæ quidem viribus recreatis fluxus quoq. enormis substitit. Vulgares mulierculæ experimentum habent ad hoc sanguinis profluvium & nimiam euacuationem in puerperis; nempe nucem iuglandem exiccatam in pulverem redigunt, & tribus vicibus cum cereuisia aut vino rubro exhibent, quo remedio fluxum enormem restringunt. Hoc modo Matrona Rotallera nobilis in Haga comitis dicitur curata. Phoca Iohannis (sic enim mulieri Alcmarianæ nomen erat) 36. annum agens, anno 1549. mense Nouembri post abortum incidit in fluxum copiosum menstruorum, ut astantes de vita desperarent, adhibita vltima inunctione per sacerdotem, ut in moribundis fieri solet. Ad quam cum accede-

accederem, dolorem quoque uteri patiebatur, ac inflationem quandam. Sed cyathum unum capiens ex hoc decocto, inflatio cessavit & dolor: R. flor. chamamel. p. j. sem. coriand. preparati, seminis myrtill. añ. ʒ. j. sem. anisi, agni casti añ. ʒ. ij coquantur in pinta dimidia cerevisiae communis. Huius acceptis subinde tribus cochlearibus, dolor sedatus est & inflatio, fluxu etiam nonnihil diminuto. Sed cum perseveraret, linimento circa pubem, & confectio in tabulis assumpta, menstrua illa vehemensq; purgatio simul cessavit: R. olei mastichini, myrtill. añ. ʒ. ʒ. olei chamamel. (ob dolorem in utero) ʒ. ij pul. corall. rub. ros. añ. ʒ. ʒ. cera parum; fiat linimentum: R. trochis. de carabe ʒ. j. spec. triumf. diarod. abb. añ. ʒ. ʒ. pul. margar. perforat. & non perforat. añ. ʒ. j. cornu cerui vsti, coriandri prepar. añ. ʒ. ʒ. redigantur in polline, & solvantur cum aqua ros. & mentha, adiecto saccharo q. s. fiat confectio in tabulis. Nostra muliercula in fluxu post abortum hoc pro arcano habens: carnem fumo indurata ad minus vetustate annu excedentem, quam minutissime concisam in patella terrea supra ignem torrent & exsiccant, ut in pulverem redigatur; dant cum vino rubro stiptico, vel alio liquore constringente; feruntq; hoc remedio deploratas mulieres ex fluxu enormi post abortum restitui. Hoc remedio Domina de Roon pro deplorata habita dicitur convaluisse. Bononia post partum & abortum à Medicis hac praescripta in fluxu enormi bellè profuere: R. pilal. de bdellio, trochis. de terra sigillata, de carabe, añ. ʒ. j. cum syr. myrt. fiant pilulae: exhibita sunt manè, & superdormiuit agra. R. margarit. non perforat. spodij, añ. ʒ. j. ʒ. coriand. prepar. cornu cerui vsti, añ. ʒ. ij. corticum medianor.

G 3

castanea

101 DE MULIERVM MORBIS,
castanea ʒ iij. sem. ros. ʒ ij. lapid. hamatitid. pilorum
leporis combustorum, añ. ʒ j. sacchari ros. ad pondus
omnium, cinnamomi quantum placet pro sapore. fa-
matur bis in die cothlear vnum.

OBSERVATIO XVII.

*De menstrua superflua euacuatione
ab arrosione.*

MULIER biliosa, ex acris humoribus ad
vterum confluentibus, superflua men-
strua purgatione laborabat; quod & dolor indi-
cabat, & subinde etiam sanies cum sanguine
menstruo effluens. Diximus enim, arrosionem
aliquando fieri à causa interna, à bile aut san-
guine acris, aut pituita salsa. Cum hinc ex sangui-
ne bilioso fieret in muliere admodum biliosa,
quodque bilem & humores acres redundantes
hac affectio contineret, habitum ego corporis
respiciens, & recrementa reiecta, omnium pri-
mò symptomati occurrendum esse duxi; deinde
ad erosionem & eius causam veniendum. Ideo
ante omnia consului, cum à me curationem po-
stularet, vt parum sanguinis detraheret in bra-
chio dextro ad reuulsionem, ad uncias tres tan-
tùm vel quatuor; & iubebam vt apertio fieret
exigua ipsius venæ, vt ita longiori tempore &
minori quantitate sanguis expurgaretur, & vires
ex larga apertione minus conciderent; id nimi-
rum tantùm ad sanguinis difflationem faciebã:
nam copiosa sanguinis missio hinc nullo modo
confert.

confert. Interea etiam præcepi ut fierent frictio-
nes fortes brachiorum & ligaturæ. Postea ad bi-
liosorum humorum, tum acrium purgationem
perreximus, ut qui erosionem augebant. Vbi
enim succi vitiosi in toto corpore redundant, &
erosionem augent, nulli dubium est quin illi
prius sint purgandi, antequam ad medicamenta
veniamus quæ sarcotica appellantur, & carnem
gignentia; ut 7. De compos. medic. secundum lo-
cos constat. Verum ut illi humores etiam con-
temperantur, possumus etiam aliquos syr. con-
uenientes adhibere (vbi detur occasio) antequam
ad purgationem veniamus. Quare ut prius hunc
syr. sumeret mandavi: & syr. ex infus. ros. ex succo
myrtilino, & succo acetosa, añ. ʒj. aquæ plantag.
polyg. acetosa, añ. ʒij. milce pro ij. dosibus.
Dedi etiam oxysacch. cum aqua plantag. dein-
de ut talis vel similis purgatio exhiberetur con-
sului: & tamarind. ʒss cortic. myrob. citrin. ʒij.
fiat decoct. in aqua plantag. & acetosa, & huius
accipe ʒij. syr. ex infus. rosar. ʒj. rhab. optimi
pulv. sine spica ʒj. vel ʒj. milce. fiat potio.
Deinde iussi ut perueniret ad topica medicamē-
ta: & prius tamen, cum fluxio paulo vehemen-
tior esset, quamvis subinde sine sanie & virulen-
tia, ut applicaret duas ventosas sub mammillis,
ad maiorem restrictionem, & auersionem: &
mandavi ut bonis cibis & boni succi, qui erosio-
nem contemperarent, præcipuè vteretur, alica,
amyl. cum lacte, & amygdalato, & emuls. sem.
quatuor frigid. maior. mundat. & hordeato; &
ut succum plantaginis iniici per obstetricem cu-
raret:

raret: huiusmodi enim profluvium supprime-
re valet, si cyathi mensura iniiciatur, ut Aëtius
inquit. Verum etiam aliquando fortius aliquod
admiscendum erit, aliàs aliud, pro affectionis
respectu. Nam si vas illud quod corroditur, vn-
de profluit sanguis, magnum & amplum fuerit,
austeris medicamentis opus fuerit, ut balauſtio,
acacia, hypocisthid. gallis, malicorio, & similibus.
si verò paruum, conferrent aloë, manna thuris,
cortex pinus, terra lemnia, lapis hæmatites, &
reliqua huiusmodi, quæ nedum cum succo plan-
taginis, verum etiam vino austero nigro, aut se-
necionis succo subdita, & iniecta conferant, ex
sententia eiusdem Aëtij. Et (ut summam di-
cam) quæ mediocriter, & sine morſu detergunt
atque exiccant, commoda sunt, ut quæ carnem
generant, ut liquet tum 3 Method. med. tum se-
cundo De composit. medic secundum genera.
Vbi igitur sordes vnà cum sanguine emanarēt,
tunc obstetrici iussimus, ut etiam aquam hordei
iniiceret cum succo apij, melle etiam paucò ad-
iecto, & ad restrictionem & refrigerationem
addendo succum plantaginis. Postea succum
plantaginis vnà cum lacte cocto iniici præcepi-
mus. Et vbi solus sanguis, magis tamen cum ar-
dore, efflueret, solummodo succum plantaginis
iniiciebat, aliquando adiecta exigua portione
trochis. de terra sigillata; quos etiam sumebat
per os cum aqua plantag. addito syr. myrt. Inte-
rea ut & ventri apponeret ceratum comitissæ,
consuluimus. Ex his bene habuit, cum corrosio
ad maiorem vlcerationem non peruenisset. Ve-
rùm

tum mulier illa Alcmariana, quæ extra portam in qua facinorosi incarcerati detinebantur, habitabat, ex erosione & vlcere diuturno, longa menstrua purgatione laborabat: & cum Empiricorum ac tonforum opera vteretur, neque in principio bonos Medicos consulisset, licet languida diu superuixerit, facie admodum fœda, pallida, & cadauerosa; tandem cum vix corpus protrahere posset, diuturna cachexia affecta obiit.

SCHOLIA.

DICTVM est prius, quodd si fiat ex erosione cum vlcere, & si dia perseueret, talis superflua menstruorum purgatio, plerumq, esse lethalem; quemadmodum in secunda muliere euenit; multoq, magis si quando ab imperitis tractetur. Si verò sit erosio circa os ceruicis, melius curatur: quod non solum per saniem, sed etiam per tactum cognosci poterit; vt Gal. docuit 6. De locis affectis. Si verò sit profunda, quod quasi per æruginem exeuntem (vt dicebat Valescius) cognoscitur, difficilius curatur. Interea tamen adhibenda sunt remedia apta. Si itaque sit ex erosione, tunc purgato corpore, remediis localibus utemur, optima tamen instituta victus ratione. Primum remedium est succus plantaginis iniectus, præsertim si valde sordidum vlcus non fuerit. (nam si sordes adsint, extergentibus erit utendum: exempli gratia, succo apij melle admisto, vel præsyj, vel brassicæ) secundum remedium aqua hordei: tertium lac: & demum omnia quibus ad dysenteriam utebamur. Quod si dolor vehemens sit, & ardor, etiam decoctum hyoscyami, & papau. cum astringenti-

Curatio, si
ex erosione.

G S genti-

gentibus iungemus, (ferè enim in ulcere cruento est maior) & tandem optatorum medicamentorum aliquid immitemus cum suprapositis succis. Iuuant & astringentia balnea in cruento ulcere. Valesius verò inquit: Si fluxus menstruorum fiat à corrosione, vel ulcere; id quod scitur per exeuntem virulentiam cum sanie, aliquando cum sanguine mixtam; & ex dolore in loco ex quo, illa virulencia & sanies cum fœtore, & aliquando ad modum fecis vini; tunc verò facta ab initio parua phlebotomia, & mūdificatione corruptorum humorum, & supposito bono regimine, administrentur hac medicamenta per partes inferiores cum traiectorio; ut sunt aloë, thus, & cortex eius, & sang. draconis, corallus, carabe, myrrha, crocus, lycium, me-mirha, amyllum, plumbum vslum, terra sigillata, bolus arm. & similia. & aliquando melicrato mūdificentur, cum in qua stringunt & mūdificant vlcus, ut res galle adusta exincta in aceto, charta bombasine combusta, cochlearum vslarum & cornu cerui adusti q. s. inde fiat pul. Vel hic apud eundem magni est iuuamenti: lapis hematitid. sang. dracon. carabes, coralli, aluminis iamem, balaust. boli arm. terra sigill. sem. portul. añ. p. a. fiat pul. & cribro excipiat. dentur ʒ ij. cum aqua myrtil. aut arnoglosse. & si vis excusari, inquit, à laboribus, accipe trochis de terra sigill. qui describuntur cap. De hamoptoica pass. & da cum succo arnoglosse, ut ibidem docetur, vel cum succo arnoglosse cum traiectorio iniciantur. Iuuant enim post mūdificationem vteri cum hydromelite, & sunt admodum viles.

OBSER-

OBSERVATIO XVIII.

De immodico mensium fluore ob sanguinis tenuitatem, caliditatem & acrimoniam.

FLVOR autem immodicus mensium magna ex parte contingere solet à sanguinis caliditate, tenuitate, & acrimonia: quemadmodum istis diebus contigit mulieri iuenculæ supra modum biliosæ. quæ cum ad me consultandi causâ venisset, vt hæc ordine fierent mandauimus. primò vt alius clystere sequenti leniretur: & folior. maluæ, violarum, parietariæ, mercurial. añ. m. j. prunor. damas. num. xij. coquantur in aqua communi pro lib. j. colæ adde olei viol. ℥ iij. cassiæ pro clysteribus ℥ j. sacchari rub. ℥ ss. vitellum vnius oui, salis parum; fiat clyster. Quod si bolo magis delectaretur, hoc vti tuadebam: & cassiæ recēs tractæ ℥ j. sem. berberis puluerisati ℥ ij. fiat bolus. Deinde: & syr. ex ros. siccis, agrestæ, de succo acetos. añ. ℥ j. ss. aquar. acetosæ, portulacæ, añ. ℥ iij. misce. ieiuna per triduum in diluculo sumat. & elect. triumfant, ℥ ss. vtatur cum syrupis, purgetur autem hoc modo: & folior. acetosæ, portulacæ, añ. m. ss. prun. damas. iniubar. sebesten recent. añ. ℥ ss. flor. nymphææ, viol. bugloss. añ. p. j. coquantur in aqua communi; & huius colæ accipe ℥ iij. adde syr. ex infus. ros. pallid. ℥ j. ss. pul. rhab. selecti ℥ ij. misce. detur in diluculo: & pilosellæ, bursa pastoris, ros. rub. cum capitibus, caudæ equinæ, plantag. añ. m. j. rad. consolidaæ

lidæ maioris, rad. sigilli beatæ Mariæ, lentium
 excortic. añ. ʒ ij cupul. glandium, balauſtij, ſu-
 machi, granorum myrti, nucum cupreſſi, añ. ʒ j.
 gummi arab. acac. hypocith. añ. ʒ ʒ. contundan-
 tur, fiat decoct. in aqua plantag. pro lib. ij. dulco-
 retur frequenter cum ſaccharo. Hoc aliquando
 exhibitum fuit Dominæ de Cruſingen labo-
 ranti ardore vrinæ, & copioſo fluxu menſtruo-
 rum. Item iſtud: ʒ farina glandium ʒ ʒ oſſium
 cap. caponum, faucium lucij combuſtorū, oſſium
 daſtylor. añ. ʒ j. coriand. præp. roſ. ſiccarum, aniſi
 torrefacti, rad. nenuph. citrinæ, añ. ʒ ij. raſuræ
 eboris ʒ j ſem. plātag. acetosæ. añ. ʒ ʒ. puluerifen-
 tur. Vel capiat ſequens: ʒ conſeruæ roſ. antiquæ,
 conſer. rad. ſymphyti añ. ʒ j. coralli rub. lapid. hæ-
 matid. cornu cerui vlti, acaciæ, hypocith. añ. ʒ j.
 diacydonij ſine ſpec. ʒ j. ʒ. corticis ouor. ʒ j. cum
 ſyr. myrt. excipiantur; & fiat ad modum elect.
 mollis. capiat ad magnitudinem caſtanæ paruæ
 duabus horis ante cibum, manè & veſperi. hoc
 deglutito, parū vini rubri chalybati bibat. Quòd
 ſi neque iis conſtringatur fluxus, tunc conſule-
 rem vt ſequens acciperetur: ʒ ſyr. myrtini, co-
 toneorum, añ. ʒ ij. ſucci ſtercoris aſinini recentis
 ʒ iij. aquæ plantag. ʒ vj. miſceantur; & ieiuna
 per triduum in diluculo bibat. Interea extrinſe-
 cus inungat ventrem ab vmbilico ad pectinem,
 & regionem renū manè & veſperi: ʒ olei myr-
 tini, roſ. cotoneor. añ. ʒ ʒ boli arm. lapid. hæma-
 titid. acaciæ, hypocithid. coralli rub. mummiæ,
 añ. ʒ ʒ cææ modicum; fiat vnguentum. Detur
 ʒ j. pul. putaminis ouorum, vel teſtarum ex qua
 pulli

pulli gallinacci exclusi sunt, vel cornu cerui, vel rad. nymphææ, vel rad. eius, ad ʒj. cum decocto vel aqua aliqua astringente, vt bursæ pastoris, vel plantag. Si his non restringatur, cucurbitulæ magnæ subter mammas affigantur, ante partum, & per horam dimidiam hæreant. fricentur brachia, & pessus indatur; vt: & michletæ, trypheræ, añ. ʒj. β. equiseti, acaciæ, añ. ʒj. spicæ nardi ʒβ. (sistit enim menses) commista hæc linteo raro inuoluantur, fingaturque pessus, qui filo coxæ alligatus, in mulieris pudenda immitatur. Vel loco pessulorum (quoniam mulieres non faciliè admittunt pessulos) lanam accipito, & cum succo plantaginis imposito. Infellus quoque fiat in hunc vel similem modum: & polygoni, ros. rub. plantaginis, bursæ pastoris, pilosellæ, añ. m. ij. folior. symphyti, balaustiorū, equiseti, añ. m. j. gallarū, sumach, malicorij, cupul, glā-dium, gallarum, folior. cypressi, vel nucum eiusdem, añ. m. β. flor. & folior. verbasci, añ. m. j. decoquantur in aqua chalybeata, aut aqua pluuiā, in qua ad vmbilicum vsque se irriget. Balneum egressa inunget se vng. supradictō, vel vng. comitissæ, & renes, & ventrem, ab vmbilico vsque ad pectinem, partemque posteriorem ei oppositam; & vtatur elect. iam dicto. Aut loco balnei, ex iisdem fiat fons; aut ipsius decocti fumum per infundibulū in vterum recipiat. Et quoties alius sua sponte excrementa, vt conuenit, non deiciat, sumat ʒj. pilul. de bdellio circiter x. noctis horam: id quod commodè facere licebit semel aut bis in hebdomada. Vt autem hæc
omnia

110 DE MULIERVM MORBIS,
omnia ordine fierent, consului præsentī dome-
stico Medico, cū apud nos manere non pos-
set, vt rite perageret.

SCHOLIA.

ACCIDIT aliquando huiusmodi fluxus su-
perflus propter nimiam debilitatem, aut ex
caliditate sanguinis (vt diximus) quæ sit à bile mixta
sanguini; vnde hæc bilis acris sanguinem exacuat &
subtiliorem reddit, & orificia venarum aperit, ob mor-
dicationem, quam tunc facit. Idcirco remouendo cau-
sam eius, oportet bilem ipsam euacuare, & incrassare
sanguinem; vt hoc modo: R. syr. de end. myrt. añ. ℥ j.
ß. aquæ plantag. portul. end. añ. ℥ ij. misce. vel detur
syr. quo nos vsi sumus; deinde eodem modo pargetur.
Postea ea quæ intus exhibentur per os, & per vterum,
& reliqua topica adhibeantur; vt iam satis dictum
est. Si plura de his desideres, vide Leonellum cap. pro-
prio: Ita quoque si salsa pituita fuerit causa huius su-
perflui fluxus, vel per æperrionem, vel erosionem, syr-
pus è corticibus citri conueniet, vel mel rosaceum cum
syr. myrtino, vel ex absinthio: & purgabimus hoc vel
simili modo: R. cort. myrobal. chebul ℥ iij. agarici tro-
chis. ℥ j. fiat decoct. in aqua plantaginis, in quo ℥ j. ß.
syr. ex infus. ros. pallidarum dissoluas, & fiat po-
tio. Postea constringatur cū iis quæ nunc dicta sunt.
quale & hoc decoctum est, quo puerpera cū enor-
mem fluxum mensium pateretur vsque ad syncopen;
commode vsa est: R. sigilli beate Mariæ, millefolij, bur-
sæ pastoris, rosar. cum roto, pilosellæ, añ m. j. sem. ace-
tose, plantag. gran. myrti, sumach, añ. ℥ j. lenitum ex-
core.

Si fiat ex
falsa pituita,
quid facien-
dum.

cort. gummi arab. añ. ʒ ij. rad. nenuph. cirrin. ʒ ij. nuci
 moschata, s. hœnāthi añ ʒ β. rad. cōsolida maior. exicc.
 ʒ ij. decoquantur in lib. ij. vini rub. & lib. i. aquæ plan-
 tag. exprimatur & dulcoretur decenier saccharo.
 Sumebat autem cum paruo cochleari istū puluerem:
 R. ros. rub. been albi & rub. spodij, añ. ʒ j. osium ca-
 pitis caponis, farina glandium, coriandri preparati,
 añ ʒ β. margar. corall. rub. osu de corde cerui, hya-
 cinthorum, sem. anthera, añ. ʒ β. cinnamomi electi
 ʒ j. pur, & misce cum saccharo ad pondus omnium.
 Inungebantur ter quaterve lumbi hoc vng. R. olei
 ros. myrtini, cydon. añ ʒ ij. decoct. bursa pastoris, sem.
 plantag. sem. acetosæ ʒ j. vnguenti comitisse ʒ β.
 bulliant simul ad consumptionem aquæ decoctionis, &
 cum modico ceræ fiat vnguentum. Quibus hæc curata
 fuit. Ceterum his meminisse oportet, quod plerumq;
 ut de signis prognosticis diximus, in diuturnis mēstruis
 fluxionibus subsequi solet hydrops: quemadmodum
 euenit vxori M. Theodorici, quæ prope Templum nouū
 Delphi habitabat. Hæc enim cum per tres annos men-
 suum profluuio laborasset ferè continuò, licet diuersis
 remedijs, ut germine ouorum, modò albumine ouorum
 cum aqua plantaginis ad constrictionem, tum alijs in-
 finitis, iūq; varijs, etiam à me exhibitis, interdū con-
 stringeretur; sæpius tamen eodem fluxu redeunte, ad
 extremam debilitatem deuenit, inde ad tachexiam;
 mox ad hydropem, fluxu tandem restricto: ita ut pro
 deplorata haberetur; cum & pedes valde intumesce-
 rent, & tandem incedere non posset. Ut illud sym-
 ptoma, post tam diuturnum fluxum relictum,
 curaremus, multis adhibitis remedijs ad hydropem &
 leucophlegmatiam, qua ad extremum laborabat,
 facien-

facientibus, post vniuersalia remedia quæ aquâ educent per vias vrinales, viebamur modò dialacca, modò diacurcuma. Et tandem per lotium multam materiam aquosam continuò effudit. Demum ad pedes tumidos, in magnam molem auctos, & œdematosos, balneo sequenti vsus sum: R. foliorû sambuci, sampsuchi, florum chamameli Romani, foliorum rorismarini vnâ cum floribus, saluie, foliorum lauri, añ. m. iij. cumini, salis, añ. p. ij. fiat decoctio in aqua & aceto acerrimo adiecto. aqua hæc in magnam cupam reponatur, vimine intertexto & cancellato super imposito, & pedes nudi super eodem ponantur, vestibus vndique circumcincti; fumum ex ea aqua calida recipiat, atq; sudor omni mane ita prouocetur. Postea & in eodem balneo pedes imponantur; idq; omni mane per plures dies, ventriculo ieiuno. Hoc presidio tandem incipiebant detumescere crura, tum fasciis circumligabantur: idq; continuando per plures dies, à leucophlegmaria, tum hydrope, miraculi instar, curata fuit. At Matrona cuidam, quæ fluxum muliebrem & menses copiosos ita habebat, vt in syncopem quasi incidere, nec vllis modis restringi possent, mulier quadam exhibuit tria cochlearia aquæ plantag. cum tribus cochlearibus vini rubei, adiiciendo vitellum vnius oui, leuiter tantum ebulliendo. singulis diebus omni mane totum sumebat, superdormiendo. Vix duobus diebus, aut tribus, cum sumisset, fluxus ille enormis cessauit, & sanitati restituta fuit. Hoc eodẽ remedio postea & plures à fædo illo malo liberata sunt per me, Deo adiuuante. Hec satis sint dicta de menstrua purgatione rubra. Nunc ad fluorem muliebrem accedamus, quem alij menstrua alba appellant.

OBSER-

OBSERVATIO XIX.

De fluore muliebri, aut menstruis albis.

Vxor illius Cornelij Alcmariani, in platea frumentaria habitantis, qui vascula conficiebat, vltra decem annos cachexia affecta, facie admodum pallida & cadaverosa, per vndecim annos fluore muliebri, vel menstruis albis, detinebatur. Cùm autem in patriam essem reuersus, & apud patrem tunc agerem, hæc quidem vicina nostra me consultandi causa accessit: cui inprimis adhibuimus medicamentum quod aluum & simul aquam duceret: deinde diuretica propinauimus: mox ad illa confugimus, quæ ad hydropem valere scripsimus; quibus etiã melius habere visa est. Verùm cùm tenuioris fortunæ esset, paulo pòst curationem reliquit, ac suo more viuens ad hydropem deuenit, & cùm tunc pro deplorata haberetur, in maxima copia ebibit cereuissiam Gedanam; qua quidem casu & bona sua fortuna alius supra modum soluta est, & totâ aquâ cùm maximo impetu per aluū effusâ, præter mentem curata fuit. Cùm autem hæc illi contigissent, hortabar vt nunc aliquibus medicamentis vteretur, quæ hepar roborarent, ne rursus eiusmodi superfluitates aquosæ regenerarentur. At mulier sui negligens, suo more vixit; quanquam ei eadem medicamenta proposuissem, quibus Gal. in Boëthi vxore (de quibus suo loco) vsus fuerat.

H

Proin

Proin post duos trésvé menses iterum in consuetum muliebrem fluorem incidit; neque tunc nostro consilio, aut aliorum Medicorum celebrium vti volens, paucos post annos denuo in hydropem lapsa est; nec vllis præsiidiis vtens, ex eadem hydropce mortua est.

S C H O L I A.

FEMINA aliquando totius corporis culpa non purgatur, (vt in præcedentibus, cum de retentione mēstruorum ageremus, diximus) aliquando parcius, aut liberalius, vt iam mox ostendimus. Ita quoque interdum malum quippiam per vterum excernitur, vt liquet ex Gal. 3. De causis symptom. Quæ quidem affectio vocatur à Græcis *ῥέξις γυναικεία*, vt patet ex Gal citato loco, & lib. De diff. sympt. & 6. De locis affectis. quem sectati sunt Paul. lib. 3. cap. 73. & Aëtius cap. 65. lib. 16. A Latinis verò Muliebris fluxio, seu Profluuium muliebre appellatur; ab alijs Superfluitas alba. Is fluxus maximè mulieribus laxis carnibus & pituitosis accidit; vnde albos flores vulgus vocat, alij Mēstrua alba. Est verò totius corporis recrementi destillatio, vt inquit Paulus. Vel vteri destillatio diuturna, vt Aëtio visum est. Vel vniuersi corporis per vterum expurgatio, ipso haud quaquam affecto, vt ex Gal. colligitur locis citatis: ita vt nec alicuius determinata corporis partis affectio hac dici possit. Iuxta alios modò est ab vtero solo, modò per consensum aliorum membrorum: interim ea ipsa est symptoma in genere excretorum immodicè, præsertim in qualitate; nam vitiosum est quod expurgatur, vt eodem lib. De differ.

&

Muliebre
profluuium
quid sit.

Quæ pars
affecta.

& 3. De causis sympt. scriptum est. Fluunt enim ex
 utero alia humiditates à sanguine, modò permixtæ,
 nunc sinceriores; atque vario colore, aliis albæ, aliis vi-
 rides, aliis fuliginem imitantes, aliis flavæ. Sed inter
 albas differentia est substantiæ. Aliquando enim pitui-
 tam lentam imitatur, aliquando tenuem & aquo-
 sam. Ex qualitate etiam, quoniam aliàs acris est &
 mordax, quod plurimum euenit; aliàs mitior. Corpus
 enim per hanc partem, ut diximus, sese expurgare ten-
 tat, idq; per excrementa varia, pro natura humoris
 qui abundat. Sicitaq. mulieres reddunt per uterum
 quadam excrementa serosa, quam purgationem mu-
 liebrem appellant, quod illis sit peculiaris & propria.
 In quibusdam quotidie, in aliis post mensum purga-
 tionem, nonnullis euenit inter duas purgationes tan-
 tum. Aliquibus hoc vitium à toto corpore dependet; in
 reliquis ab affectibus uteri; ut Rondeletius quoque cen-
 sebat. Generatur autem hic fluxus muliebris, vel ex
 completendi suctione imbecilla, vel expultrice immo-
 dicè concitata, vel ambabus simul lasis, aut quòd totus
 sanguis tenuis, serosusq; est redditus, ut lib. De differ.
 sympt. à Gal. scriptum est. Atqui sanguis talis fieri po-
 test, vel ex sanguifica facultatis operis frustratione;
 vel ex eius quæ tenue & serosum separat, seu idem ex-
 cernit. Incidere etiam aliquando potest ex retentrica
 ipsa immodicè opus suum urgente, & cute inspissata
 & remibus occlusis; ex eiusdem Galeni decreto. Vel
 ambabus simul lasis ob copiam & sanguinis qualita-
 tem. Et ita secundum quosdam à tribus quoq; causis
 potissimum procedit. Primum à toto sanguine aquoso
 transmissio ad uterum, quo fluxu subinde sequitur ro-
 tius alleviatio, modò non superfluat & diu adhareat;

Quis affe-
 ctus præter
 naturam sit,

Differentiæ.

Causæ.

idq; etiam ab hepate: quando nimirum à toto prouenit, & hepar debilitatur in sanguificando, ut non possit probum ac bonum sanguinem generare. Secundo à capite, humiditatibus in cerebro per viam indigestionis collectis, vel ex vaporibus eleuatis ad caput seu cerebrum, vbi conuertuntur in aquosam materiam, qua descendit per nucham vsque ad vterum, & euacuatur ab eodem. Tertio ab vtero ipso, quando vterus proprium suum nutrimentum non digerit, & id in humiditates multas mutatur, quas natura propellit foras. Ita & Sylius dicebat: Albus hic fluxus fit ab imbecilla coctione ventriculi, & corporis totius, ex mœrore, vel vsu ciborum pituitosorum. Sic & Fernelius: Causa autem, inquit, quæ corruptum humorem assiduò gignit, aliàs in vtero, aliàs in principibus partibus consistit. Grauius proinde hallucinantur, qui omnium ex vtero prodeuntium, quemadmodum & omnis suppressionis mensium, causam ab vno requirunt vtero. Etenim quibus mulieribus viscera refrigerata, vel obstructa, vel scirrho dura, cruditates, malum habitum aut leucophlegmatiam inuexerunt, corruptus humor in varias partes effusus, sæpe in vterum procumbit, & illac decurrens, corpus expurgat; quod quibusdam per renes aut per aluum fieri diximus. Sic mulier, apud eundem Fernelium, hydropem mensibus singulis per vterum expurgabat. Altera causa ex vtero quidem rarior existit; eaq; vel intemperies est, fereq; frigida; vel imbecillitas ab vteri gestatione, à partu, coniunctione, aut ab alia externarum causarum vi contracta; vel erosio, vel exulceratio ex inflammatione aut ex abscessu derelicta. His quippe causis oblasus vterus, & proprium alimentum malè conficiens, excrementa multa

*multa progignit, quæ foras elabuntur & excidunt.
Hæc illustrabuntur exemplis viuis subsequen-
tibus.*

OBSERVATIO XX.

*De menſtruis albis, per modum con-
ſultationis.*

GENEROSÆ cuidam & nobili matronæ
ab utero continuò humiditates effluebant,
ita ut hanc ob causam ſterilis permaneret, & ſi
conci-peret, ad felicem partum non veniret. Erat
enim mulieb- re profluuium, quod menſtrum
album vocant: plurimum pallebat, cibos ſaſti-
diebat, ægrè deambulabat, tume- bant genæ, & to-
tum corpus flaccidum erat, quaſi ad leucophleg-
matia inclinata eſſet. & quantū ex iis notis quas
etiam enarrabat vulvæ rheumatismus, erat id
ex uni-verſo corporis humore defluente ad ute-
rum; fluxioque erat alba, pituitoſa, & ſeroſa;
nam & faciæ ſive panniculi in umbra exiccati,
album colorem præferebant. Non concipiebat
propter humiditatem uteri, qui ob continuam
defluxionem ſemen non retinebat; & ſi conce-
piſſet, partus facilè ante tempus excidebat: uti
etiam eveniebat mulieri cuidam craſſæ cereui-
ſariæ apud Delpheneſes, quæ pluſquam octies
abortum ex levi cauſa paſſa fuerat. Rarò enim
vulvæ habitudo humida ſine rheumatismi vitio
evenit, & ſuperabundantis humoris capax eſt:
veluti enim nauiſ carina, corruantium humo-
rum locus eſt. In hac nobili muliere continge-
ba

bat tam ex debili concoctione ventriculi, quàm hepatis mala sanguificatione, totius corporis humore ad vterum profluente. Quamobrem vt huic rectè consuleremus, animaduerso iam profluuij modo, intelleximus similem ferè casum esse cum vxoris Boëthi, cuius historiam Galenus posuit in libro De præcognitione: & hîc casus difficilis quidem est, & ideò particulatim rectè proponitur à Iacchino, viro doctissimo; & diligentissimè examinatur. Medici, inquit, ante Galenum cogitabant de curatione, atque eam in duobus scopis ponebant. Primus erat siccare totum corpus, & partes quæ circa vterum: secundus, astringere & roborare eas partes, quæ à toto suscipiunt. Hæ enim sunt communes intentiones in morbis è fluxione, vt respiciamus mandantes partes & recipientes. Sed hac via, inquit Galenus, cum processissem, nihil est profectum; sed res in deterius labebatur. Attamen meliorem curationem hæc nemo inuenire audebat, cum neque Rationales per methodum, neque Empirici per experientiam meliorem inuenissent. Cum ergò sic dubij essent, tumor circa ventrem apparuit, ita vt grauida crederetur. At Medici hoc non suspicabantur, inquit, quoniam causam tumoris cernebamus, id est, aquosum humorem, qui ex parte quidè excernebatur, sed maiori sua parte retentus, tumorem fecit. Hîc ergo videtur Iacchino erratum fuisse; scilicet astringentibus intempestiuè adhibitis, id est, non bene antea siccato corporis habitu. erratum post ab obstetricibus, cum lauarent, & victum prægnantium infli-

instituerent; id est, non respicientes humidum affectum. Rogabat igitur Boëthius rursus ut mulieris cura haberetur: sed persequi tutum non videbatur, inquit Galenus: nemo tamen hunc modum reprehendere audebat, inde omnes hæsitabant. Tandem ipse cogitans super ea re noctu, in mentem reuocauit symptoma quoddam, quod est mollities musculorum, qui circa hypochondria sunt siti: appellat autem mollitiem, talem carnis tactum, qualem in hyposarca affectu sentimus: tumor scilicet laxus & mollis, qui digitis adedò cedat ut carnem ipsam dissoluere te posse videaris. Hic est tumor œdematodes, soboles pituitosi sanguinis, qui per vniuersam carnem est dispersus. Tale quid sentit circa hypochondria, vnde coniecit, affectum hunc esse intemperiem frigidam & humidam, cum humore pituitoso plurimo aggenitum ex viscerū intemperie, quibus debetur concoctio, peruenientem verò ad vterum pellente natura: qua expurgatione prohibita, vterus intumuerat, & viscera ipsa eo humore plena, vicinas partes & sibi incumbentes affecerant: inde mollis tumor. Iam igitur nosse poterat in quo prior curatio defecisset: nempe quòd respexerat solùm superfluā humiditatem siccando: (nam de siccatione solùm meminit) oportuit autem adicere, & calefacientia. Sed alia ratione reprehendendus modus ille veniebat; quoniam astringentibus utebantur intempestiuè; vnde retentis excrementis, tum venter, tum hypochondria frigida & humida intemperie magis affecta erant, atq. aquoso

H 4

humo-

humore intumuerant; ac proinde de hydropo mulier periclitabatur: vt nostra quoque hæc matrona, quæ neque gruida erat. Huius secundi erroris non meminit Galenus; sed innuit, inquit Iacchius. Postquam secundo loco curam instituant, nihil astringentium meminit: non quod prorsus damnanda essent, vt videbimus; sed quia intemptius vsus eorum damnandus est: hoc est, priusquam corpus egregiè sit expurgatum. Instituit igitur calfacere, vt & siccare: & hoc per arenam marinam ex calfactam, in qua ægram volutari iussit, & operiri; ac victum potumque instituit per exiguum, ad siccandum; & frictionibus vsus est ad siccationem & extensionem corû quæ circa cutem, & vt excrementa plurima ad cutem auertendi gratia ferrentur. Confert enim in his affectibus è fluxione, vacuatio quæ auersione fit. Sed & potiones quæ deriuent adhibet, tum per aluum, tum per vrinas. Pro exemplo facit mel coctum probè, mox refrigeratum ita, vt speciem præbeat aquæ fontanæ per æstatem, id est, tunc cùm æstas viget tali temperie, melle uteremur. Nam frigidum prorsus noceret affectui; & non posset fricatio ex eo fieri, quod densatum hæreat, neque extendatur. Hæc ad corpus vniuersum fieri præcipit. Nam si vellet referre frigido fontanæ aquam quali frigiditate est per æstatem, esset vsus incommodus. Hæc diebus septē peracta: quæ cùm cōferre visa sunt, ausus est Galenus solus petere curam mulieris. Primum ergo aquam ducente per aluū medicamento est vsus; qualia sunt quæ suprâ De hydrope po-

pe posita sunt: secundò propinavit aquam, in qua
asarū & apium erant incocta: ac postridie medi-
camentum rursus aquam ducens propinavit, ut
ita assuesceret natura ad urinas, & per aluum ex-
crementa deducere, quæ antea in uterum con-
fluebant. Usus quoque est quotidie fricationi-
bus ex linteis; primùm mollioribus, mox aspe-
ris, demum ex melle iam dicto. Itaque, inquit,
post dies xv. nihil affectus restabat. Hæc, si aquo-
sus & frigidus humor sit collectus, profunt. Hæc
muliere curata, Boëthius quadringentos aureos
ad Galenum misit. Consului ego itaque cum
Medici domestici præsentis consilio, ut hæc ipsa
matrona nobilis, præter victum exiccantem &
excalfacientem, etiam medicamenti aquam &
humores aquosos per aluū educantibus, ut dia-
carthamo & similibus, uteretur: deinde iis quæ
per urinam tales humores educere valent: &
tertiò etiam iis uteretur quæ per cutem eos hu-
mores euocare possent. Suasi insuper ut ea ipsa
crebrius repeteret, quo, corpore toto ita probè
repurgato, & humiditas uteri cum exiccantibus
caloremque eiusdem vigorantibus corrigeretur,
ac retentiva vis matricis simul roboraretur &
constringeretur; ut non solum fluxus ille dimi-
nueretur & cessaret, verum etiam ut semen re-
cipere posset, ac receptum retinere. Imitabar
scilicet consilium illud 207. Montagnanæ pro
Domina cuiusdam strenuissimi militis, ad
fluxum uteri ab immoderata humiditate, cuius
causa sterilis esset. Tandem ad ea deveni quæ
fluxum illum album simul constringunt, & hu-
midita-

H 5

midita-

122 DE MULIERVM MORBIS,
 miditates albas tollunt; qualia etiam apud eun-
 dem Bartholomæum de Montagnana referun-
 tur ad longum consilio 204. 211. 214. 215. 216.
 217. in quibus consiliis multa & apta remedia
 inuenies ad menstrua alba: quæ nunc breuitatis
 causa omittimus; eadem etiam tunc domestico
 Medico perlegenda dedimus, quibus etiam im-
 mutatis pro suo iudicio uti posset.

SCHOLIA.

Signa de-
 monstratiua.

Signa pro-
 fluij mu-
 liebris.

Fluor mulie-
 bris quibus
 modis diffe-
 rat à mensi-
 uo.

SIGNA verò profluij muliebris demonstratiua
 facile innorescunt, agram interrogando & inspi-
 ciendo ea ipsa quæ ab utero prodeunt; præsertim si mu-
 lier sentiat tales humiditates ab utero emanare. Sed
 antequam ad curationem procedatur, diligentiore
 examine opus est, non solum ex qua causa & humore
 ortum habeat, verum etiam quomodo causa distin-
 guantur, & quibus modis ab aliis affectibus & inter
 se differant. Nam fluxus muliebris, ut Aetius re-
 fert lib. 16. cap. 67. ex Archigene, licet diuturna sit
 uteri destillatio; ab eruptione tamen sanguinis differt,
 ut in qua sincerus sanguis emanet: hic verò fluxus
 corruptus apparet; diuersorum tamen colorum, pro
 diuersitate redundantis succi, ut dicemus, qui etiam
 citra dolorem prodit. Quapropter loci (teste Paulo)
 continuò madent humoribus colore variantibus: labo-
 rans decolor est, cibum non sentit, eumq; fastidit, in
 obambulatione difficulter spirat, oculos habet prætu-
 midos, nunc cum dolore, nunc citra dolorem. Fluor
 muliebris, inquit Fernelius, differt à mensium proflu-
 uio, quod non sincerus sanguis, sed corruptum quiddam
 prodeat,

prodeat, idq³ continenter, aut nullo ordine, nulloque circuitu. Est autem id modò liquidum & albicans, lactis sero aut piisana cremori persimile, modò citrinū; modò pallidum; adeò acre ferè & adurens, ut quascumque partes attrigerit, erodat haud leuiter: atque id rursum modò tetrum est & graueolens, modò odore nullo molestum. Ita & Aëtius loco citato: Hic fluxus corruptus apparet, atque interdum ruber, est q³ ipsius sanguinis sanies; interdum albus, cremori piisana similis, à sanguine videlicet pituitoso excolatus; interdum pallefcit, ubi bilis amara redundauerit, sepe aqua modo liquefcit, quod à seroso excremento fit. Inferre quoq. solet hic fluor inenarrabilem tristitiam, & pedum tumorem: & in aliquibus perpetua destillatio perseuerat; in aliquibus per interualla quædam redit, ut ex eodem constat. Paulus lib. 3. cap. 63. dicebat, fieri nunc cum dolore, nunc cura illum; aut cum exulceratione, aut sine illa, aut inflammata, aut sordida, aut pura. Verum aliquibus hoc vitium à toto corpore aliquando dependet, ut nunc ostendimus; in reliquis verò ab affectibus vteri. hæc cum vlcere vteri conuenit ferè, ob id distinguenda est. Distinguntur autem ex consistèntia recrementorum redditorum. Nam quas vlcus infestat, pus reddunt crassius, sordidius, albius: purgatio autem muliebris est velut ichor, aut serū. Differt etiam, quòd mulieres quæ vlcus in vtero habent, maximè si in collo fuerit, congressum viri non patiuntur; aut si patiuntur, irritatur vlcus. Quæ verò menses tales patiuntur, nullam sentiunt in coitu molestiam. Quantitate etiam differunt. Maior enim copia serosæ substantiæ emititur, quàm puris. At si purus sanguis, qualis ex dissecta vena, profluit & cum dolore,

Quomodo
ab vlcere
vteri distin-
guatur.

Quibus mor-
dis differat
à mulierum
feminali
spontanea
excretionē.

dolore, vteri erosionem indicabit; de qua antea sermo-
nem habuimus: nec tale profluvium muliebri appel-
lari debet: nam in eo vterus nequaquam affectus est;
in hoc proprio morbo laborat, qui erosio seu exulce-
ratio existit: item hic corruptus fluxus qui in mulie-
bri profluvio ruber apparet, seu sanies sanguinis fit, ve
paulo antè diximus. Differt quoque, iuxta Benedictū
Veronensem lib. 26. cap. 11. à gonorrhœa, seu feminali
spontanea excretionē; cum hæc non sine irritatione &
voluptate aliquando fluat, vel ex debilitate vulvæ
contingat, ut De incontinentia seminis refertur, se-
minalibus vasis imbecillibus: quod enim tunc fluit, al-
bum & limpidum est, substantiæ mediocris, sine gra-
ueolentia: ac minus abundat, quàm rheumatismus
hic vteri; magisq; membra consumit, ac ocyus exter-
minat. At ex rheumatismo, seu fluore muliebri, ve
paulo antè dictum est ex Paulo, genitale ipsum sem-
per humore madidum est: ex seminis incontinentia
non semper humefcit. In eiusmodi rheumatismo vte-
ri, turbulenta quoque & graueolens vrina demitti-
tur, crasso humore permixto. Purgatio itaque hæc
muliebri serosa est, quandoque bilis serum aut ichor,
quandoque pituita, & id frequentius quàm sanguis.
Raro fit à melancholia, aut si fiat, tandem cancer ex-
citatur in vtero, ut aliquando in praxi vidimus in
muliere Bononiæ, cum eam vnà cum præceptoribus
inviseremus. Prodeuntium odor (inquit Fernelius)
color, atque substantia floris speciem demonstrat.
Nam perpetuò id quod euacuatur, tale specie est, quale
est quod in animali redundat, ut liquet tertio De cau-
sis symp. potissimum autem id, si mulier laxa sit car-
nibus, & pituitosa, ex eiusdem Gal. sententia 6. lib.

Signa can-
cerum: &
quales succi
dominètur.

De

De loc. affectis. Qui itaque exquisitè colorem præse-
 fert aliquem, is redundantem humorem facile indi-
 cat. Et ita cognoscitur cuius sit humoris ichor, aut
 serum, à colore, qualitate, & totius corporis cacochy-
 mia. Nam si à bile fit, color est subflavus, & pallidus,
 humor acris; quam acrimoniam mulieres potissimum
 sentiunt in parte proxima externa, & in pterygiis.
 Et color quidem totus bile redundare videtur; maxi-
 mè quando per consensum totius corporis fit; quod
 etiam ex moribus & victus ratione deprehenditur.
 quæ enim acris vascuntur alimentis, & quæ natu-
 ra sunt negotiosa, hanc affectionem patiuntur. Sin à
 pituita, color totius corporis albidus est, & magna
 quantitas defluit, sed minus acris; ut in hac matrona
 de qua nunc diximus Observatione precedente, ene-
 niebat. Sunt autem & tales otiosa & desides, quæ
 hunc affectum patiuntur. A sanguine fiunt tales pur-
 gationes plerumq; ut Rondeletius sentiebat, tantum
 cum mulieres uterum gerunt, vel quando suppressi sunt
 menses. tunc aliquando natural loco mensium serosum
 excretum reddit, quod utrumque rubescit, & tale
 est, quasi esset aqua paucò sanguine tincta. Tamen &
 alius contingit ut animaduertimus, quibus nec menses
 restricti essent, nec quæ uterum gerebant. Si corpus
 sit plenum sanguine atro, erit purgatio fusca; vel si
 cancer iam factus sit, purgatio illa non multum dif-
 fert à sanguinea, nisi quòd magis fusca est. Si verò
 obscurum colorem habeant, causam horum ita per-
 scrutabimur: luteum eo inquinatum arefactum, sim-
 plici aqua eluemus, & inde à macula colore redun-
 dantis humoris notionem capiemus, inquit Aëtius. Si
 autem fiat sanguifica virtutis vitio, vel eius quæ re-
 nue

Si vitio san-
 guificæ vir-
 tutis fiat,
 signa.

nue & serosum separat seu excernit, id cognoscet ex iis quæ de hepatica affectione, aut de renum affectibus conscripsimus. Inspissatam autem cutem probè ex se ipso percipies; neque magno labore retentricis, aut expultricis, facultatis lesionem, seu vitiarumq³, reperies.

Signa ex vitio vteri.

Ex viscerum aut totius corporis affectu.

Prognostica

Muliebte profluuium rarissime virginibus accidit.

Rarius autem diximus ex vteri vitio fieri: si ita sit, cognoscetur si reliquæ partes bene habeant, & præcessit retentio mensium vel immodica purgatio, vel alia vteri affectio. Internoscuntur autem causæ, ex solo vteri affectu venire, iuxta Fernelium, si fluor sit purior, & eius affecti adsint indicia. At si ex viscerum totiusve corporis affectu fluor sit, erit copiosus, nec malè affectorum viscerum notæ desunt. Ceterùm quod ad prognostica, ætate vigentes mulieres rubra fluxio serè comitatur, ex auctoritate Archigenis apud Aëtiũ; declinantes autem candida: quarum utraq³ si suis ætatibus contigerit facillè curatur; sin alienis, difficulter. In omni verò defluxu os vteri aperitur, & veluti relaxatur. quibusdam etiam vterus ipse decidit, ut vsque ad muliebrem pudendum progrediatur; ut vetula cuidam Delphensi longo tempore albo fluxu laboranti. Quamobrem magna cum diligentia curanda est affectio hæc, neque localibus auxiliis fluxus confestim reprimendus erit. Nam aliqua inde in hydropem, aliqua in nervorum affectiones, aut oris ventris, aut capitis, vexationes collapse sunt; ut liquet ex eodem Aëtio. Corpora equidem inuadit, quibus plurimo partu & coitu partes illæ laxiores factæ sunt; quamobrem rarissimè virginibus. Nihilominus tamen hic affectus non ætate maturas tantùm, verùm etiam virgines quas pallor decolorat inuadit; quo & puellam octauo ætatis anno Fernelius obsessam vidit, ac diu postea

postea grauiter q̃ afflictam . His quoque accidit, quæ Quibus
autem po-
tissimum.
praua viuendiratione vtuntur, luxuosa quidem, sed
minimè exercitata. Vnde & nunquam visa agrestes
mulieres id pari, sed urbana: & inter eas, quæ sunt ma-
gis muliebri habitu & quæ sedentariam vitam perpe-
tuò degant. Diligentes in hac curatione esse debemus,
cùm saepe mulieres etiam ditissima consilium à nobis
petunt, ob multa incommoda quæ inde sequuntur.
Nam & coitu lædunt virile pudendū, & steriles sunt:
quoniam per humiditas partes (vt de muliere præce-
dente diximus) semen defluit, & laxius redditur os
vteri continuo affluxu, & minimè validum ad tra-
hendum semen, aut etiam continendum. Sed vlcera
periculum est, & fœditatis. Sape etiam & pulchræ
mulieres hoc solo scædantur. Adde quòd faciem debo-
nèstat, & corpus vniuersum: intumescit facies, &
oculi præsertim: pallet mulier, gracilis euadit, mæsta,
sine appetentia; pigrizia adest immensa, lumborum
grauitas & dolor: maritis nullo sunt oblectamento.
Atque hæc affectiones difficillimè curantur, quia pars
illa promptè recipit aliarū partium excrementa, tum
ob situm inferiorem, tum ob multitudinem venarū eo
pertingentiū, tum etiam propter consuetā illam natu-
ralem purgationem. Post tales purgationes solent fieri
vlcera in vtero, & ab vlcerebus fluxus immodicus san-
guinis. Si vlcera fiant arrodētia vel virulenta, à biliosa
materia; si putrida & sordida, à pituitosa; carcinomata
à melancholica magis eueniūt. Nulla frequentior mu-
lieri molestia affluit, nisi quòd à viris & sibi hoc pudendo-
rum madore perpetuò displicet. Non raro tamen ex
putredine in corpore, aut vtero, vel ex mista bile fla-
ua, aut seroso excremento, acrimoniam acquirit, &
partes

partes vteri vrit & vlcerat, & tandem doloris impatientia & atrophix enecat, & ob aliquem vteri affectum, alium ex vtero deprauatum infert. vtrumq; autem conceptum impedit: quia semen vel corrumpit, vel lubricando elabi compellit.

OBSERVATIO XXI.

De fluore muliebri post naturalem mensium purgationem.

VXORI meæ charissimæ, post mensium naturalem purgationem, coniugit aliquando vt fluorem muliebrem modò tendentem ad naturam sanguinis, modò ad bilem, experiretur: & quia sæpe facies rubore inficiebatur, & venæ turgidæ essent, sanguinem bis aut saltem semel, in vere detraximus; & egregiè iuuabat. Et hoc est quod dicebat Aëtius lib. 16. cap. 64. Mulierem rubro fluore vexatam curaturi, primò ad sanguinis missionem vertemur, quæ non tantum ad vterum confluenti aduersatur, sed detentionem constrictionemque tutam efficit: nam multa sequerentur incommoda, si repente sanguinis vel cuiuscunq. defluxus impetum locaibus præsidiis reprimeremus, quemadmodum etiam de mensibus profluentibus diximus: nam ita quædam in hydropem vel neruorum morbos, aut oris ventriculi, vel capitis, inciderunt, eodem Aëtio teste. & sic item in hoc casu, si nihil obstiterit, id est, si quæ obstant non valde fuerint insignia, sanguis mittendus, ætate consentiente

tiante. Et ita vena basilica secta, pauco extracto sanguine, aliquando etiam partita non solum in mea vxore, verum in aliis egregie profuit. Purgauimus deinde eandem cum decoct. myrobal. citrinar. & puluere rhabar. adiecto syr. ros. ex infus. ros. rubrarum apertarum. Et quia in lumbis sæpe dolebat, loca renum frequenter inungi iussimus vng. ros. sed non ante purgationem totius corporis: nam vbi habitus vitiosus est, omnium primò castigandus est, & in suam naturalem constitutionem reducendus. Curato corpore, ad vterum veniendum: nam quemadmodum oculorum affectus non perfecte curantur, nisi corpus vniuersum curatum fuerit, sic neque vterus. Ideo bilem purgauimus cum medicamentis ad bilem facientibus, aliquo modo astringentibus, vt est rhab. myrob. succus ros. & earum syrupus, & quæ bilis acrimoniam frangunt. Dedi etiam aliquando pilulas ex rhabar. & myrobal. frequenter maceratas in succo ros. nam pilulis magis delectabatur. Conficiebam autem hoc modo: R. rhabar. electi frequentissime irrorati succo ros. ʒ ij. myrobal. citrinarum, chebul. indarum infusarum in succo ros. añ. ʒ j. mastiches ʒ j. spicæ ʒ ʒ. cum syr. ros. laxat. de quibus sumebat semel in hebdomada, in lecti exitu, duas vel tres, vel quatuor ad summum. Postea cum modicè distillaret, succida lana vino & rosaceo madente fouimus, summitatesque superiores, nempe brachia, vinculis deligauimus. quæ præsidia non solum in principio post venæ sectionem adhibet Aëtius, verum etiam post aliquot periodos

dos ante accessionem, in ipsa adeò accessione adhiberi possunt. Constat autem, mulierem coxis accliuibus collocandam esse, cruraque ad partes vteri colligendas extendenda & inuicem complicanda. Quod si sanguis copiosè deferatur, coxas, pectinem, & lumbos spongiis postea madefactis, inquit idem Aëtius, cooperiemus, si modicè, iam dictis fovebimus. Sed & leuiter vrinam prouocantia, & simul bilem contemperantia propinauimus, vt hoc vel simile decoctum: *℞ rad. cichorij cum toto, end. sum. milit. lupul. borag. fumarie, añ. m. j. lactuca m. β iunibar. sebesten rec. añ. nu. vij. capill. ven. polytricht, añ. p. j. sem. anili 3 ij. sem. quat. frigid. maior. añ 3 j. β. flor. ros. rub. p. j. sem. pap. albi 3 j. fiat decoctio pro lib. j. coletur & sacch. dulcoretur, & arom. spec. triumfant. 3 j. β. misce. Deinde bibebat vinum rubrum stipiticum Gallicum; & rectè habebat. Dedi quoque ex hac mixtura, vel simili, ad magis restringendum: *℞ conserua rosar. antiqua 3 j. β. diacydon. sine spec. 3 β. conserua flor. cichorij 3 j. pul. triumfant. coralli rub. vili & loni añ. 3 j. β. cum syr. cotoneor. fiat mixtura. Vt ero etiam abluto decocto hordei & lentium, cum pauco saccharo, postea etiam adiectis ros. siccis, adhibito insuper in fine fotu magis adstringente, tandem rectè habuit, optimo victu utens. Maximè iuuabat in fine collutio adstringens, moderatè refrigerans; quale illud est ab Aëtio commendatum: succus plantaginis, polygoni, stratiotæ, cydoniorum & mespilorum. Eiusmodi, inquit, collutiones non sunt omittenda.**

Vnum

Vnumquodque istorum, iuxta eundem, rosaceo aut myrrino oleo perfundatur, fiatque infellus in myrti, radicum rubi, malicōij, & similium decoctis. Sed quia alia iuuabant, infellionibus opus non fuit, neque etiam pessis, tum aliis præsidis, quæ ab eodem capi iam citato lib. 16. recensentur.

S C H O L I A.

QUOMODO autem aquosus & frigidus humor collectus (si causa huius mali sit) curetur, iam ex parte diximus Obser. 20. precedente, ex mente Galeni. Sed si ulterius generis excrementum in causa sit, quomodo erit curandum? Respondet idem Iacchius: Erit abstinendum à calefacientibus, & purgandum corpus vniuersum, & ea quæ urinas ducunt propinanda, & frictions totius cutis adhibenda, & victus instituendus, qui maximè ei humori repugnet. Semper tamen multa aquositas cum his admiscetur, & plerumque frigida, quæ tamen vel missione, vel putredine acquirit acrimoniam. Ideo in vxore, cum etiam bilis abundaret, vsi sumus rhab. & myrob. nam & hic conueniunt quæ bilis acrimoniam frangant, quæq; aquam illam biliosam purgent: atque etiam hic ex parte conueniunt illa quæ scripsimus superius conuenire immodicæ purgationi mensum ex bile corrodeute, aut venarum arrosione. Sic bile flaua redundante, hiera cum rhab. myrobal. citrin. decocto, ac syr. ex pluribus infusionibus ros. purganda erit agra. Sed hic abstinendum vult Rondeletius à diureticis, vel aperientibus, nisi in declinatione, aut curato corpore, & cum volumus ad urinas eos humores deriuare: tale

Bile redundante, quid lacteandum.

apozema nobis commendat idem Rondeletius : R. ci-
 chorea, end. scariola, lupul. fumaria, cicla, mercuria-
 lis, lactuc. borag, añ. m. j. folior. brassica marina m. ß.
 passul. prun. sebesten, añ. par. xx. sena orientalis &
 medulla carthami, añ. ʒ ij. (sufficiet ʒ j. vniuscuiusque)
 flor. cord. p. j. anisi ʒ j. quat. sem. frig. maior. ʒ ij. ta-
 marind. ʒ j. fiat decoctio in sero caprino, vel in aqua.
 in lib. j. ß. dissolue succi ros. syr. end. simpl. añ. ʒ iij.
 (sufficiet ʒ ij. vniuscuiusque) sacchari parum. fiat apo-
 zema media decoctionis. capiat in quatuor matutinis,
 vel iuxta quod aluum moueat. purgat enim aquosam
 materiam biliosam, & simul per renes. Si mulier sit
 delicata, arom^r cum sant. rub. Finitis syrupis, potest
 hac potio sequens sumi : R. decoct. glycyrr. ponendo ʒ
 ß. & polypodij ʒ j. myrobal. ʒ ij. Coquantur leuiter
 in vna parte apozematis; in quartario vno colatura
 dissol. cathol. ʒ j. vel ʒ vj. syr. ros. laxat ʒ j. misce. In
 ditioribus loco cathol. accipe rhab. ʒ j. ß. Vel suman-
 tur pilula in Obs. precedente descripta. Conuenit &
 eryphera persica diasebesten. & reiterari possunt syr.
 vel apozemata, & purgatio. Sed in processu purga-
 tionis, quæ purgant & simul adstringunt magis con-
 ueniunt, quia minus deducunt recrementa ad partem
 affectam, & eandem corroborant & siccant. A pur-
 gatione, ea medicamenta exhibeantur, quæ propriè
 εἰρηναῖα, id est, vrinam cientia dicuntur, quorum silua
 à Gal scripta est lib. 5. De simpl. medic. facult. calida,
 inquam, ac sicca existentia. Sed hic quaeritur, quo-
 modo faciant ad vsum, quæ vrinam cient? Siquidem
 omnia cient menses. Mouebunt ergo hoc profluium,
 non sistent. Respondebimus: Ea quæ propriè vrinatiua
 dicuntur, non mouent menses, vt ex Galeno accipi-
 mus;

Num vrinā
 cientia hīc
 conueniunt.

mus; sed potius cohibent, dum sanguinem siccant
& crassant. Quod si ad ducendos menses aliquando
utamur, hoc est ex accidenti, quatenus obstructions,
quibus detinebantur, tollunt. Contra, (inquit etiam
Iacchinus) si vrinas ducunt liquando vel separando aquo-
sum, ut Galenus vult; ita ergo sanguis liquatus, & aquo-
sus humor, feretur ad vterum, sicut ad vesicam: quare
augebitur affectus. Respondendum, Non fertur ad renes
humor ille, sed trahitur, prout liquidior sit: ad vte-
rum autem, neque sponte fertur, nec trahitur, sed
trahitur à natura: facile ergo aueriri potest in partes
alias. Et sic ab his (ut etiam dicebat Donatus) sanguis
non extenuatur duntaxat; sed & funditur, ac secer-
nitur; non secus atque lac, quod coagulatur; seroso
videlicet, & tenui seorsum segregato, crasso verò in sese
coëunte; siquidem quo facillimè ad se attrahant renes
quod in sanguine aqueum, tenueq; , ac serosum est.
Vtraque hæc conferunt, nempe totius sanguinis pri-
mum fusio, deinde segregatio; quorum neutrum abs-
que valido calore peragiqueat. Hæc itaque peculiari- Vretica.
ter ab eodem Galeno ibidem Vretica, siue vrinam mo-
uentia appellantur, non quia solum moueant vrinas,
sed quia solas absque vi, etiam menses, aut lac: inter
que apium, atque asarum eligens, mulieri de qua an-
tea dictum est, eorundem decoctum in aqua exhibuit.
Hæc namq; per vrinam humorem, qui per vterum
expurgabatur, deriuando etiam euacuant, ut ipse te-
latur, cum hoc quod neque mense sciunt, ut quibus-
dam Arabicis falsò visum est, & renes occlusos libe-
rant; si id quoque talis affectio, vel muliebris proflu-
ij causa fuerit: nec minus & per totius corporis fri-
ctiones humor quoque euacuandus est. Et si ex cute

spissata adhuc talis affectio fuerit orta, iisdem frictio-
nibus rarefiet; quæ primò mollibus lincis, demum
asperis faciendæ sunt, ut ex Galeni mente antea ex lib.
De præcogn. ad Posthumum, diximus. His quippe
medicamentis vniuerso corpori adhibitis, intacto qui-
dem utero, huiusmodi muliebres fluores Gal. sanauit,
ut 6. De loc. aff. scriptum est. At in biliosis minus ca-
lidis vreticis vtendum est, ut iam ex Rondeletio quo-
que ostendimus, nisi in fine, aut corpore saltem repur-
gato, & humoribus acerbis ac biliosis contemperatis
& eductis. Queritur etiam hic, num astringentibus
vtendum? Respondetur quòd sic, dum tempestiuè vta-
ris, postquam corpus vacuatum fuerit, & per ea quæ
reuellant, & deriuant. Tunc enim assuescit natura
per cõuenientes regiones quotidiana excrementa mit-
tere: quare non lædent retenta. At inter initia vti,
incommodum: neque vehementer iis vtendum. Nam
via est naturalis purgandi, ne forè supprimantur
menses. Et ideo vbi hæc non suffecerint iam supradi-
cta, & muliebrc profluuium perseuerauerit, ea exhi-
benda sunt, quæ de mensium profluvio scripsimus ad
retentionem conferre: quorum latissimum campum
habes etiam apud Aëtium lib. 16. cap. 68. Potissimum
tamen ea eligantur, quæ non admodum efficacia ex-
istunt; item portulaca commanducata, succuq; ipsius
potus præsidio est: balaustium, rubi fructus, ut inquit
Paulus. nec minus & equisetum sistis rubrum fluo-
rem (qualis hic subinde erat in vxore mea) potum ex
aqua aut vino: vel hypocisthid. aut lemnisci fructus tor-
refactus cum vino. Samius aster, terra lemnia, sphra-
gis appellata, coagulum leporis aut hædi, aut ouis, aut
vituli, aut cerui, confert: vua immatura sicca, picea
cortex

Quæ medi-
camenta à
purgatione
competunt.

cortex & myrti, & pœonia grana pallida quindécim
assidue pota, aut corall. ʒj. e vino nigro, aut vinacea
trita cum vino; aut corticis loti arboris decoctum,
Actio recte. præcipue ad fluorem album aut serosum;
& iuxta Gal. 10. De simpl. med. facult. leporis coagu-
lum, si cum aceto ebibatur, sanat profluvium mulie-
bre. Quod si cum dolore fluxus deferatur, asininum
lac, præsertim asina per pascua pratorum nutrita,
quicunque fuerit succus, præstat. Confert etiam (vt
antea quoque retulimus) stercoris eiusdem asinae suc-
cus; similiter & alicæ aut prisanæ succus, & rosaceum
quoque vel per se, vel cum lacte infusum. Ne verò ab
humore transeunte vlcus excitetur, sanies profluens
assidue calida aqua eluatur, & ipsis locis moderatè
astringentia adhibeantur, quæ simul abstergendi vires
habeant; deinceps rosaceum aut myrteum aut meli-
num oleum illinatur, & aqua etiam pura, nihil ad-
stringens habens admixtum, in principio præsertim,
adhibeatur, ob influentis humoris acrimoniam: nec non
& ob eandem causam & alicæ, & oryza succus in-
fundatur, ex eiusdem Aëij consilio. Ceterum ubi flu-
xus cessauerit, à veloci ambulatione, à multis pectinis
ac lumborum frictionibus, ab acrimonia esu, à calefacien-
tibus, à flatuosis, & ab his quæ urinam prolestant, diu
abstinendum est; & balneis raro utendum; neque ven-
ter mouendus est, neque spiritus retinendus. Hæc enim
omnia malum reuocant, vt idem inquit Aërius. Quæ
fortè præcepta (inquit Donatus) Boëthi uxori Gale-
nus instituit, postquam ab eodem affectu ipsam vin-
dicauit, ne in posterum amplius eo morbo egrotaret,
ab eodem Boëtho rogatus, prohibens, ne illi simile
quod vacuauerat, in futurum aliud gigneretur.

Nunc verò tempus est vt ad alia exempla earum quæ à nobis curatæ sunt, porro progrediamur.

OBSERVATIO XXII.

De proflauio muliebri in muliere admodum biliosa.

MATRONA admodum biliosa, bile prædominante magis quàm in mea vxore, menstrua alba patiebatur, quæ colore flauo etiã linteolam inficiebant. Primò igitur materiam communem aggrauantem hoc medicamento leniente eduxi: & cassiæ recens extractæ ℥ j. pulpæ tamarindorum ℥ j. β. myrobal. citrinar. subtiliss. puluerisatarum ℥ j. saccharo asperso fiat bolus. cepit in diluculo. Deinde hunc syrupum quinque diebus continuis propinauimus: & syr. de succo acetosæ ℥ j. β. syr. ex ros. siccis, syr. myrtini, mellis ros. colati, añ. ℥ β. aquæ plantag. acetos. end. añ. ℥ ij. misce pro duabus dosibus. In istis syr. tria complectebamur; alterando videlicet intemperiem calidam totius, ac hepatis præcipuè generantis bilem; etiam corrigendo materiam aquosam, & quasi pituitosam per mel rosaceum, quæ semper nonnihil peccat etsi à subdominio in his superfluitatibus biliosis; tertio vt quædam stipticitas in membris & humoribus relinqueretur, propter fluxum biliosum: nam eiusmodi tres intèriones hîc erant spectandæ, vt rectè etiam Benedictus Fauentinus præceptor meus in sua Empirica cap. proprio annotauit. Deinde illam ita purgauimus: & diacatholici

lici ꝓvj. elect. de succo ros. ꝓj. ꝑ. rhab. electi ꝓij.
 sine spica, (nam magis aperit) myrobal. citrin. ꝓ
 ꝑ. cum ꝓij. decoct. com. florum & fructuū, ad-
 dēdō syr. ex infus. ros. pallid. ꝓꝑ. misce. fiat potio.
 Deinde ablata iam causa antecedente, syrupis
 adhuc semel reiteratis, & sumptis pilulis in præ-
 cedente Obs. dictis; iniecto quæ cremore hordei
 cum succo plantag. & mucilag. cotoneorum,
 (nam ex acrimonia bilis sentiebat ardorem in
 collo vteri) & exhibita emulsione sem. 4. frig.
 maior. & pap. propinaui & illud quod erat se-
 cretum præceptoris mei, quo multas curauit
 mulieres. Præcepi nimirum vt ieiuna hunc prius
 bolum per sex horas ad minus ante cibum su-
 meret; deinde potum per 15. dies: & albuminis
 oui recentis & non cocti num. ij. thur. masculi,
 boli arm. terræ sigill. añ. ꝓꝑ. pulueris entur pul-
 uerisanda, & misce, ac patienti exhibeatur: &
 vini rub. stiptici extinctionis chalybis pluries in
 eo ꝓiiij. gummi arab. tragac. añ. ꝓꝑ. misce, & fiat
 potus. Detur in diluculo. Hæc erant præcipua ex
 suis arcanis & secretis: & egregiè sæpe iuuabāt.

SCHOLIA.

CVM ex bile, & præcipuè biliosis mulieribus hæ
 superfluitates contingunt, his quidem omnia
 sicca magis quàm humida conueniunt: frictions loco
 exercitiij, antequam surgant, viles sunt. biliosus hu-
 mor contemperandus est, tum expellendus ac euacuan-
 dus remediis iam sæpe dictis. Conueniunt syr. de ribes,
 myrtill. cotoneorū cum aqua end. portul. & plantag.

I 5

conuenit

Historia
profluvij
menstruorū
alborum
curati.

conuenit & ʒ j. β. rhab. infusi in aqua hordei, & expressi. intus verò panni linci infusi in aqua decoct. aluminis lameni; tum alia in Scholio precedente dicta. Inueni in arcanis M. Iohannis Tiengy quondam Medicum Amsteladamsensem anno 1538. suam uxorem curasse in fine mensis May, cum laboraret fluxu menstruarum alborum in tanta copia, ut vires deficerent, cum multa inflammatione ac sudore copioso, hunc in modum: Primò descripsit pullum decoctum cum herba acetosa & sem. eius, & cum ʒ ij. sumach ligatis in nodulo. quod ins paratum cum vino rubro & vitellis ouorum sumebat pro virium restauratione. Vtebatur etiam vitellis ouorum frixis in patella cum mentha, gallicrico, nepita, & costo vulgari, herba acetosa, tam in prandio quàm cena: diu prius sumendo vitella ouorum. Manè capiebat vinum rubrum & cereuisiam Hamburgensem vel Collibegensem, cum duobus vitellis ouorum simul cocta, pane modico intrito. Quod ad medicamenta attinebat, in primis sumpsit hanc infusionem: R rhabar. selecti ʒ j. agarici optimi ʒ β. spice zinç. parum; minutim incidantur, & infundantur in aqua end. & lupul. & post horas xij. fiat expressio: cui addantur medulle cassie recens extracta ʒ β. oxymellis simplicis ʒ ij. misce; fiat potio. Eduxit quinquies. Omni quoque mane & vespere per horam vel duas ante cenam sumebat cochlear vnum istius pulueris permixti cum saccharo: R farina glandium ʒ β. ossium capitis caponum, & faucium lucij combustorum, ossium dactylor. añ ʒ j. sem. coriand. præp. ros. siccar. anisi torrefacti, rad. nenuph. citrina exicc. añ. ʒ ij. rasura eboris ʒ j pulueriscentur subtiliter. detur cum cyatho vno istius potionis: R pilosellæ, rorismarini, lentium

lentium excortic. cauda equina, rosar. cum capitib.
 melissæ, menthæ, bursæ pastoris. plantag. añ. m. j. ra-
 dicitu consolid. maioris, rad. nenuph. citrina, rad. sigilli
 beate Mariæ, añ. ʒ ij. semin. agni casti, carpobalsami,
 schœnanthi, gran. myrti, rad. cyperi, sem. acetosæ, su-
 mach, añ. ʒ j. contundantur crasso modo; decoquan-
 tur in vino rubeo & aqua acetosæ pro lib. i. pro qua-
 tuor vicibus. Postea exhibuit hanc infusionem: R cor-
 ticum myrobal. chebul. ʒ ij. citrinor. ʒ j. tragac. gum-
 mi arab. añ. ʒ β infundatur in aqua plantag. & aceto-
 sæ per horas 18. postea fiat expressio; cui addatur dia-
 cathol. ʒ β. & eduxit bis satis copiosè. Deinde iterum
 utebatur 6. vel 7. diebus porione & pulvere. & denuo
 sumpsit infus. myrob. & spina dorsi tota inungebatur
 mane & vesperi hoc vng. R ros. cum capitibus, su-
 mach. sem. acetosæ, plantag. bursæ pastoris, granor.
 myrti, añ. ʒ j. contundantur crasso modo, bulliant in
 aqua plantaginis & acetosæ pro ʒ ij. exprimatur, cui
 addantur oleorum ros. myrtini, añ. ʒ j. bulliant simul
 ad consumptionem aquæ, & cum modico ceræ fiat
 vng. molle. Postea iterum dedit hanc infus. R rhab.
 electi ʒ j. corticum myrob. chebul. ʒ β. infundantur in
 aqua plantag. acetosæ, post 18. horas fiat expressio. Et
 re urgente hoc cataplasma umbilico appositum est,
 undique ad latitudinem manus, quo maximum sensit
 leuamen, & sanari cepit: R gypsi ʒ j. boli arm. ʒ β.
 pulueriscentur subtiliss & cum albumine oui & aceto,
 fiat cataplasma, quod ponatur supra stuppam cum
 mediocri spissitudine, & applicetur, & cum exicca-
 tum fuerit, iterum humectetur. Est Bartholomæi
 de Montagnana.

OBSERVATIO XXI II.

De fluore muliebri aquoso & pituitoso.

MULIER pituitosa, alba & pallida, menstruis albis supra modum inficiebatur ex materia pituitosa & aquosa: in qua & metus erat de leucophlegmatia: nam & illud quod emanabat, à pituita originem habebat. Hæc cùm consultandi causa ad me accederet, vt hoc ordine medicamentis vteretur, consului. Primò vt materia hoc modo cōcoqueretur post leuem euacuationem seu minorationem materiæ: & diasebesten lenitiui ʒvj. diaphœnici ʒij. aquæ artemisiæ ʒiij. mellis ros. colati ʒj. misce. Syrupus talis sit: & syr. de eupatorio, de artemisia, de rad. añ. ʒj. ʒ. aquæ artemisiæ, agrimonix, nepitæ, añ. ʒij. misce pro duabus dosibus; adiecto cinnamomo ad ʒj. & pul. spec. diamoschi dulc. ʒj. ori suauius reddatur. eoq̃ue finito: & pilul. de hiera, agarici trochis. añ. ʒ. ʒ. cum melle ros. fiant pilulæ vij. dentur in exitu lecti. Fiat & tale apozema; & rad. petros. fœniculi, cyperi, valerianæ, rubiæ tinctor. añ. ʒ. ʒ. absinthij, hyssopi, artemisiæ, mellissæ, nepitæ, menthæ, añ. m. j. pulegij, cassuthæ, valerianæ, añ. m. ʒ. sem. anisi, carui, fœniculi, dauci, añ. ʒj. ʒ. brassicæ marinæ m. ʒ. spicæ nardi (exiccat enim humiditatem) ʒj. ʒ. cicerum rub. m. ʒ. stœchados, florum chamæmeli, roris-marini, añ. p. j. coquantur in aqua communi pro lib.

lib. j.β. col^a adde syr. de absinthio, de eupatorio,
de artemisia, añ. ʒ j. sacchari parum ad saporem,
depuretur; additis ʒ ij. cinnamomi selecti, & ʒ j.
spec. diambrae, iucundiore & odore & sapore
reddatur. Utatur diebus quinque appetente di-
luculo. Postea purgetur cum ʒ β. diacarthami in
tabulis. Vel si pilulis delectetur, & pilul. aggre-
gat. cochiar. de agarico, añ. ʒ j. cum aqua beto-
nicæ fiant pilulae vij. altero die sumat mithrida-
ticæ confectionis, theriacæ, añ. ʒ β. scobis eboris
ʒ β. misceantur; & postridie post purgationem
manè sumantur sex horis ante pastum. Potest
etiam sumere decoctum apij & asari, ut Galenus
faciebat. Utatur deinde condito seu electuario
sequenti: & conseruæ roris marini ʒ j. β. conseruæ
florum betonicæ, stæchad. si haberi possent, añ. ʒ
β. pul. diarod. abb. aromⁱ ros. sine moscho, dialac-
cæ, diacurcumæ, añ. ʒ j. cornu cerui, coralli rubri
vsti, añ. ʒ iiij. concharum marinar. vstarum &
lotarum in vino ʒ j. cum syr. conser. corticum ci-
tri q. s. fiat elect. molle. capiat ad magnitudinem
paruæ castaneæ. Conuenit hîc etiam uti balneo
naturalî, ut sulphureo aut aluminoso, manè &
vesperi ante pastum per dies decem. Verùm ubi
non sunt, tale parari potest: & foliorû lauri, ori-
gani, calaminthæ, pulegij, menthastri, sabinæ, añ.
m. iiij. artemisiæ, melissæ, nepitæ, betonicæ, sam-
psuchi, añ. m. iiij. rad. rubiæ tinctorum, cyperi,
añ. ʒ iiij. rad. rusci, asparagi, añ. ʒ ij. spicæ nardi,
iunci odorati, añ. ʒ ij. sem. rutæ, dauci, anisi, fœni-
culi, seselios, añ. ʒ β. rad. valerianæ ʒ ij. coquan-
tur in aqua pro balneo, quo irrigetur & se lauet.
Viden-

Videndum tamen, quod si valde fluant humiditates albæ, ne concitator fiat fluxus, ut stiptica magis addantur. Aliquæ lotionem recusant: & si hæc matrona idem faciat, calentis decocti prædicti fumum per infundibulum in uterum recipiat. Quod si his remediis fluor non vincatur, rursus semel in hebdomada accipiat has pilulas: R pilul. mastich agarici trochil. añ 3 ij cortic. myrob. chebul. ʒ ij. excipiantur melle ros. & è 3 j. fiant pilulæ vj. dentur ij. pro vice. Fiat & pessus ad uteri repurgationem: & artemisæ, sampsuchi, dictamni, ablinthij, añ. 3 ʒ. corticis olibani ʒ ij. pulverisatis & exceptis cum succo mercurialis, fiat pessus. demittatur in uterum. Quod si fortè magis fluat, tunc astringentibus utendum tam per os, quàm etiã intus muliebribus impositis, vel infusis. Et ubi hæc affectio inclinauerit, quod ex humore perquàm paucò effluente cognoscetur, ut prorsus exsiccentur, sequenti pessò utetur: & acaciæ, balauustiorum, cucullarũ glandium, menthæ, olibani, spicæ nardi, añ. 3 j. ʒ excipiantur succo polygoni, aut millefolij, aut plantaginis, vel sanguinaræ; hisque omnibus linteo raro inuolutis, singatur pessus, qui filo coxæ alligatus in laborãtis pudenda immittatur, muteturque quotidie, recenti alio imposito. Succini farina cum sorbili ouo detur. Hæc sunt quæ ad album fluorem profunt; & præcipuè hic pulvis, quo multæ matronæ nobiles, post vniuersalia remedia, sanatæ sunt: R fauciũ lucij, capitis caponis exiccat. in furno, añ. 3 ʒ. oliũ dactylor. 3 ij coriand. præpar. sem. anisi torref. añ. 3 j. rad.

rad. nenuph. ʒ β. sacchari ros. ʒ iij. datur ʒ j. cum
vino rubro. Hæc nobili viro pro eius vxore cu-
randa pro consultatione dedimus, vt iis vire-
tur cum Medici sui domestici consilio.

SCHOLIA.

Hi s verò vniuersa victus ratio ad caliditatem & siccitatem & potius paucitatem inclinare debet, abstinendo ab humidis, vt iusculis, & multo potu, & ab his quæ humorem aut seruin generent. Præterea iisdem curantur quibus vxor illa Bacthi, de qua prius dictum est. Et sic si sit à toto, deponendo, secundum alios, seu minorando materiam noxiam: secundo digerendo & eradicando illam: tertio hepar confortando, vt possit bonum sanguinem generare. Minoratur hoc modo: R. pilul. aggreg. ʒ ij. agarici trochis. ʒ j. fiant pilul. v. dentur ante diem per horam. Digeratur hoc modo: R. syr. de eupator. mellis ros. colati, añ. ʒ vij. syr. de end. ʒ ij. aquæ absinthij, capill. ven. cichorij, añ. ʒ j. purgetur hoc modo: R. diacath. ʒ v. diaphæme. ʒ j. β. elect. andi maioris ʒ ij. dissolue in ʒ ij. decoct. flor. & fructuum melissæ, absinth. passul. ab arillis repurg. liquir. ras. sebesten iuiub. adiect. ʒ β. mell. ros. colati. Vel: R. pilul. indar. ʒ β. aggregat. ʒ ij. fiant pilula v. vel vij. Si à capite minoretur materia hoc modo: R. pilul. scætid. cochiar. añ. ʒ j. hieræ parum, fiant pilul. v. dentur hora secunda post cenam. R. syr. è stœchade, mellis ros. colati, oxymell. simpl. añ. ʒ β. aquæ betonica, melissa, bugloss. añ. ʒ j. misce. Eradicetur hoc modo: R. pilul. scætid. cochiar. agar. trochis. añ. ʒ j. cum syrupo è stœchade fiant pilula v. Ungatur nucha oleo cossino cum lectum

Curatio
mulieris
profluvij ex
pituita.

A toto.

A capite.

Ab utero.

Alia curatio
pituitosa, &
fluxus mu-
liebris a-
quosi.Purgatio, si
serofus hu-
mor vel suc-
cus serofus
abundauerit.

lectum serò intrabit, & hic pul. capiti inspergatur:
 R. corticum thuris, mastich. sandaracæ, stæchad. arab.
 cubeb. ros. rub. añ. ʒ. ʒ. fiat pul. subtilissimus. Si ab ute-
 ro: R. pilul. foetid. ʒ. ʒ. pul. bened. ʒ. j. fiant pilule quin-
 que; dentur manè: R. syr. de artem. mellis ros. colati,
 oxymell. simplicis, añ. ʒ. ʒ. aquar. artemis. melissæ, adia-
 thi, añ. ʒ. j. misce. R. pilul. foetid. aggreg. pil. de bene-
 dicta, añ. ʒ. j. diag. gr. j. fiant pilule vii. Istis intentio-
 nibus peractis, mundificetur uterus, & roboretur pessa
 ex herba mercuriali, adiecto melle; vel solo melle cum
 bombace, vel abluendo hydromel. ʒ. vi. mellis ros. colati
 ʒ. ij. & sumen & pectinem inungendo oleo liliaceo, spi-
 cato, & costino simul mixtis. Alij hoc modo fluxum
 muliebrem aquosum ex pituita curant, primò pur-
 gando medicamentis pituitam purgantibus, ut agar-
 carth. elect. de citro sol. diacarth. & concoquunt ma-
 teriam, & modicè calidis, ut melle ros. syr. de artemi-
 sia. Post primam euacuationem syr. de absinthio, &
 alijs quibusdam leuiter adstringentibus, ut in hunc
 modum: R. pilul. de hiera, vel de arom. añ. ʒ. j. agar-
 trochis. ʒ. j. ʒ. cum melle ex ʒ. j. fiant pilule vi. vel vii.
 in exitu lecti capiat. Postea tantum tres vel iiij. Dein-
 de R. mell. ros. colati ʒ. ij. syr. de stæchade, de artemis.
 añ. ʒ. j. aquar. beton. hyss. absinth. añ. q. j. misce. arom.
 cum ʒ. j. diarod. abb. vet. arom. ros. iisq. finitis, R. pi-
 lul. aggreg. foetid. cochiar. añ. ʒ. j. cum aqua artemis.
 fiant pilule. R. decoct. hord. ʒ. ij. mellis ros. colati ʒ. j.
 pro absters. medicamenti. & altero die capiat ʒ. j. the-
 riaca mediæ ætatis vel mithrid. v. horis ante prandium.

Si serofus humor abundet, purgetur pilulis ex hiera, &
 agarico vel potione myrobal. chebul. syr. ex multiplici
 infus. ros. rub. vel persicarum. Quod si neque vna pur-
 gatio

gatio satis sit, iteranda quoque eadem erit, in minori
tamen quantitate; quemadmodum Galenus in vxore
Boëthi fecit, primò (vt diximus) medicamento vtens
aluum educente, secundo eis qua vrinam educerent,
tertiò qua per cutem humores aquosos euocabant;
quibus remediis (vt paulo antè diximus) quindecim
diebus cum vsus fuisset, prorsus prædictam mulierem
à morbo vindicauit; & proinde Boëthius quadringen-
tos aureos ad illum misit. Rursus si pituitosus fuerit
sanguis, nedum hiera, agar. & myrobal. purgare con-
uenit, verùm etiam reliquis insignioribus medicamen-
tis pituitam per aluum educentibus, vt cataportis scæ-
tidis, ex sagapeno aut agarico compositis, vel etiam
is qua ad hydropem facere conscripsimus: prius tamen
ea sunt adhibenda medicamenta, qua iam dictam pi-
tuitam conquoquere ac præparare valeant. A purga-
tione ad vetrica deueniendum, de quibus satis dictum
est, & ad topica remedia, etiam in fine adiectis ad-
stringentibus, si fluxus perseveret, vt iam satis do-
cuimus Scholiis præcedentibus. Quidam & hîc post
purgationem laudant stuphas sudorem euocando, hu-
miditatem trahendo ad cutem; vt Rondeletius, qui
& vomitum ante cibum vel à cibo commendat, multoq;
magis quàm euacuantiâ; cum fiat auersio in contra-
riam partem. Si sit ex materia melancholica, & ha-
beat aliquam acrimoniam, velut biliosa curanda est;
nisi quòd in euacuationibus vti oportet purgantibus
melancholiam, vt epith. cuscuta, thymo, folliculus senæ,
decoct. mercurial. & aliis, vt etiam syr. fumar. cum
syr. de end. qui magis conueniant: nam syr. alij melan-
choliâ conuoluentes calidiores sunt, quàm vt hîc
conueniant. Supra partem addi possunt metallica,
K quibus

Si pituita
abundet,
purgatio.

Si ex ma-
teria melan-
cholica.

Quæ in om-
nibus causis
profunt.

quibus in carcinomate palliando vii possumus, vt vng.
ex pomphol. cerusa, tuthia, antimonio, lythar. nutritio,
& similibus; ex his conficiendo vng. empl. cum oleo
myrt. & aceto. Si nulla sentiatur acrimonia, vsurpari
possunt remedia ad pituitam praescripta, id est, quæ
calesfaciunt & exiccant. In omnibus causis pilula de
bdellio conueniunt: sed quia multa sunt descriptiones,
accipienda est ea, secundum Rondeletium, quæ conchas
venereas recipit. Hæ pilulæ exiccant omnia vlcera in-
terna, neque laxant, sed potius constringunt. Vinca
peruinca decoctum ad fouendas partes multum con-
uenit, & in pituitosa lixiuium in principio; in pro-
cessu lixiuium cum paucis alumine magis prodest. Bal-
nea omnia naturalia ad id sunt vtilia, vel quæ arte
parantur ex alumine, sale, vel chalcitide, vel ex lixiuiis
& decoct. herbarum, rad. & florum resiccantium.
Vt: R. lixiuij parati ex cineribus ilicis, vel quercus, vel
ficus, vel cannarum, q. s. ad encathisma conficiendum,
in quo decoque rad. bistorta & lapathi acuti, añ. lib. ij.
corticis malignati, gallarum, suberie, añ. lib. i. ros.
rub. p. ij. fiat decoctio, in qua dissolue salis communis
lib. ij. aluminis lib. j. chalcit. lib. ss. fiat encathisma; quod
& valebit ad procidentiam ani & vteri. Vtatur potius
encath. quam balneo, quando constringendum est:
balneo autem, quando sudor prouocandus. Et post om-
nia alia remedia, vtatur hoc encath. longè à mensum
purgatione, ne retineantur. Idem encathis. valet in
fluxu sanguinis seroso, vel immoderato fluore à rari-
tate venarum per diapedesim. Sit tepidum tantum,
& diutius sedeat in eo, reiectis excrementis alui &
vesicæ. Potest etiam fieri lixiuium ex cineribus concha-
rum vstarum, vel sarmentis, vel piro siluestri, vel aliis
arbo-

arboribus astringentibus, vt sorbo, corno, & similibus. Ad menstrua alba hac commendantur à Rondeletio: Ad men-
 & folior. clemat. daphnoidis, añ. m. j. herbarū vatipicri, strua alba.
 & hederæ, añ. m. ß. fabar. integrarum num. x. hordei
 integri leuiter torrefacti p. j. ros. rub. p. ß. fiat decoctio
 in aqua artemisia, vino rubro, & aqua cisternæ, ad
 lib. ij. misce. foueatur locus, vel fiat iniectio in vuluam,
 & hoc remedio sistentur menstrua alba. Proderit ta-
 men vti suffumigio sequenti, post sotum vel iniectio-
 nem: & gallia moschata, & alipta moschata, añ. ʒ ij.
 ladani, hypocistid. añ. ʒ j. styracis, beniouini, ligni aloës,
 santal. omnium, añ. ʒ j. nucis moschata, macis, caryo-
 phyllorum, añ. ʒ j. mucag. gummi tragac. q. s. fiant
 trochisci, addendo modicum carbonis salicis: & post ex-
 iccationem inungatur oleo moschatelino, vel nardino,
 & recipiat fumum per emborum, post exactam pur-
 gationem menstruam. Deinde apponatur empl. se-
 quens: & emplastri pro matrice ʒ iiij. rad. bistortæ,
 musci quercus, añ. ʒ iiij. fiat emplastrum rotundum,
 applicetur regioni vteri, post exactam purgationem
 menstruorum, vsque ad tempus purgationis, quod
 tunc auferatur. Oboritur autem ob virosam hunc hu-
 morem circa pudenda fætor quidam, propter quem
 vxor à viro plerumq; fastiditur, vulua quoque lubri-
 ca fit, & dilatatur, quo fit, vt genitale profluium re-
 tineri non possit. Viriq; autem affectioni in hunc mo-
 dum succurrendam: & symphyti, balaustiorum, rhois
 opsoniorum, seu sumach, baccarum myrti, aluminis,
 boli armena, añ. q. v. horum pars vna in puluerem re-
 digatur, pars altera decoquatur in vino adstringente,
 & pauco aceto. Decocto calido vulua saepe foueatur,
 puluere verò post sotum inperso: deinde lintheum ma-
 defactum

148 DE MULIERVM MORBIS,
defactum in vino, quo dicenda proximè excepta sint,
admoneatur: & galliæ moschata, nuci moschata, añ.
ʒij. caryophyll. ʒj. ʒ. moschi ʒʒ. excipiantur vino, in
quo calefacto linteum madesiat, fiatq; ut dictum est.
Præterea gossypij lanugo, aut linteum in prædicto vino
madesactum, in vterum, in modum pesti, demittatur
per noctem, manè auellatur. Hæc dicta sufficiunt de su-
perfluitatibus albis matricis & corrigendis & sanandis.

OBSERVATIO XXIIII.

De muliere laborante gonorrhœa.

MULIER valde formosa cùm ab aliis exi-
stimaretur fluore muliebri laborare, à me
iudicata fuit gonorrhœa affici: nam semen al-
bum, limpidum, mediocris substantiæ, sine gra-
ueolentia emanabat, subinde, non continuò; &
membra citius ac ocus consumebantur, quàm
in vteri fluore. Ideo præscriptis iis remediis quæ
vasa seminaria roborarent, & simul materiam
spermatricam infrigidarent, exiccarent, & increas-
sarent; non certè cum iis procedendo quæ sper-
ma multiplicarent, sed potius ea propinquo quæ
semen manifesta qualitate imminuerent. Et quia
utrunque biliosa erat, hoc imprimis minoratiuū
exhibui: & cassiæ recens extractæ ʒj. elect. de suc-
co ros. ʒj. ʒ. pulpæ tamarind. ʒj. fiat bolus. Dein-
de syr. incrassantibus his utebar: & syr. myrt. co-
toneor. de portulaca, añ. ʒʒ. aquæ plantag. por-
tulacæ, acetosæ, añ. ʒj. misce. Iis ter quaterve
repetitis, hanc purgationem exhibui: & seminis
plantag.

plantag. sem. acerosæ, agni casti, coriand. præparati, añ. ʒ ij. myrobal. citrinar. ʒ iij. bulliant in aqua chalybeata, & in ʒ iij. adde syr. ex infus. ros. rub. ʒ j. rhab. selecti ʒ j. misce. detur in auro-
ra. Ter excrevit. Postea quia ardorem sentiebat, aliquot diebus intermissis, cepit ʒ iij. lactis ouili, & succi plantaginis ʒ ss prius ebulliti, ac chalybati, addendo ʒ j. boli arm. veræ. Vtebatur & hoc electuario, vel hac mixtura, capiendo manè ʒ ij. & conser. ros. ʒ j. cornu cerui vsti, farinæ glandium, gallarum, lapid. hæmatiud. seminis agni casti, menthæ exiccatae, seminis lactucæ, añ. ʒ j. pulueriscentur subtilissimè, & cum melle adiecto pauco saccharo ros. fiat mixtura. Lum-
bis, prius inunctis vnguento ros. apponebat laminam plumbeam. Quibus optimè habuit. Sed non diu lamina plumbea utebatur, & non nisi prius repurgato corpore.

SCHOLIA.

QUOD mulieribus etiam contingat gonorrhœa, id in Obser. 15. lib. 26. ostendimus, agentes de pædullificis cuiusdam vxore, idq. ex Aërio & Galeno. Ita & Fernelius gonorrhœam dicebat affinem esse muliebri profluvio, sed ab eo differre (ut diximus Scholio Obser. 20. huius libri) quod nec assiduo, neq. quotidie, ut in vterino fluore, sed quibusdam intervallis album nec graueolens fluat, atque eandem causam cum virili gonorrhœa habes. Et ita gonorrhœa commune viri est viris & mulieribus, iisdemq. de causa eueniens. Semen enim, ut antea diximus lib. 26. excernitur sine

150 DE MULIERVM MORBIS,
 coeundi desiderio. Vbi enim non est excernendi deside-
 rium, ibi neque voluptas: siquidem voluptas fit excre-
 tione eius quod vehementer angebat. Causas iam di-
 ximus cum lib. 26. de penis ac virga vitii ageremus.
 Est tamen huic affectui similis quodammodo exulce-
 ratio pudendorū; aded vt Medici hoc non distinguen-
 tes, confundant omnia, & gonorrhœam dicant. Si-
 militudo verò est ex defluxus colore, scilicet albicante,
 cuiusmodi est pus effluens. Vtrumque verò sensim stil-
 lat. Sed manifesta distinctio est odoris. Sanies enim non
 sine fœtore est: at illud caret fœtore. Sanies præterea
 colore rufescit aut liuescit necessariò ex transmuta-
 tione, aut cruentum quid admistum habet: at semen
 cardiacat prorsus. Sed & ex his quæ consequuntur,
 scilicet dolore & inflammatione quæ circa partem ex-
 ulceratam fiunt; quibus caret gonorrhœa. Quæ etiam
 sequuntur, gonorrhœam evidentem faciunt; vt con-
 tabefactio corporis vniuersi: quoniam illud excremen-
 tum est vile; quod natura ob generationem resarcire
 properat, & semper eò sanguinem transmittit; aded,
 vt multi sanguinem seminis vice coeundo excreuerint.
 sed & lassitudo, & alia quæ debilitatem facultatū se-
 quuntur. Putat Iacchinus quòd Paulus & Aërius con-
 fundant hunc affectum cum Veneris insomnis, & ma-
 lè, vt ipse existimat. Hic enim, inquit, frigiditatis vel
 humiditatis nimia germen est: illud caloris & acri-
 monia. Rursus ibi ducentium vasorum est: hic verò in
 seminis qualitate. Quamobrem cura scopus ibi est re-
 frigerare lumbos, & pectinem, vt docet Gal. 6. De loc.
 affect. & qualitatem seminis temperare: hic verò sic-
 care cum modicè calidis, vel omnino temperatis. Ve-
 rum hic frigidus opus fuit in muliere biliosa: sed vt
 magis

magis temperata essent cauimus, & quæ proprietate ad semen minuendum conferunt quadam frigida selegimus; iisq; ipsis adieciimus mentham exoccatam in puluerem. Habet tamen gonorrhœa diuersas causas, atque inter eas à lue Venerea, vt docuimus lib. 26. & iuxta easdem modò frigidis, modò siccis, modò calidis, vel omnino temperatis curari debet; vt non sit opus denuo curationem longiore sermone prosequi, cum in variis ibidem locis, libro iam citato, hæc ipsa ad vnguem explicata sit.

OBSERVATIO XXY.

De vteri suffocatione in vidua ex semine retento.

V I D V A annum 44 agens, soror Laurentij Ahenarij, Pastoris in pago Soechiwouda dicto, præceptoris mei in iuuentute, quæ quidem Alcmariæ habitabat prope gruem, anno 1546. mense Maio, grauissima vteri suffocatione laborabat. cumque pro mortua haberetur, & quasi syncope afficeretur, subitò ad eam vocatus fui. Erat autem suffocatio ex semine retento. Mulierculæ præsentem faciem vino aspergebant, naresque ac tempora oblinebant, putantes hoc modo illam posse à syncope excitari; sed hoc modo malum magis augebant. Excitantur quidem hac ratione à paroxysmo syncopis, aut etiam epilepsiæ, vt spiritus conuertantur ad exteriora. Verùm in hoc casu nullo modo conueniunt, neq; atomatica superius adhibita, aut na-

K 4 ribus

132 DE MULIERVM MORBIS,
ribus admota. Quare & Gradus supra textum
Rhasis, cap. proprio De suffocatione vteri, hunc
errorem vulgariū his verbis taxat: Contra
hunc textum, inquit, sæpe committitur error
ab indoctis: nam in paroxysmo mulieri suffoca-
tæ succurritur communiter per astantes cum
aspersione & irroratione vini aromatici supra
faciem infirmæ: ita vt odor ille suavis naribus
communicetur, & tandem matrici, quæ talibus
odoramentis delectatur, & per consequentiam
uterum disponit ad maiorem ascensum: & sic
non tollitur paroxysmus, sed aggrauatur (vt
huic viduæ eueniebat.) Sed è contra oportet na-
ribus adinouere malè olentia, vt est castorium,
sulphur, assa fœtida, ac plumæ perdicum com-
bustæ, & similia; eo quòd uterus fœtidis con-
tristetur, & ea fugiat, vt olentibus delectatur,
iisque magis sursum rapitur. Ita Plato vim ol-
faciendi vtero tamquam animali attribuit. sed
potius illi est hæc vis propria, quemadmodum
spleni ac hepatis proprietates est dulcia appetere.
Quamobrè ego hîc vt ab irroratione tum asper-
sione ac frictione vini abstinere iussi; & vt
propriis pilos combustos olfaceret, (cùm plu-
mæ perdicis ad manum non essent) eosque pro
odoratu continuò naribus adinoueabam; tum
frictiones dolorosas pedum adhibebam, præci-
puè sub volis cum sale & aceto fortiter fricando:
sua enim acuitate & punctione (eodem Grado
teste) conuertunt superfluitates ad inferiora, &
excitant à paroxysmo. Adhibebamus quoque
ligaturas fortes circa coxas, modò relaxando,
modò

modò constringendo. nam hæc omnia cùm dolore inferunt, etiam deturbant materiam ad inferiora, & inhibent ascensum vaporum ad superiora. Dum hæc fiunt, necessitate cogente, obstericem accersiri iussimus, ut intus fricando cum digito muliebria sequenti oleo inungeret: & olei liliorum ℥ j. moschi, croci, añ. gr. iij. vel quinque. Atque hoc modo præter spem à paroxysmo excitata est. Talis autem titillatio cum digito ab omnibus Medicis, ut Galeno ac Auic. tum aliis, commendatur; præcipuè in viduis & castè viventibus, ac monialibus, ut asserit Gradus: minus tamen iunioribus, & elocandis, vel maritum habentibus; cùm excellentius remedium sit ut viro copulentur. Id tamen non nisi re valde urgente, aliis præsidiiis non iuuantibus, faciendum duco; & multo minus illud fordidum exemplum (quamvis à Gal. 6. De loc. affectis laudatum) ipsius Diogenis cynici, cuius manus hymenæum præuenerat, cum Campesio viro pio, probare possum, cùm id mollitiem sapiat. Impudicum quoque consilium illud est cuiusdam mulierculæ, ut pili pudendi vellicentur, quo suffocatæ ad se redeant. Id quidem factum à chirurgo nimis impudenter dum famula quædam subitò suffocata solo prostrata iaceret, multis præterea in cubiculo existentibus, vidimus; & illa mox cum verecundia excitata, ridentibus aliis, discessit sanata. Ceterum nostræ viduæ iam bellè habenti, ne in idem malum incideret, præcepimus ut ab omnibus dulcibus rebus quoque abstineret; nam, præter vteri suffoca-

154 DE MULIERVM MORBIS,
focationem, solebat etiam ictero malo esse ob-
noxia. Ideo vt & decocto cetaurij, & marthubij,
ac absinthij sæpe vteretur, præcepi. At, suffoca-
tione vteri non amplius redeunte, sana permansit.

SCHOLIA.

MATRIX, seu vterus, cum supernis eiusque prin-
cipibus partibus communicat, cordi siquidem
per arterias, cerebro per spinamembranas, & iocinori
per venas. Non mirum igitur, si cum in eo affectus
quidam oritur, omnes vel quædam prædictarum par-
tium consentiant. Affectus hic à Græcis ὄστρακον
ὄστρακον, à quibusdam ἀσπληνία ὄστρακον dicitur. La-
tini autem Vteri strangulatum, seu Vterinam suffo-
cationem, vel spirationis ob vterum Præuentionem vo-
cant: volentibus tamen ipsis vtrique appellatione vnum
quendam affectum explicare, nomen assumendo tum
à parte ipsa læsa vel affecta, tum à superueniente sym-
ptomate. Alij & Præfocationem vocant vteri. Gale-
nus Vterina symptomata appellauit, volens generaliori
vocabulo omnia comprehendere. Ceterum affectus hic,
Paulo auctore (cap. 71. lib. 3) est vteri recursus ad su-
periora, modò sursum, modò in latus; etiã Gal. teste 6.
De loc. affec. quamuis Aërius quoque fateatur, quòd
in hac affectione vterus velut ad supernas partes ad-
scendisse videtur. Nec ob id quòd vbi ita per corpus vte-
rus errauerit, ad septum transuersum perueniens,
respirationem impedit, idcirco strangulatio fit. Sic &
falsa est eorum opinio, qui asserunt, vterum exiccari
vbi suppressi sunt menses, deinde humectari cupien-
tem vsque ad viscera ascendere; cum verò ascendendo
nonnun-

Qui dicit
Strangulatio
vteri.

nonnunquam septum transuersum contingat, idcirco
 animal spiratione priuari. Etenim tanquam erroneæ
 prædictæ opiniones à Gal. eodem 6. De locis affect. im-
 pugnantur & refelluntur. Causa igitur alia huius re-
 tractionis, seu recursus, inuestiganda erit, prius tamen
 parte affecta explicata & affectu ipso. Quod verò
 vterus primò, ac præcipuè in hoc vitio afficiatur, om-
 nium Medicorum consensu liquet. Sed non ita liquet
 qualis sit affectus. Interim tamen si cum eius retractione,
 seu peruersione, fiat, nulli dubium est, morbum esse
 in situ, seu figura ipsius vteri, prout Hippoc. & Gal. 3.
 De articulis scripserunt. Citra eiusdem peruersionem,
 tum immodicè intemperie frigida quidam vterum la-
 borare dicunt: licet oriri haudquaquam possit, quo-
 modolibet generationem habeat, nisi intemperies hac
 principibus partibus impertiatur; cordi, inquam, aut
 cerebro, seu vtrisque primùm, & deinceps ab eis vni-
 uerso corpori, præsertim in prima ac præcipua eius
 specie, seu differentia. Perpetuò itaq; (vt Donatus
 quoq; sentiebat) intemperie, eaq; nimium frigida, in
 hac affectione vterus laborabit. Qua de re morbum
 hunc non inflammationem, sed flutuosam perfrigera-
 tionem esse Soranus dicebat. Interim autem simul
 cum ea malè situatus, seu figuratus erit, pro diuersita-
 te, seu magnitudine causarum ex quibus originem duxe-
 rit. Causæ autem referuntur in semen retentum, vel
 in menstrua cohibita. Neoterici addunt fumos vapo-
 resq; corruptos à materia corrupta in vtero existente
 eleuatos, cor & pulmonem petentes, & anhelitum
 coangustantes, ita vt mulieres strangulari videantur.
 Vapores illi inflant corpus matricis, & propter talem
 inflationem putant eos attingere diaphragma, vnde
 &

Pars affecta.

Quis affe-
 ctus præter
 naturam.

Causæ.

Verularum
nugimenta
redarguun-
tur.

& officina spirandi coarctatur: & volunt quod isti humores ascendant ad pulmonem, cor coangustando, tum meatus illos ac vias efflationis, vnde & prae-focatio oritur. Modò ascendunt ad cerebrum, & inducunt quasi vertiginem, & saepenumero epilepsiam. Modò petunt stomachum (vt Leonellus dicebat) & inferunt nauseam, & inclinationem ad vomitum; & tamen non fit vomitus: sed vt plurimum subsequuntur ructus, propter quem vapores illi exhalant. Aliquando iidem vapores ad gulam ascendunt; & videtur tunc mulier strangulata interitura. Et quandoque inflatur guttur; (vt nuper in puella nobili vidimus) & dicunt tunc vulgò mulieres, vterum ad guttur ascendisse. sed hoc fieri nequit, quicquid garriant vetulae, & anatomia ignara blaterent. Quin potius vapores in causa sunt eleuati ab vtero stomachū & modò dicta membra impetentes. Conuenit igitur inter omnes Medicos, vt idem asserit Galenus 6. De loc. affect. hunc affectum magna ex parte viduis euenire; hisq; maxime, quae cum antea probè purgarentur, ac parerent, atque virorum concubitu gauderent, iis omnibus priuantur; ex quibus conicere possumus, quod ob retenta menstrua, vel ob semen cohibitum, mulieres vteri suffocatione seu strangulatione cruciantur, idq; fortasse magis (vt idem Gal. inquit) à semine retento contingere potest, vt pote magnā vim obtinente. vt est enim in mulieribus humidius, ita & frigidius. Semen etenim in vtero paulatim coaceruatum, aut etiam sanguis menstrualis, vitiosa redduntur, ac perfrigerantur; quibus perfrigeratis, vterus quoque taliter afficitur, à quo demum ad cerebrum ac cor frigida transmittitur paulatim tractu temporis; à quibus deinceps vniuersus

ersum corpus celeriter alteratur, ac refrigeratur, ob eam causam corpus hysteriarum mulierum refrigeretur) & symptomata iam dicta inferunt, vel tenui quadam substantia, veluti aura, ab iisdem excrementis ad iam dictas partes principes ascendente, vel continuitate partium traducta alteratione per quam veluti qualitatis diffusionem mediis corporibus, cum quibus vterus ipse predictis principibus partibus communicat. Neque mirum videri debet, si vel ex minima humorum mole tanta consequantur symptomata, (de quibus latius de signis dicturi sumus) etenim in phalangij quoque ictu totum corpus affici videtur exiguo veneno per minimum foramen injecto: & longe maiori admirationi est scorpionis ictus, quod brevi idmodum tempore gravissima infert symptomata, quanquam exiguum sit id quod iniicitur, aut nihilominus, nullo apparente foramine in ipsius aculeo: nec non quod canis rabie capiti solum sputum (ut antea de morsu canis rabidi diximus) si corpus humanum tetigerit, rabiem excitare possit, ex eiusdem sputi qualitate aucta quadam corporis dispositione, ita ut post sex menses, quando ad magnitudinem notatu dignam peruenierit, discerni possit (ut de hydrophobia vivis exemplis aliquando ostendimus) item similibus quoque affectibus infestari possumus iis, qui pernicioso epoto veneno eueniunt, corruptis in nobis ipsis adeo humoribus, ut veneni tum qualitates tum vires aquent. Viriatum itaque semen aut menstruum cum retinentur corporibus potissimum ut afficiantur idoneis, paulatim tractu temporis principalem partium aliqua consentiente, à qua deinceps uniuersum corpus celeriter alteratur, cuius totum corpus refrigerare

gerare valeant, prædicta graua symptomata inferre possunt: & alias aliæ quoq. accidentium species oriri solent pro multitudinis qualitatibus & ratione tum menstruorum, tum seminis. Et ita rectè Gal. disputat transmutari posse in veneni naturam. Quod suppositum monstrat alius experientius, quod in corpore nostro possit gigni venenosus humor, qui æquet vim externi veneni. Proinde in phrenetico illo descripto 3. par. Epid. admiratur, non aded quod gigni is humor venenosus possit ex transmutationibus quæ putredine fiunt, vel corruptione; sed quod latere diu possit, (non enim subita est generatio, vt nunc diximus) & postea tamen adoriri ac occidere. Causa videlicet latet, quousque à natura dimoueri incipiat: & tunc, causa mota, vel inde plus imprimat; vel partem aliquam attingit, quam antea non attingebat; vel vaporem ex se mittit, quem antea non mittebat, vnde subitò accidentia infert. Vterus igitur primus est, qui persentiscit malum, & pellere nititur; vnde violenter per corpus mouetur, quod veteres errare dixerunt: vel refugit noxam eam, vnde sursum retrahitur. At hæc multo dilucidiora cernuntur in viuus exemplis sequentibus.

OBSERVATIO XXVI.

De uteri præfocatione partim ex menstruis retentis, partim ex semine intus remanente.

NOVIMVS puellam, alioqui pulcherrimam, sed obesam, & parvæ staturæ, utcunque pituitosam, cui nomen Aleida Theodorici, quæ ad

ad pontem lapideum Alcmariæ habitabat, quæ
um in grauissimâ vteri præfocatione incidisset
anno 1553. mense Iulio, adeò grauiter labora-
bat per diem integrum ac noctem, vt à paroxys-
mo nullo modo à mulierculis, multis tentatis re-
mediis excitari posset. Ad quam accitus, ex ma-
re intellexi, quòd, incerto ordine, à mensibus
non purgaretur. Erat & iuencula salax, nubilis,
& vnica filia; ita vt non solùm ex mensibus re-
entis, sed & semine intus recluso hoc malum
oriri existimarem, ob grauissima symptomata;
quibus apprehendebatur. Videbatur semimor-
tua; audiebat quidem, sed non poterat loqui.
quia videlicet materia non trahitur, aut extra
mittitur sufficiens ad vocem, aër, qui trahitur in-
piratione, idem & reiicitur expiratione, ob di-
atationem & compressionem thoracis. ob id
enim non loquuntur, quia aër is satis non attra-
hitur, aut extra propellitur. Alij referunt ad fri-
giditatem humidi & frigidi seminis torum cor-
pus refrigerantis, vt sic transpiratio illis vix suf-
ficiat: de qua re latius in Scholio. Videbatur
gitur hæc tam ex menstruo suppresso, quàm se-
mine retento, laborare ex retro vapore sursum
elato per spinæ membranas & nervos ad cere-
brum. modò enim sine sensu mortua iacebat;
modò haud dissimile morbo comitiali quid pa-
iebatur; modò cùm stupida permaneret, crura
turrum videbantur conuelli, sed non diu. Et li-
cet non loqueretur, subinde plorabat, rursus ri-
debat. Venit mihi tunc in mentem illud exem-
plum ipsius Benedicti Veronensis Medici do-
ctissimi

160 DE MULIERVM MORBIS,
Atissimi lib. xxvi. cap. 16. De suffocatione matricis, ex Galeno, cum ita scribat: Vidimus vxorem fratris in præfocationis cuiusdam motu in delirio ridentem atque collachrymantem, cum plumæ perdicis sub naribus cum carbonibus ad motæ essent, incautè pruna ingens ex batillo in pectus excidit: at illa tam diu stetit donec omnino extinctus carbo videretur: eoque die sine dolore fuit; sequenti die de inusto tantum pectore conquesta est, vt ingens adhuc cicatrix videatur. Hoc est quod etiam interpretes Hollerius refert: Quibusdam risus, inquit, aliis lachrymæ, aliis vtrumque; vt Dominæ de Rochepot, quæ cum varicosa esset, eo affectu corripiebatur cum delirio, risu, lachrymis, contractione oculorum. Alteri risus, deinde perturbatio mentis, hinc lachrymæ: à quibus etiam monitæ non cessant. Sed nihil admirabilius, quàm quod duabus filiabus Præsidis Rhotomagensis contingere solebat in motu sursum vteri, quo ex interuallis laborabant. Risu enim longo ad horam, & hora duas, imminente paroxysmo, capiebantur, quem neque metu iniecto, neque hortatu, neque aliorum artibus poterant compescere. Parentibus interrogatæ & obiurgatæ respondebant, se non posse continere risum. Aliis prius lachrymæ, deinde risus mouetur in eodẽ affectu, vt sæpe vidimus. quibusdam lachrymæ tantum, aut risus. At hæc puella diu lachrymabatur, aut ridebat. sed postea taciturna tamquam mortua permanebat. Astantes mulierculæ varia adhibuerant remedia, sed frustra. Cum verò pro deplorata habebatur.

batur, vt fieri solet, ad eam accitus fui. Vt igitur vapores illos venenosos ad inferiores partes retraherem, membra extrema inferiora continuo fricari imperabam; tum coxas & crura ligari, iis modò solutis, rursus fortiter constrictis. Naribus admovebam plumas caponis, cum perdicis ad manum non essent, quæ tamen valde expertæ sunt: nam postea memini cum Noordt-wici ad nobilem essem vocatus, famulam quandam in iisdem ædibus consuetam malo vterino grauitè detineri, adedò vt etiam pro mortua haberetur, cum nullis præsidii excitari posset à paroxysmo, plumis perdicis combustis naribus ad motis, ad vitam quasi à nobis reductam. præterea & huic nostræ, de qua nunc agimus, globulum assæ fœtidæ sindone obuolutum naribus ad odorandum obicimus. Gatenaria commendat fumum corij combusti ex calceis detracti, & refert mirabilem historiam, hoc modo viperam in stomachum per os delapsam, cum nec lacte ad os attraheretur, eius fœtido odore per anum egressam & expulsam. quod vix credere possumus, ob venenum viperæ, talem non fuisse ex eius intus latentis morsu extinctum. Sed cum hæc omnia non iuuarent, coacti fuimus suadere, vt aliqua mulier digito in hoc liquore immerso vuluam intus confricaret: & olei lilior. ℥j. moschi optimi gran. v. ambra gr. iij. croci orientalis gr. ij. cauendo ne odor ad superiora tenderet. Hæc enim, vti alia odorata, valent; sicut ziber, seu ciucta, bombax moschatus, aut cotton moscho conspersum, oleum moscho perfusum,

L gallia

gallia moschata, alypta moschata, caryophylli, & similia. At oleo supradicto imposito, excitata fuit. Cùm ad se rediisset, exhibui parum castorii cum cereuisia vel aqua chamæmeli, & purgaui cum pilulis sequentibus: R agarici trochis. pilul. de hiera, añ. ʒ. ß. agni casti, castorii, añ. gr. iij. fiant pilulæ vij. saphenæ venam fecalem si ex solis mensibus suppressis malum ortum fuisset. sed quia in puella salaci, licet pituitosa, semen abundaret, consului matri vt viro collocaret.

S C H O L I A.

Signa præ-
sagientia.

SIGNA præsagientia vteri suffocationem diligenter examinanda, vt mulieres huic malo obnoxie præseruari possint, antequam paroxysmus inuadat. Sic mulieres viuide, si ipsis menses retineantur, facillè incurrunt in hoc vitium: quamuis & aliis vacuato vtero fieri solet, vt per immodicam mensium fluxionem, (quemadmodum & sæpe vidimus) aërè tunc vterum implente, atque ita inflante conuulente collo. sic de puellis valde salacibus, quæ non purgantur per menses, quamuis ea purgatione egeant, præsertim cùm viri appetentes ex natura sint, & bene habitæ, de talibus, inquam, possumus prædicere, quòd facillè in tale malum incident. Id quotidie experientia monstrat in his quæ ex voto monastico violenter castæ detinentur, & inter crates ferreos cohibentur, ne furore vterino percitæ viros adorianur. In quibusq; enim ditioribus monasteriis, & in puellis nobilioribus, oriosis, delicatè viuentibus vsu id crebrò euenit, vt, dum chorea iuuenum nobilium agantur, & obiecta potentiam moueant,

ueant; & semen copiosè generetur, neque expellatur, huic malo sapius obnoxia sint. Ita & possumus predicere in muliere viro orbata, quæ consuea erat coitu vti, & nunc ab actu venereò abstinere: quæ licet in continentia viuat, interim non mutat vitæ institutum consuetum, sed in quiete ac deliciis agens, opiparè adparata conuiuia sequitur, quæ quoque libenter & sæpe fabulatur de coitu. Idem contingit quibusdam mulieribus potentibus; & magnificis relictis à suis viris; etiam nobilioribus, quorum mariti in bello versantur; ita ut à complexu cogantur abstinere. In talibus certè expectare ac predicere possemus vteri præfocacionem: multoq; magis in iunioribus, & aliis consuetis incurere paroxysmos certis periodis: quos & tempore autumni, teste Rbase, magis quàm aliis temporibus expectabimus; cum tunc magis corrumpantur humores, simul concurrente aliqua restrictione pororum cutis. Ita quoque si præcesserit apostema in vtero, & malè curatum ad carcinoma deductum: nam id cum ulceratur, tetros vapores emittit; à quibus talia expectantur. Cum iam instat strangulatus (teste Paulo lib 3 cap. 71.) gravis sopor premit, quæ cataphora dicitur, mens desipit, sensuum instrumenta deprahenduntur, impediunturq; vox obmutescit, crura contrahuntur, deinde maxilla rubere incipiunt, faciesq; repletur. comitatur, inquam, torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, pallida facies, aspectus oleosus. Alij & hæc addunt. Cum magis instat paroxysmus, sentiunt quid in gula tanquam glandulosum hæere, aiuntq; tunc muliercule, vterum eò ascendere, nocummento diaphragmati communicato, inobedienti iam factò in dilatactione, vnde principium præfocacionis.

Imminentis
signa.

Impendentem ab viro suffocationem ostendunt symptomata eadem, quæ præsentem, sed leniora; ut respiratio & pulsus difficilis, cordis palpitatio, dolor capitis, sæpe cum rubore labiorum, faciei & oculorum; qui etiam interdum clauduntur, ut aperiri nequeant; interdum tristis est aspectus, modo vertigo scotodinos, à vapore putri ad cerebrum elato, spiritum visorium & sæpe animale reliquum perturbante; ut etiam delirium leue accedat, nunc apprehensionis, nunc ratiocinationis, nunc utriusque, per quod affecta secum dicenda, tacenda loquitur; interdum veluti attonita stupet. Ex his plura antecedere solent paroxysmum, & præter perturbationem mentis ac intellectus, & anhelitus difficultatem, etiam in toto & in cruribus potissimum debilitas, & dolor ab umbilico ad muliebria usque, subinde & aphonia. At signa demonstratiua cum alia genus ipsum ac morbum præsentem indicant, alia verò specierum & causarum differentias ab affectibus similibus. Signa igitur generis & paroxysmi præsentis sunt hæc: casus subitus, sicut euenit epilepticis & syncope laborantibus; & fit cum eo defectus saltem sensus exterioris, & anhelitus quasi ablatio, tenerque manus compressas supra ventrem, tanquam prohibitura ne adscendat, & genua reflexa habet, hypochondria inflantur, tanquam quid pectus & gulam occluderet; etsi nomine proprio vocetur, licet intelligat, respondere tamen non potest, quamvis quoque post paroxysmum omnia recordetur; sensu denique & motu priuata ut mortua sæpenumero iacet. Varij enim sunt, inquit Galenus, præfocationis in mulieribus affectus: quarum quadam sine voce, sine sensu, & sublato venarum pulsu, iacent, mortuis simillimæ: alia quidem

Signa demonstratiua.

Varij affectus in præfocatis.

quidem sentiunt, & mouentur, ac memorantur: quibusdam & sensus intercipitur, non sine anhelandi difficultate: quibusdam crura & brachia distensione comitialiter torquentur: nonnullis modò pulsus parui, ac debiles fiunt, alii penitus intercipiuntur: quibusdam autem neque respiratio sensibilis permanet: aliqua verò, aliis actionibus integris manentibus, magnam respirationem ex hac affectione habent; stomachi etiam dolore vexantur, & saliuam vomunt, si in stomacho aut capite humiditas sita sit. interdum etiam sic exanimat, ut tamquam comitiali morbo prosterneant. Inclinate verò accessione, corpus firmari incipit, male rubescunt, ac oculi post multam grauitatem attolluntur; & ubi iam malum agram relicturum est, humiditas quadam ex locis muliebribus excurrent, tactu percipitur; intestina murmurant, ac ipse uterus paulatim laxatur, atque sic exurgens agra intellectum & sensum recipit, ut liquet ex Aërio & Paulo. Obstetrices quoque seu Medicae, quæ ipsas exquisitè retigerunt, fatentur circa uterum notas quasdam apparere. Nam ceruix eius inclinata videtur, interdum veluti sursum retractus sit totus uterus, interdum veluti si ad latus. Nam simul cum utero, ceruicem quoque ipsius retrahi necesse est, Gal. auctore 6. De loc. aff. Sunt autem hæc symptomata varia multum & graua. Non tamen id esse debemus interim, ut mulieribus adulantes, quicquid affectus illis contigerit, in uterum causam referamus; seu caput doleat, seu ventriculus flatuosus sit, seu venter doleat, seu respiratio difficilis fiat; cum possint hæc aliis de causis fieri. Primum igitur omnium est circa respirationem symptoma; quando saepe adeò vitatur, ut nihil maius excogitari

Signa incli-
nantis ac-
cessionis.

Symptoma-
ta varia mul-
tum & gra-
ua in uteri
præfoca-
tione.

gitari possit de infrequentia, de tarditate, de paruitate. Verum nunquam adeo exigua fit, ut prorsus tollatur, vel exigua linqatur, & prorsus insensilis reddatur. Leditur hinc vox adeo, ut nihil eloqui possint, etsi velint. Alia ad cerebrum attinent, cum sensus & motus aufertur, vel cum furore capiuntur, vel cum conuelluntur toto corpore, quando aut cerebrum, aut spina laborat. Alia ad cor pertinent, ut animi deliquia, syncope: alia ad ventriculam, ut morsus ventris, eructatio plurima. Quae omnia cum ex propriis affectibus earum partium fiant, quarum sunt symptomata; non temerè, ut dixi, in vterum referenda sunt; sed inquirendum cui parti adscribi debeant. quod fiet, si consideratis illis partibus, laborare eas priuatim aliqua ratione cognoscemus: vel contrà, noxa esse vacuas. Tunc enim fieri per consensum credendum erit, atque in vterum authorem referentur. Quomodo vterus hac faciat, semper difficile fuit intelligere. Plato enim sursum ferri ait, & spiritus meatum obstruere. Sed quamuis verum sit, retrahi vterum modò ad superiora, modò ad latera; ex hoc tamen censenda haec causa eorum symptomatum non est. Quid enim tale eius retractio, & vitiatu situs potest efficere? ut Gal. disputat. Sed neque vno modo semper situm mutat: quod Rhases & Paulus censere videntur, sed variè. Contingit autem ut haec situs mutatio fiat ab eisdem causis, à quibus & cetera accidentia, ita ut simul cum illis eueniat, sed eorum causa non sit. Causam ergo, ut prius diximus, Galenus inuenit, quem & alij sectati sunt, vel ex suppressa purgatione, aut retenta genitura. ita ut tunc castæ ferè, nisi derinerentur (ut Iacchinus dicebat) intra crates ferreos

reos viros adorirentur. Sed tamen simulationem mulierum cauere oportet. Sape enim talia mala simulant, quo cogant ad coitum viros: hinc in illam caliditatem ludit autor vulgati versiculi:

Hystericam vitulo se simulat esse marito.

Causa autem varietatis accidentium, est ex qualitate, vel quantitate eius quod detinetur veneni. Qualitas autem sit primum ex materia, ex qua est genus transmutatione. Vidit igitur Galenus, quod ex semini retenti transmutatione deteriora sunt symptomata, quam ex menstrui retentis: & hoc est verum. Quod si contingat aliquando retentis menstrui talia fieri, hoc est rarius, & vna euenient ob coitus diminutionem. Veniunt quidem ex illis dolores capitis, grauitates, vertigines, & cetera quae diximus. At apnoea, conuulsiones, potius ex retento semine, ut syncope, & subita mortes. Neque Iacchino placet in reddenda huiusmodi ratione Galenus, cum omnia in frigiditatem referre vult: cuius ratione animae non egeat respiratione, & pulsu, proinde his priuetur. haec enim causa facit, ut non laedatur ita, si careant respiratione. Sed respirationis causa esse non videtur, quoniam saepe crebram facit, velut praefocati, & paruam. Potius ergo voluntarium motum tollere dicemus, neruorum origine affecta: idque ex natura veneni, cuius est modò vnam principem partem, modò aliam afficere: ut patet per venena discurrendo, è quibus alia cor laedunt, alia cerebrum, alia alias partes nobiles. Sic igitur spina affecta, conuulsiones, & apnoea eueniunt: cerebro verò affecto, furores, sopores graues, epilepsia, sensus & motus priuatio: corde verò affecto, pulsus mutantur,

L 4

&

& omnino eius robur concidit, adeò vt syncope premantur, & aliquando subito mox pereant.

OBSERVATIO XVII.

*De muliere præfocata, & pro mortua habita,
tandem in vitam reuocata.*

PLVRI BV S diebus strangulationis deliquio aliquando iacent mulieres, vt pro mortuis habeantur. Huc pertinet, inquit Plinius, nobile illud apud Græcos volumen Heraclidis septem diebus feminæ exanimis ad vitam reuocatæ. Feminarum, inquit, sexus huic malo maximè videtur opportunus: conuersione valuæ, quasi corrigatur, spiritus restituitur. Ad tertiam vsque diem feminam ab eo malo non efferri, clamat omnis schola. Ego memini, mulierem, cùm Pithueris in Gallia praxim exercerem, hoc malo detentam 24. horis in paroxysmo permanisse, frigidamque extitisse, vt pro mortua haberetur. Ad quam & nos acciti, id quod Hollerius etiam annotauit, inprimis num mulier viueret, diligenter cognoscendum rati sumus. nam sæpe fit, vt idem ait, vt grauiore accessione intereant, aut non aliter iaceant quàm mortuæ. Pulsus huic adeò parvus & obscurus erat, vt non sentiretur: & cùm respiratio nulla appareret, ori & naribus speculum tersum bene ac perpolitum admo- uimus, quod expirationis vapor crassus in res- pirante velut obnubit, & maculat (vt & Syl- uius ex Ganerio ponit) nota vitæ certissima: vel
ori

ori aut naribus subdito carptæ & pexæ lanæ flocculos, aut pennam molliſſimam, quæ motu reſpirationem eius teſtentur, modò aſſidentium expiration hęc mouens tibi non imponat: item cyathum aqua plenum ori ventriculi imposito. Vult tamen Hollerius, infidele ſignum eſſe, quod, floccis naribus admotis, vel vaſe pleno aqua imposito regioni ſtomachi, colligetur. Sternutatoriis potius, inquit, cognoscendum. Ceterum admoto hîc ſpeculo, certò viuere cognouimus. Adhibuimus itaq. frictiones infernas cum peplis calidis, & ligacula cruribus iniecimus, & odorifera intus per mulieres imponi iuſſimus, quale eſt thymus inſtar peſſi in vuluam poſitus. nam hoc modo noui aliquas etiam puellas, huic malo frequenter obnoxias, eſſe excitatas. Conducunt etiam zibettum & alia. Naribus malè olentia obiecimur, & adhibito ſternutatorio, hęc tandem ad vitam reuocata à paroxyſmo excitata fuit. Vbi iam aliquid ſumere potuit, exiguum caſtorii dedimus cum aqua chamæmeli. Peſſaria verò, qualia & hîc potiſſimum conueniunt, poſtquam incipiunt loqui, & melius reſpirare, imponi mandauimus ex attrahentibus; vt ſi ſemen aliquod corruptum eſſet, vt hîc erat, ex parte traheretur & euacuaretur. Conueniunt verò maximè ea, quæ ex diſcutientibus ſtatus parantur, vt ex benediſta, hiera, cumino, ſemine rutæ, & ſimilibus; vt & Rondeletius quoque docuit. Atque his, vel ſimilibus remediis miraculi inſtar hęc mulier curata fuit.

SCHOLIA.

Quomodo
vivere pos-
sint, quæ
vteri suffo-
catione la-
borant, etiã
si nihil om-
nino sparent.

CVM vteri strangulationis differentias, pro effi-
cientis causa magnitudine, vel pro specierum
quarundam varietate inter se differentes, plures esse
dixerimus; quia in earum aliqua omnino spiratio per-
ditur, vt huic mulieri euenit: non ab re quæreretur quis-
piam, quomodo vivere tales possint, quæ nihil omni-
no spirant? Cùm in confesso sit, spirationem à vita, &
vitam à spiratione separari non posse: aded vt viuen-
tem non spirare, & spirantem non vivere sit impossi-
bile: quinimo vbi cor respiratione priuetur, ilico ho-
minem perire necesse est; vt liquet 5. & 6. De loc. aff.
& lib. De utilitate respirationis. Quare Heraclicæ po-
steriores (vt Donatus quoque refert) iis experimentis
iam dictis explorabant nam agrotans viveret; cùm ta-
men aliquando sublata penitus oris ac narium respira-
tione animal vivere posse constet, modò ea supersit,
quæ in toto corpore ab arteriis & corde perficitur: id
quod in latètibz animalibus manifestò apparet, nulla
apparente in ipsis spirationis nota: hac enim per totam
hyemem mortuis simillima in cauernis latitant, per
arterias tantùm totius corporis transpirantia. Pari-
item ratione in vteri strangulatione fieri potest, vt
toto corpore frigesacto, (id enim manifestè videtur)
nulla prorsus prodeat ab ore spiratio, supersit autem
ea, quæ à corde & arteriis fit. est enim maximus &
precipuus respirationis vsus (vt sexcentis in locis à
Gal. decretum est) vt intimus calor & refrigeratione
& ventilatione seruetur. Qua de re exiguus ille calor
in hystericis mulieribus derelictus, arteriarum cordisq;
officio

officio conseruari poterit, quæ actio à quibusdam Medicis transpiratio dicitur; quamuis (vt diximus) quæ sit ab ore & naribus respiratio omnino fuerit abolita; licet etiam aded parua esse possit, vt sensum lateat nedum respiratio, sed etiam transpiratio ipsa: illudq; clarè constat non solum in Gal. sed etiam Aristotelis doctrina, qui lib. 1. De natura animalium cap. 11. talia protulit verba: sed datur viuendi facultas, etiam si desit spiratio. Quamquam itaque perfecta animalia, quæ temperatè calida sunt, præsertim dum sanitate fruuntur, citra spirationem haudquaquam viuere possint, vt liquet ex modò citatis Gal. locis; attamen quæ frigida suapte natura sunt, vt latentia, aut ex accidenti vniuersum eorum corpus tale redditum est, vt in hystericis conspiciamus, citra respirationem non inconuenit vt in vita seruentur, modò arteriarum cordisq; officium eis conseruetur; nec propterea his, quæ de apoplexia scripta sunt, contradicimus. Vel dicendū quod refrigeretur corpus ob frigidum semen in venenum transmutatum; vt in scorpionis & phalangij ictibus præcedente Scholio contingere diximus. Ceterum cum symptomata huius mali enarrauimus, quæ & aliis affectibus quasi similis contingere diximus; sæpe enim vteri suffocatio similis esse videtur lethargo, apoplexia, epilepsia, syncopi, catalepsi & lumbricis: differunt tamen ab iisdem. Habet autem maximam affinitatē præcipuè cum syncope, catalepsi, apoplexia & epilepsia; ita vt quandoq; epilepsiam faciat. Conuenit cum his affectibus, quod repente obmutescant, & cadant, aut non possint consistere. Dissidet tamen à syncope, pulsu. Nam in syncope & animi defectu pulsus cessat: in suffocatione vteri pulsus remanet, sed exiguus, rarus, & languis-

Signa quibus differat suffocatio vteri ab aliis affectibus.

Differentia à syncope.

languidus. In syncope sudor apparet frigidus, & color pallidus admodum est, similis colori mortui: in suffocatione pallida quidem redduntur, sed minus. Differunt etiam propter causas antegressas seu antecedentes. Solet enim suffocatio vteri provenire, post largam mensium euacuationem, quia aëre repletur uterus; vel ob seminis putrefactionem, & retentionem in vtero, quia cum putrescit, eleuantur multi fumi, qui postea distendunt vterum. Dicimus cum Rondeletio, in vtero semen putrescere. Nam in vasis spermaticis non putrescit, sed conseruatur, vel absumitur ad nutritionem vasorum; vel quando est in maiori quantitate, facultas expultrix in vterum reiicit inter somnium. Neque valet eorum ratio, qui dicunt sanguinem putrescere in venis; ergo & semen putrescere posse in vasis spermaticis. Non enim similia sunt. Sanguis enim putret, quia minus coctus est, & plus habet humiditatis excrementosa ac aliorum recrementorum. Semen autem coctum est perfecte, & assimilatum, & ab excrementis repurgatum ac redundans, benignumque dicitur, ob quantitatem, non qualitatem. Quod autem non permisceatur semini virili, & à vulua non alteretur ad conceptum, putrescit; tum etiam ob alia recrementa in vtero collecta. Ergo quibus semen defluxit in vteri cavitatem, & in ea retinetur, ut viduis, qua defectu coitus os interius vteri clausum habent, frequenter fit suffocatio vteri. Argumento est, quod viduae difficulter curentur ab accessione, & iis recurrit frequenter; nisi pessa, aut alia ratione, aut medicamento alio, reiiciatur semen putrefactum. Fit etiam suffocatio ob gratos odores naribus attractos, ad quos uterus natura mouetur. Et in hoc differt à syncope,

de, quod odores grati syncopē potius sedent, recrean-
 spiritus : his suffocantur mulieres, nisi parte infe-
 ore adhibeantur : Rhases verò comparabat suffoca-
 onem fortem & pessimam ad syncopen non fortem.
 quidem Auicenna intelligit ad pluralitatem acci-
 dentium, quæ sunt in suffocatione: tamen in syncope
 er essentiam cordis sunt difficiliora accidentibus præ-
 cationis; licet non tantum duret paroxysmus syn-
 opis. Ab apoplexia distinguitur stertore, qui hic non
 titur; deinde quod partes resolutas non habeant,
 eque sensum amiserunt, quamvis obtusum habeant.
 iam cum pili extrahuntur, vel punguntur, sentiunt;
 & manu adhibita circa collum indicant se suffocari,
 quod in apoplexia non fit; & apoplectica stertunt cum
 uncatione. Cum epilepsia conuenit; sed etiam differt,
 quod non conuellantur partes, nisi quando suffocatio
 teri epilepsiam facit. Tunc enim conuellantur. Ab
 pilepsia quoque distinguitur spuma circa os; quæ si
 adsit, signum est utrumq; iungi symptoma; & sape
 difficultus est distinctio, ob similitudinem: sed vultus de-
 clarat, qui tumet & rubet in præfocatis, pallens in his:
 & hoc etiam à syncope frigidiusq; humoribus uteri di-
 stinguitur, ut diximus. Adde semper generale signum
 retractionis uteri ad superiora, & quod præcessit in
 utero affectus suppressorum mensium, vel retenti se-
 minis. Differunt quoque à lethargicis, cum lethargica
 semper cum febribus sint; hysterica ea non laborant.
 A catalepsi verò, quod qui catalepsim siue comprehen-
 sionem patiuntur, quasi rigidi & refrigerati rema-
 neant, oculis apertis, non audiunt neque vident. A
 lumbricis, secundum Moschionem & Cleopatram:
 nam illæ quæ lumbricis laborant, & in intestinis pun-
 ctiones

Ab apo-
plexia.

Ab epilepsia.

A lethargo
& catalepsi.

A lumbricis.

Ationes sentiunt, & matricem sanam habent. Et quamuis propter silentium similes sunt caducis & apoplecticis, & quæ lumbricos habent, lethargicis quoque & catalepticis: in hoc separantur, quod apud caducas & epilepticas, & quæ lumbricos habent, matricis nullæ querelæ præcesserint, & ipsa matrix suo loco reperiatur. A caro, quod in eo non uterus sed cerebrum afficitur, nec excitari possunt à somno. Quandoque post accessionem insaniunt, & aliena loquuntur, nec ad interrogata respondent: & tunc videtur potius mania per consensum uteri, aut melancholia. Nam melancholia fit epilepsia, & contrà: & melancholia fieri potest per consensum, ut mesenterij, splenis, & aliarum partium: unde hypochondriaca est dicta. Differt etiam suffocatio à furore uterino, ut Aëtius ex Sorano lib. 16. cap. 76. hunc in modum scripsit: Uterinus furor est uteri intemperies ad passionis consensum cerebrum trahens, quem rabidum delirium consequitur, ab uteri suffocatione differens primò causa: neque enim hic retractus uterus aliquod membrum nobile ad affectionis consensum ducit, vel compressione, vel punctione, vel vapore: sed eodem ipse loco persistens per spinalem medullam, aut alias sibi insertas propagines, depravatam qualitatem, quacunque fuerit, ad cerebrum mittit, deinde etiam signo ab uteri suffocatione distat: quoniam egrotæ minimè in hoc sicut in illo affectu maræ ac sine sensu decumbunt; quin potius garrulæ, iracundæ, & inquietæ redduntur. Differt etiam à furore non per consensum, sed primariè cerebrum impetente: nam istarum amentia tota in Venere est; nihilq; aliud vel imaginantur, vel loquuntur, quàm de concubitu, pruriuntq; frequen-

ter

A caro.

Ab infania
& melancholia.A furore
uterino.

er loca pudoris, quorum attactu mirum in modum
 audent. Accidit id morbi genus temperatura calidis,
 tate vigentibus, ac castitatem seruantibus, quæ opti-
 mis cibis vescuntur, atque in deliciis & animi iucun-
 ditate versantur; præcipuè si aliàs libidini Veneriq;
 assueuerint: tunc enim maximè infestantur. nam ni-
 il aliud huiusmodi agritudo est, quàm ardor & in-
 ensio vteri, cerebro ac toti corpori earum communi-
 cata. Ita nouimus nobilem puellam, succulentam, car-
 osam, & in deliciis vinentem, quæ nobilis cuiusdam
 iuuenis amore capta, deinde nihil quàm de rebus Ve-
 nereis somnians, loquens, hoc vteri furore affecta fuit,
 & cum delirio mox maniam incurrens, ut à duobus
 viris contineri non posset, frustra ab Emilio Medi-
 co ante me Alcmaria agente, curatione tentata, bre-
 ui admodum extincta est. Verum nos quoq; pauci ab
 hinc annis iuenculam virginem formosam & hone-
 tissimam præ manibus habuimus eodè malo laboran-
 tem. Impudicè admodum de Venere loquebatur, tan-
 quam si in prostibulo enutrita foret. sed paulatim in-
 sana facta est, cum nulla remedia admisteret, quæ ad
 intemperiem calidam vteri faciunt, & insania con-
 grua, quæ huc transferenda è loco De mania; ut sunt
 irrigationes capitis, & alia præsidia furori accommo-
 da; de quibus egimus lib. 10. nostrarum Observatio-
 num. Sed peculiaris est pastillus trygonis apud Aëtium
 & alios, ac potius hydrosati. Diacodium aceto aut so-
 lani succo admixtum & impositum ardorem extin-
 guit. Quod si ob deprauati seminis abundantiam af-
 fectus contigerit, nitram & cardamomum cerato as-
 sumito, & pudendis subucito: quiddam enim salina
 simile elicitur, & morbus sedatur. Ruta verò & ca-
 storium

Historia de
 furore vteri.

176 DE MULIERVM MORBIS,
storium cum myrtino cerato supposita, genituram
contrahunt, & furorem leniunt. Hac satis de signis
distinguentibus uteri suffocationem ab aliis affectibus

OBSERVATIO XXVIII.

*De muliere quæ ex ira frequenter præfoca-
tionem uteri patiebatur.*

MONTANVS, Medicus doctissimus, re-
fert Consult. 89. De præfocatione matri-
cis, quòd hæc ipsa aliquando veniat ex ipso ani-
mi affectu: vt si aliqua mulier præ zelotypia viri
irascatur, & animus valde afficiatur, quòd tunc
aliquando fiat eiusmodi præfocatio. Addit se
nouisse tales mulieres, quæ ita irascebantur, &
afficiebantur à zelotypia, vt statim caderent in
hunc morbum, & perpessæ sint grauissima ac-
cidentia. Ita & ego nuper habui præ manibus
mulierem, aliqui diuitem, quæ ex leuissima
ira, huius mali paroxysmum incurtebat cum
grauissimis symptomatis; præsertim quoque si
dulcibus vteretur syrupis vel aliis iulebis. Quod
vltimum quidem multis contingere vidi, tam
puellis quàm nuptis. Ita eueniebat vxori cuius-
dam cercuisiarij Delphensis, quæ adeò dulcibus
offendebatur, vt si vel ea gustaret tantum, illico
iterum paroxysmum incurreret: quare & ante
paroxysmum, & post paroxysmum, & in ipso
paroxysmo, amaris semper vti cogebatur. Et
ideo hoc notatu dignum, quòd rarò admodum
sint præfocatæ, quæ dulcia ferre possunt: quem-
admodum

admodum enim odore suavi, ita & sapore dulci
facile vterus sursum rapitur. Decoctum absin-
thij his conueniebat, & pilulæ ex castorio &
assa fœtida, dando ʒ j. & post paroxysmum eas
euacuando cum hiera picra; fœtida naribus ad-
mouendo, & odorifera inferius supponendo.
Primum enim videndum quid in accessione
agendum sit, seu conuulsionibus ægra tentetur,
seu strangulationem patiatur, seu animo defe-
cerit. Hæc enim tria sunt symptomata, quæ ma-
ximè vrgent, & opem Medici exigunt. Sunt au-
tem remedia communia, quoniã & causa com-
munis est, vnde & cõmunis scopus. Si igitur ex
retentis mensibus, seu aliter, seu semine fiet, vnus
est scopus, vacuatio eius quod in vtero præter
naturam continetur. Sed id commodè non fiet,
nisi vterus in naturalem suum situm reuertatur,
ita vt cornix recta inclinet ad externa, itaque &
facile profluant. Vnde succedit his secundus
scopus: ob ea peragenda in primis malè olida na-
ribus admovebimus; cuius contrarium in reli-
quis syncopis fiebat. Et quandoquidem hîc ex
ira vapores in vtero existentes paroxysmum for-
tè mouebant, vt vterus ascenderet; ideo olida
rectè naribus obiecimur. Ita & vtero bene odo-
rata offeremus. Hæc Gal. 1. Ad Glau. Eius rei
mira est proprietas; causam autem postea dice-
mus. Facile igitur parabilia accepimus, vt pen-
nas combustas, corium vetus, capillos vstos,
cornua animalium cremata, & castorium. Odo-
rata subtus admovebam; vt hoc, vel simile: æ-
aliptræ moschata ʒ ij. ligni aloës, caryophyl. añ.

M

ʒß.

℞. moschi, ambræ, añ. gr. iij excipiantur oleo de spica, & cum cottone, imponatur aut cotton per se moscho conspersus, aut oleo moscho perfusum. Cùm autem excitata esset à paroxysmo, quia videbatur humore crasso & pituitoso laborare, exhibui 3 ij. pul. hieræ picræ. Dum autem in paroxysmo esset, etiam frictiones adhibuimus, & vincula cruribus iniecimus: & hypochondria fascia ligauimus, eaque moderatè constricta, ut vterus minus ascenderet. Extra paroxysmum, quòd dulcia abhorreret, imperaui ut cereuisiam absinthij biberet, qua delectabatur, & à paroxysmo præseruabatur.

SCHOLIA.

SIGNA autem specierum & causarum diligenter sunt examinanda, antequam ad curationem accedamus, non minus quàm prognostica ipsa. Hæc enim mulier (viri & alia) ex ira in hoc malum incidebat, ex commotione videlicet vaporum vel humorum, qui in vtero exislebant & ascensum inferebant. Fernellius, Galeni auctoritate motus, nonnunquam putauit vterum nihil aut perexiguum è sua sede dimoueri: at agrotarum mulierum modò querimonia, modò precibus adductus, hunc sæpe tactu deprehendit instar globi cuiusdam in ventriculum efferri, eumq; grauiter opprimere. Hinc & sæpe manu depressus est, manifesteq; in propriam sedem propulsus. Id quoque sæpe vidimus à mulierculis in hac re exercitatis fieri. Aliquando ex ascensu dūtaxat premitur mulier quodam præcordiorum dolore, spirandi difficultate, aut animi defectione; at sine meru, sine delirio, aut alio

symp-

Signa ascen-
sus vteri &
stragulatus.

symptomate grauiore; vt etiam vidimus. Interea, si strangulatus accedat, etiam grauissima symptomata succedunt. Licet enim aliquando primum exigua mali sit causa, ex vtero sublatus vapor viscera ventericuliq₃ feriens, mox tamen sublatus in diaphragma thoracisq₃ partes, respirationem crebram & breuem infert: inde cor obsidens defectionem animi inducit, & ad arcem cerebri conscendens soporem, veternum, desipientiam, & alia iam supradicta. Hac tamen symptomata, vt Fernelius etiā putat, non semper à menstruo, vel semine retento suscitantur; quum & eas quæ bene purgantur, & vterum gestant, & viri consuetudine fruuntur, plerumque fatigent: quumq₃ contra supra quingentas eodem cœnobio (inquit Fernelius) degere videamus, quæ diu consuetum Veneris vsum intermiserunt, nullo hysterico symptomate oppressas. Et ita quiuis humor (etiam præter semen aut menstruum retentum) hoc modo in vtero corruptus, eius generis vaporem ex loci natura venenatum expirat, & vnde vita illinc & summa veneni perniciēs exoritur. Hinc fit vt tamen si viris diu hæmorrhoides suppressæ sint, aut Veneris vsus sit intermissus, nulla tamen hysterici similia symptomata contingant. Hac quoties grauius incidunt, noscuntur quidem facile; leuia difficile, quod melancholicis aut cardiacis non admodum sint dissimilia. Sed quomodo ab iisdem distinguantur, dictum est. Si itaque fiat suffocatio vteri ab aliis humoribus corruptis, hæc aderunt signa: Mulier certis periodis habet suas purgationes, insuper virum aliquando habet ac coitu vitur. Item an tales humores maligniores facti vnà cum sanguine peccent, vel crassi pituitosiq₃, aut melancholici sint, id etiam ex propriis

Signa à vapore vel quouis humore corrupto.

Ex aliis cau-
sis.

Si ex men-
sium sup-
pressione
fiat vteri
suffocatio,
signa.

signis saepe dictis innouescet: biliosi equidem fortiora
producant symptomata; saepe mentis perturbationem
& rationis permixtionem, syncopen, ob cerebri tum
cordis consensum. Declarabunt autem & vitae insti-
tutum, victus praecedens, anni tempus, urinarum dispo-
sitiones, tum reliqua, num adsit plethora vel casochy-
mia. Si autem vapores maligni ex apostemate vteri,
ulcere, vel cancro ulcerato aut non ulcerato, praefoca-
tionem inferunt, aut humores putridi ab iis exhalan-
tes, ex propriis locis indicia sumentur. At si ex men-
sium suppressione vteri strangulatio excitetur, perue-
niente quidem ad uterum ipso sanguine menstruo, sed
ad interna ipsius ingredi non potente, aut quia crassior
est, quam ut per ora vasorum possit penetrare, aut
quia clausa sunt ora, propter quod multiplicatus in
venis, eas extendit, atque vicina ipsis vincula made-
facit; id citra eius peruersionem non erit, quoniam pleni-
tudo repletorum corpora & in latum, & in profundum
extendit; sed longitudinem abbreviat continuo, propte-
rea uterum retrahi necesse est: ob quam causam vel
sursum, vel ad latus retrahatur oportet. Quo fit
ut si aequaliter undique trahatur, recta erit & sine in-
clinatione ipsius transmutatio: si vero inaequaliter, ad
partem vehementius trahentem: vasorum itaque ad
ipsum uterum peruenientium & plenitudo & suspen-
sio, causa est, ob quam uterus in ipsius strangulatione
vel sursum, vel ad latus trahatur: id quod semper eue-
nit, quando eadem affectio ex menstruorum reten-
tione originem habet; & praeter id quod purgationes
eisdem supprimuntur. Inspiratione tamen non priuan-
tur, neque animi defectu, nec aliis modo dictis sym-
ptomatis valde laborare videntur. Id igitur cognosce-
mus

mus an symptomata sint leuiora, & menses præter consuetudinem suppressi fuerint, perseverante victus ratione eadem; mamma an tumentes lacte ex sanguine in ipsas regurgitante, corpus totum grave, oculorum, colli & partium aliarum dolores. Quid mamma intumescant, sit ob sanguinem, consuetum fieri per menses, ad eas reflectentem sensus iis sunt debiliores, & subinde in febrem incidunt. Sed insignia symptomata raro à mensibus retentis & suppressis contingunt: Interea affecta sentit pondus circa pectinem, & hora qua solebat mensibus laborare, percipit torsiones, doloresq; circa partes vteri. Si vnà cum menstruorum retentione adsit dominium alicuius humoris, illud ex eiusdem malignitate apparebit: nam si sit sanguis, apparet plenitudo & pondus grauans circa pectinem. Sin bilis, erunt symptomata paulo vehementiora, & motus promptiores: nam & atra bilis infert alienationes, ob fumos cerebro communicatos, vt in melancholia mæror & timor exaggerantur. Si pituita, corporis pigritia, albedo, & laxitas, & sputi copia aderunt: sicuti in bile è contra minus sunt quietæ. At vi-

Signa si fiat
ex viriata
femine.

tiato semini maior quidem quàm menstruis vis adest ad noxam vniuerso corpori inferendam, ex eiusdem Gal. sententia, & proinde magis spirationis ac pulsus abolitiones eo redundante apparebunt, conuulsiones, animi defectiones, ac alia paulo antè dicta symptomata: & sapius viduis (vt prius quoque retulimus) moribilibus, atque aliis similibus, ex tali causa proueniet vteri strangulatio. etiam vel si optimè purgentur, præsertim si naturaliter multo semine abundauerint, aut affatim à concubitu, quo antea creberrimè fuerant usæ, abstinerint. Sæpenumero circa vteri peruersio-

M 3 nem

Historia
Galenī de
vidua præ-
focata.

nem tales fiunt strangulationes, cum videlicet tenue, ac non multum fuerit semen retentum: quandoque etiam cum eiusdem peruersione, seu retractione; cum videlicet semen ipsum plurimum fuerit (vt etiam Donatus annotauit) ac crassum, eodem modo quo sanguis menstruus, tum vasa, tum vincula implens, extendens ac madefaciens. Quemadmodum accidit in muliere vidua longo iam tempore, qua præter cetera mala, neruorum quoque distensione vexabatur, cui cum manibus tractaretur partes muliebres, adhibitisq; calidis medicamentis, oborta titillatione cum labore ac voluptate, veluti per cotum vsu venire solet, crassum plurimumq; semen excreuit, atque ita à molestia sua liberata est; vt idem Gal. testatur lib. 6. De loc. affect. Huic etenim vterus retractus erat, sic obstetrice dicente. His itaque & symptomata grauiā & magis repentina eueniunt, & mox apicē præhendit, & crura sursum contrahuntur, & aliquid ab vtero ad os ventriculi attolli præsentunt. Minusq; dubitandum, si mulier sit virosa, & iam diu continens, aut virgo, sed Venerem appetens, corpulenta, multū sanguinis, victu calido, humido, flatulento vtens, in otio viuens cum Veneris irritamentis, & si menses illi non sint suppressi, vino generoso vtens, multūq; delicatis serculis Venerem incitantibus & sperma generantibus. Verum, teste Aëtio, cum hæc affectio etiam oriatur, vel vtero perfrigerato dum menses prodeunt, vel propter abortum, vel sanguinis eruptionem ab vtero ab aliquo repente suppressam, id promptè ex astantis loquela percipiemus. Nunc adhuc restant signa prognostica: de quibus mox dicemus, hoc rursus interposito exemplo.

Si ex vtero
refrigerato
dum menses
prodeunt,
vel ex abor-
tu, signa.

OBSER-

OBSERVATIO XXIX.

De præfocatione uteri lethali ex semine retento.

RECTE dixit Aëtius lib. 16. cap. 70. de uteri suffocatione: Si paroxysmus inuadere assuescat, epilepsiæ more chronicus efficitur, omnino quidem tutus apparens, singulis tamen accessionibus præceps periculum afferens, ut non eodem tantum die, sed intra paucas horas interinat, tuncque pulsus ab ordine suo primò ad frequentiam permutantur, deinde inordinate trepidant: postremò subfrigida quædam humiditas cutis superficiem irrorat. Sic & Paulus lib. 3. cap. 71. Nonnullæ in ipsis accessionibus perierunt subitò; quibus pulsus quidem crebriores & inordinati collabuntur, id est, intercidunt. Idq. multis contingit in accessione vehementi & longa, quemadmodum nuper pulcherrimæ mulieris quæ Delphis in delphine habitabat, quæ crebræ præfocationi obnoxia, nullis remediis inuantibus, cum accessio etiam diuturna ac vehemens esset, subitò vitam in mortem cōmutauit, quod breui fore, spuma ad os sublata indicauerat. De ea præcipuè timendum est, iuxta Guainerium, cum adsit intensio cum paroxysmi lōgitudine, si spuma ad os defluat; maximè, inquit, si spermatis corrupti vitio prouenire cognoueris. Ideo & nos mortem mox affuturam prædiximus.

SCHOLIA.

Signa pro-
gnotica.

VBI igitur respiratio tollitur & pulsus, sunt gra-
uissima praefocationes, vti huius mulieris erat.
Nam ab his de vita periculum est; idq; ob affectum
cordis iunctum. Suffocatio quoque vterina seminali
est tanto acutior & periculosior quam menstrua.
quanto semen prolificum tenuius, ac in generatione
actuosius est & efficacius ipso sanguine menstruo.
Dixerunt aliqui, si remedia optime adhibita secun-
dum artem, post diem primum non contulerint, agra
esse derelinquendas: quod tamen minimè faciendum
est. Nam & tandem plurimas curatas vidimus, &
ipsi curauimus. tum piuni esse ducimus, vt quoum
modo succurramus, etiam si res deplorata nobis videat-
ur. Non ignoramus interea, quanto magis retentio
menstruorum vel seminis diuturnior fuerit & diu
precesserit, quod tanto periculosior fiat hac afflictio.
Quod verò grauior & molestior sit vteri suffocatio ex
desento semine orta, quam ex suppressis mensibus,
maiores noxam, ac maiora symptomata inferens, ex
Galeno liquet 6. De lac. affect. Quemadmodum etiam
quod periculosior sit ea, in qua tum spiratio, tum pul-
sus abolentur: quam primam eius speciem, siue diffe-
rentiam nominauimus. etenim nonnulla ex talibus
pereunt; licet quadam etiam seruata videantur. Ac-
cidit hac affectio omni quidem tempore, sed hyeme
praecipue ac autumno, praecipue autem iunioribus sa-
lacibus, ac sterilibus, maxime si tales per medicamenta
fuerint. Fit quoque magis corporibus delicatis, otiosis,
& strictas venas habentibus, quam laborantibus, &
quibus

quibus est amplitudo venarum. Magis etiam mulieribus sanguineis, aut pituitosis, ex multitudine materiae. Ita memini, me saepius in curatione habuisse puellam admodum crassam & obesam, bene habitam, quae Delphis habitabat ad pontem Auenarium, quae multis annis huic malo obnoxia fuit, & saepius à me curata: cuius parentibus consului ut viro eam copularent. Melancholicis autem accidit ex debilitate, magis tamen in hyeme quam in aestate; etiam praecipue in autumno. Suffocatae iuuenulae, vel aliae, à semine, si coeant, paratissimae sunt ad impragnationem, & promptè concipiunt. Ita cognata mea Eua Teylingia in Haga Comitibus habitans, cum nuperrimè virum duxisset, statim à suffocatione ilico post coitum concepit: de qua etiam postea agemus. Memini me in curatione habuisse pulcherrimam iuuenulam, quae saepe pro mortua habebatur. Consului ut parentes eam viro locarent. quod postquam contigit, statim impragnata fuit & admodum fecunda copiosam prolem deinde ex marito susceperat, ac nunquam eo malo fuit in posterum detenta. Cum verò deficiunt menstrua, & semen superabundat, tanto molestior & prolixior est agritudo, maximè quando partes occupat altiores. Grauidae tamen, iuxta Galenum 6. De loc. aff. cap. 5. licet iis diu menses supprimantur, tamen in symptomata haec nunquam aut rarò delabuntur: quòd horum parte puriore fetus in utero nutritur, reliquum crassius in vasis ad uterum pertinentibus, ad secundum in partu expulsionem, servatur integrum, aut non ita corruptum; nisi aliunde, ut ex febre magna, putredinis occasio accesserit. Grauidas nihilominus vidi hoc malo tentari, ut postea exemplo docebimus.

M 5

Sus-

Suffocatio à pituita putri grandævis, & mensium a seminis annos egressus, ut sexagenariis & septuagenariis est familiaris: & iuuenibus victu prauo vtenibus, & potu largo, & intempestiuo aqua potu aut vini, aut esu fructuum crudorum. In his vel in capitis dolorem duorum trium quatuorve dierum, vel cynanchem, vel peripneumoniam, vel spinæ vel genitalium tumorem, ut quidam sentiunt, magna ex parte degenerat. Accidentia leuia paroxysmi breuitatem significant: vehementia & diuturna periculum notant, & saepe mortem cum grauissimis symptomatis. Fortis enim non est vilipendenda, cum multa praefocata in paroxysmo suffocentur. Quadam ut mortui iacent etiam per duos dies, quos si excedunt raro resurgunt: & ideo non est festinandum ad sepulturam: imò ne post tertium quidem diem, ut quidam volunt cum calor naturalis tanto tempore in interioribus corporis occultari possit. Sed post hoc tempus nulla visa est suscitari. Praefocatio vteri cessatione mensium naturali, 43. anno, vel 50. vel cessat, vel ingravescens interficit. Si menses vel humiditas seminis effluant ad os matricis in suffocata, mitigatur inde passio statim. Mulieri, quæ vterinis molestat, aut difficulter parit, superueniens sternutatio, bonum est, ut liquet ex Hippocrate aph. 35. lib. 5. quo loco per vterina, suffocationes vteri intellexit Galenus, & bonum tum signum, tum causam esse sternutationem, fatetur.

OBSER-

OBSERVATIO XXX.

De præfocatione uteri in prægnante; & de altera in ipso partu eueniente.

PAULO antè dictum est, grauidas nunquam pati uteri præfocationem, vel admodum raro. Attamen cùm hæc recolligerem anno 1589. mense Octobri, vxor nostri pharmacopœi, secundo à conceptu mense uteri præfocationem incurrebat, cum motu quasi epileptico modò sub noctem, modò in nocte, non sine febre, tanquam certa periodo, idque per quatuor aut quinque vices. sed paroxysmi non diu durabant. malè olentia naribus admota parum iuuabant. infernis non ausi fuimus odorata subicere, ne abortus sequeretur. Syrupus ex absinthio adhibitus, propter amaritudinem, ut existimo, valde iuuabat. Secunda verò vxor Petri Opmeri, quæ annum 42. agebat cùm illam duceret, (nam virgo annosa ea erat antequam matrimonium iniret) anno sequenti, mense Augusto primipara, cùm noctu pareret, atque obstetrix infantem suscepisset, & valde intenta esset in puero mundando, ipsa interea in uteri suffocationem incidens mox exanimis reperta est, & pro mortua habita. Ad quam & ipse accitus in nocte, assam fœtidam pro odoratu naribus applicabam; & emplastrum contra matricem supra alutam seu corium rotundum, paulo amplius dalero, extensum, & in circuitu galbano obdu-
ctum,

ctum, vmbilico apponi iussi: quibus duobus tantum præsidii ad se rediit, & ilico à paroxysmo excitata est, atq. ab illa molestia etiam mo liberata, cum magna astantium admiratione. Cùm iam à paroxysmo excitata foret, imperauimus vt emplastrum amoueret: & cùm benè purgaretur in partu, postea bellè se habuit.

S C H O L I A.

SCRIBIT Auicenna, quòd vteri præfocatio non contingat in partu, seu tempore partus; cùm motus ille sit laboriosus, & ad inferiora expellat superfluitatem deorsum: & quia est operatio natura, ideo in ipso non præcedat vapor venenosus ad membra superiora. Et verum est, inquit Gradus, in pluribus, non tamen semper. Vidi enim, ait, quòd in actu pariendi, vel post partum, de proximo euenerit ex euaporatione etiam ad superiora de materiis quæ mouentur in partu, etsi earum materierum fluxus sua corpulentia moueatur ad inferiora. Idem contigit huic secundæ mulieri. Primæ quoque grauidæ existenti: licet hoc etiam raro contingat. Ambæ istæ mulieres erant facie rubicundiore, & calidioris temperaturæ; quales magis hac ægritudine leduntur, & in maiori periculo versantur, quàm in pituitosa aut melancholica temperatura, quæ, ceteris paribus, est minoris malitiei. Ratio per se manifesta est, quia diminutio vel quasi prohibitio anhelitus citius fit ad mortem, vel periculo non vacat, ceteris paribus, in muliere calidæ temperaturæ, vbi est indigentia maioris euacuationis, quàm in opposito modo disposita.

O B S E R -

OBSERVATIO XXXI.

*De uteri suffocatione post menses
fluentes orta.*

EV A Teylingia, cognata vxoris meæ, in Hage Comitatus habitans, nuper nupta, post mensium purgationem, anno 1561. sub finem anni, morbum vterinum seu præfocationem passa est, ex frigore, vt opinor, & ventositatibus: vt aliquando etiam aliis contigisse animaduertimus: erat enim tunc asperissima hyems: quo tempore magis (vt antea diximus) fieri id solet. Theodorus Hoogherbetius Hornanus Medicus, tunc temporis agens in vicinia apud sororem, noctu ad eam vocatus, assam fœtidam naribus applicuit, & exhibuit tres pilulas paruas ex assa fœtida & puluere dauci compositas: quibus nonnihil sese remisit paroxysmus. Altero die aduocatur Hugo Nieuenius Medicus Haganus: is naribus castorium adhibet, & subtus vuluam cotonem ex moscho seu globulum imponere iubet; quibus modò leuabatur paroxysmus, modò denuo redibat. Paulo pòst cùm se remitteret paroxysmus, pro purgatione propinavit diaphœnicum, & hieram picram, sed in exigua dosi. Tertio die ego vocatus sum, cùm magis augeretur, & medicamentum non operaretur; & glande indita vtrunque acuta, copiosè aluum deiecit, & paulo pòst cessauit paroxysmus. At noctu rediit vehementior. Tum vnà præscrip-

præscriptimus emplastrum ex galbano, quod
supra corium lenigatum ad palmæ manus magnitudinem supra umbilicum ponebatur. Illud
ceratum de galbano, est secretum Montagnanense
in morbo vterino. Vide apud eundem alia cerata
in suo Antidotario, quæ idem applicat umbilico.
Galbanum dissoluimus cum modico aceto
& in corio rotundo extendimus, ac umbilico
mulieris apponimus. Quo remedio infinitis
præfocatas curauimus, & à paroxysmo excitauimus.
At verò etiam nostram hanc cognatam præ
ma fronte iuuare videbatur: postea tamen, ut as
serebat, ferre non potuit. Quare sacculos duos
quadratos intersutos, ex ruta, artemisia, calamita,
origano, & matricaria concinnatos, circum
ventrem inferiorem paululum calefactos ap
posuimus, modò vnum, modò alterum, & tan
dem bene se habuit. Interea tamen altero die
rursus glandem ex hiera, cumino, ruta, melle, &
sale paratam, imponi iussimus; qua & alui
probè reddidit, multis ventositatibus simul
emissis. Verùm, quod penè omiseram, cùm in
paroxysmo validiore esset, & quasi paraphrene
sin incurreret, fronti pannum lineum aceto &
oleo rosæ inculcatum, apposuius, ad malignos
vapores reprimendos; & egregie contulit: tum
præcipuè ligationes & frictiones crurum, ad in
feriora materiam & vapores malignos diuertendi.
Atque istis præfidiis restituta fuit, bene habita,
& ad Venerem inclinata. Cùm autem haud
ita pridem nupsisset, viro à me tacitè inquirente,
te, num coitus utilis esset cùm apud eam lectum
incum

cumberet, annuebam, id vnicum & optimum medium esse, vt omnis schola Medicorum estatur. me itaq. abeunte Venerem cū egre-
iē exercuisset, statim quoque ab eo tempore
impregnata est, & non amplius vteri præfoca-
tionem passa est. Nam suffocatae ab vterino
nalo, si coeant, (vt Scholio Obs. 29. diximus)
romptē concipiunt.

SCHOLIA.

QVONIAM verò hac affectio duplicem cura-
tionis modum requirit (vt paulo antè dicere Curatio ac-
cessionis.
ceperamus, & Observationes præcedentes idem osten-
dunt) vnum accessionis tempore, reliquum verò ea-
dem non urgente; propterea ea qua accessionis tempo-
re adhibenda sunt, primò conscribunt auctores, victus
ratione derelicta. Nam accessionis tempore, ac etiam
vbi eadem conquieuerit, cibum nullum, aut paucum,
præbere oportet, vt liquet ex Paulo. Iubent itaque
agrum ceruicæ, ac scapulis accliuis collocari, ac in-
guinibus decliuis: extremas partes deligari, ac fri-
cari; crura præsertim, & pedes: & quemadmodum in
multo effluxu cucurbitas mamillis imponunt, sic
quibus sursum, aut in latus tractus est vterus, ingui-
nibus & coxis adhibent. Communibus enim remediis
est vtendum, cum iis quibus ad excitandam sopitam
naturam, vti solemus: cucurbitulis, inquam, ad pubem
& inguina, & ad coxas, & vinculis ad summas
coxas, & crurum frictionibus ex acris factis, vt ex
sinapi cum aceto. Scopus enim est ad inferna reuellere
humores & vapores qui sursum tendunt. Sunt mox
clamo-

Quæ nari-
bus admo-
uenda.

Cur vterus
retros odo-
res refugiat.

clamoribus excitanda, compellendo proprio nomine pilos vellicando, ac nares trahenda. Et sic communis ratio curanda suffocationis est, ut ad id quod magis urget, nempe ad suffocationem nos totos conuertamus; neglecta ad tempus causa, ut miseras prefocatuscitemus: naribus quidem ea admoventes, quæ foetidissimum odorem habent; vtero autem odorata, & ea etiam quæ laxare ac calefacere possint, medicamenta adferemus; iuxta Gal. De ar. cur. ad Glauconem. Sed nemo, inquit Lacchinus, causam dixit; nisi forte & illi sensum odorum inesse dicas, ut refugiat retros, & ita recurrat deorsum; & ut sectetur gratos. Hæc questio duas habet partes. Prima est, cur tetricis odoribus narium recedat? Quod sanè situm malum inde mutetur vterus, fortè vndiquaq; verum non est. Sed quod à paroxysmo excitantur, idq; vehementi facta concussione in cerebro, vnde & in toto corpore, id sanè sit ex tristitia obiecti. Hoc esse verum patet, quia non foetida modo offeruntur, sed & acuti odores euigilantes, ut apud Aëcium, ruta, & thymus cum aceto; & acetum acerrimum in quo pulegium, calamintha, origanum, conyzæ & tenuis, & reliqua eiusmodi acria decocta sint. Hæc enim crassos vapores in cerebro detentos incidere & attenuare possunt, ac simul frigiditatem depellere; thoracemq; pulmonem, & quæ stomacho attinent expurgare. Eiusmodi verò acetum (inquit idem) naribus admouendum est. Hæc enim facillè parabilia sunt, ut ruta ex aceto & thymus, vti & penna combusta, capilli, corium vetus: post hæc castorium, assa foetida: hæc enim cum ad sopores & epilepsiam faciant, nil mirum si etiam ad hoc malum, ut potè simile. Thymo tamen sine aceto, & pulegio, tum odoriferis solis, non liben-

libenter ego uti soleo. Memini enim quod illustrissima
 vxor D. Principis Aurai, cum primipara Delphis in
 partu esset, ex odore florum redolentium in hoc ma-
 lum incurreret: cui naribus admotis male olentibus, &
 amotis floribus è cubiculo, cautoq; è meo consilio ut pe-
 dissequa vestibulis ex moscho redolentibus non uteren-
 tur, facile ab hoc malo liberabatur. Nam omnia foeti-
 da sunt efficacissima olfacta, aut naribus admota, ut
 galbanum, assa foetida, opopanax, bitumen, petroleum,
 oleum ex gagate (quod non multum differt à petro-
 leo: nam & petroleum & gagate bituminis concreti
 species sunt: quare stultum est emere quod non magis
 efficax est viliores) odor lucernarum extinctarum: nam
 & Paulus lib. 3. cap. 71. linamentum ex lucerna ex-
 tinctum, lanasq; laciniasq; combustas naribus admo-
 uet. Valet & fumus foetidus, qualis eleuatur ex plu-
 mis vstis, aut corio, herbarum foetidarum, ut ruta;
 quae omnia suo ingrato odore, uterum deorsum pellunt.
 Et ita, inquam, nares suffiende, castorio, galbano, sa-
 gapeno, sulphure, aut funiculo lucernario recens ex-
 tincto, aut pennis vstis, seu soleis antiquis, aut cepa-
 rum aliorumve corticibus, aut capillis ipsius propriis
 exustis. Quidam etiam matulam urinariam inuete-
 ratam, & pannos sulphureos incensos naribus admo-
 uent: sinapi item triticam aceto naribus adhibeatur:
 aut rutam viridem manibus contritam suffito: aut
 eadem cum melle lana excepta in anum indatur, ex
 Gal. auctoritate 9 De compos. medic. sec. locos. qui
 etiam quae iam diximus adfert, addens picem liqui-
 dam, & cedrinam, item cornu cerui. Hoc etiam tem-
 pore, iuxta Aetium, sternutationes excitabimus, ca-
 storium, piper, struthium, specilli nucleo naribus ad-
 N mouen-

Cur inferius
iuuent bene
odorata.

Suffitus.

mouendo: osq; patientis aperiemus, ac medium digi-
tum ad vomitum prouocandum intromitemus: &
super hac omnia (vt paulo ante diximus) mulier ma-
gnis vociferationibus excitetur, aut vocetur. Vterum
verò seu pudendum ipsum aromaticis & odoratis suf-
ficiemus. Quemadmodum enim foetida sursum appo-
sita, vterum deorsum propellunt, sic odorata vtero vel
coxis alligata, deorsum trahunt. Ista & secunda pars
quæstionis erat, cur iuuent bene odorata? Gal. inquit,
odorata & quæ calfacere ac laxare possunt, hac ipsa
ratione iuuant, quòd calfaciunt: quæ verò calfaciunt,
extenuant & laxant: vnde fit, vt quod retinetur præ-
ter naturam crassum, & difficile mobile, extenuatum
mox per apertos meatus facile expurgetur. Habent
etiam id vt flatu discutiant; quibus sæpe infestantur.
Hinc suffitus aromatum educit muliebria. 5. aphor. Sed
quæstio adhuc est, cur ad hac, si aperiant solum. Sunt
enim & alia, quæ laxare, & calfacere possunt, vt ipsa
quæ diximus malè odorata; quibus tamen auctores non
vtuntur in hac casu, quasi ab his refugiat vterus, &
adstringatur. Fortè quæ pessimè odoratu sunt, vni
quandam deleteriam, & inimicam visceribus habent;
vnde ledantur, non quæ sic odorata, sed propriæ tem-
peramentiratione. Exempla verò eorum, quæ immit-
tuntur, primum sunt pessi ex gallia moschata cum
oleo moschato, aut iasmino, aut benzoino, aut de nucẽ
moschata, aut zibetto compositi, & impositi. Vel vte-
rum infernè per pudendum odoratis suffias, styrace,
cinnamomo, cassia, costò, amomo, ligno aloës, ac si-
milibus. Sufficiendus, inquit Aërius, vterus aromaticis,
quæ simul remittendi, calefaciendi, flatumq; educendi
vires habent; quale est quod enneapharmacum apud
illum

illum appellatur, & cetera huiusmodi à veteribus ad
 vteri durities descripta, amaracino, gleucino, irino,
 ligustrino vnguento diluta, ac adiecta etiam rata aut
 cumini portiuncula: quæ quidem obstetrix digitis ca-
 piens vsque ad os vteri immittet, leuiterq; ac multum
 defricabit, vt eo irritamento crassus humor, qui semi-
 nariis vasis adhæserit, prouocatus ac quadantenus ca-
 lesfactus excernatur: inq; ipsum vterum clysteri vte-
 rario amaracinum, gleucinum aut foliatum vnguen-
 tum calidum iniiciet. Sic Paulus vnguenta odora-
 tissima in vuluam infundi iubet, vti est amaracinum
 iam dictum, vel malabathrinum. Et sic intra puden-
 dum per obstetricem ea illinantur, quæ laxant, calfa-
 ciunt, & flatus dissoluant; veluti est oleum irinum,
 nardinum, rutaceum, aut in quo cuminum, aut ani-
 sum fuerit decoctum. Pessi item parentur ex his, quæ
 eandem vim habent calfaciendi, laxandi & flatus dis-
 cutiendi; quorum formulas loco De mensium suppres-
 sione inuenies, nisi quoddam odorata quædam iniicere po-
 teris; lignum aloës videlicet, cassiam, cinnamomum,
 costum, moschum, & interim ea, quæ à vulgo am-
 bra canis, & zibet appellantur: testudinis item terre-
 stri hepar tritum in pessa subditum ad ʒ j. namq; ad
 vteri strangulatus ac dolores confert. Vel in hunc mo-
 dum: R. gallie moschata ʒ ij. cinnamomi, folij macis,
 caryophyl. añ ʒ j. ambra, moschi, añ. gr. ij. labdani,
 styracis, añ q. s. cum aqua rosata, moschata, fiat ve-
 luti suppositorium, quod indatur genitalibus: Pulue-
 res eiusmodi aliquando inspergimus oleo costino, de
 spica, de lilio, vt inde intinctis digitis obstetrix affricet
 os vteri in virginibus: in aliis etiam interiora. Post-
 quam autem incipiunt loqui, & melius respirare,

Vtero quæ
 immittenda.

Pessi.

Quæ per se-
dem inili-
clenda.

nonnulli tunc quoque in vterum pessaria trahentia
immittunt; vt si semen aliquod corruptum sit, ex ea
parte trahatur & euacuetur; aut si aer, vel spiritus
quidam in ea parte conceptus, aut conclusus, is absu-
matur. Potissimum autem ex discutientibus paran-
tur, vt ex benedicta, hiera, cumino, semine ruta, &
similibus. Hoc etiam tempore in sedem glandes in-
dantur ex ruta, cumino, agarico, sale gemma, hiera,
ac melle preparata: aut ex cumino, ruta & caricis
eadem parentur. Sape enim per hæc sensibilibus cras-
sus humor effluit. Propterea etiam proderit, vbi hæc
non suffecerint, clysteribus stercus subducere, vt inquit
Paulus; quorum copiam apud eum cap. De coli dolore
reperies. Et ideo, cum magna ex parte plena sint ven-
torum, glandulis, clysteribusq; iam dictis, tum vn-
ctionibus, quæ flatus discutiunt, vtendum erit ex ca-
pite De colico dolore. Præcordia item fasciis vincian-
tur, & dislentis manibus os vteri comprimatur; illi-
nanturq; imus venter ac inguina: & saccelli in eisdem
locis adhibeantur; prout eodem capite De mensium
suppressione docetur. Aliqui hîc (vt Rondeletius) eo-
dem tempore cucurbitulam ponunt supra regionem
vteri, id est, inter os pubis & umbilicum, magnam,
& cum multo igne: postea emplastrum ceroneum su-
pra eandem partem ex lachrymis: id digerit, calfacit,
& materiam absumit. Conficiendum est illud empla-
strum ad formam scuti, & in parte illa acuta, dum
apponitur parti inferiori, gratum odorem inspirat in-
tra ipsum vterum, & vterum retrahit, aut retractum
retinet. Non vult vt apponatur emplastrum de ma-
trice, cum in id aliqua astringentia intrent. Nos ta-
men sæpissime, & collega meus Cornelius Heydus,
magna

magna cum utilitate emplastro contra matricem (ut exemplis subsequenter adhuc dicitur) commodè vsumus; supra alutam ducendo ad rotunditatem, & in circuitu galbano obducendo, ac umbilico imponendo. Componuntur etiam emplastra ex solo galbano & assa foetida, iuxta Rondeletium. Sic etiam Iacchinus: Quod si, inquit, non praefocatione, sed conuulsionibus, aut torminibus & inflationibus capiatur, prater hæc optimum est emplastrum è galbano appositum imo ventri: nec solum sic iuuat, sed & praeservat à morbo inuasuro. Hæc inquit idem Iacchinus in accessione: Ea si dolorem facit, colicis remediis utemur omnibus: præcipuè verò iuueni expedit semen imperatoria & radicem bibere ex mulsa; & pilulas sumere, quæ ex assa & castorio & ruta componuntur. Terebinthina potius utilis, & aquarum sulphurearum, & castorij cum decocto artemisiae; & infusio chamameli. Et ubi facultas detur, infusiones quoque parentur in decoctis In sessiones. baccarum, & foliorum lauri, pulegij, calaminthæ, marrubij, artemisiae, conyzæ, sabinae, centaurij, dictamni, sansuchi, scænuigr. althææ, chamameli, aristolochiæ, iridis & serpilli, ex eiusdem Aëtij sententia. Verùm infusionum tempore cerebri cura non relinquatur; sed rosaceo & aceto caput irrigetur; & in aceto etiam spondylium, serpillum, ruta. & interdum castorium decoquatur; ac naribus quoque prædicta odoramenta assiduè adhibeantur; præsertim castorium cum aceto, ut ipse inquit. Post hæc ad castorij potionem transibimus: quod assiduè potum sæpe penitus ab hoc malo liberat, dandumq; est quotidie ʒj. pondere, aliquando cum aqua mulsa, aliquando cum artemisia decocto, Aëtio & Paulo testibus. In accessionibus

198 DE MULIERVM MORBIS,
nibus tamen in seſſionibus difficulter vti poſſumus. Sac-
culi melius applicari poſſunt, quibus nos commodè in
muliere præcedente uſi fuimus. Hac autem iam dicta
in acceſſione conueniunt: qualia autem præſidia adhi-
beri debent vbi acceſſio conquieuerit, poſtea dicturi
ſumus. nunc rursus aliud exemplum curationis pro-
feramus.

OBSERVATIO XXXII.
*De uteri ſuffocatione ex ſemine
retento.*

ANNO 1565. menſe Ian. ſamula Henrici
Moermeesterij pharmacopœi noſtri Del-
phenſis, in grauiffima ſymptomata præfocatio-
nis incidit, idq. ex ſemine retento: nam quatuor
integris horis perdurabat paroxyſmus admodum
vehemens, idque de nocte. Cornelius Ericius,
collega noſter, Medicus doctiſſimus, emplaſtrum
contra matricem (quo & nos quoque vti ſole-
bamus, forma rotunda, ad magnitudinem ferè
palmarum manus, ſupra alutam extenſum, & in cir-
cuitu galbano obductum) ſub ſiniſtro hypo-
chondrio ponebat, in quam partem uterus ex-
tollebatur & ſuſum ascende-
bat. ſamula verò
exclamabat, vt altera iu-
uencula aſtans manibus
depelleret vterum ad in-
feriora, cum ſe ſuffocari
ſentiret. Forte fortuna
eadem nocte officinam
ingreſſus ſum, vt pro
alia etiam eodem malo
laborante nonnulla re-
media præſcriberem,
collega dudum domum
reuerſo. Cumque viderem
virginem miſerè torqueri,
imperavi vt empla-
ſtrum

Arum dictum à loco illo amouerent, & pudendo muliebri apponerent: quod cum fecissent, ilico ad miraculum cessauit vteri suffocatio. Vbi ad se rediit, dixi vxori pharmacopœi, vt rogaret num menses tempore debito fluerēt: quod cum ita se habere dixisset, procul dubio hoc malum ex semine retento esse conieci. Nam appposito emplastro, statim relaxabatur vterus, humiditate quadam seminali ex locis muliebribus excurrente: atque vtero mox relaxato, ægra exurgens bene se habuit. Non diu post hæc ipsa marito copulata, bellè deinde ac sanè vixit: erat enim boni habitus, & satis salax, vt videbatur. Hæc est eiusdem emplastri descriptio: & galliæ moschatæ, aliptæ moschatæ, styracis calamitæ, ladani purissimi, mastiches, añ. ʒ j. xyloaloës, xylobal-sami, carpobalsami, galangæ, cyperi, añ. ʒ iij. ros. rub. ʒ j. β. ceræ nouæ lib β. puluerisanda pulueriscentur, & cum l. q. terebinthinæ fiat emplastrum, vt artis est. Huius accipio ʒ j. & obduco in circuitu galbano, in forma rotunda, atque appono vmbilico, vt aliàs diximus. & inuenimus sæpe magnam vtilitatem quotidiana experientia. Est & alia descriptio emplastri pro matrice in Methodo miscendorum medicamentorum Ioannis de Boys, pharmacopœi Parisiensis, cap. 22. ita descripta: & rad. bistortæ ʒ iij. ligni aloës, santali moschatelini, nucis moschatæ, berberis, antheræ, añ ʒ ij. cinnamomi, caryophyllorum, schœnanthi, florum chamæmeli, añ. ʒ j. thuris masculi, seu olibani, mastiches, aliptæ moschatæ descript. Præpositi, galliæ moschatæ, styracis calamit. sty-

200 DE MVLIERVM MORBIS,
racis rub. añ. gr. xv. moschi gr. vij. (alij legunt, \mathfrak{D}
ij. gr. v.) ceræ citrinæ \mathfrak{Z} iiij. β . ladani puri lib. 1.
pilis naualis \mathfrak{Z} ix. fiat emplastrum. At nos supe-
riori descriptione semper vtiliter vsi sumus. Eo-
dem ferè tempore, mense Februario, alia quo-
que in vico Nosocomij Delphensis grauitè ex
eodem malo decumbebat, postridie à nuptiis,
adeò vehementi, vt per tres horas pro mortua
haberetur. Ad quam vocatus, licet in cubiculo
calido & lucido esset, quod quidem probatur,
statim imperaui vt stramenta altiora fierent ad
caput, vt quasi erecta sederet, & spina recta col-
locaretur, vt ita facilius spiraret; & vt statim la-
quei pectoris & ventris soluerentur: nam vesti-
bus constrictis iacebat: & voce alta vt nomen
eius ad aures inclamaretur, iussi, ac vt pili tem-
porum conuellerentur: (autores quidam, sed
fatis impudenter, iubent vt obstetrices pilos pu-
dendorum vellicent) deinde vt pedes primùm
sursum, postea in medio & imo vinculis dolori-
ficis vincirent, & simul pannis asperis fricarent,
& sub volis pedum frequentius ac asperius,
etiam cum sale & aceto acerrimo: alij & plantas
pedum oleo nardino inungunt. hoc enim mo-
do, tum calore valentius reuellebamus. Coxas
igitur super genu strictissimè ligauimus, modò
& tibiis vinculis iniectis. Nodulum verò infra-
scriptum naribus obiecimur: & assæ fœtidæ \mathfrak{D}
ij castorij \mathfrak{D} j. in sindone fiat nodulus. Tum em-
plastra matricis, forma circulari & in circuitu
galbano obducta, vmbilico applicari iussimus.
Quibus & hæc incantamenti instar à paroxys-
mo,

mo, præter omnium mentem statim liberata est. Aliquando tamen, propter odorem, galbanum omittendum; potissimum si pudendo apponendum sit emplastrum. Obseruandum nihilominus ut instar scuti sub vmbilico applicetur, & quod antè quoque monuimus, in parte illa acuta quæ tangit vuluam imponenda sunt aliquot grana moschi; ob causas Scholio præcedentis Obseruationis dictas, ex Rondeletio; qui cerioncum emplastrum præfert, ut & ibi videre est.

S C H O L I A.

NON desunt qui emplastrum sequens ponunt inter vmbilicum & pectinem: R. emplastri ceronei, emplastri pro matrice, añ. ʒj galliæ moschata, aliptæ moschata, ladani, añ. ʒj. subigantur cum oleo nardino & fingatur emplastrum rotundum, quod inter vmbilicum & pectinem applicetur. Solum emplastrum ex galbano vmbilico appositum nobis sæpe suffecit ad excitationem. Aliquando etiam non omnia ista, sed sola linimenta odorata vel alia pessi modo in vuluam imposita profuerunt. Quædam solo odoratu

Mulier in ultimo mense imprægnationis, solo odoratu assæ fœtidæ curata.

assæ fœtidæ per nos excitata sunt: ut Maria Gerardi, Delphis in foro frumentario habitans; quæ cum vltimo mense imprægnationis validè morbo vterino correpta, anno 1561. sub finem Decembris ex præfocatione corruisset, olfacta solummodo assæ fœtidæ sindone obligata, præter spem multorum hoc solo remedio excitata fuit. similiter euenit aliis quamplurimis. Interea tamen, præter communia remedia iam superius dicta, aliquando propria quædam requirunt, quibus à

N 5

paro-

paroxysmo excitentur: nā iuuantibus assa fœtida, castorio, & eiuscemodi alijs. Sic contigit in illa virgine quæ Delphis circa aquam fosseam vterino symptomate detinebatur: quæ neque emplastro contra matricem, neque malè olentibus naribus admotis licet aliquando eodem malo ante laborans, iisdem suisset à paroxysmo liberata, excitari potuit. At Cornelius Ericius collega meus, egoq; simul vocati, cum tandem plumas perdicis vstas naribus adnouissemus, mox ad se rediit: deinde postea, eodem malo subinde recurrente, semper iisdem remedijs fuit restituta. Idem alteri puellæ cum Noordwici ad curationem cuiusdam Bronchorrhœ vocatus essem, euenit. Tales igitur plumæ à quadam proprietate iuuant, quare cum aliæ plumæ combustæ eidem tam efficaciter non præstent, ideo has semper deinceps paratas habere voluimus. Memini nihilominus, matronam nobilem, cui ex vteri præfocatione subito syncope superuenerat, adhibitis fortibus ligaturis & dolorosis in coxis tibijsq; tum pedum plantis fortiter fricatis cum sale & aceto acerri-
mo, mox plumis caponis combustis ad nares admotis, subito reuixisse. Sed cum postea sentiret tumorem vteri cum dolore, hoc vnguento mox cessauit: R. vng. de ammoniaco ℥j olei lilior. de cappar. añ. ℥ss. misce. Memini & uxorem Theodori Teylingij, adfinis mei, ab vterino malo excitatam (ut antea quoque narrauimus) solo pessa subdito ex floribus rorismarini cum panno lineo ad digiti formam. Sic aliæ puellæ nobiles, pessa ex thymo eodem modo subdito, à paroxysmis ilico restitute sunt: quamuis rursus alijs id vidimus non profuisse. Nouimus alias sola masticatione seminis leuistici, & semen paulatim deglutiendo, à paroxysmo

Plumæ perdicis vstæ excitant à proprietate à paroxysmo.

cyfmo fuisse liberatas. Sed & illud pro mirabili
 secreto & experimento accepimus, valens & ad se-
 cundinam extrahendam, ad menses suppressos, ad
 vteri suffocationem, tam ex semine retento, quàm
 ex mensibus suppressis, ad molam quoque & fœtum
 mortuum extrahendum vel educendum; atque ex-
 pertum dicitur in iis quæ per 14. dies vel plures se-
 cundinam à partu retentam habuere, quæ neque vllis
 modis ab ea exonerari poterant, vt extrema in-
 unctiōe inuncta animam exhalaturæ viderentur;
 donec hoc secreto ab obstetrice, quæ id à Iudeo Me-
 dico, cui pro famula inseruierat, se accepisse refere-
 bat, curarentur. Sumebat folia leuistici viridia,
 contundebat, & succum exprimebat cum vino op-
 timo Rhenensi; eius cyathum vnum propinabat. In
 hyeme verò contundebat semina eiusdem & modicè
 in vino ebulliebat, demum colabat cum expressio-
 ne; vel in aqua artemisiæ bullita atque expressa ex-
 hibebat quàm felicissimè. Ego tamen sæpe observa-
 ui dum eiusmodi, seu pulueres, exhiberentur cum
 vino, quòd vterus magis ascenderet: & ideo potius
 talia exhibeo vel cum aqua artemisiæ, vel cum cere-
 uisia & non cum vino. Noui mulierem admodum
 exigua staturæ, valde prolificam, Delphis habitan-
 tem, in vua pensili in foro, satis obesulam, quæ vel
 leui occasione abortum patiebatur. Huic familiare
 malū erat vteri suffocatio, ad quam etiam sæpe nocte,
 cum quasi pro mortua haberetur, euocati fuimus. Hæc
 autem primo & secundo mense imprægnationis hoc
 malo detinebatur. præsentiens paroxysmum, sola ra-
 dice ostrutij in ore retenta, & parum masticata, à suf-
 focatione liberabatur; nec alio remedio quàm hoc ipso
 soluta

Historia
 prægnantis,
 quomodo
 ab vteri suf-
 focatione
 liberata.

solita erat hoc malum à se depellere. Superbibebat ta-
men vel absorbebat parum aceti vini optimi; unde
ructibus emissis, semper restituebatur; quamuis etiam
stomacho imbecilliori esse videretur. Scribunt tamen
Medici, acetum neruis, membrisque, neruosis, tum vte-
ro, minimè conuenire. Rectè igitur dictum puto à
Galeno, cuiusque naturam propriam Medicum
nouisse debere. Sed cum vniuscuiusque (vt idem Gal.
3. Meth. med. rectè dicebat) naturæ proprietas ines-
cabilis sit, nec vel exactissima scientia comprehensibilis,
ac præterea cuiusque hominis propria curatio habeatur;
is erit optimus cuiusque particularis ægritudinis Medi-
cus, qui iam etiam methodum comparauit, ex qua &
dignoscere naturas possit, & coniectura consequi, quæ
sint cuiusque propria remedia. Et licet quidam dicant
acetum non conuenire, scilliticum nihilominus ab aliis
commendatur; quare non est mirum, hic acetum cum
radice astragali conuenisse. Interea ratio imprægnatio-
nis habenda, ne subtilius aromata supponantur, aut alij
pessi, ne abortus subsequatur. Muliercula Delphenses
sequenti puluere vtuntur ad vteri suffocationem: R.
granorū iuniperi, calami arom. rad. gentiana, sem. pa-
stinacæ añ ʒ j. fiat pul. subtiliss. à ʒ ij. ad ʒ j. dabāt cum
vino. Sed vinum cum boni sit saporis, vterum per se
ascendere facit. Præstat vti cum cereuisia, aut alio li-
quore conueniente. Idem pul. valet ad ventositates ex-
pellendas, & ad ventriculi roborationē, eo quod sæpe vsus
sum, & multas restitui, exhibendo cum cereuisia.

OBSER-

OBSERVATIO XXXIII.

*De uteri vehementissima præfocatione
ex semine retento.*

PVELLA annos 20 nata, filia illius qui in Speculo in foro frumentario habitabat, 15. Septemb. die anno 1579. sub vesperam gravissimam præfocationem uteri incurrit, cum tussi valida, ut mox suffocari videretur. Cum globulum ex assa fœtida & castorio pro odoratu naribus admonissemus, & hunc pulverem sequentem sumpsisset cum cerevisia exigua, eodem vesperi accessio illa, licet grauior, cessavit: & rad. gentianæ, sem. dauci, ostrutij, añ. ʒß. fiat pul. subtilissimus. Sequenti die utcumque habebat. Pro tussi tunc pectus inunximus; & capiebat frustū vnum aliquando ex rad. inulæ saccharo conditæ. habebat enim aliquid amaritudinis, ideo minus nocebat præfocationi. dulcia autem planè ferre non poterat. Et quia macilenta erat, tamquā tabida, fusca, citrina, & quasi ictero affecta, continuò sumebat cerevisiam in qua decoctum erat marrubium. 17. die Septemb. melius habuit, ita ut vltiorem curationem relinqueret, ac parentes mihi soluerent. At 18. die sub vesperam reuersa est uteri suffocatio, durans per quatuor horas, adeò violenta, ut pro mortua haberetur: anhelitum trahere non poterat, frigidum exudabat, totumque corpus quasi conuellebatur, utero ad superiora retracto; mulieribus tamen
non

non sentientibus ascensionem eiusdem, vt ali-
quando fieri assolet: sed putridus vapor ascen-
dens guttur & pectus occludebat adeò, vt astan-
tes illam in agone esse existimarent. Dedi ʒj. pu-
matalis, qui ita describitur à Leonello: & rad-
dictamini, sem. baucia, añ. ʒj. cinnamomi electi
cassia lignea, melissa, añ. ʒij. croci orientalis ʒ
β. castorij pinguis & recentis ʒj. misce: fiat pul-
dosus est à ʒβ. ad ʒj. cum aqua vriticæ vel cha-
mameli. Dedimus ʒj. cum cereuisia. Semper
sub noctem redierat quasi febricula adiuncta
fuiſſet. At nunc adeò violenta, vt neque pul-
iuaret, nec odor assæ foetida & castorij, nec
plumæ perdicum vstæ, quæ omnia tamen sæpe
iuuare solebant. Sororius eodem tempore acces-
sit cum tonfore iactabundo empirico, qui sani-
tatem pollicebatur. At huius consilium adhibi-
tum non fuit, nec nos admittere voluimus; nec
enim originem ex semine retento cognoscebat.
Adeò autem violentus erat paroxysmus, vt in
vita talem non viderim, duabus horis infestans.
Imperaui vt mater sequens emplastrum vmbili-
co apponeret, & in oleo sequenti digitum intin-
ctum clam in vuluam imponeret: & emplastri
contra matricem ʒβ. ducatur supra alutam ro-
rundam paulo ampliorem daleo, & in circuitu
obducatur galbano: & olei lilior. ʒj. moschi gr. v.
libetti gr. ij. misce. Vix digito imposito in vuluam
cum confricatione, ad miraculum, ad se rediit, &
ab orci faucibus quasi renocata est. Sed ne am-
plius redirent paroxysmi, imperaui vt empla-
strum per duos dies retineret. Interca dedimus
postea

ostea 3j. rhab. cum decoct. marrubij; atq. etiam lobulum ex iisdem, nempe rhab. & marrub. xiccato, adiectis croco exiguo & speciebus diarrhod. abb. propter icterum, & febriculam quam habere videbatur. Hæc igitur astantium admiratione euasit. Ceterum ne morbus rediret, quoniam tales præseruari debent, cum hic morbus periodos habeat, quia ex semine originem traherebat, consului ut potius nuberet. Interea, si hoc integrum non esset, consulimus ut iis vteretur quæ nonnihil semen exiccare possunt, idque victu & medicamentis; ut cannabis semine, aut viticis, & radice nymphææ. Iniunximus autem victum extenuantem, & maximè siccantem, cum exiguo potu, multam exercitationem atque inambulationem. Sed de his latius in Scholio.

SCHOLIA.

QUOMODO accessio curetur, iam diximus. Verum ubi ea conquieuerit, ac si ab eadem præseruari velit agra, aut diuturnus factus fuerit affectus; videndum nunquid ex semine retento fiat, uti hic erat. Quamobrem singulis medicamentis admiscenda sunt quæ semen minuunt ac abolent; de quibus antea diximus cum de iis ageremus qui in venerem proclines essent, & ex seminis profluuium laborarent. Talia sunt viticis, ruta, cannabis semina. Castoræ quoque 3j. assidue potent, modico aniso adiecto, ut Aëlius suadet ex Philagrii auctoritate. Interim quoque diambra, diamoscho, ac antidoto mythridatica uti poteris. Celsus castorium, vel gith, vel anethum potius dandum.

Vbi accessio non vigeat, curatio.

Topica.

dandum præcipit. Patet etiam cauendas esse contritiones, fabulas, aspectus, lectiones impudicas, caritiones, ceteraq; quæ Venerem excitant: quamuis alia ea commendent. Interea quoque suprârelata in seſſiones ac peſſi conducent. poſtremò verò ad naturalia balnea, eaq; calida, conſugiendum, quæ etiam ab Aeginaeta commendantur: poſt quæ vnctiones quoque approximentur peſtini, inguini, ac lumbis, ex oleo liliaceo, irino, rutaceo, & nardino, viticis ac ruta ſemine coſto, ac caſia, cum pauxillo cere paratæ. Interim quoque ſaluia, aut calamintha contuſa, ſeu ſeminis cannabis quidpiam admifceto. Multum etiam conſerunt deambulationes matutinae, geſtationes, quæ in curru vel naui, vel iamento adhibentur. A motu verò geſtationis, prodeſt vociferatio, & lectio clara, modulata, ac concinna. Item vnctio, frictio, & exercitatio, per congrua interualla repetita, vt Aërius admonet. In vniuerſum, vbi ex redundante potiſſimum ſemine generatur hac affectio (vt etiam Donatus ex Aëtio, Paulo, Galeno annotauit) tum victus, tum medicamenta conſerunt, quæ reſiccandi vim habent, ſiue calida, ſiue frigida fuerint: ſimiliter & hū vtendum (de quibus mox diximus) quæ totis ſubſtantiis ſemen extinguunt. Ad vteri ſtrangulatus conuenire inquit Gal. 9. De compoſ. medic. ſec. locos, agarici ℥ j. in potu acceptum ex vino: item plantaginis ſemen, & ſuccum cum vino. nec minus conſert onyx ex cōchylia potatus, & acetum ſcilliticum abſorptum, vt ipſe inquit. At frequens coitus hūc magis iuuat. At cum pregnantibus ſemper clementer agendum, vt iam antea quoque dictum eſt. Quod ad phlebotomiam attinet, ſuſpectum remedium eſt, niſi cū ſuppreſſi ſint menſes,

ses, vt exemplo sequenti docebimus: tunc enim conuenis, si ex mensibus retentis malum oriatur.

OBSERVATIO XXXIIII.

De uteri praefocatione ex menstruis retentis.

MATRONA nobilis de Bombergen Antwerpiana, vxor Iacobi Persinij, ad Montem Piscinæ, in Haga Comitatus habitans, ex menstrua purgatione retenta, symptomate vterino cum correpta esset, ad eam vocatus fui, anno 1566. 16. Martij die. Statim pro accessione curanda, naribus obieci globulum ex assa foetida, vt odoraretur. Emplastro contra matricem, circulari forma, & in circuitu galbano obducto, etiam vmbilico imposito, & oleo liliaceo cum granis aliquot zibetti in vuluam per obstetricem digito indito, cum ad se parum rediisset, semen leuistici cum cereuisia exhibui, ex quo bellè habere visa est. Deinde cum à suffocationis accessione libera esset, 18. Martij die ita illam purgaui: ꝛ diacatholici ꝛ ꝑ. diaphœnici ꝛ j ꝑ. pul. hieræ picræ ꝑ j. cum decoct. artemis. & melissæ ꝛ iij fiat haustus. Septies aluum deposuit cum multis ventositatibus. 19. Martij ad menses euocandos: ꝛ florum chamæmeli, folior. sabinæ, añ. m. ꝑ. sem. dauci ꝛ j. bulliant in aqua communi, & huius decocti accipe ꝛ iij. Adde spec. diacalaminthæ, diacumini, añ. ꝑ j. castorij ꝑ ꝑ. pul. dominarum gr. iij. calidè vnica vice sumebat: ꝛ olei rutacci, anethini, chamæmel. añ. ꝛ ꝑ. misce.

O

in un-

inungatur venter inferior. Fiebant etiam frictio-
nes & ligaturæ crurū in principio, ad diuersio-
nem. Redibat adhuc semel paroxysmus, sed le-
uior. 21. Martij sequens dedi: & decoct. flor.
chamæmeli ℥ iij. in cereuisia decocti, pul. cu-
mini ℥ j. sumpsit vnica vice. Bis fuit reitera-
tum, & profuit. Sacculus quoque paratus ex
floribus chamæmeli, absinthij, artemisæ cumini,
ventri inferiori calidè apponebatur, sed non po-
tuit ferre, rediitque denuo paroxysmus; qui ta-
men suffitu plumarum perdicum combustarum
cessauit. 23. Martij propinavi hanc purgatio-
nem: & elect. lenit. ℥ β. elect. de dactylis ℥ ij. elect.
hieræ picræ ℥ j. cum ℥ iij. aquæ artemisiæ, addē-
do syr. de byzantiis sine aceto ℥ j. misce. & ex eo
habuit quatuor sedes. Interea & hoc condito
utebatur: & conser. absinth. rom. flor. borag. añ.
℥ j. confect. mithridaticæ, theriacæ diatessaron,
añ ℥ ij. diacumini ℥ β. misce. capiebat ad magni-
tudinem parvæ castaneæ, & optimè deinde se
habuit. Aperuissem eo tempore libenter venam
tali, vt menses melius fluerent; sed noluit ad-
mittere. Tamen continuando conditum, bene se
habuit. Reliquam curationem commendavi vi-
ro; cum Venus hîc valde conueniat. Postea &
menses debitè fluxere, & curata permansit. At
puellæ illi pituitosæ, valde crassæ, ad quā voca-
tus fui 21. Nouemb. anno 1588, quæ circa pontē
Auenarium Delphis habitabat, emplastro ma-
tricis etiam vmbilico imposito, & oleo liliaceo
cum zibetto subtus indito per mulierem, cum
ad se rediisset parum, hunc puluerem exhibui-
mus.

mus: & rad. gentianæ, sem. ostrutij, dauci, añ.
 ʒj. fiat pul. detur cum pauxillo cereuiſiæ, non
 autem cum vino. Memini cū in Hagam Co-
 mitis accitus eſſem ad filiam præfocatam inſi-
 gnis illius Aduocati Cocci dicti, quòd alius Me-
 dicus propinaſſet theriacæ ʒj. cum vino, maio-
 rem eam incurriſſe acceſſionem vterinam. at
 cū puluerem ſupradictum dediſſem cum ce-
 reuiſia, admotis etiam caſtorio & aſſa fœtida ad
 nates, ſtatim reſtituta fuit à paroxyſmo. Cete-
 rum huic puellæ craſſæ poſtea exhibui hanc
 purgationem: & ſyr. ex inf. roſ. pallid. cum foliis
 ſenæ ʒj. ʒ. elect. hieræ picræ, diaphœnici, añ. ʒ
 ʒ. aquæ cardui benedicti ʒij. ʒ. miſce. Egre-
 gie excreuit. Poſtea, cū aliquo modo febricitaret,
 adhuc ſemel eam hoc modo purgauimus: & ſyr.
 ex infuſ. roſ. pallid. cum foliis ſenæ ʒj. ʒ. elect.
 hieræ picræ ʒj. diacatholici ʒʒ aquæ cichorij ʒ
 ij. ʒ. miſce. Deinde vena tali ſectæ fuit; & men-
 ſibus erumpentibus; hæc fuit curata. Ita etiam
 ſanata fuit filia pulcherrima Valkeſtenia cognæ
 noſtræ, caſtorio & aſſa fœtida naribus admo-
 tis, & emplastro matricis vmbilico impoſito, &
 puluere ſupraſcripto exhibito, ac ſubtus impo-
 ſito olei amýgd. dul. ʒʒ. cum moſchi optimi gr.
 iij. & zibetti gran. ij. &c.

S C H O L I A.

DICTVM eſt paulo antè, vbi acceſſio conquie-
 uerit, & non amplius vigeat, ne agra rursus in
 eandem incidat præſeruari debere; & tunc curationē

aggredimur pro ratione causæ. Nam si ex mensiū suppressione, ij ducendi sunt modi quos suprà diximus.

Vena sectio. & sic plerique initium sumunt à vena sectione: ex talo enim venam secant; quæ tamen minus conuenit, ex semine retento, vt paulo antiè retulimus. Deinde à alui purgationem seu euacuationem progrediemur. Sic etiam Aëtius in eo affectu, qui iam chronicus euasit, à sanguinis missione inchoat, præcipuè si menstrui purgationes detentæ fuerint. Secatur autem, vt dixi tali vena. Purgatio verò fit ex hiera, ex aloë confecta, picra dicta, quam & Aëtius valde commendat.

Purgatio. Si cum mensium suppressione crassi etiam succi frigidi succi redundabunt, iidem prius concoqui a præparari debent, & deinde purgari ex eadem hiera cum agarico; seu pilulis fœtidis, aut sagapeno cum eadem hiera & agarico & (vt summarim dicamus) eisdem medicamentis vtentur, quæ antea ad menses suppressos conscripsimus: à quibus diaspolitico pharmaco assiduè uti debent, & eo quod ex tribus piperis generibus constat, ac etiam eo quod ex calamintha appellationem habet. Si autem humores corrupti in vtero sunt, euacuentur, minorando, deinde digerendo, post eradican- do, postremò roborando matricem. vt: R. pilul. hiera ʒß. fœtid. ʒj. fiant pilulæ v. R. syr. de artemis. ʒj. ß. decoct. matricaria, melissa, artemisia, añ. ʒj. misce, & in ʒij. decoct. eiusdē diss. diacath. ʒv. elect. indi maior. ʒij. diaphœnici ʒiij. misce. detur deinde lauatium ex iure pulli cum saccharo rub. roboretur cum arom. ros. & diamos. in tabulis. Iungitur aliquando suffocatio vteri cum epilepsia per consensum: vti euenit

Historia
epileptiæ
cum suffo-
catione
vteri.

Barbaræ Brunonis Delphensi, annos 24. nata, anno 1568. 27. Nouemb. Erat leuis cum palpitatione in malis

malis ac facie; postea concidebat ferè, sed non semper. Hoc decocto epoto, per integrum annum, malum deinde non rediit: & maiorana, artemisia, pulegi, salvia, melissa, añ. m. j. betonica m. ss. flor. stæchad. p. j. folior. sene z ß. agarici feminini z ß. sem. anisi z ij. rhab. selecti z j. schœnanthi, zinzib. añ. 3 ß. vuar. pass. ab. orill. repurg. z ß. glycyr. ras. z ij. coquantur in aqua communi pro z vij. fortiss. express. adde syr. de artemis. è stæchade, añ z j. misce pro duabus dosibus matutinis. Aluum egregiè deposuit, cum multis ventositatibus: & intra annum postea non rediit malum, nisi anno 1569. die 16. Septemb. tunc iterum exhibita fuit eadem potio, adiectis aliquot seminibus pœonia: & malum non reuertebatur. Sed, quod ferè omiseram, menses consuetos semper habebat. at ex vtero videbatur vapor ascendere ad superiora, tandem in genis & facie palpitationem inferendo, mox casum, sed non semper. Plura de vteri strangulatu vide apud Alexandrum Benedictum Veronensem, lib. 26. à cap. 16. vsque ad caput 23.

OBSERVATIO XXXV.

De vteri procidentia, per modum consultationis.

PROCIDERE vterum dixit Aëtius lib. 16. cap. 78. quando ita euertitur, vt exterius emineat: neque enim vterus, vt imperiti suspicantur, à suis solutus propaginibus totus decumbit: nam si ita procideret, restaurari minimè posset. Ita & Paulus lib. 3. 72. Quidam, inquit, & totam vuluam prolabi memoriæ produnt:

○ 3

quod

quod à vero longè abest. Vterus enim ligatur parte inferiore duobus fortissimis ligamentis, quæ illum retinent, ne superiores partes comprimatur, & neque in dextram aut sinistram contorqueatur, & meatum vel cornu, vel os interius dilatans. Quòd si alterum ligamentorum relaxetur, aut contrahatur, trahitur ad partem dextram vel sinistram. Parte superiore uterus firmatur, & ligatur vasis spermaticis, & venis in superiorẽ vteri partem peruenientibus. Et quia venæ & arteriæ facillè rumperentur, nisi firmerentur firmissimo aliquo vinculo, natura peritoneo munivit & venas, & arterias, & totum uterum. Si peritoneum relaxetur, deuoluitur & decidit in partem inferiorem, aliquibus magis, aliquibus minus. Nam quibusdam extra apparet, aliis in collo sentitur. Alij verò (vt Fernelius) distinguunt descensum vteri à prolapsu. Descensus vteri apud eos appellatur, quum in inferas partes prouoluitur. Percipit obstetrix hunc pudendo obuium; laborans verò ipsa, si erecta steterit, grauitatis pondus in pudendum incumbere; sin autem vel sedeat, vel supina iaceat, vel aluum exoneret, quasi onere rectum intestinum premi; sin prona iaceat, vrinæ difficultatem nasci, vt etiam viri congressum pertimescat. Prolapsus verò descensu grauior est, quòd euersus uterus procidat eiusque fundus promineat, & manu attrahatur, anserini saltem oui magnitudine. Hinc Aërius loco citato: Quod verò procidit, ouo struthiocameli simile est, maioris tantum, aut minoris ratione differens, prout euersio.

euerfionis violentia coëgerit. Fernelius ad huius differentiam addit etiam conuulfionem. Conuulfio, inquit, est, cum uterus in alterutrum inguen contorquetur. Linguinis, ac sæpe coxendicis, vehemens sum dolor exercet; qui si atrocius excandescat, vterifutor appellatur; de quo antè egimus ex Aëtio; crustorum maximeq. femur torpescit ac friger. Tam varij, inquit, motus & errores iis duntaxat obtingunt, quibus vteri appendices laxiores, idque ex graui vteri gestatione, vel ex casu, atque contusione, vel ex copiosi humoris perfusione, euasunt. At prolapsus non ex leuioribus hīs causis, sed ex vehementiore solūm pariendi conatu, quo uterus foetum secundave cum impetu excludit, seque inuertens præcipitat, consequitur. Interdum & imprudentis obstetricis temeritas vterum cum foetu aut cum secundis inuertit detrahitque, vt nos aliquando fieri cognouimus. Sunt & aliæ causæ vehementiores, iuxta Aëtium & Paulum locis citatis. Ab alto enim mulier si in coxatum vertebrae deciderit, disruptis membranis quibusdam, quæ vuluam cum vicinis membris connectunt, eo morbo corripitur. Nec minus corripietur ob violentam loculi expulsionem, quod præcipuè in abortibus accidit. Nimia præterea spiritus detentio, aut immensi pōderis eleuatio, aut percussio vteri procidentiam inferre solent. Sæpe & ob humoris plurimi ac tenacis defluxum, partuumque frequentias, laxantur solunturque appendices profundo vtero superius inhaerentes. Ob vehementes etiam animi affectus;

vt si filiorum interitus, vel hostium incursus nunciatur, vel in maximam pelagi tempestatem inciderint; toto corpore mulieres exolui solent; ita vt vulua quoque elabatur & procidat. Nonnunquam & sine vlla istarum causarum debilitantur corpora, vt, membranis musculisque vuluam sustentibus exolutis, affectus contingat, quod decedente ætate fieri solet. Hæc Aëcius. Easdem ferè causas ponit & Paulus. Ideò querendæ sunt causæ antequam ad curationem veniamus. Sic rustica mulier, cui uterus relaxatus propendebat, cum Alomariæ adhuc praxin excercerem, me consultandi causa accessit. Cum autem hæc mulier valde alba & pituitosa esset, perpetuò circa aquam versari solita, (nam ex Waterlandia ad nos venerat; & nudis pedibus in campis versabatur frequenter dum vacas emulgeret, & aliquando per aquam ad illas cogebatur accedere) cumque adeò uterus sæpe procidat ob relaxationem factam ex frequenti & diuturna mora in aquis: sanè quòd ex humiditatibus mucaginosiis laxantibus appendices matricis, hoc malum ortum suum haberet, illico cognoui; testante & id mulieris habitu, tum copioso humoris fluore. Nam similiter confitebatur se quoque longo muliebri profluuiio laborasse; & tota constitutio eius erat pituitosa: ideo & resiccantibus & restringentibus curanda erat. Licet igitur hîc materia pituitosa prius concoqui deberet, & deinde euacuari, atque id multis remediis, vt nos antea longiore sermone docuimus; tamen cum apud me manere non veller,

ne

ne sine præfidiis à me discederet, (etiam præhabita prædictione quòd non tam facilè curaretur, nec vnico remedio) imperaui vt septimo quoque die tres pilulas hora vna ante cœnam caperet: & pilul. de hiera simplici, agarici trochis. añ. ʒj. β. corticum myrobal. chebul. ʒj. cum melle ros. fiant pilulæ vj. è ʒj. Postero die vt caperet ʒj. theriacæ optimæ cum vino ad minus quinque horis ante cibum; idque semel in hebdomada, post pilulas assumptas. Cùm bene esset repurgata, iussi vt ʒij. vel iij. aliquot diebus caperet ex rotulis spec. diamoschi dulcis, idque ter quaterve in hebdomada. deinde partem vteri exterius eminentem lauaret simili decocto: & foliorum lauri, & baccarum, menthastri, menthæ, artemisiæ, sampsuchi, rorismarini, añ. m. j. coquantur in vino adstringente. Vngatur post lotionem mucagine sem. cotoneorum & inspergatur pul. sequens: & acacia ʒij. baccar. myrti, ros. rub. añ. ʒij. cornu cerui vsti ʒij. β. redigantur in tenuem puluerem, quo post fotum & vnctionem inspergatur vterus per obstetricem, vt dictum est. Interea, priusquam in suum locum vterus per obstetricem imponatur, si in recto intestino durum stercus fuerit, illud educendum erit. Aëtius clysteri vtitur: nos poterimus in hac rustica vti balano, nam clysterem non admitteret. Hoc autem tempore, vt etiam admonet Rondeletius, abstinendum erit à iusculis, nisi cùm aluus proritanda erit, quæ sæpe & propter decubitum, & vsum astringentium constringitur. Quare huic symptomati

occurrendum erit cassia vel prunis, vel clystere detergente, & proritante leuiter facultatem. Neque imponendæ maluæ, aut aliæ emollientes herbæ, ne pars relaxetur. Sufficit herbam mercurialem & ciclam in decoctione ponere, betonicam, artemisiam, vel absinthium. Neque oleum ponendum est. Nam si adstringat, actionem clysteris impediet: si emolliat, partem lædet. Quamobrem satius erit citra oleum parare. Dum hæc quoque peraguntur, decumbendum est, & sobriè edendum. Simili modo si in vesica lotium collectum fuerit, studendum vt prius reiiciatur: sin minus, fistula vesicaria euocandum, iuxta Aëtium. Euenit enim plerumque, vt idem testatur, vt eorum detentione vterus, qui inter vtrumque, rectum inquam, intestinum & vesicam medius statuitur, compressus, & intra locorum angustias coactus, in prolapsu suo impediatur ne repelli & in propriam situm reduci queat. His autem rite peractis, agram supinam obstetrix collocabit, coxis accliuibus seu altioribus, reflexis poplitibus, & cruribus disparatis seu inuicem dilatatis: deinde prolapsam vteri partem, oleo tepido, vel butyro, vel betæ, maluæ, althææ, fœnugræci, seminum lini, aut similium decocto affatim fouebit; hastulamque laneam præparabit, vel lanam conuolutam, crassitudine & figura muliebri pudendo conformem, cui tenuissimū purissimūque lintecolum exterius circumuoluet, ac deinceps acacia aut hypocisthide vino dilutis intinget; tum vteri partem sensim repri-

mens

mens, in proprium locum statuet, postea hastulam laneam in fultum pudoris subiciet, atque inde lanam vino adstringenti madefactam superponet, & totum perinæm lana aut spongiis è posca expressis operiet, & alligabit; cruraque mulieris extensa insertim collocabit, ut alterum alteri inequiter aut inieunbat: tutius tamen erit pedes simul vinciri, fasciam usque ad genua deducendo. Nonnulli uterum qui nuper deciderit, cucurbitæ domesticæ & betæ decocto cum urina foetida, aut aceto acri, vel aliqua re foetenti colluunt. At si prolapsus uterus temporis diuturnitate intumuerit, plurimoque humore infarctus fuerit, ita ut tumor reductionem impediat, betarum decocto ipsum irrigamus; deinde acetum circumfundimus, salque tenuissimum inspergimus: postea, ubi detumuerit, eodem decocto colluentes, sicut prædiximus, repellimus; deinde cucurbitulas umbilico & utrisque ilibus cum plurima flamma affigemus, & odorata naribus iugiter admouebimus. Tertia verò die, lana adhuc in pudendo persistente, mulier in vino nigro austero quadantenus tepesacto, aut in myrti, lentisci, rubi, malicorij decocto infidebit. Ac peracta infusione, rursus supina accliuibus coxis locabitur, sublataque è pudendo priori lana, noua iterum eodem medicamento madefacta imponetur. Suminiq; imponantur, cataplasmatibus modo palmula, polenta, malicorium, lenticula cum oxymelite; & alternis diebus, usque ad exactam

curatio-

curationem, permutetur. Atque hæc, tribus diebus interpositis, rursus fient, quoad perfectè vitium discusseris: enimvero vbi vteri crebrò prolabantur, postea abluantur, in eademq. mulier diutius insideat, & deinceps omnia relata fiant. Hæc autem vt per obstetricè fierent mandauimus. Vbi iam in locum vterus reductus esset modo dicto, cucurbitulas duas iam dictas in ilibus figeret, & vnâ magnâ supra vmbilicum, suâ, & vt sequens emplastrum inter vmbilicum & pectinem applicaret: & emplastri ceronei (confert frigiditati matricis) emplastri pro matrice, añ. ℥j. galbani, ammoniaci, añ. ℥j. gummi dissoluantur in vino, fingaturque emplastrum rotundum, quod ventri inter vmbilicum & pectinem admoueat. Interea odorifera iugiter naribus admoueantur, fœtida verò inferius. Obstetrix quoq. vti poterit tali pello: & assæ fœtidæ ℥j. picis colophonix, mastiches, añ. ℥ij. inuoluantur linteo raro, fingaturque pessus, qui filo coxæ alligatus in vterum dimittatur. Cunnus deinde decocto sequenti foueatur: & balaustr. gallar. rhois opsoniorum, rosar. rub. añ. q. v. decoquantur in aqua chalybeata vel cisternæ, & in vino astringente: fiatque vt dictum est. Ei quoq. puluis paulo antè dictus inspergatur, quo vterus exterius eminens inspergendus dicebatur. Interea oportet vt ipsa à vociferationibus, sternutationem mouentibus ac tussim, aliisque immodicis motibus abstineat, ita vt quietè ac tranquillè viuat; & vtatur tenui victu, ne multa recrementa in intestinis colligantur: vtatur itaque cibis boni succi,

succi, & odorato vino ac tenui, sed quia rustica, etiam cereuisia absinthite. Post curationem abstineat à coitu nimio, saltatione, ira, clamore. Quòd si his remediis non curabitur, erit incurabilis. Plura vide Consultatione 222. apud Montagnanam, De exitu matricis.

SCHOLIA.

QUICQUID sit, siue uterus decidat, prolaba- Pars affecta.
 tur, exeat, aut in partem aliam moueatur,
 semper uterus afficitur & laborat morbo in situ. Et sic
 affectus præter naturam pertinet ad morbum in situ.
 Causas autem multas etiam in Obser. præcedente esse
 diximus. Externæ videlicet sunt, si ab alto delapsa sit Causæ ex-
terna.
 mulier, vel ex violenta secundæ extractione, ex abor-
 tu, vel fœtus inartificiosa extractione, ex spiritu de-
 rento, oneris leuatione, vel uteri plaga, offensione,
 vulnere, ob vehementes animi affectus, liberorū amif-
 sionem, hostium incursum, periculosam nauigatio-
 nem; ex frigore, mora in aqua, & similes. Internæ, Internæ.
 humoris plurimi ac lenti defluxus, partuum frequen-
 tia, membranis aut musculis uterum sustinentibus
 resolutis. Signa demonstratiua satis patent, quia ute- Signa.
 rus extra propendet, vel à loco suo motus est; ut in
 Obser. præcedente ostendimus. nam & illud quod pro-
 cidit struthiocameli ouo simile est, iuxta maioris aut
 minoris differentiam, prout violenta euersio contin-
 git. Iuxta Aëtium, in principio plurimus sanguis erum-
 pit; deinde consequitur dolor præcordiorum, lumbo-
 rum, imi ventris, ac pudendorum; & periculum est,
 ne, perfrigeratis locis, conuulsio inferatur: quamuis
 progressu

Causarum
diagnosio.

Prognostica

Historia
Gradi de
muliere sine
matrice vi-
uente.

Beniuenius
cap. 11. De
abditis cau-
tis morbo-
rupt.

progressu temporis, ubi affectio inualefcit, & loci cal-
lofi facti sunt, neque conuulsionis periculū imminet,
neque dolor insequatur, eodem Aëtio teste. At causarum
diagnosio haud egre quoq; haberi poterit, partim ex re
ipso, partim ex agra vel astantium scimone, praesertim
causa externa. Interna quoque, ut si ex humore putri
rberim ex locellis defluit humor. Iam quoque mulier
pituitosa est, desidiosa, primum quoq; saepe vsa fructibus
piscibus. Verum ex quacumq; causa fiat, cum adhuc re-
cens est affectio, curari oportet, ut vterus ipse contrahatur
in principio enim facile dirigitur, & recte locatus
permanet, praecipue in vigore aetatis. In etate prone-
ctioribus contrahitur quidem, sed ex leui occasione rur-
sus prolabitur; ex eiusdem Aëtij testimonio. Si ad latera
tendat, facile curatur. Si extra os vuluae exit, vix cu-
ratur, secundum quosdam. Si longo tempore procide-
rit, nunquam. Si ex succis corruptis, putrefactis, & pra-
cipue ipsa matrice putrefacta, vel ligamentis putrefa-
ctis, frustra curatur. At si processu temporis id quod pro-
lapsum est, computruerit, id ipsum auferetur nullius
metu periculi. Etenim vniuerso vtero ablato, ubi pu-
trefactus fuisset, mulierem nihilominus superuixisse,
narrat Aëtius & Paulus, quorundam auctoritate. Refert
Gradius, se mulierem Papiae ex nobili prosapia, à qua
tota matrix putrefacta frustatim deciderat diuersis
temporibus, cognouisse, & eandem aliquot annis su-
peruixisse. Idem refert Beniuenius de muliere perni-
cioso vlcere vexata ipsius vuluae, ita ut corrupta vul-
ua, & frustulis comminuta descendens, non ante
fluere destiterit, quam tota putrescens deciderit, & ta-
men ipsam 10. annos sine vulua superuixisse. At ob
causam externam, ut occursum aëris frigidi, vel aqua
frigida,

rigide, si in varium pellatur situm vterus in corpore
 ano, remediis calfacientibus vtero admotis, & vento-
 itates carminantibus, facile in locum reducetur: ita
 quoque ab humiditate curari poterit. At ex difficili
 partu, aut fœtu extracto, vel secundina ab obstetrice
 gnata, aut quacunque ex causa violenta ruptis liga-
 mentis, non speratur curatio. Si cancro similiter, cum
 non speretur remissio causæ. Quomodo curetur, iam
 ex parte diximus ex Aëtio, quibus videlicet modis im-
 pellatur, facibus prius eductis, & vrina euacuata. At- Cutatio.
 tamen causa prius inquirenda. nam vbi ob relaxationē
 quæ ab humiditate fit, curatur resiccantibus & astrin-
 gentibus: ita quoque si ex diuturna mora in aquis tales
 ab humiditatem non concipiunt. Nouit tamen Ronde-
 letius pagum in Prouincia, in quo omnes ferè mulieres
 vteri procidentia laborant, & tamen cōcipiunt. Erunt
 igitur curanda eo ferè modo, quo & ani procidentia.
 Si ob humiditatē, inquam, nimiam relaxatio fiat, exic-
 candus est habitus corporis pilulis & medicamentis quæ
 facile alui deiciunt & sine nixu. Nam dum magna
 intentione reddūt alui excrementa, procidit etiam vte-
 rus. Quare vomitio frequens multo esset vtilior, quia
 non solum pituitā euacuaret, sed & vterū sursum at-
 traheret: nam siccat. Quemadmodum vterus in coitu
 deorsum mouetur, vt semen tanquam manu recipiat:
 sic pars ventriculi inferior ad superiorē contrahitur, &
 mouetur, vt id, quod in fundo est, expellat. & dum vē-
 triculus sese contrahit, & peritonēū distenditur, vte-
 rus, & quæcunq. illi alligata sunt, quadam cōsecutione
 retrahūtur. sed antè quā retrahatur, oportet intesti-
 na vacua esse excrementis, vt diximus, itē vesicā; dein-
 de partem extra propendentē hac vel simili decoctione
 fouere:

fouere: ꝛ corticū pini ꝑ.ij. cort. thur. ꝑ.ij. cort. querc.
 ꝑ.ij. betæ, hedera, absinth. añ. m. j. ros. rub. balau.
 flor. stæchad. añ. p. j. fiat decoctio in aqua ferrata, &
 vno adstringente. Cum decoctione foueatur pars, &
 appareat: vel immittatur syringa, vel alio instrumēt
 in partem interiorem vteri. Deinde pessario vel bacul
 pannis inuoluto leuiter & suauiter suo loco repona
 natur. Quod si odores foetidos in summitate pessi au
 baculi inuoluti posueris, & odorata naribus exhibue
 ris, mouebitur facilius, & retrahetur in partem inte
 riorem. Retractione facta, vtendum est fumigio, quo
 partem resiccat & ad superiora eleuabit, sic: ꝛ musc
 arbor. siue vsnea in clibano exiccata, & collecta in
 quercu vel ilice, m. ij. absinthij ꝑ.ij. ros. rub. ꝑ. j. corti
 cum thuris, pini, añ. ꝑ. j. ꝑ. caryoph. ladani puri, &
 hypocist. añ. ꝑ. j. auripigmenti rub. & galbani, assa
 foetide, añ ꝑ.ij. excipiantur terebinthina, & fiant tro
 chisci magni, & per embotum magnum, fumum re
 cipiat, vel canali in vterum deducatur, ipsa in lectum
 decumbente. Nam postquam vterus repositus est suo
 loco, quiescendum est, in dorsumq; recumbendum,
 partibus pudendi alius collocatis. Emplastra cata
 plasmataq; constringentia & resiccantia multum
 supra regionem vteri & renes ponenda; vt: ꝛ vsnea
 m. ij. solior. myrti, vel lentisci, vel summitatum rubi,
 vel quercus, vel piri agrestis, m. j. cortic. querc. mali
 granati, añ. ꝑ. ij. gallarum. spongie bedegaris, bi
 storta, & quinq; folij, añ. ꝑ. ij. centaurij minoris,
 ros. rub. flor. anth. stæchad. saluie, añ. p. j. fiat decoctio
 in aqua cisternæ & aceto: qua foueatur pars cum
 spongiis nouis sero & mane, addendo die quinto vel
 sexto fomentationis salis aluminis, & vitrioli, añ.

3. j. Cum cessabis à fotu, accipe residuum decoct. & pone in sacco, & applica supra renes & ventrem: quibus addere oportet polygoni & herniaria, añ. m. ij. Hunc fotum, iuxta Rondeletium, continuare oportet ad quadraginta dies: postea emplastra adstringentia continuè gestare; qualia sunt, pro matrice, de pelle arietina, & de mastiche, addendo spongiæ bedegaris, & rad. bistortæ, & pul. herniaria, añ. 3. j. in 3. ij. emplastri. Et frequenter pars est fouenda vteri inferior fotu prædicto. Aliquando pars vna vteri relaxatur, quæ dicitur mitra vulgò, apud Gallos la landie, & extra vterum procidit; quod semel vidit idem Rondeletius; & sic curatum fuit malum: R. rad. bistortæ & narcisci, añ. lib. j. solior. hederae m. iiij. summitatum myrti, consolid. absinth. plantag. costli, ladani, polygoni, herniaria, añ. m. ij. ros. siccarum, flor. anthos & stæchad. añ. p. ij. matric. & artemis. añ. m. j. fiat decoct. pro balneo. in ultimo adde aluminis lib. i. salis communis lib. ß. Radices contundantur; postea ad formam cataplasmati reducantur; & applicetur parti affectæ. Quod si ob tensionem ligamentorum inferiorum decidat vterus, non erit inutile, inguinibus apponere vnguenta relaxantia, quale est vnguentum de adipibus, vel resumpt. vel dialib. dissoluta portunculæ galbani in his & assæ fœtida, ut partes relaxentur, & fœtore vnguenti vterus (ut dicebat idem quem suprâ citavi Rondeletius) sursum retineatur, neque ultra procidat.

OBSERVATIO XXXVI.

*De quibusdam uteri præcipitatione
laborantibus.*

PAUPERCVLÆ mulieri, cui uterus proci-
debat, ut galbani cerato vteretur, mandavi.
Quibusdam enim, inquit Benedictus Veronen-
sis, multos per annos vulva procidit, ac per vr-
bem, ut nouimus, ambulant, nec alio vtuntur re-
medio, quàm galbani cerotario. Sed & alteri cui
aduersa vulva erat, iussi ut digito obstetricis cor-
rigeretur: facili enim cognoscitur: nam nec ori
nec ceruici locorum situs respondet, dolorque
ac grauitas in altero sentitur latere; quam cu-
curbitula contrario latere corrigit, imposita à
balneis duntaxat. & ita iussi ut cucurbitulam in
contrario latere poneret: hoc enim modo redu-
cebatur ad suum situm. Verùm mulieri, cui ute-
rus deorsum tendebat, quamuis nondum exi-
tum manifestum fecerat, consului ut malè olen-
tibus subtus suffumigaretur, quo sic sursum tra-
heretur; & ut superius ad olfaciendum odori-
fera naribus obicerentur: & iubebam fieri li-
gaturas dolorosas in brachiis; & supra umbili-
cum ponebam ventosam sine scarificatione.
Guainerius verò in mammillarum radicibus
ponere iubet, & versus quodlibet latus alteram,
& in medio aliam, ita ut supra ventrem tres ven-
tosæ simul sint: & tam diu ista fieri iubet, donec
uterus in proprium locum reducatur; quod ex
accidentium remissione cognoscitur. At alteri
mulieri

mulieri vterus magis solutus, ex materia muco-
sa, plus extra pendeat: quod cum plurimum
accidit, ut antea quoque dictum est. quare ut
humor pituitosus hoc modo digereretur, præ-
cepi: & syr. è stœchade, de matricaria, oxymeli-
tis simpl. añ. ʒj. β decoct. saluæ, maioranæ, cha-
mæpit. artemisiæ, melissæ, calaminthæ, mentha-
stri, añ. ʒvj. fiat syr. pro ij. dosibus. adhuc semel
reiteretur: deinde ita venter solvatur: & pil. scæ-
tid. cochiar. añ. ʒβ. fiant pilulæ vij. vel si portio-
ne delectetur, & florum stœchados, borag. an-
thos, matricariæ, melissæ, añ. m. β. passul. enu-
cleat. ʒβ. sem. anisi ʒij. fiat decoct. in aqua com-
muni, & in ʒij. dissolue diacath. ʒβ. electuarij
indi maior. ʒij. diaphœnici ʒj. elect. elecscoph. ʒ
β. mellis ros. colati ʒβ. misce. fiat potus. Postea
exhibeatur theriacæ vel mithridatij ʒj. Deinde
abluatur vterus cum decocto puleg. calaminthæ,
origani, matricar. meliss. nucû cupressi, & folior.
rhois opson. malicorij. Potest etiã postea venter
spongia immersa super regionem vteri fomen-
tari. Inde, prius cum oleo mastichino & ros.
inunctus, in locum naturalem reponatur. Si in-
ditus fuerit, subdatur pessus ligneus, aut cande-
la molli vellere inuoluta, oleo liliorum, irino, vel
cyprino, intincta, quatuor digitorum mensura,
pro longitudine cervicis. Alij hunc puluerem in-
spargunt: & thuris, mastich. bol. arm. myrrill.
sumach, gallar. omphacitid. cupulorum ros. aca-
ciæ, añ. ʒβ. fiat pul. subtilissimus, quo vterus
aspergatur. Deinde obstetrix inungat manum
suam, & suauiter impellat eundem, muliere ita

situata vt prius dictum est ex Aëtio. Postea ventosa magna sumini apponatur per quartam partem horæ. qua remota, ceratum sequens apponatur, pilis tamen pubetenus prius derasis ac tonsis: & boli arm. sang. dracon. hypocist. stomach. añ. 3ß. corall. rub. glandium ros. rub. myrtill. añ. 3ß. pulueriscentur, & cum pice & resina pini q. s. fiat ceratum in forma quadrata in corio vel aluta, & vteri regioni applicetur. Moretur in lecto; & cum non amplius prosilierit vulua, femora arctius ligaturis contineantur. & si aluus constringatur, vtatur clysteri vel balano. Et vbi iam curata fuerit, vitabit deambulationes, equo aut curru vehi, aut iactari: hæc enim plurimum obsunt; vri & balnearum vsus, ac coitus. quidam tamen balnea sulphurea commendant, vel ferrosa, qualia nunc celebrantur in agro Veronensi Caldariana dicta. Abstineat à cibariis frigidis & humectis, ventosis, quales pisces sunt, olera, rapæ, & similia. Vinum nigrum seu rubrum bibat ex pluuiæ aqua. Et sicuti Venus illis importuna est; ita & sternutamenta, vociferationes, tusses, ac magno conatu aluum comprimere obest. Atque his optimè habuit: tum aliæ plures.

SCHOLIA.

Curatio, si
in latus de-
scendat.

DICTVM est prius quod descensus vteri sit vel cum exitu, vel sine. Si igitur in latus declinet, cognoscitur ex dolore: id etiam ob causam in suffocatione ab vtero dictam contingit interdum; nonnunquam verò ob flatu impellentes. Si à flatibus fiat, cucurbitula

carbitula magna primùm lateri opposito affigatur, in ipsumq; laborans mulier cubet. sequens deinde clyster iniiciatur: & parietaria, althæa, mercurial. añ. m. j. origani, calaminthæ, añ. m. ß. sem. dauci, carui, anisi, fœniculi, añ. ʒ ij. sem. lini, fœnug. añ. ʒ ij. flor. chamæmeli, rorism. meliloti, añ. p. j. coquantur in s. q. aquæ ad tertias: eius accipe lib. j. cass. sacch. rub. añ. ʒ j. benedict. ʒ ß. mellis anthosati ʒ j. ß. olei chamamel. ʒ ij. fiat clyster ante pastum. Deinde utatur rhombis sequentibus: & pul. diacumini, diacalaminthæ, añ. ʒ j. ß. sacch. soluti in aqua melissæ q. s. fiat elect. solidum, in rhombis ponderantibus ʒ ij. detur vnus manè ante pastum, quater in hebdomada. Vbi nondum extra descendat, naribus quoque, vt dixi, apponunt aromatica, vt moschum, ambram, spicam, styracem, & similia: inferius fumigia è rebus malè olentibus. Ilibus verò cucurbitulas imponunt, etiam si excidat, aut vmbilico.

Ex ventositate.

Experimento constat gallinaceum ouum vetustum mirè conferre, quo nihil grauius olet. rupto cortice lana colligitur molli, & ita vuluæ apposita mirè corrigit procidentem vuluam, vel in veteri vitio: sed cauendum est ne odor ille grauissimus corripiat nares mulieris.

Malè olentia.

Id tamen alij cum cautione faciendum esse volunt in mulieribus delicatis, & in quibus viæ ac meatus sunt satis ampli, & quorum virtus sensitiua matricis est multum acuta & sensibilis. quibus & ob eam causam subitò concidunt vires, & syncopen incurrunt, vel dolores tales incurrunt; in talibus ab iisdem abstinemus, & semper incipiemus à foetidis debilibus paulatim ad fortiora; & primò potius imponendo, quàm suffumigando. Sed vbi contenta est materia in locis angustis & intra panniculos, tunc præstat vti suffu-

Cautio de malè olentibus.

Ab partu.

Ab alia
causa.

migijs quæ magis penetrant : primò ex terebinthina
iniecta, vel plumis perdiciis combustis. Fortius est assa
foetida; & fortissimum omnium iam dictum de oua.
Postea tale, vel simile, ceratum optimum & exper-
tum à Bayro apponatur super umbilicū, diu tenendo:
℞ mastiches, ladani, añ. ℥iij. galbani ℥j. gummi stira-
cis ℥ij. confice in mortario cum pistillo calido, extende
super coriū subtile & rotundum. Si matrix descēdat,
& foras exeat, idem Bayrus applicat auenam calefa-
ctam in sacculo. Deinde iubet fieri pessarium ex tere-
binthina abietis, medulla cruris vituli recens liquefa-
cta & colata, opij, croci, ros. añ. pauxillo; imponen-
dum discretè ab obstetrice. Si non propter partum, sed
ex alia causa, spongiam in aceto infusam applica, &
statim restringet egressam. Folia viticæ viridia loco
emplastri apposita, matricē exeuntem cohibent. ita &
suffumigiū ex foliis & ramis buxi per inferius valet.
Sed & bubulum finum appositum laudant, ac aiunt
etiam esse procidentia aluo peculiare remedium. Uteri
verò procidentia si à casu, aut saltu, aut percussione,
aut ob difficilem partum fuerit, prædicta omnia fiant,
quæ antea Obser. 35. ex Aëtio tum alijs diximus, pur-
gatione excepta. Id vitii tamen, ut dictum est antea,
in senectute nunquam serè restituitur, si malū præser-
tim vetus est: in iuuenibus restituitur, si recens fuerit.
Sic cum Maria Theodori, vxor cuiusdam cereuisiarj
Brasserij dicti, valde annosa, & quæ iam multas proles
ex marito susceperat, quæq; difficulter parere solebat,
plurimis annis vteri prolapsu laborasset, cumq; ex me
consiliū peteret, hanc ego curationem in vetula, ut
impossibilem aggredi non ausus fui. nonnulla tamen
præsidia proposuimus, ut saltem mitius malum ferret,
si non

si non integrè restitui. Quod si in principio accitus
fuissem, eadem tentassem, quibus Amatus in vteri
procidentia ex pondere leuato aliquando vsus fuit, quæ
hic pro egregio exemplo adferre libet. Pudicissima (in-
quit) & honesta vxor vicini, nata annos viginti qua-
tuor magnū imprudenter attollēs pondus, in vteri pro-
cidentiam incidit, dolor lumbos inuadit, grauamē circa
ūterov, id est, pubem vel pectinem, magnū persentiebat,
adeo vt deambulare non posset, lotiū continuò mitte-
bat: sed primo die multo sanguine mixtū, secūdo minus
sanguinolentum; tertio verò à sanguine alienum, tan-
quam pus in eo misceretur, in quo tunc eam febris
corripere cepit: quarto in eo multum puris apparuit.
Semper sitiuit, multum fuit anxia, & grauiter om-
nia ferebat, vt vix in cubili perquiescere posset. Ad
quam quum primū perueni, obstetricem accersen-
dam curauī; quam doceo, vt leuiter matricem, quoad
fieri posset, ad locum reducat, deinde illico locellos hoc
dicendo lauacro proluat, quod habet: R. ros. rub. fo-
lior. plant. corrigiolæ sanguinaria dictæ, añ. m. j. in
aqua fiat decoct. quousque aqua subrubea fiat. facta
colatura, adde mell. ros. colati parum, misce, & fiat
lauacrum, quod calidum per insectarium eiaculaba-
tur. non minus, caput decline, & crura maximè ele-
uata habeat semper, suadeo. Sed & moschū & Zibet-
tum galliāve moschatam, ac res bene olentes nari-
bus, veluti graueolentes pudendo admonendas mando.
Graueolentia siue fœtida medicamenta sunt galbanū,
pennarum vstarum fumus. Iis tantū duobus primis
diebus peractis, & fœcibus per clysterem depositis, ter-
tio die sequenti mel rosaceum colatitium prædicto de-
cocto in maiori quantitate addo: nec enim potentio-

Cent. 1. Cu-
rat. 14.
Historia
procidentie
vteri ex
pondere
eleuato.

ribus medicamentis astrictorius opus erat, ob apparens
pus: timor enim erat ne obclusum vlcus malignius
inde redderetur, ob incarceratam materiam. Quarto
verò die multum puris in vrina exiuit: sed quinto mi-
nui capit. proinde tunc somentum ex balaustis, myr-
ro, hypocist. ros. rub. & sem. sumach, in vino rubro
austero parare feci, quo vterus optimè lauabatur, &
spongia eo imbuta pecten & pudendum fouebantur.
& intus quoque in sinu lana vino illo imbuta adapta-
batur. Octauo verò cucurbitulas magnas duas vmbi-
lico multa flamma ignitas affigendas iussi: post quas
illico ceratum hoc descriptum subueniri, id est, pubi,
apponendum curavi, quod habet: R. mastiches, thuris,
ladani, sang. dracon. añ. ʒ ij. gallia moschata ʒ j. tere-
binth. cera, resina, añ. parum, & ad ignem fiat cera-
tum, & super corium alutam dictum extendatur,
vel melius super pannum cocco intinctum, & calidum
admoueatur. quibus rectè habuit. Ceterum à motu,
& rebus sternutamentum irritantibus, illi per quin-
decim dies interdiximus: veluti à vino, & rebus calidis:
nam victus rationem subtilem præscripsimus. porro ab
aque potu, quantum possibile erat, Hippoc. consilio,
eam arcebamur: sed primis diebus halycacabi (alke-
kengi, Officina Mauritanica voce appellant) aquam
bibendam propinauimus.

OBSERVATIO XXXVII.

*De vteri stillicidio, cum imbecillitate ac in-
temperie frigida & humida eiusdem.*

MULIER Alcmariana, extra portam qua
Harlemum itur habitans, valde pallida
&

& cachectica, multo tempore vteri stillicidio laborabat, cum eiusdem imbecillitate & intemperie frigida atque humida. cui cum vtilissima remedia præscriberem, & non statim ab eo malo liberaretur, ad varia etiam tonsorum remedia confugit, & illius itidem Iudæi Empirici, qui ob facinora deinde Leydis flagellatus fuit. Ceterum hæc tandem, remediis ad malum non facientibus, ad vteri ulcerationem deuenit, qua multis annis adhærente, tandem miserè vitam finiit.

S C H O L I A.

SANGVIS in hac muliere stiriatim excernebatur: Menstruorum stillicidium.
Sab Aëtio id dicitur etiam menstruorum stillicidium; quando videlicet cum grauissimo dolore intimas partes opprimente, sanguis ita stiriatim excernitur. Pubi apponit lanam vino & rosaceo madefactam, vel vesicam oleo calido plenam, sæpe & fomenta ex lentibus confecta; & in principio, si dolor perstiterit, & vires ferant, cubiti venam secatur: cataplasma, si perseuerat, è sem. lini, pane, & aqua mulsâ paratum applicat. in seſiones ex alth. sem. lini, scœnugr. anethi, rutæ, artemis. adhibet. si inueterauerit, pectîni atque inguinibus cucurbitulas cum scaris. imponit, & balneis naturalibus vitur, vt apud eum videre licet, lib. 16. cap. 65. Habet enim aliquam similitudinem cum stranguria & dysuria. Iam quoque vt aliæ partes, ita & vterus debilitatur, vt ex eodem constat, lib. citato cap. 75. Accidunt iis, Sorano attestante, Veneris fastidium, flatuosi spiritus excretio, menses exuberantes, bis aut ter singulis mensibus inordinatè delati,

Vteri imbecillitas.

P 5

nigri,

Vteri reso-
luto.

nigri, & aquosi; neque semen viri injectum diutius detinetur, sed à concubitu defluit, aliis confestim aliis post aliquot dies; quadam trimestrem foetum abortiuntur: quæ verò non abortiuntur, gracilem imbecillumq; foetum generant. Hac ipsa cerè cum & humidam & frigidam intemperiem haberet, nunquam concepit: quod etiam contingit illis quæ uterum resolutum habent; quamvis ob multas causas; sed præcipuè, ut idem Aëtius refert cap. 77. ob frequentius repetitos abortus: cuius curationem similem etiam ait cum menstruorum stillicidij; & præcipuè confert castorij assidua potatio. At de intemperie frigida & humida postea agemus, cum de conceptione dicturi sumus. Sed cum hæc nacta esset Medicos imperitos, uteri subsequente ulceratione, ex remediis minus aptis, ut arbitror, tandem miserè perit. non mirum, cum grauias essent accidentia, quæ Medicum peritum, ut rectè curari posset, exigebant. De uteri ulceribus postea dicturi sumus.

OBSERVATIO XXXVIII.

*De spiritu in utero collecto cum gra-
uissimo dolore.*

VXOR mea charissima, Eua Teylingia, post consuetam mensium purgationem, cum se non bene tueretur, uterus eidem spiritu impletus est cum intolerabili cruciatu & dolore; qui à pectine, ob uteri inflationem, imoque ventre ad septum transversum & inguina excurtebat, ut penè dolore enecaretur, nec posset vel crus, vel se ipsam in ullam partem mouere. Eo dolore mense Iunio, anno 1560. suborto, & adedò crescente ut ferè pro mortua haberetur, sanguinem, licet Paulus & Aëtius hoc suadeant, ausus non fui

ui detrahere, ob debilitatem. Depositis verò ex-
 rementis per glandem, quod agrè admisit, de-
 coctum florum chamæmeli, pulegij, & sem. dau-
 ci, anisi, carui, fœniculi, artemisiæ, pauco inie-
 cto oxymell. propinavi, & sacculum ventri ap-
 posui concinnatum ex floribus chamæmeli, me-
 liloti, furs. cumino, ruta, paratum. Clysterem
 iniicere non potui: nam si leuiter se moueret, in
 syncopen cadebat: à qua cùm excitata esset, ac
 proba matrona Heutera, eius cognata, de nocte
 ad eam venisset, chirothecas habens perfuma-
 tas moscho; mox præfocata pro mortua habeba-
 tur. Sed illico remotis chirothecis (matrona enim
 me hercle proba statim eas reiecit) plumisq. cō-
 bustis ad nares appositis, & cerato ex galbano
 vmbilico appposito reuixit. Dolor tamen in imo
 ventre, neque vng. emplast. ex baccis lauri, nec
 fomentis sedari potuit. At quia aluū non depo-
 nebat, dedi ꝑ j. β. mannæ selectiss. cum iure pulli,
 & optimè excreuit; & quod mirabile erat, vti &
 in aliis animaduerti, ex pudendo spiritus erum-
 pebat. tandē, miraculi instar, sacculis denuo ad-
 motis, & sæpius diacumino ac diacalamintha
 deuoratis, præter omnium opinionem vxor mea
 dulcissima sanitati restituta fuit.

SCHOLIA.

VVLVA, inquit Aëtius lib. 16. cap. 80. interdum *Causæ infla-*
 à partu refrigerata, spiritu impleri solet, siue os *tionis veri.*
 eius claudatur, siue grumescere sanguine obstruatur.
 Idem & Paulus refert lib. 3. cap. 70. Alij addunt, &
 post vsum balnei aut stuphæ, aut mensium purgatio-
 nem, posse fieri; vt vxori mea contigit; aut quia flatus
 in

Signa.

in toto corpore collecti sunt ob calorem imbecillum. Post partum verò, si emissio partu, ventrem non comprimant, nec ab aëre se tueantur: ita & post purgationem. Ob id mulieres nostræ fasciis se constringunt ut uterus in sese concidat, nec recipiat aërem. Post balneum, si sese aëri exponant: ita & post stupham. Aliàs spiritibus, inquit Paulus, in concavo ipsius spatio conceptis, aliàs vteri corpore rarefacto, tumor pubis & imi ventris comitatur, cum dolore pulsatili, quæ ad septum transversum vsque & stomachum inguinæq; pertingit, ac sonitus digitorum impulsu tympani modo redditur. Idem ferè habet Aëtius. Spiritus, inquit, sæpe in vteri cavitate colligitur; sæpe in sinu, qui sensui patet, nec rarò inter cacos meatus coërcetur. Affectum sequitur pectinis tetiusq; suminis tanquam tympanita hydropis, tumefactio sequitur; doloresq; punctiois sensum inferentes, qui vsque ad stomachum & septum transversum perueniunt, ac nihilominus utrimque in lateribus extenduntur: sæpeq; alteri inguini, interdum utrique, interdum & umbilico, lumbisq; ac pectini dolor communicatur, cui caput quoque assentitur: nonnunquam spiritus efflatio per muliebrem pudendum erumpit, ut ab agris percipitur. Si ergo spiritus in vteri cavitate collectus fuerit, gurgulationes ac sonitus quidam in corporis flexu audiuntur; quales intestinis accidunt, quæ torminibus vexantur; impulsuq; digitorum sonus tympaniticus redditur. At ubi flatus intra cacos totius vteri meatus aggregabitur, dolores vehementiores, ac curatio difficilior infestant. Flatus enim in cavo locellorum sinu contentus facilius discuti digeriq; potest, quam ille qui in angulis ipsorum consistit. At qui locellorum villis

Prognostica

illis & substantia haeret, difficillimè curatur. Quod à partu fit, & citò succurratur, facile sanatur. Alioquin si non statim succurratur, difficulter. Scribit Aesculapius, multas se vidisse mulieres, quæ adeò magnos ventres ob flatum in utero collectos habebant, ut hydroica viderentur. Auxiliatur ergo primum, iuxta Pauli Curatio. um, sanguis demissus, si nihil obstat, ac nisi aras & anni tempus, secundum Aëtium, obstiterint. mox in accessibus inedia uteris, & olei dulcis calidi irrigatione, in quo rutam & anethum decoxeris; vel oleo rutaceo, in sessione quæ ex ruta, pulegi, artemisia, cassia lecto, vel calamintha, prassij, thymi, artemisia, althææ, & carycarum, iuxta Aëtium. Iuuant & cataplasmata ex sem. apij, cumini, fœniculi, anisi, ammeos, farina lolij. Ad hac curbitula tum leues, tum cute incisa affixæ. Ac si diutius vitium se prorogauerit, purgatio ex hierapicra utilis est, vel Ruffi, Archigenis; etiam ex Aëtio: dropaces, synapismi, & aquæ naturales. Obstetrix autem prius digito peruncto inserto grumum incumbentem, si contingat, auferet, leuiter ipsum dissipans; rursus quæ admouebit cataplasma ex ficu, nigro, & absinthio. Reliqua vide apud Aëtium & Paulum locis citatis, & quales pessi sint adhibendi. Interea & alimenta attenuantia & flatum discutientia exhibebimus, & diospoliticon, & diacalaminthum. Sed clarius ex exemplo sequenti innotescunt.

OBSER-

OBSERVATIO XXXIX.

*De uteri inflatione cum insigni dolore post
abortum oborta.*

MVLIERI Alcmarianæ, cū abortu
passa esset, purgatione subito restricta
cū se citius vento exposuisset, venter inferio
ita in tumorem eleuatus est, vt de hydrope au
tympanite metus esset, cum tanta torsione &
dolore acerbissimo, qui inguina & totum ven
trem occupabat, vt ipsa colicū dolorem esse pu
raret. Sed ego omnibus animaduersis, spiritū fla
tulentū in vtero existentem, horū symptomatu
causam esse percepi. Quare cū alius etiā restri
cta esset, clysterem statim iniicere iubeo: & florū
chamæmeli, meliloti, summitatū anethi, artemi
siæ, parietariæ, añ. m. j. maluæ, m j. ß. sem. fœnug.
anethi, anisi, añ. ʒ ij. sem. dauci, cari, añ. ʒ j. ß. rad.
althææ ʒ j. fiat decoct. in aqua communi pro lib.
j. col^æ adde benedictæ laxat. hieræ picræ, añ. ʒ ß.
olei anethini, chamæmel. rutacei, añ. ʒ j. salis ʒ j. ß.
fiat clyster. quo egregiè cum vëtositatibus emis
sis aluum deposuit. Cum residuo decoct. forus
cum spongia fiebat circa pectinem & inguina;
etiam loco inuncto oleo rutaceo, liliaceo, & ane
thino, postea etiam cheyrino: deinde exhibui
diacuminum. Etiam purgata ex hiera, adhibui
quæ menses euocarent, & simul flatus discute
rent. sacculis quoque ventri imo apposis ex pu
legio, artemisia, matricaria, meliloto, & floribus
chamæmeli. Etiam per os accepit diacurcuma:
& tandem bene habuit. Alioqui dedissem, vti
præceptor

receptor meus Elideus mulieri exhibuit, try-
heræ magnæ ℥ β. aquæ matricariæ ℥ viij. dedit
utem duabus vicibus, & dolor ac inflatio cessa-
uit, quæ eidem euenerant post quartū mensem à
partu mortuo, cum non esset bene purgata. Ve-
niam tamen tali incidit: primò tamē duabus cu-
curbitulis in ribiis positis cum scarificatione,
quod cum nō satis efficax esset præsidium, saphenā
aperuit; & dolor cessauit, mox fluctibus mēstruis.

SCHOLIA.

PRO causa quæ hanc inflationem vteri gignat, præ-
sidia adhibenda. Quibus enim flatus ob cruditatem
sensim in vtero generantur, vel in toto corpore, licet ij
minus molestare solent, tamen statim expedit in hac
specie pituitam euacuare, aut crudos succos frigidos, à
quibus eleuantur flatus, & corroborando calorem na-
turalem ventriculi, & omnium partium naturalium;
discutiendo deinde flatus genitos & collectos in hunc
modum: ℞ mellis ros. colati, syr. è stæchad. añ. ℥ j. syr.
de artemisia ℥ iij. aquæ absinthij, artemis. apij, petrosf.
añ. q. j. fiat syr. arom. cum ℥ j. diagalagæ. His pilulis vel
similibus purgetur: ℞ pilul. aggreg. cochiar. añ. ℥ j. agar.
trochis. ℥ β. fiant pilule cum syr. de byzantiis. dentur
post mediam noctem cum custodia. Altero die capiat
℥ j. theriaca vel mithridati; & inungat ventrem &
inguina cum oleo nard. rutaceo, anethino, & appona-
tur emplastr. de baccis lauri, quo Galenus utebatur: &
fiant sacculi ex milio & sale torrefacto flatus absorbant
& discutiunt, adiect. sem. calidis maioribus & mino-
ribus. Si autem à partu fiat, non opus est purgatio-
ne per pilulas, aut alia medicamenta; quia sufficit

Si ex crudi-
tate sensim
in vtero
fiant flatus,
quomodo
curentur.

Si à partu
fiat.

illa

Si suffoca-
tio accedat.

Si fiat à
balneo.

illa purgatio naturalis, quæ fit per vterum: quæ non fuerit, est prouocanda, & inuanda pessariis attrahentibus, & cucurbitulis apposis in coxis, aut alijs remedijs præscriptis ad menses retentos. Et si venia ex retentione menstruorū, etiam ij prouocandi erunt. Pessaria ex benedicta & alijs flatus discutientibus sunt valde ex vsu, & constrictio ventris per fascias. Cataplasmata conducunt ex stercore ouis vel vaccæ, vel capræ, additis quibusdam flatus discutientibus. Sic R. stercoreis vaccæ lib. i. cumini ℥ ij. seminis apij, petros. añ. ℥ ij. mellis cocti parum, vini maluatici q. s. misce fiat cataplasma. Iam si post balneum aut stupham fiat ex aëre frigido, aliquando motus adest, aliquando quies. Et cum mouetur hac & illuc, potissimum sursum, suffocationem vteri facit: tunc succurrendum erit remedijs præscriptis ad suffocationem, vt in vxore mea fecimus. Aliquando quoque si à balneo vel stupha id accidat, sterilitatem adfert, propterea quod partes relaxatas (vt Rondeletius dicebat) aër frigidus condensat, & internam vteri regionem, & ora claudit, per quæ semen à testiculis descendit in vterum, per eius cornua. Etiam à partu, absoluta mensium purgatione, optimum erit iniicere clysteres, qui fiebant ad sedationem doloris colici, & ex oleis discutientibus flatus, & ex decoct. sem. calid. maior. & erit vtilissimum parum exhibere ex confect. arom. ros. & tabul. vnam diagalangæ; & decoquere piper in eius iusculis, & alia quæ dicta sunt loco De colico dolore & flatibus. Si fiat à balneo, eodem modo curare oportet, discutiendo flatus topicis remedijs descriptis. Quod si opus esset aliqua euacuatione, ob cacochymiam, vel cruditatem ventriculi, dentur pilul. de arom. vel hieræ simpl.

*simpl. In omnibus his causis maximè conferunt pul- In omnibus
ueres flatus discutientes & resiccantes, si post eorum causis.
assumptionem, parum vini maluarici bibatur. Su-
mendendi autem ante pastum potius, quàm post. Item
cucurbitula magna cum multo igne (facta prius eua-
cuatione recrementorum alui per clysterem aut pilul.
aut aliter) si non adsit suffocatio vteri, supra umbili-
cum adhibita, plurimum prodest. Quòd si suffocatio
adesset, admoueatur inguinibus cum multo igne, vt &
reuocetur, & flatus absumantur.*

OBSERVATIO XL.

De intenso vteri dolore.

CUM intenso vteri dolore ex frigore contra-
cto mulier laboraret, nihil quicquam huic
magis profuit, quàm castorij \mathfrak{z} ij. cum vini Rhe-
nani exiguo sumpti. sed & alteri puellæ, cui cum
dolore ventositas admixta erat, pulueris rad.
gentianæ ad \mathfrak{z} j. cum vino generoso. Nihil enim
æquè dolori subuenit, vt rectè dixit Benedictus
Veronensis lib. 27. cap. 2. quàm castorium, si ex
frigida fuerit causa, siue potum, siue illitum: ita
& gentiana trita mirè prodest ex vino calefacto
pota, si ex vento fuerit: nam & imminentem ar-
cet dolorem. Præceptor meus Benedictus Fa-
uentinus in sua Empirica, vbi dolor vehemen-
tior infestaret mulierem, & timor esset de de-
bilitate virtutis futura, sequens remedium seda-
re dicebat dolorem matricis: & philonij Roma-
ni \mathfrak{z} j. diacumini, diagalangæ, añ. \mathfrak{z} β . misce. &
Q fiat

fiat bolus, qui detur patienti, qualibet hora doloris. sed oportet habere rationem causæ, vt in Scholio latius. Plura vide apud eundem loco citato.

SCHOLIA.

Varius vteri
dolor.

DOLET feminarum vterus aut ex mala habitu-
dine, aut vento, vel inflatione maximè, (vt
iam dictum est) vel spiritu incluso, aut humore ex-
tendente, aut erodente, vel si ex eo vapor intus pro-
generetur, eo modo quo in colicis fieri solet. Id vitium
vetulis, ac præpinguibus sæpe euenit; vel contrà ad ma-
ciem nimiam tendentibus. tum inguina, & ilia, &
crura, cum spina dolent, & præcordia, imò quoque
venter, malè habent, ac sinciput ipsum dolet. Vidit
aliquando in eo affectu Benedictus Veronensis nigre-
dine dimidiâ linguam tinctam diu perseuerasse: ischia-
dicos item dolores haud dubiè excitasse affirmat. Cu-
rabitur hic dolor iuxta causam: si cum ventositate,
vti inflatio. Si adsunt humores, illi quoque parandi &
educendi: si erodentes, contemperandi, & mox leui-
bus educendi, iam quoque ex vtero per decocta infusa
conuenientia iucundè extrahendi, prout frigidi vel
calidi sint. Id quidam cum tripolij, zinz. cassia, cinna-
momi, añ. ʒj. cum artemisia decocto epota faciunt. vel
lana apposita illo decocto iniuncta, vel elleboro (sed for-
te est) aquas inde trahunt. Si ex caliditate procedat,
muliebri lacte ex lana imponunt & mitigant. Vel, si
opus est fortiori medicamine, cum hyoscyami decocto,
vel succo, iniecto sedatur; vel papauerino, vel malua
decocto. Iuuant & infusiones. Vtiliter supponitur
ouum

uum ex lacte equino, exiguo croco addito. Ladanum quoque Galeni emollit & dissoluit, & suauiter adstringit. Oleum lentiscinum, lilinum, violaceum, luteum, probantur. In frigidis castorium, ut dictum est, & bacca iuniperi matura in potu. cinnamomi, galangæ, zedoariæ ex vino 3 j. Salutares in sefiones fiunt ad locorum cruciatu, quæ habent maiorana, ocymi, artemisia, abrotani, fœnug. brassicæ, sem. lini, meliloti, chamæmeli, omnium pares portiones: eas ex aqua seruescito. Sed & nepita, pulegium, lauri bacca & folia, maiorana, artemis. fœnug. semen vel herba, lini semen, sed lauri folia per se imbrice calefacta sacculo subdita valent. Aliqui prioribus fomentis addunt anethum & althæam, sesami semen. Dolores verò à partu sedantur schœnantho ex aqua decocto, donec dimidium supersit, ita ut loci foueantur, & decoctum bibatur ternis cyathis. Addi iubet Dios. ficus præpingues, vel carycas cum fœnug. nam & alia vulnæ vitia sanant. Dolores ex vento discutit semen cumini aceto maceratum, deinde torrefactum cum ammeos sem. ac Zinz. & castorio. sumuntur singulis diebus obolorum duum pondere. Reliqua vide apud præceptorem meum Benedictum Fauentinum in sua Empirica cap. proprio. quibus addas supradicta de vteri inflatione. At vteri vulnera quæ etiam dolorem inferunt, ad Chirurgiam pertinent. de his vide harmoniam Gynæcorum cap. 31. quæ ex Moschione & Cleopatra decerpta sunt.

OBSERVATIO XLI.

De vteri inflammatione.

MVLIER quædam ex infima plebe, cum a viro calcitrone supra anum ventrem circa vteri regionem egregiè percussa esset, paulo post valde doluit, ita ut lotium difficulter redderet, febrisque ingens mox suborta est. Sanguinem tamen per vuluam non demittebat: dolebat autem capite; ceruicis nerui, digiti, collumque pariter distendebantur; & dolor ad ventriculum usque eleuabatur, pulsusque parvus ac frequens aderat, & plurimum vniuersus vterus dolebat. Ad quam aduocatus, hæc animaduertens, dum excrementa alui etiam detinerentur, inflammationem vteri esse percepi: ideo illico venam axillarem in cubito incidere iussi, iuxta Arabum & etiam Græcorum decreta, (de qua re latius suo loco) cum ægra satis robusta & sanguine repleta foret. Cumque aluum non deponeret, mox clysterem mollem præscripsi ex decoct. maluæ, viol. lactuæ, prunis, cum cassia & oleo violaceo. Interea vterum & locum dolentem & pubem cum oleo ros. myrteo, & modico aceti fovebam. Altero die, cum difficulter meiceret, & lotium tinctum esset, dolore crescente, sanguinem quoque ex saphena ut chirurgus me præsentem detraheret imperavi. Interim tenuissimo victu contenti, solo hordeato, & potu pitisanæ vulgaris, iulebo sequenti utebamur: & syr.
de

de end. ex infus. ros. rub. añ. ζ j. β . syr. viol. nym-
phææ, añ. ζ β . aquar. borag. cichor. end. lupul. añ.
 ζ iij. misce pro quatuor dosibus. Interea primis
diebus, dum in principio essemus, ad repellentia
accedebamus; etiam ad iniectiones quæ citius
parantur quàm cataplasmata, ex oleo ros. myr-
teo, (vt diximus) cum aceto, adiecto pauco suc-
co plantaginis. Postea & cataplasma tale impo-
nendum duximus, quo & Gal. utebatur 2. Ad
Glauc. ex succo semperuiui, sapa, vino austero,
farina hordei, & balauistiis, vel ex cortice mali
granati. Et ita in partem internam iniicimus,
præter iam dicta, etiam aquam plantaginis, vel
solatri. Deinde quia aliquid resudat à parte in-
flammata, his admiscuimus decoctum hordei,
vel parum sacchari ros. & infundere iussimus
per metrenchytram per obstetricem. Sic & se-
rum lactis ad deterfionem, & lac recens mul-
sum ad doloris sedationem facit. Cùm in au-
gmento essemus, cataplasma digerens & repel-
lens & dolorem sedans apposuiimus, prius qui-
dem ex mica panis cum lacte cocti & oleo cha-
mæmel. paratum; deinde sequens quod dolo-
rem sedaret & digereret: α rad. althææ, folior.
maluæ, viol. añ. m. j. flor. viol. chamæmel. melilo-
ti, añ. p. j. fiat decoctio. contendantur herba &
rad. & per cribrum transmittantur, his aliquid
decoctionis addendo, & farinæ hordei qr. j. sem.
lini qr. β . olei ros. qr. j. Misce. fiat cataplasma.
Postquam constitisset defluxio, & dolor vtcun-
que remissus esset, quæ potentius digererent su-
pra partem apposui, cataplasmati superscripto

Q 3

addendo

addendo farinā fabarū, vel has herbas vtero destinatas: & rad. lilior. & bis maluæ añ. qr. j. maluæ m. j. artemisæ vel matricariæ m. ß. flor. meliloti, anethi añ. p. j. fiat decoctio vt suprā dictū est; cōtundantur; quibus postea adde farinæ fabarū & hordei, añ. qr. j. pingued. porci ꝑ. iij. butyri recentis ꝑ. ij. olei chamæmel. & lilior. añ. ꝑ. j. ß. misceantur; & fiat cataplasma. Tunc enim magis detergentia admiscemus; quia id quod resudat à parte affecta, si retineatur, maiorem inflammationem excitat. Et quia hæc pars facilè scirrhum patitur (quòd caro eius densa sit, & defluxiones acceptas pertinacissimè seruet) diutius non est vtrendum (vt Rondeletius quoque rectè admonerat) repellentibus, ne ob congelationem scirrhus fiat. Proinde in declinatione malactica addenda sunt; vt emolliatur, & crassum discutatur & euacuetur. suprādictis igitur adieciimus farinam seminis lini & fœnugræci. Aëtius farinam hordeaceam cum fœnug. & lini semine in aqua mulsā coctam imponit, aut carycarum decoctum adhibet, ac pessos subdit, si calorem ferre possint, ex æsypo, butyro, medulla ceruina, adipe anserino, oleo anethino, chamæmelino, seu irino, & cera, compositos. Ceterum butyrum, medulla & adeps, omnia recentia ad pessos diligenda: etenim antiqua dum liquantur, nidorosa sunt, ac calidiora euadunt, & inflammationes exacuunt, vt liquet ex eodem Aëtio. Post hæc remedia, emplastra digerētia ex lachrymis multum laudantur, vt quicquid est in parte discutiant & euacuent. Nos emplastra de meliloto,
de

mucilag. & ammoniaco in fine apposuiimus; & facta est resolutio, nulla duritie permanente. Sed, quod ferè omiseram, post quartum diem cum febris atque dolores mitigarentur, pro purgatione dedi ℥ j. cassiæ recens extractæ dissolutæ in aqua viol. borag. artemisiæ, añ. ℥ j. syr. viol. ex multipl. infus. ros. añ. ℥ β. quibus probè aluus reddebatur. Nam hîc nullo modo medicamenta laxantia quæ attrahunt danda sunt, ut quæ ad partem affectâ magis trahant. Sufficit enim his (non tamen in principio, sed postquam dolor aliquo modo mitigetur) syr. viol. ex multis infus. ros. cassia, vel manna, & lenientia tantùm sine attractione. Atque his sanitatem recuperavit.

S C H O L I A.

VEL UT reliqua corporis partes, ita quoq. uterus inflammatione laborat; idq. pluribus ex causis, ut referunt, Paul. Ægineta lib. 3. cap. 64. & Aëtius lib. 16. 85 De uteri inflammatione ex Philumeno: nempe ex ictu seu percussione, mensium retentione, frigore, & inflatione; adeoq. ex abortu; item ex foetu sinistra edito; ulceratione, concubitu metas rationis excedenti, sella nimis dura in sessione, longissima intensissimaq. deambulatione; saepe & transpiratione ob frigus prohibita, uteri inflammatio contingit. Est enim multum uterus inflammationibus obnoxius, cum eò multus sanguis fluat ad mensium purgationes, vel post partum, qui retentus parit inflammationem. Retinetur autem propter aeris circumstantis frigus, aut propter frequentem cucurbitularum appositionem supra uterum. Fernellius phlegmonem fieri ait tenui feruidoq. sanguine è vena cava per tenues venas, non in uteri capacita-

Causæ inflammationis uteri.

Q 4

tem,

Externa
causa.

Internæ.

Signa.

rem, sed in illius substantiam effuso: qui collectus ac-
census ac putrescens phlegmonem parit. Cause itaque
sunt vel externa vel interna. Externa, velut ictus,
sive percussio, multitudo coitus, vel laboriosus, ex
membro inepto, pessus acutus, abortus, partus violentus,
aut innaturalis, vel sinistrè editus foetus, obstetrix
inepta, ventosa posita supra inguina vel regionem
uteri, corpore impuro existente, nullaq; diuersione
pragressa, durioris sella in sessus, longa intentaq; am-
bulatio, flatus frigiditasq; astringens. Interna verò, ut
mensiu suppressio, totiusq; corporis plenitudo, ut dictu
est, & uteri exulceratio. Neoterici volunt, ex omni-
bus humoribus fieri posse, modò per collectionem, modò
per defluxionem ad uterum. Verum ad partis affecte
dignotionem ut accedamus; comes huius inflamma-
tionis est, iuxta Paulum loco citato, febris acuta, dolor
capitis, tendinum, basis oculorum, brachialis, digito-
rum, & colli conuulsio, inclinatio in aduersum, sto-
machi ex consortio dolor, oris vulue conuiuentia,
pulsus exigui crebriq;. Febris autem hanc inflamma-
tionem sequitur, ut in aliis inflammationibus inter-
nis, propter maximum consensum cum corde per ar-
terias. Hanc etiam indicabunt, inquit Aëtius, mulie-
brium locorum, pubis, suminis, lumborumq; arden-
tes dolores; & si digitus in os uteri imponatur, occur-
rit tangenti durum, clausum, feruidum, retractum;
praesertim si in ipso aut in collo fuerit inflammatio.
Nam licet oris uteri compressio commune signum con-
ceptionis, & tumoris praeter naturam sit; id tamen
ex duritie distinguitur, ut patet apud Hippoc. &
Gal. aph. 51. & 54. 5. lib. Molle siquidem est grauidis
& secundum naturam, durum verò in quibus praeter
naturam

naturam est tumor. Cum itaque os vteri inflamma-
 tio affligit, in abdomine dolor est, digitoq; immisso, os
 occurrit durum ac rigidum. Plerumq; etiam vterus
 in eam partem declinat ac retrahitur, qua inflamma-
 tus est, & ob eam causam os & collum eius auerti-
 tur. Et vbi cavititas, seu fundum vteri fuerit inflam-
 matum, in umbilico potissimum dolor cum tumore
 infestabit, ut ne contactum quidem foris admittat.
 Differt autem ab ea quam superius vteri retractionem
 propriè appellari diximus, quoniam cum inflamma-
 tione vehemens est febris, & ardor intensus. At si non
 vniuersus vterus, sed pars eiusdem aliqua inflamma-
 tione fuerit obfessa, in ea magis dolor intenditur &
 sentitur. Nam si posteriora eius, iuxta eundem Aë-
 tium, inflammatione laborant, dolor lumbos affligit, ac
 spinam magis; & sterqus recto intestino (compresso
 eo) retinebitur. Anteriore autem parte inflammata,
 dolor pubem occupabit, & stillicidium, aut vrinae diffi-
 cultas (pressa vesica) excirabitur. Lateribus verò vteri
 inflammationem expertis, inguina tenduntur, & cru-
 ra grauantur, ac agrè mouentur, & quibusdam cruris
 ipsum, quod è regione est, per incessum claudicat: quin
 etiam in coxam dolor transit; eiusdem quoque partis
 dolor cum grauitate non nihil significare potest, Gal.
 teste De loc. affect. Comitantur autem vteri inflam-
 mationem, prater iam dicta, tumor ac dolor eiusdem
 haud validus, si languida fuerit inflammatio; vehe-
 mens verò, vbi valida fuerit; eritq; is dolor, ut dixi-
 mus, quem percipiunt egrotantes, pulsatilis, Paulo
 teste; secundum vniuersum, vbi vterus totus fuerit
 inflammatus; aut secundum partem, si pars ipsa fue-
 rit affecta; tum illa qua paulo antè diximus. Iam vbi
 Q 5 magis

Signa si os
 vteri in-
 flammetur-

Si vteri ca-
 uitas fuerit
 inflamma-
 ta, signa.

Posterioris
 vteri partis
 inflammatae
 signa.

Anterioris
 signa.

Signa si la-
 tera fuerint
 inflammata.

Signa in
 languida vel
 valida in-
 flammatio-
 ne.

Augescentis
inflammationis
signa.

Cur febres
vehementes
hic fiant, &
dolor capitis
in sincipite.

Causæ quo-
modo di-
gnoscentur.

magis augeatur, consequuntur, animi deliquium, ex-
lucio, singultus, pedum torpor, genuum perfrigeratio.
& extremarum partium exudatio, vrinaq; ac sterco-
rum recrementa supprimuntur, & dentibus frendent
agrotantes, & febres magis augentur, praesertim sincipitis
dolor, vt ab Hippoc. & Gal. 6. De morb. vulgari-
bus scriptum est. Eadem quoque habet & Aëtius. Cum
nimirum inter omnes corporis partes, plurimas gran-
dissimasq; venas vteri habeant, phlegmone vtcunque
ipsis orta, calidas vehementesq; febres accendi opus
est; aded vt inter synochorum species connumeranda
sint; cum ex putrido sanguine excitentur, ex quibus
calentium vaporum copia ad caput subuolat (vt recte
etiam Donatus censebat) quo dictorum vaporum ple-
no, grauitates, & maximè in sincipite, agram vexant,
tum quoniam recta in sinciput per infundibulum ar-
teriae deducuntur, per quas calidi illi vapores ascen-
dunt; tum quod etiam sanitatis tempore tenuia, &
halitiosa excrementa cerebri maximè per sinciput
diffuari solent, cum in ipso sutura laxissima sint, calua-
ria subtilissima, plurimisq; meatibus peruia. Ad hac &
multa sensibilia corpora per suturas euadunt, tum
membranula, qua crassum inuolucrum pericranio
connectunt, tum etiam multitudo tenuium concepta-
culorum per suturas exiliunt: & propterea cum sen-
sibilior sit locus, hinc ab inferentibus dolorem causis
magis cruciatur. His itaque de causis in sincipite ma-
gis dolores fiunt, ex Gal. sententia eodem 6. De morb.
vulg. Causa autem externa facile ex sermonibus agra
diagnoscuntur, aut astantiū. Interna verò ex praegres-
sis causis, ex corporis plenitudine, vel si menses sup-
pressi fuerint. Signa quoq; praedominantis humoris, vt

am saepe diximus, eam ostendent; vel si ulceratio ad-
sit, vel præcesserit, vel abortus, aut partus difficilis, &
similia. Verum exemplis subsequentibus hæc iam di-
cta manifestius apparebunt.

OBSERVATIO XLII.

De inflammatione seu apostemate uteri calido.

MULIERI Delphensi plenitudine labo-
rati ex prædominio sanguinis inflamma-
tio uteri oborta fuit, quod istis signis percepimus
apostema calidum esse: nam oculorū subsequen-
batur dolor, & matrix intus palpitabat, & in
ventre sub umbilico sentiebatur calor, tumor
quoque ac grauitas, eratque dolor magis acutus
arguens materiam calidam, occupans spinam,
inguina, & ad præcordia ascendens, modò etiam
in utroque coxendice dolebat. Cùm enim san-
guinea esset, magis ex sanguine quàm bile ad
uterum defluxo, hoc malū originem cepisse a-
maduertimus. Cùm scilicet rubedo faciem &
oculos occuparet, lotium quoq. rubrum & cras-
sum esset, non erat ex mensibus suppressis, neq.
ob partum, aut abortū atq. ictum, sed ex humo-
re calido sanguineo ad uterū defluxo. Ideo cùm
plethora adesset, uti in præcedente muliere, venā
in brachio dextro ex basilica secari iussimus: nam
& in uteri parte magis dextra dolebat. Enol-
liente quoq. clystere humectante & refrigerante
prius iniecto, cùm aluum non deponeret, &
hunc syr. propinavi: r. syr. ex infus. ros. rub. de
end. acetos. simpl. añ. ʒ. j. aquæ acetos. portulacæ,
end.

252 DE MVLIERVM MORBIS,
 end. añ. ʒij. misce: fiat syr. pro duabus dosibus.
 Interea cū in principio essemus, hoc vnguento
 locum dolentem inunximus: & ros. rubear. myr-
 till. sumach, hypocisth. boli armenæ, añ. ʒj. olei
 ros. myrtei, añ. ʒvj. ceræ parum, fiat vng. Fiebat
 & hic vel similis fodus: & ros. rub. balaust. su-
 mach, hypocisthid. chamæmeli, añ. m. j. conton-
 dantur crasso modo, bulliant in lib. iij. aquæ ad
 consumit. mediet. deinde spongiam infunde in
 dicta decoct. & expressam pectini superpone; &
 vbi ceperit tepesceri vel calfieri, inde remouea-
 tur. Postea in augmento percussiva cum reso-
 lutiuis apposuius, percussiuus tamen vin-
 centibus. Nempe in principio augmenti hoc se-
 quenti vel huic simili utebatur: & flor. chamæ-
 mel. meliloti, summitatum anethi, ros. rub. ba-
 laust. sumach, añ. m. j. conquassentur crassiuscu-
 lè, & bulliant in s. q. aquæ secundum artem, &
 fiat fomentum. deinde inungatur cum oleo ros.
 & oleo chamæmel. In statu apposuius reso-
 lutiuu temperata. vt: & florum chamæmeli,
 summitatum anethi, meliloti, sem. lini, fœnu-
 græci, artemisiæ, matricariæ, melissæ, añ.
 m. j. bulliant in aqua, vt suprâ, & fiat fodus; mox
 vtero quoque inuncto, vnguento hoc vel simili
 resolutiuo: & olei liliacei, chamæmel. añ. ʒß. pul-
 ueris matricariæ ʒj. adipis anserini, medullæ cer-
 uinæ, añ. ʒij. ceræ exiguum, fiat vnguentum;
 postea etiam adiecto oleo cheyrino; quibus ma-
 teria resoluta fuit. Interim post duos dies à se-
 ctione venæ basilicæ exhibui hanc potionem
 minoratiuam & lenientem: & cassiæ recens ex-
 tractæ

tractæ 3vj. elect. lenitini 3ij. dissolue cum 3ij.
 quæ artemisiæ, syr. viol. 3ß. misce. Deinde ad-
 uic iuleb fuit reiteratum. Post quartum diem,
 dolore utcumque sedato, ita eandem purgavi:
 2 diacatholici, cassiæ recens extractæ, electuarij
 lenitini, añ. 3ij. electuarij de succo ros. 3j. ß.
 cum 3ij. decoct. flor. & fruct. cord. addendo
 syr. viol. 3ß. misce. fiat potio. Quibus egregiè
 excreuit. Capiebat deinde ad roborationem,
 diamarg. frig. & triumfant. in tabulis. Quibus
 materia resoluta, ut iam diximus, sanitatem
 consequuta est.

SCHOLIA.

SIGNA prædominantis humoris diligenter per-
 scrutanda in vteri apostemate vel inflammatione,
 antequam curationem ineamus, ut hoc exemplum
 calidi apostematis ostendit: nam hic febris acuta &
 continua aderat vehementior, capitis dolor, tremor,
 ac spasmus quasi membrorum digitorumq; & cerui-
 cis; oculorum radices dolebant & interior vulua, unde
 & vniuersum corpus languescebat. Refert Benedictus
 Veronensis lib. 27. cap. 5. se Iudæam quandam in eo
 affectu secasse. Supra enim inguinem, inquit, pluri-
 mum intumuit, imo ventre: nam diu locorum vitio
 laborauerat. Miro modo tumor ille dimota vulua in-
 terdum latefcebat, interdum in mucronem conspicuus
 cernebatur, iam iam me & chirurgum sæpe delusit
 ferramentum & medicamina apparantem. Ad ma-
 turitatem emplastris perduximus, mox manum deni-
 que non effugit: & sanata est, ac exinde concepit.

Signa præ-
 dominantis
 humoris.

Historia Be-
 nedicti Ve-
 ronensis.

Altera

*Alter a pariter Iudaea (addit idem Veronensis) ex eodem vitio sanata est, quam secari ex improviso iussimus, tanta odoris grauissimi foeditate, ut Medicos & necessarios omnes domo propelleret: is tumor immobilis erat, annexo peritonco. Sicuti & Permarena nobili filia. Si à sanguine sit, iam diximus Obser. precedente. Si à bile, febris est magis acuta, dolorq; acrior, sitis, lingua sicca, vigilia, tum alia omnia intensiora. In frigida apostemate genua torpere sentiuntur, tum pulsus tenuis est ac exilis. in vniuersum stomachus languet, ac singultum patitur: tum & sub occipitio dolor insidet: in maxillis & supra frontem dolent. sine dolore aliquando tumor est, qui grauis est, & extenditur iam & extrema molliora redduntur ac tumen-
 A bile. Si à bile, febris est magis acuta, dolorq; acrior, sitis, lingua sicca, vigilia, tum alia omnia intensiora. In frigida apostemate genua torpere sentiuntur, tum pulsus tenuis est ac exilis. in vniuersum stomachus languet, ac singultum patitur: tum & sub occipitio dolor insidet: in maxillis & supra frontem dolent. sine dolore aliquando tumor est, qui grauis est, & extenditur iam & extrema molliora redduntur ac tumen-
 A pituita. tia, & agra minus insomniculosa est, ac minus sitis, sine lingua nigredine, pulsuq; minus frequenti, & vrina minus rubens, genae tument. A pituita etenim febris est mitior, dolorq; magis grauans, non tamẽ multum intensus, vrina minus colorata, pulsus mollis, inordinatus. Melancholici verò apostematis nota sunt, tumoris durities; nec dolet durities, inquit Gal. nisi in carcinoma mutatum fuerit. At cum venter supra modum turget, hydropis similitudinem gerit, tum pedes tument, crura extenuantur cõmunicatione iecoris viriati; sic aluus sistitur, ac vrina importunè supprimitur, ac menses cessant. Ita à melancholia, secundum alios, febris lenta, dolor mitis, pondus in vtero grande, liaescētes venae omnes, maximè autem saphenae, vrina interdum subtilis, ad plumbeitatem declinans, nonnunquam tamen tenuis atque alba; pulsus inordinatus, durus, paruus, & tardus. Ex atra bile id vitium saepe oritur, aut phlegmone cum induruit, subito mace-
 Nota apostematis frigidi.
 Signa melancholici apostematis
 Ex atra bile.*

ria

evanescente: id communi vocabulo Sephyros vocatur, & cum plurimum in orificio contingit; atque cancer lapideum inuenitur sine vlllo dolore. Si calidi apostematis dolor paucis diebus non quieverit, sed gravior ac magnitudo perseverat, tum inuicta sequitur rities, quæ medicaminibus vinci nequit: facile enim, incipere conamur, in exulcerationem interdum mutantur. Et sic, in summa, inflammatio aut apostema sum aut ex toto dissolvitur, aut maturatur, aut increpescit carcinomati modo. Si maturetur, inflammatio in abscessum transeunte, dictæ quidem notæ inflammationis superius descriptæ intensiores erunt; dolores etiam circa puris generationem ipsis augentur, ac febres quæ cum humore, plerumque ad vesperam inveniunt, ac inordinatæ accessiones ipsis obveniunt, prius quidem temporibus intensa, cum doloribus ad vltimum: ubi suppurauerit, aliquantulum remittunt, ut inquit Paulus cap. 65. lib. 3. tumor attollitur, dolor unctiorius adest, aliquando vrina, aliquando sterco- ris recrementa supprimuntur, aut viraq; simul, Aëtio teste: aliàs tumor in pube eminet, & vetuti ex- citationis sensus, cum abscessus maior fuerit, ut liquet ex eodẽ Paulo. Dum verò neque ipsa inflammatio so- luta est, neq; in abscessum transmutata, adhuc perse- verant, in scirrhî naturam transmutabitur, idq; inde percipies. Febris, ac dolor, & reliqua leuiora sympto- mata remittuntur, tumore tamen & renitentia per- manentibus cum gravitate, & agro motu non solum rurum, sed totius corporis, ac segnitie ad omnes vitæ fûctiones; ut liquet ex eisdem Aëtio & Paulo. Signa etiam temporum, propter curationem dignoscenda. Sic principium est ubi incipit. malo augescente, augmen-

Sephyros.

Signa in-
flammati-
onis in ab-
scessum
transcuntis.Si in feir-
thum per-
mutetur,
signa.Signa tem-
porum.

Imperito-
rum Medi-
corū error.

Signa præ-
sagientia.

Prognostica

augmentum . in vigore existente , status . dum incipiat malum , declinatio . Differt quoque à pleuritide quod imperiti Medici agrè distinguunt , ob septi transversæ compressionem . Si enim magna est inflammatio sequitur vteri suffocatio : si minor , magna difficultas spirandi , & ad latera & costas protenditur dolor hinc existimant pleuritidem esse , ignorantes consensum vteri cum septo transverso , & cum clavicula . Integritur enim peritoneo , & eo solo firmatur , ac retinetur à parte superiore . Quare si distendatur assuetum , & in maiorem molem accrescat , distenditur peritoneum , & hypofascia , ob illam unionem , quæ in septo transverso , ex peritoneo & hypofascia . Restant adhuc signa præsagientia , tum merè prognostica . Si causæ externæ plures in muliere fuerint & effectus digni , inflammationem vel apostema in vtero expectare possumus . At merè hæc subsequentiæ signa prognostica sunt : scilicet quod deterior inflammatio est , quæ plures vteri partes occupat , quàm quæ pauciores : similiter quæ os , aut cervicem fatigat , minus periculosa existit , quàm ea , quæ fundum , seu cavitate , quoniam promptius curationem admittit . Verò vterum gerenti erysipelas in vtero fiat , lethale est , inquit Hippoc. aph. 43. §. lib. quanquam de veritate inflammatione propriè dicta dubitet Gal. num fœtus possit aliquando vivere : id quod negari haudquam debet , eadem exigua existente , ex qua nedum maligna , verum etiam nec acuta febris gignitur : necesse est etiam si in iocinore , ventriculo aut septo transverso orta sit , ut liquet ex Gal. 2. Prophet. Ex erysipelate autem semper acuta febris generatur , & sæpe numero maligna . In hoc vitio urina alba & tenui

in alun

alium minatur. Et quum reliqua accidentia inua-
 scunt, & sudor affuerit malignus, cum ventris in-
 atione ac animi defectu frequēti, ita ut non loquan-
 tur, spei locus nullus est. Inflammatio, apostema, ab-
 cessus, vel suppuratio in utero, iuxta Auic. & Ara-
 es, si in ore uteri, inquit, possibile est ut sanentur;
 & si in profundo, minimè; Gradus addit, valde diffi-
 ile. Si induretur, lethale: si in pus mutetur, difficile.
 Id tamen cum fluit, sine odoris grauitate nimia erum-
 it: nam & in colore album est vniuersum pus, & sa-
 uitem prencipiat: vti in muliere illa quæ Delphis ha-
 bitabat in insigni capitis aurei, vxore pistoris; cui su-
 bitò ruptum est intus apostema, & copiose effluxit
 sanies alba, & minimè fœtida: ac nostra industria hac
 uasit, Dei benignitate. Eius historiam Obser. 44. po-
 nemus. Quod si illud pus quod effluit, terribili sit odo-
 ris ac virulentum, perniciem minatur. Si excremen-
 ta in uteri inflammatione, seu apostemate, & vrina
 erineantur, atque dolor ad vltimum extendatur, ne-
 que per se, neque per artem subitò minoretur, lethale:
 quemadmodum fuit in Adriana Gerardi Alcmariana
 vicina nostra, muliere quidem pulcherrima. cui cū
 secundò difficillimè pareret, & fœtum mortuum cum
 violentia quadam peperisset, neque bene tractaretur
 post partum, nec diligenter custodiretur, ingens dein-
 de in utero abortus est dolor, febre continua acceden-
 te, cum uteri inflammatione ac apostemate calido; ita
 ut lotium primò difficulter redderet, postea & in toto
 suppressum fuerit, ut in grauiore inflammatione fieri
 assolet. Hic obstetrix planè imperita, & muliercula
 astantes masura, ut huic pessimo symptomati occurre-
 rent, multa calida pectini adnouere; etiam filum co-
 R ctum

tum in lixiuio, vt lotium provocarent: & ita aposte-
 ma augentes, tum febrem ipsam, aptis non adhibiti
 remedijs, nec me quidem licet vicinum vocarunt, au-
 consilium petierunt, & agram in mortem precipita-
 runt. In fine quidem Gallum Medicum Harlemen-
 sem vocarunt: sed & is nihil profecit, ac ipsa pauci
 deinde horis extincta est. Rectè dixit Bertrutius in su-
 Collectorio tract. 9. sect. 3. cap. 10. De apost. & cancr.
 matricis, Consuevit hic, inquiens, superuenire acci-
 dens timorofum, scilicet retentio stercoris & vrinae
 cui succurrimus agram ponendo in balneo aquae dul-
 cis, vel in aqua decoct. viol. alibae, chamameli, saenyg-
 sem. lini, cum ventrem leniat, vias elarget, & dolor
 sedet. Difficiliter quidem talia in puerpera adhiberi
 poterant: foris tamen vel cataplasma ex iisdem parari
 potuisset, vt aliquando in puerperis quibus vrina deti-
 nebatur, commodè fecimus. haec enim inflammation
 aut apostema non augent. Iam quoque frigiditas ex-
 tremorum, vel sudor frigidus circa frontem & tem-
 pora, lethale: arguit enim magnitudinem apostematis
 seu inflammationis, & virtutis naturalis angustiam.
 Alienatio quoque fortis & instantia vigiliarum, quae
 per artem remoueri non possunt, infra diem quartum
 vt quidam volunt, lethale. Apostema tempore im-
 praeagnationis eueniens in utero, interficit matrem, vel
 foetum, vel vtrumque; & propriè si fuerit confirma-
 tum, vti euenit cuidam mulieri iuencula, ad quam
 accitus sum, iam per sex septimanas quasi hectica fe-
 bre consumptam. Doloze in regione vteri semper tor-
 quebatur, & agrè lotium reddebat, cum stranguri-
 videlicet, ob crassam residentiā quasi purulentam
 ita vt ab vlcere vteri ac renum: nam in renibus etiam
 dolebat

dolebat. Sed præcipuè ex apostemate præcedente videbatur abscessus esse in utero. Erat iam in septimo mense prægnans, vel in principio octauæ mensis (si bene meminimus) cum ad ipsam accersitus fui. Ante meum aduentum hæcenus alij Medici præsentibus illam tractauerant, licet agrè remedia admitteret. Cum ad illam venissem, accersita obstetrice, cum conamina partus adessent & insignes dolores, de abortu metuebam; & animaduerti ex certis signis infantem per tres dies ad minus mortuum fuisse; nam ab illo tempore fætum non sentiebat. Et cum valde angeretur, neq; alium deponeret, ut à fætu mortuo liberari posset, cum leniens clyster & emolliens iniectus esset, multis precibus agra inducitur; mox peperit filiū omnibus membris perfectū, & satis magnum, sed mortuū, qui etiam ante tres dies saltem mortuus fuisse videbatur. Post tres dies cum rursus in regione uteri valde doleret, & purgatio non bene subsequeretur, exhibito puluere ad illam promouendam apto, peperit molam carneam. Et postea melius habere videbatur. Post duos vel tres menses dolore iterum ingrauescente, cum dysuria & vrina crassa, ex eodem apostemate in vlcus transmutato, mortua est. Apostema igitur uteri in prægnantibus semper est periculosum. Et quaecunque etiam illud fuerit in alijs mulieribus etsi non sint græuidæ. Quemadmodum hoc anno 1596. contigit in muliere Alcmariana pulcherissima, quæ per annum prius apostemate uteri laborans, postea eo in vlcus malignum transeunte, mortua est magna cum miseria. Alij eam calculo laborare putabant: ego autem vlcus esse in utero semper iudicaui. & facta incisione post mortem, marito iubente, vlcus, uti prædixeramus, in utero repertum est. Quaecun-

que igitur apostema sit in vtero, non est contemnendum; imò diligenter curandum; cùm ex eo facillè abscessus fiant, saepe & scirrhus, cancer, rima vteri & rhagades ac condylomata. De quibus etiam suo loco dicturi sumus. Atque hac de signis dicta sufficiunt. Curationis erit ex subsequentibus exemplis magis luculenta.

OBSERVATIO XLIII.

De oris vteri inflammatione.

MVLIER cùm in abdomine valde doleret, atque etiam febricitaret, os vteri inflammatum iudicabam: quamobrem Adrianam Biezelingiam, quæ mulieres curabat, vocari iussi, vt immisso digito experiretur num os occurreret durum ac rigidum; quod & clausum dicebat, ac feruens, ac retractum. Id signum erat (vt antea quoque diximus) in ipso ore vteri & collo inflammationem esse. Quare vt rectè curationem aggredieremur, ægram in domicilio obscuro collocauimus & moderatè tepido, & somnum moderatum præcepimus, cùm vigiliæ etiam conferant in principio magis quàm somnus: prohibent enim phlegmonem augeri, cùm in visceribus generatur; vt pater 6. De morb. vulg. & Comment. aph. i. lib. 2. Interea imperauimus vt quietem amplecteretur, etiam omnem crurum motum interdicentes. Cùm autem ægrè aluum deponeret, molli clystere infuso excrementa euacuauimus. Et sic, clysteri iniecto, mox venam secari iussimus ex vena basilica in brachio dextro; quod fortis esset, ac in morbi
princi-

principio adhuc essemus. Iussimus quoque ut immodicos animi motus vitaret. In principio parum cibi dedimus, nisi hordeatum, aut hordei cremorem. Paulus iubet lib. 3. cap. 64. per triduum cibo abstinere, & curationem, post venæ sectionem, absoluit chondro ex aqua mulsâ, vel pane, vel ouis sorbilibus, vno die interposito. Sic & Aëtius lib. 16. cap. 85. Chondro è mulsâ, aut pane abluto, aut ouis sorbilibus patiens alenda; esseque oportebit, quicquid cibo exhibetur, quantitate moderatum. Et sic nostram alebamus pane loto, aut ptisana, seu eius cremore, aut etiam alternis diebus ouis sorbilibus. Pro potu aquam hordei dabamus, siue in qua & hordeum mundatum & glycyrr. incocta erant. Alij sem. coriandrorum præparatorum decoctum, seu ipsammet aquam modicè calidam dant. Nos & cereuisiam tenuem concessimus, à vino abstinentes. & iussimus, ut artus & extremæ corporis partes, manuum præsertim, auersionis gratia, perfricarentur. Quod ad medicamenta attinet, fotum ex œnelæo vel vino rosaceo, iuxta Paulum, super pubem adhiberi iussi, hapsis ex lana puriore atra deligaturam. Interea exhibui quoq. iulebos ex syr. viol. nymphææ, cum aquis lactucæ, end. cichor. acetosæ, & similibus. Tertio die purgaui cum manna & cassia, quia delicata erat. Interea quoque cataplasma apposui ex farina hordei, sem. lini, fœnug. vitellis ouorum assatis cum rosaceo & decocto capitum papanecris & meliloti, ac exiguo vino seu aceto, composita. Sic & Aëtius feruescente inflammatione,

R 3

lanam

lanam succidam vino & oleo, aut oxyrhodino
madefactam, sumini ac pubi applicat, aut pal-
mulas in vino decoctas, aut mala cydonia simili
modo in vino decocta. Post quintum diem ap-
plicui id quod à Paulo etiam commendatur;
nempe cataplasma ex polline farinaceo, semine
lini, fœnug. ex mulsa, in qua papauerum capita
decocta proiiciantur, & ex oleo, paratum. Et
quia calor erat magnus, aquam rosaceam cum
succo plantag. & portulacæ per modica inter-
ualla pudendo affundi iussimus. Vbi dolor ma-
gis excrucicaret, iuxta Paulum, lachrymarum
papaueris valde exiguum, (tria videlicet aut
quinque grana) cum lacte muliebri & succo
fœnug. apponendum consulebam. Et si dolor
non cessasset, inessus adhibuissim, quos &
Paulus per totum morbi decursum utiles esse di-
xit, ex decocto fœnugræci, seminum lini, maluar.
artemisiæ, & olei, præcipue post principium.
In iis autem, quæ calorem non sustinent, & ma-
ximè circa initia, ex aqua modicè calida rosa-
ceo superfuso inessus fiant. At mitigata inflam-
matione lana oleo calido & ros. chamæmelino
& irino imbuta pubem fouimus: & magis de-
clinante, cataplasma sumini & pubi apposui-
mus ex farina hordeacea confectum, fœnug. &
lini semine, cum decocto althææ, carycis etiam
adiectis. Aëtius ægrotam in fœnug. althææ, sem.
lini, interdum pulegij, marrubij, salniæ, artemi-
siæ decoctis sedere iubebat: & cataplasma simile
iam dictum in aqua mulsa coctum apponebat.
sed, si grauitatem cataplasmatum & calorem
ferre

ferre non possent, in aqua tepida sedere iube-
bat, & loca rosaceo inungebat, pessosque im-
ponebat qui moderatè refrigerarent, ex adipe
gallinae, rosaceo & vino confectos. his quæ calo-
rem ferunt, ceratum nardinum illinetur, collu-
tionesque & pessi adhibebuntur, ex æsypo, bu-
tyro, medulla ceruina, adipe anseris, vnguento
susino, & cera. Sed, quod penè omiseram,
quarto die, cum nondum dolor cessaret, iussi-
mus quoque, ut in muliere robusta, ut vena tali
secaretur, sed in exigua quantitate, quia prius
vena secta fuerat ex basilica. huius rationem ex-
plicabimus Scholio sequenti. Deinde utebatur
topicis iam supradictis. Verum, dolore iam mi-
tigato, & curatione procedente, tunc, iuxta eius-
dem Aëtij sententiam, tenuè viuendi rationem,
tum cibi paucitatem auferebamus. & cum iam
manifesta declinatio facta esset, vinum conces-
simus, & cibos reficientes. Atque his remediis
iam dictis inflammatio probè resoluta fuit.

SCHOLIA.

QUOD venam hinc ex basilica primò secari iussi-
mus, id auctoritate tum Pauli tum Aëtij egi-
mus. Vbi enim, inquiunt, vehementior inflammatio
insestauerit; si neque aetas, neque habitus, neque anni
tempus obstiterit, neque inflammatio post abortum,
aut immensam sanguinis euacuationem superuenerit,
cubiti vena secanda est, ac sanguis pro virium ratione
educendus; licebit quæ in secunda quidè venam incidere,
in tertia verò sanguinis missionem repetere. Sed hinc

De venæ
sectione.

R 4 dubita-

Dubium de
venæ sectio-
ne.

Solutio.

Aliorum
medicamen-
torū ratio.

Purgatio.

dubitat (vi etiam Donatus longiori sermone refert)
cū Gal. De venæ sectione lib. poplitæ & malleoli ve-
nam secare iubeat, vterque, renibus vel vesica affectis,
etiam 13. Meth. med. Sed hoc facit summa indicatio-
ne à parte affecta, pro euacuatione cum deriuatione
eius quod in parte inflammata continetur, & non pre-
aersione eius quod influit. Si enim in generatione est,
per contrarias partes & longissimas facit; 13. Meth.
& sic initio venas superiores etiam Arabes mittunt.
deinde, ubi opus est, pro deriuatione & euacuatione,
à talo. Exigua verò existente inflammatione, valenti-
bus viribus, potissimum ubi corpus totum plenum non
fuerit, & inflammatio iam facta sit, tali vena inci-
datur, & si opus est, eadem iteretur, rectitudinem
perpetuo seruantes. A venæ sectione, si eadem inflam-
matio cum erysipelate præsertim participet, ubi quo-
dam modo mitior fuerit reddita (non autem circa
initia) leui quadam purgatione vii conuenit, etiam
pro deriuatione faciendâ; vi castia fistula, manna, sac-
charo viol. syr. ex infus. ros. pallid. diacatholico. Dein-
de imo ventri ac pubi & lumbis foci, irrigationes,
seu epithemata, ex iam dictis in Obs. adhibebimus. Et
si erysipelatis naturam participauerit (quod ex igneo
calore percipies) intubum, & umbilicum Veneris, se-
dum, polygonum, portulacam, plantaginem, ac vi-
ti pampinis cataplasmaticum polenta apponite: vel
quopiam earundem herbarum succo cum rosaceo aut
melino oleo lana madefacta in sinum pudoris, iuxta
Aërium, mittenda est. Pessi quoque ex succis herba-
rum dictarum subdendi. Quod si cataplasma à locis
non toleretur, aquam rosaceo admixtam ex modico
interuallis ingiter infundimus. In exacerbationis de-
clinâ-

clinatione agra in aqua tepida vsque ad lumbos insi-
deat. Deinde pessi imponendi ex aliquo vnguento le-
uiter astringente; sicut rosaceo, melino, lentiscino, æ-
nanthino, adiectis ouorum vitellis crudis aut assatis,
& croco; interdum ex memoratis succis addendo.
Mitigata inflammatione, præter pessos in Obser. di-
ctos, cucurbitulas idem Aërius affigit in lūbis; magno-
q; existente tumore, etiam cum scarificatione. Idem
componit & pessos ad sedandos dolores inflammatio-
num vteri, fœnug. madefaciens, primam ac secundam
aquam abiciens, deinde vbi in tertia, quæ dulcis pu-
taq; sit decoct. per colum traiecit & decocto admiscet
adipem anserinum recentem, vel gallinaceum, ac per-
mittit simul super ignitis carbonibus colliquari: postea,
vbi refrigerit, concretum adipem aufert, & seruat;
quem vsus tempore spatula specilli in manu subactū,
pesso excipit, & supponit. Alius dolorem sedans: Pa-
paueris capitula in passo decoquito, donec flaccescant,
deinde exprimito, & decocto transcolato medullam
ceruinam liquatam admisceto; & vtere: & si me-
dulla ceruina defuerit, vitulinam sumito. Habes apud
eundem innumeros pessos valde convenientes. Sed hic Cautio.
cauendum ne in extensionibus & inflammationibus
vteri menses eliciamus: magis enim loca extendun-
tur, & cum ob inflammationem oculusa sint, sangui-
nis transitum intercipiunt. Sed & tetrapharmacum
ad inflammationes vtriusq; imponitur, aut infundi-
tur. Quod si inflammationi vlcus adiunctum fuerit,
cerato rosaceo, ex cera alba, cum tertia anserini adi-
pis parte confecto, albumen oui, quantum capere po-
terit, instillato; & vtere. Idem & in declinatione
balneum admittit. Neoterici hæc addunt, vbi calidum

Calidi apo-
stematiz
curatio.

R 5

apostema

Astringen-
tia topica.

In sangui-
neo.

Biliosi apo-
stematis re-
media.

Phlegmatici
cura.

apostema est: Egrotam in cubiculo frigidiusculo collocant, quietem imperant, & ut famem sustineant, parum bibat hordeaceam aquam pro siti. Inclinate morbo, vires recolligunt sensim, pullus detur in cibo, ouum sorbile, attriplex, spinachium, malua. Prisana iuuat, nam totam curationem complet. Imbecillioribus far hordei, aut alica dari potest, ut diximus; panis aqua elotus, aut subinde coctus. Interdum auicula conceduntur, aut pulli lactuca preparati, vel perdicee cum cucurbita, vel cum seminibus frigidis, vinum cauendo; singulis diebus aluum emolliendo clystere, vel manna, vel castia, vel saccharo viol. si opus est purgatione. Initio quidem calidi apostematis, discutientia & refrigerantia apponuntur; etiam leuiter astringentia: talia sunt, rosa, leus dempto cortice, balauitia, plantago, vitis pampini vel folia, strychnum, seris satina, portulaca, virga pastoralis, semperuiuum, cucurbita ramenta, ac hordei farina. Insidere in aqua cum oleo ros. plurimum iuuat, & hoc emplastrum, in materia sanguinea: Farina lentu excorticata, hordeacea, añ. ℥ ij. succi plantag. semperuiui, strychni, virga pastoralis, olci ros. vel omphacini q. s. linteolis tam imo ventri, quam in spina imponatur. Bilioso apostemati magis frigida conueniunt; syr. viol. de end. acetos. simpl. cum aqua end. solatri, acetos. & leuis purgatio ex castia, pauco adiecto elect. de succo ros. Roborentur cum diamarg. frig. sacch. viol. diatrium sant. Topica sunt qualia superius diximus conuenire erysipelati. Probatum & hoc in bilioso: Farina hord. ℥ iij. rament. cucurb. succu lactuca, nymphae, hyoscyami, pap. albi plantaginis q. s, rosaceo infuso, feruesacito, & apponito. Vbi vero phlegmaticu fuerit

fuerit apostema, cubile calidiori loco constituendum
 est, priori contrario, & vigilandum est; calidiuscula
 & exiccantia offeruntur. materia digerenda cum syr.
 matricariae, de duabus rad. oxymel. simpl. & aquis ar-
 temis. scenituli, & similibus, vel decoct. artemis. puleg.
 melissae, alijsq; prius quoque minorata materia, se-
 cundum aliquos, cum ʒ ij. pilul. scetid. deinde leuiter
 purganda cum elect. indo, agar. & diacathol. Et cum
 primum ortum fuerit, componatur cataplasma; vt,
 farinae lentium, & fabaceae, ac ciceris, añ. ʒ ij. ma-
 stich. aloës, mannae thuris, farinae, scenugr. flor. cha-
 memeli, añ. ʒ ss. cum oleo chamamel. absinthino,
 ros. componantur. Si sit melancholicum, durum, in
 humecto loco locanda est agra: somnus hic iuuare
 creditur. humor melancholicus & attrabilis digeren-
 da cum borag. meliss. chamad. chamapit. & buglos.
 decocto, & syr. de epith. borag. viol. & purganda
 cum sena, epithymo, & diacath. Cui & emollientia
 ac pariter dissoluentia quam citò sit possibile impo-
 nenda sunt, nec differenda: vt ex farina hordeacea,
 lini, ex meliloti decocto, addita sapa, & oui luteo
 rosto, & per intervalla iuuant infusiones in meli-
 loti decocto cum lini semine, ac althaeae vel maluae
 floribus vel semine. Prodest & per se cysypum sub-
 dere, vel cum anatino adipe cum croco & meliloti
 seminis farina. At cum sanguineum increscit apo-
 stema, superiori emplastro, quod initio apponitur,
 scenugracum, melilotum & chamamelum aduicito:
 ac frequenter in eo decocto insidere iuuat, in quo
 plantago, lens dempto cortice, ac rosa cum malua,
 & althaea decocta sint. In bilioso verò eadem malua,
 & althaea, semperuiuum, lactuca, nymphaea, viola,
 cum

Melancho-
 lico apotte-
 mati quæ
 conueniunt.

In augmen-
 to quæ con-
 ueniunt in
 apostemate
 sanguineo.

In augmen-
to aposte-
matis bilio-
si, phlegma-
tici, & attra-
bilarij.
In statu.

In declina-
tione.
In sangui-
neo.

Biliofo.

Phlegmati-
co.

Melancho-
lico.

cum meliloto imponi debent. Infunditur subinde vi-
laceum, ac gallinaceus adeps. In phlegmatico item
calamum arom. adiici opus est, ac myrrham. Ex atra-
bile, galbanum addi potest. In statu pariter sanguinei
abscessus, artemisia ac calamus arom. admiscetur: in
bilioso, lini semen: in phlegmatico, palmula meden-
tur, caryca, menthastrum, ac calamintha. In me-
lancholico demum, quæ valde emolliunt ac dissoluunt
imponenda sunt. Inclinate apostemate, & mitiga-
to dolore, è chamamelo, meliloto, althæa, & semine
lini cum oleo violaceo ac cera cataplasmata conficies,
& in vterum violaceū luteum infundito, ac lilinum:
tum enim quæ maximè dissoluunt imponi debent; si-
cuti sisymbrij succus, ac maiorana, & foliorum tener-
rimorum lauri. Aliqui ea damnauere, veluti nimium
excalfacientia, sed butyrū, adipem anatinum, cerui-
namq; medullam commisceri volunt, ne qua aposte-
matis pars lapidescat. Inclinate bilioso, althæam,
maluam, melilotum, lini semen ac chamamelum ad-
iiciunt. In phlegmatico, decocto menthastrī & cala-
mintha infidere iuuat, addita ruta, roremarino, maio-
rana, & lauri foliis. Sed & lixiuum per se valere
creditur. Imponitur & emplastrum ex erui, lupino-
rumq; farina, cum oleo nardino, rutaceo: imponunt
aliqui linteolum aqua ardenti madens. At illud cum
cautione faciendum puto. Inclinate melancholico,
operiet magis emollire, quàm dissoluere, donec ex toto
tumor discutiat. Ego commodè in iis vtor emplastro
de macilaginibus, & nostro de ammoniaco dicto.

OBSER-

OBSERVATIO XLIIII.

*De apostemate uteri frigido in abscessum
transmutato.*

AGATHA Petri, filia illius Petri Aromatarij Hagani, istis diebus nuper nupta pistori cuidam Delphis in insigni capitis aurei commoranti, anno 1569. 26. die Octobris incidit primò in uteri suffocationem grauem, cum conuulsione & motu epileptico, ut & caput simul conuelleretur adeò vehementer uti ad sellam in qua sedebat idipsum illideret. Erat enim adeò fortis paroxysmus, ut vir humerum & caput magna violentia continere cogeretur. Aderant & duæ mulieres, quæ manus detinebant: nam & digitos atque pollicem in manum contrahebat, ut vix in rectum deduci possent. Tertia quoq. mulier astabat, quæ ventrem vi comprimebat: adeò enim uterus sursum rapiebatur, ut penè suffocaretur. Durabat autem hic paroxysmus adeò atrox circiter quinque aut plures horas, quibus per remedia ab astantibus & mulieribus adhibita à paroxysmo excitari aut subleuari non potuit. Tandem sub noctem ad eam accitus sum. Eo tempore, ad diuersionem, crura fricabam fortiter, & ligaturas adhibui circa coxas vehementiores, & simul emplastrum sequens vmbilico apponi iussi: & emplastri contra matricem $\frac{3}{4}$ β . ducatur supra alutam rotundam paulo ampliorem daleo, & in circuitu obducatur

270 DE MULIERVM MORBIS,
catur galbano. nodulum in se complectentem
assam foetidam naribus pro odoratu obiicie-
bam. Sed nondum in toto à paroxysmo excita-
batur, quamuis leuius ferebat, subinde scilicet
per interualla redeunte, non tamen ita acriter
vt prius. Tandem rutam manibus confricatam
naribus, vt continuò olfaceret, obieci, & à pa-
roxysmo planè liberata est. Verùm altero die
cùm tempus ventosum esset, nimium citò sese
aëri committens domo excundo, in maximum
dolorem vteri incidit; atque 28. die me rursus
reuocarunt. Mulieres astantes incusabant, em-
plastrum nimis diu fuisse retentum supra um-
bilicum; cùm potius ex aëre frigido spiritum
flatulentum concepisset. Doloze magis incref-
cente per totum ventrem inferiorem, & po-
tissimùm circa pectinem & pubem, cum tu-
more apparente, cepi ego metuere de aposte-
mate vëroso, vel potius phlegmatico & frigido,
in muliere admodum pituitosa, alba, & pingui.
Sed cùm aluū non deponeret, vt glans sequens
subderetur, mando: ꝛ pul. hieræ picræ ꝓ j. salis
parum, pul. cumini ꝓ ꝓ. mellis q. s. fiat glans seu
suppositorium. Antequam imponeretur, em-
plastrum ab umbilico detraximus: nihilominus
dolor, quem ex emplastro malè originem ha-
buisse dixerant, æquè persistebat, neque vllò
modo mitigabatur; nec imò ventre etiam in-
uncto hoc oleo: ꝛ olei lilini, de meliloto, cha-
mæmel. anethini, añ. ꝓ ꝓ. misce. Ex supposito-
rio squibalas tantùm duras reiecit. Clysterem
libenter iniecissem (quod melius fuisset) sed
non

non admittens potionem sequentem ebibit: & artemisiæ, flor. chamæmeli, añ. p. j. sem. fœniculi, carui, añ. 3 j. β. folior. senæ à stipitibus repurg. 3 iij. vuar. passul. ab acinis repurgatarum 3 β. fiat decoct. in aqua communi q. s. cuius expressionis accipe 3 iij. in qua dissolue elect. lenitiui 3 vj. diacathol. 3 ij. misce. qua ter aluum deposuit, nec dolor tamen sedatus est. Adhibui hunc sacculum: & herbar. sicc. matricariæ, artemisiæ, añ. m. j. pulegij sicci, absinthij, calaminr. rutæ, melissæ, omnium herbarum exiccat. añ. m. β. sem. anisi, carui, añ. 3 j. flor. chamæmeli, meliloti, añ. m. j. incidenda incidantur, & contundenda contundantur, & misceantur in linteolo puro quadrato, & fiat sacculus intersutus secundum artem; & calidè ventri apponebatur. Dicebat, simili sacculo se aliquando curatam fuisse, cùm similem dolorem passa esset. Sed dolor ex sacculo mitior factus non est. Die sequenti, quæ erat 29. Octobris, Hagganus Medicus, me iunior accitus fuit, qui eandem aliàs præ manibus habuerat: is solam inflationem vteri esse putabat ex præfocatione præcedente. Ego tamen verebar, simul cum ventositate apostema adesse ex frigida materia pituitosa, & quòd facilè abscessus fieret, cùm tumor appareret cum quadam duritie circa vnam partem vteri magis, & è regione illius partis etiàm coxa doleteret, præcipuè cùm illa non iuuissent, quæ ad vteri inflationem valent, magis de abscessu timebam: & ideo potius ad maiora emollicentia, (cùm durities

ties cum tumore magis adesset, non sine febre, licet exigua & lenta) deueniendum esse proposui. Ille verò vrgebat vt emplastrum de baccis lauri toto ventri apponeretur, ad flatus discutiendos: ego autem eius caliditatem metuebam, ob febrem, licet lentam. Verùm ægra illud emplastrum esse apponendum annuebat, cùm & ipsa ventositates esse diceret. Hæc igitur præscripta sunt: ꝛ pul. Leonelli contra matricem, descripti Obser. 33. huius libri, ꝑ iij. pul. rad. pæoniæ (ob motus epilepticos, qui præcesserant) & sem. pæoniæ, añ. ꝑ ß. misce, fiat pul. pro ij. dosibus; & vnâ statim fuit exhibitus cum aquæ flor. chamæmeli & artemisiæ añ. ʒ j. ß. & emplastrum de baccis lauri supra alutam toto ventri appositum fuit. Trigesimo Octobris, cùm hic Medicus non amplius rediret, ac dolor semper in peius vergeret, magis timebam adhuc abscessum, cùm perfectè sentirem duritiem quandam vteri, eoque magis cùm difficulter tandem Ioriū redderet: & cùm suffocatione vteri prius laborasset, matri clam consilium dederam, vt marito diceret, vt cum illa concumberet, ne vteri suffocatio rediret. Verùm cùm ipsa coitum ferre non posset, vt mater postea mihi narravit, maiorem suspicionem habui de vteri apostemate frigido; at, dolore ita perseuerante, quòd facile ad abscessum tenderet. Quare, emplastro de baccis lauri amoto, vt talis inunctio fieret, præcepi: ꝛ mucilag. althææ extractæ cum aqua maluæ ʒ j. pingued. anatis, gallinæ, vituli, añ. ʒ ß. ammoniaci in aceto dissoluti ʒ iij. adie-

ctis

Etis oleis superscriptis, adiectaque cera exigua, fiat linimentum. & post inunctionem, hoc sequens cataplasma infimo ventri applicetur: Rad. althæe mundatæ ℥ iij folior. maluæ, parietariæ, florum chamæmeli, meliloti, artemisiæ, añ. m. ij. cerefolij (vt & melius lotium redderet) m. j. coquantur in aqua ad mollitudinem, pistentur; adde farinæ seminis lini, fabarum, añ. ℥ β. furfuris subtilissimè triti & cribrati ℥ β. cum butyro recenti, oleo amygd. dul. liliaceo, chamæmel. añ. q. s. fiat cataplasma; quo & dolor nonnihil mitigabatur. Interea cum ventrem non deponeret, hoc decocto utebatur: R. artemisiæ, matricariæ, melissæ, añ. m. j. flor. hyperic. chamæmeli, añ. m. β. parietar. maluæ, viol. añ. m. j. sem. dauci, carui, cumini, añ. ℥ j. β. sem. pastinacæ, agni casti, (quia aderant simul ventositates) añ. ℥ β. folior. senæ ℥ vij. agarici feminini albi leuis ℥ ij. zinz. albi ℥ j. coquantur in aqua artemisiæ, chamæmeli, q. s. pro ℥ xij. fortiss. express. adde syr. de artemis. ℥ ij. syr. de calaminta ℥ j. Misce pro iij. dosibus matutinis. quo decocto modò quinquies, modò sexies aluum deiciebat. Hoc tamen apozema non conuenit in apostemate calido, nec in principio in frigido: sed quia minus dolebat, & venter valde strictus esset cum ventositate, & cum clysteres non admitteret, id præscripsi. Multas inde ventositates simul cum stercore reiciebat: & quia iam malum processerat, minus hæc purgatio nocumenti inferebat. imò ex ea se leuari quoque dicebat. Cataplasma autem continuò

S

appo-

apponebatur:& quia tumor mollior fiebat, paulatim fiebat maturatio apostematis, adiectis adhuc ficubus, & vno atq. altero capite liliorum cum oleo liliaceo. id verò percepimus ex sedatione doloris. Tandem itaq. nono die abscessus intus ruptus est, & effluxit sanies copiosa alba, & ab omni dolore liberata est. Eo tempore, emplastro amoto, oleo amygd. dul. inunximus; & antequam rumperetur, lanam succidam cum medulla cernina & butyro recenti vt in vuluam imponent, iussimus. Verum post eruptionem, sanie copiosè effluente, iussimus, vt decoctum hordei còmunis & cicerum rub. & glycyrbiberet, ad vlceris repurgationem, etiam adiecto melle ros. collumque vteri vt eo lauaret. Mox vlcere per se consolidato, conualuit.

SCHOLIA.

Quomodo
apostemata
vulvæ ma-
turantur.

PRÆTER veterū remedia ad emolliendā vteri dīritiē facientia, Recentiores emplastrū laudant, quo abscessus maturantur: habet farina tritici, althæe, añ. ʒiij. farina scænug. sem. lini, añ ʒ. j. palmularū, carycarum, rad. liliorū ac passularū q. s. decocto feruefiat: addatur item oleum lilinum, carthaminū cum gallinaceo ac anatis adipe. Decoctū althæe ac malvæ, meliloti, scænug. cum acantho, insidentibus medetur. Vbi igitur inflammatio non potest discuti, sed ad suppurationē vergat, suppurationi auxiliū prædictis emplastris ac infestationibus ferendū est; cataplasmatū inō venter ac lūbis impositis ex lini semine, scænugr. farina hordei, carycis decoctis, althæa rad. ac terebinthina: quo etiam tempore pudendi sinus per spongiam assiduè foueatur, & vapores per arundinem operculo olla

alla perforato insertam intra pudendum recipiantur. Demum inseciones frequentes fiant decoctū in aqua his, quæ vim attractoriam habet; velut est pulegium, marrubium, laurus, salvia, artemisia, dictamnium, centaureum. Maturant caryca, lily radix cum simo columbino. Item pessuli indantur ex terebinthina, myrrha, æsypo, anseris pinguedine & butyro compositi: aliquando etiam columbinū stercus cum oleo & melle, pro cataplasmate, adhibebimus, ut ruptio fiat. Interea ad ruptionem facit gressus aduersus scalas, aut rheda vehi, vel equo, vel saltus, vel manu comprimere: eo enim modo saepe pus erumpit. Si verò abscessus in conspectu fuerit, ficu, sinapi, ac columbino simo facile rumpitur, nec ferramento opus est: si versus vesicam vulva suppurare videtur, quæ modicè urinam cient danda sunt; ut est semen melopeponis, cucurbitæ & cucumeris. Disrupto autem abscessu, quibus medicamentis deinceps utendū sit, mox de vlceribus vteri curandis dicemus. Si versus vesicam erumpit, laudant decocta melopepon. & psillij cum tragac. & sacch. & succum glycyrrhizæ. Si versus aluum, ius lentis decorticatæ decocta cum ros. ac balaustis, oryza, & similibus infusum. Si sanies exeat carnis recentis loturæ similis, & grauis odoris, infundunt decocta astringentia. Quidam protinus rupto pure, mulsæ colluunt frequenter. Mox vomica persanamus trochis. qui ex succino fiunt, si in potu sumantur. Colluere iuuat sero caprino ac melle despumato. Repurgato vomica sinu, insudenda sunt quæ vlceræ persanant, de quibus mox dicemus. At si non in abscessum ac suppurationē inflammatio aut apostema transfecit, sed ad duritiem vergat, emollientibus pugnandū

Quæ ad ruptionem iuuant.

S 2

medica-

276 DE MULIERVM MORBIS,
*medicamentis, tum intus tum extra adhibitis; quo-
rum siluam reperies locis de scirrho cum lienis, tum
iocinoris, & qua nunc adferemus de vteri scirrho.*

OBSERVATIO XLV.

De vteri scirrho.

VTERVS, inquit Aëtius lib. 16. cap. 86. ex Sorano, interdum quidem nullo prius indicante signo, repente induratur. Ita & Paul. lib. 3. cap. 68. Scirrhum contrahit vulua, aliàs repentè, vt nulla causa euidens præcesserit. Id euenit mulieri Delphensi, de qua nunc agemus. Plerumque tamen, iuxta eosdem, præcedente inflammatione, quæ neq. discussa fuerit, nec in abscessum mutata. Ita aliquando & malè curatas inflammationes sequitur, vel intempestiuū repellentium vsum, vel constringentiū in principio, vel in fine fortioribus remediis discutiendo quod tenue est, & quod crassum siccando. In hac itaque muliere durus tumor aderat sine febre, & tactui renitebatur; nullus, aut obscurus, aderat dolor; si staret, graue pondus (quod in aliis tumoribus obtingit) quasi prolapsurum incumbibat in pudenda: vbi verò sederet, aut decumberet, sua grauitate intestinum rectum premebat: incessus aliquo modo difficilis erat, & segnities totius corporis aderat, non tamen eius magnitudinis deuenerat, vt totum vterum apprehenderet. Erat hæc mulier melancholica & subfusca; ita vt ex humore crasso & terreno, paulatim vteri substantiam occupante,

pante, sine inflammatione præcedente initium
umpferat. Cum hæc robusta esset, & subni-
griuscula, & venas satis latas haberet, cumque
non ita diu hoc malo laborasset, ex vena lienari
(nam in sinistra parte vteri tumor durior erat)
sanguis vt extraheretur mandauit; iuxta Aëtium,
qui in principio, si nihil prohibeat, neque ætas
aut vires repugnauerint, mediocrem sanguinis
copiam à cubiti vena auferre iubet. Idem &
Paulus facit: atque vterque purgat materiam
crassiorem cum hiera Archigenis. Ego prius ex-
hibui syr. ex infus. ros. pallid. cum foliis senæ,
adiecto pauxillo elect. de hiera. Deinde appo-
sui emplastrum de mucilaginibus, & de meli-
loto: postea & emplastrum nostrum de ammo-
niaco, prius inuncto hoc vel simili linimento:
℞ mucilag. sem. lini, fœnug. althææ, maluæ, añ.
℥v. succi ireos ℥ij. pingued. anatis, gallinæ, an-
teris, añ. ℥vj. olei cheirini ℥j β. bulliant ad con-
sumptionem succorum; deinde adde croci ℥β.
cum cera fiat vnguentum. commendatur à Ni-
colo. lis remediis hæc optimè habuit. Hoc quo-
que emplastrum sequens pro Nobili Abbatiſſa
de Toorn, pro vteri duritie descriptum est: ℞
galbani electi in aceto dissoluti ℥j. bdellij mollis
& subalbi ℥ij. pul. matricariæ ℥j β. myrthæ ℥β.
Vbi dissoluendum dissolutum fuerit & cola-
tum, addantur reliqua puluerisata, & fiat em-
plastrum, seu ceratum, formæ sphericæ latitu-
dine sex digitorum. Valet & infessus ex fœnug.
ficubus coctis in aqua hordei: deinde eadem
quoque apposita profunt.

S 3

SCHO-

SCHOLIA.

Callus dif-
fert à scir-
rho.

Lib. 14. De
morb. cur. &
2. Ad Glau-
conem.

Tumores
diuersi quo-
modo à
scirrho vteri
distinguan-
tur.

Inflatio
vteri.

Vteri hy-
drops.

QVAMVIS Benedictus Veronensis, Medicus
doctissimus, de callo & duritie vuluæ ex *Æ-*
gineta sub vno nomine tractet; callus tamen à du-
ritie, seu scirrho, differt, ex Moschione, quod callus
in totum nihil sentiat; in duritie exiguus est sensus:
& ita scirrhus vix sentiens est durities. Scirrhum
enim ex Galeno nominamus tumorem durum, qui
sine dolore est, non tamen omnino sine sensu. Scir-
rhus exquisitus est tumor præter naturam sensu pri-
uatus durusq;: non exquisitus, qui non sit omnino
insensilis, quamuis valde difficulter sentiat. At callus
maiorē duritiem habet, quā scirrhus. Fiunt cer-
tè diuersi tumores in vtero. Tumet quidem infla-
tione, de qua antè dictum est: sed impulsu digito-
rum sonitus tympani modo redditur, tumorq; pubis
& imi ventris comitatur cum dolore pulsati; ali-
ter quoque hic tumor curatur, quā scirrhus. Tumet
etiam vterus hydropē laborans, vt cap. 81. lib. 16.
apud Aëtium constat: quem affectum sequuntur,
tumor amplius, laxis, flatuosus, gurgulationes tan-
quam intestinorū, in ambulando grauitas, & anhel-
itus difficultas, alui foetida excreta, menstruorum &
conceptuum detentio, & quæ deferuntur, nullo ser-
uato ordine excreta: vbi verò violentè excernuntur,
fractus interdum paruis corpusculis quæ vesicæ assim-
lantur, viscida quedam aquosaq; erumpunt. Ita &
Fernelius: Tumet & nonnumquam vterus aquarum
copia; qui certè hydrops est vterinus. Inflationis signa
adsunt; sed grauitas maior, & sonus quasi fluctuantis
aquæ. Huius, quemadmodum & ascitæ, efficiens causa
est

si iecoris aut lienis vitium: aqua tamen ex abdominis
 apacitate cecam & inusitatā viam sibi parat in vic-
 tum. Interdum etiam vena cava solum sanguinis serū
 eodem instillat. Mulier quaedam hoc hydrope correpta,
 quoties appetebat mēstrua purgatio, omnem aquarū
 colluuiem ex utero per ceruicē profundebat, peluesq;
 sex aut octo implebat aqua citrina feruētissima, dum
 venter totus subsideret. Mox deinde menses insequē-
 bantur ex natura præsripto. Collecta proximo mense
 par colluuiēs, statō dein tempore profluebat. Hæc tan-
 dem per sanata vterū gestaui, peperitq; bene vitalem
 fœtū. Tales autem Aëtius curat, decubitu, quiete, vo-
 mitu, & validis collutionibus ac pēsu, ut apud eundem
 ad longū videre licet. Post aquarū eductionē, exercitiū,
 sudoris prouocationibus, validisq; frictionibus totius cor-
 poris, sed præcipuē suminis vtendū iubet. Sed & vteri
 oedema tumor quoq; consequitur in pallido candidus,
 sublaxus, tactu mollis, digitorum pressioni cedens, se-
 q; rursus paulatim attollens, cuiusq; alui manu appre-
 hēsa faciliē attrahitur. Loca igitur oleo cōmuni ca-
 lida, aut iunio, aut ligustrino irriganda Aëtius iubet;
 pēsuq; vtendum ait, ac reliquis præsidiis quæ superius
 diximus de spiritu in vtero collecto, seu vteri infla-
 tione. Huius curationem etiam vide apud Fonta-
 nonum De morb. interioribus cap. 27. De oedematis
 vteri curatione. Ab omnibus his tumoribus iam dictis
 differt scirrhus. At scirrhorū genere cōprehenditur, iux-
 ta Paulū, etiā durities, quam σκληρώμα Græci vocāt,
 circa vuluæ ceruicē, potissimū obueniens. Aëtius ap-
 pellat schirrhoma. Habet autem similem tumorem,
 sed tactui renitentem, & moderatē affligentem:
 Plurimumq; inquit, in vteri ceruice schirrhomata

Historia
 apud Ferne-
 lium de mu-
 liere vteri
 hydrope la-
 borante.

Oedema
 vteri.

Scleroma.

Scirrhus.

Notæ.

S 4

enepiunt,

Causa.

eueniunt, quæ immixtis digitis percipi possunt, ac plerumque vuluæ collum versus scirrhomia auertitur. Vbi verò scirrhus vteri fundum inuaserit, tumor vehemens & taclui renitens occurrit, grauitatem motionesq; difficiles non tantum crurum (vt diximus) sed totius corporis, & segnitiam ad omnes vitæ functiones afferens. Causas iam diximus. Fit enim ex humore lento crasso vteris infixo, & statim in principio congregatus paulatim & augebitur: crebrius verò Medicorum imperitia paratur quum vehementer erysipelata & inflammationes adstringunt, & infrigidant, & si quis medicamenta vehementer dissolutiua adhibeat: in summa, in vtero repente fit ex humoribus iam dictis, vel inflammatione precedente & malè curata.

Prognostica

Cum autem duplicem esse diximus scirrhum, verus & exquisitus, sine sensu, incurabilis est: at aliter, cum aliquo sensu, curari potest, sed agrè. In vtero verò diutius si perseueret, deprauatus corporis habitus, & decoloratio subsequantur, interdum & moles aquosa. Iuxta Auic. in interiore spatio vteri, incurabilis est; in vteri ore, aut ceruice, nec omnino sensus expers, curari potest. Ita & Aëcius: Quæcunque scirrhomata circa os & collum vuluæ constiterint, facile curantur: quæ verò circa fundum, difficulter. Accidit insuper & non rectè tractatis habitus aquosus. Nam Rhaf. 9. Cōtinent. Apostema durū & non cancriforme (hoc dixit, quia facile scirrhus in cancerum transit) si diutius prolongetur, instantur pedes, & extenuantur tibiæ, & cessabunt menstrua. & Add. Auic. Magnificatur venter, & subsequitur aliquando verus hydrops: ideo scirrhus vteri cum magna diligentia curandus est. Curatur autem in principio, si vires ad-

mittunt,

Curatio.

mittunt, iuxta Paulam & Aëcium, vena secta, ut diximus Obs. precedenti, & purgatione ex hiera Archig. Valent ea quæ de apostemate melancholico diximus; purgatio ex epithymo, senna, confect. hamech. Habes apud Aëcium infessus plurimos, pessos varios emollientes, & cerata, forus, emplastra. Utitur infusionibus è sænug. sem. lini, pulegij, artemis. rad. & solior. cucumeris agrestis, decoctus. Vterum celluit susino oleo, narcissino, irino, glencino, adipe anserino, gallinaceo, porcino recenti, alicui vnguento admixto, lacte bubulo aut caprino cum anserino adipe. Cataplasma sumini illinit è carycis, hyssopo, nitro, absinthio; cucurbitulasq; cum scarificatione affigit; & postea vritur medicamento polyarchio, emplastro diachylo, cum oleo susino, pessusq; mollitorio. Atque horum copiam apud eundem inuenies lib. 16. cap. 86. De scirrho ac scirrhomate, ex Sorano. Verum licet scirrhus etiam præscriptis medicamentis pro declinatione inflammationis curari possit; tamen cum sine febre sit, possumus & vti fortioribus ad partem emolliendam; quale illud est à Rondeletio descriptum: & rad. lilior. bis mal. cucum. agrestis, añ. qv. j. artemisiæ, vel nepitæ tertiam partem m. j. ficuum paria xx. sem. lini, sænug. añ. ʒ ij. flor. chamameli, viol. meliloti, añ. p. j. fiat decoct. in aqua & oleo dulci. Ex decocto soneatur regio vteri. Ex residentia pistla & transmissa fiat cataplasma, quod applicetur supra partem post sotum. Deinde utatur sequenti vnguento: & butyri recentis, axung. porc. añ. ʒ ij. ping. gallinæ, anati, anseris, añ. ʒ j. ß. olei amygd. dul. & olei lilior. añ. ʒ ij. mucilag. sem. sænug. extract. cum vino albo ʒ j. terebinth. cera q. s. quo utatur post vsum fotus. Et post vsum istius vng. rur-

sum redeat ad folum, & iterum ad vnguentum. Similibus præsidis aliquando vsus fuit commodè in vidua quadam Alcmariana, in qua durities maior erat quàm in muliere præcedenti, ita quòd totum fere vterum occupauerat. Sequens quoque valde vtile est: R. oppopan. bdellij, ammon. añ. ʒj. styracis, myrrha. añ. ʒß. propoleos vera ʒj. rad. iridis ʒj. croci ʒß. dissoluantur lachrymæ in oleo lilior. & amygd. & vino maluatico & depurentur; quibus adde parum terebinth. & ceræ; fiat vnguentum. Emplastra, diachylon, vt diximus, ex gummis & ireatum partem illam induratum emolliunt. Huius partis emolliuionem plurimum iuuat fons ex eadem decoct. vel oleorum de lilio, amygd. de myrrha, de styrace. Hac enim partem contingunt. Vtilissimum etiam est illis encathisinate vii ex decocto fons præscripti, & diutius in illo sedere. Iniectio etiam clysterum emollientium, & relaxantium ex ol. plurimum conferet. In declinatione herba digerentes poni debent in encathisinate maiore quantitate; quales sunt, nepeta, pulegium vtrumq;, artemis. calaminth. flor. anthos, stæchad. sambuci: quia hæc herbe decoctæ in multa aqua minus ficcant, & digerunt sufficienter. Radices cucumeris agreß. & brion. in eodem encathis. addi possunt. scirrhus enim fit à materia congelata; quam ob causam medicamenta calida, & dissoluentia sunt ex vsu, permixtis quibusdam humidis, malacticiis, ne id quod tenue est, discutiatur, & crassum remaneat. Radix mandragoræ in vino & oleo amygd. & axung. porci decoctæ & confusa partes induratas emollit, maxime si pauca quantitas oppopan. cum ea misceatur.

OBSER-

OBSERVATIO XLVI.

De uteri cancro ulcerato & lethali.

MULIER Alcmariana vuluam carcino-
mate adeò corrosam habebat, ut particu-
latim excideret: quam cum Chirurgus tracta-
ret, & nos ad eam acciti essemus, licet longo
tempore palliatione usa fuisset, malum lethale
esse pronuntiavimus: quæ quidem cum magna
fœditate & dolore aliquandiu vitam protra-
hens, tandem miserè obiit. Venit mihi tunc in
mentem casus ille quem aliquando, Bononiæ in
Italia existens, vnà cum præceptoribus ægrotan-
tes inuisendo, vidi in muliere quæ cancerum in
utero habebat etiam ulceratum. Conuocatis
Medicis eo tempore illustribus, ut Elideo præ-
ceptore meo & Luca Chini, & Passino, facta est
consultatio: concluderūt, mulierem morituram,
ad tēpus tamen vtentes palliatione. & illa cum
magna miseria, ut hæc nostra ægra, tandē obiit.
Longo tēpore his duabus præcesserat scirrhus,
qui facilè in cancerum vertitur. Causam adfert
Rondeletius: Nam in partibus, quæ scirrhum
patiuntur, si materia vratur, in cancerum verti-
tur scirrhus, ob materiæ similitudinem. Fiunt
enim isti duo affectus à materia melancholica,
cancer ab adusta, scirrhus à crassa frigida non-
dum adusta, & à pituita crassa. Cognoscimus
scirrhum mutatum in cancerum, si cum prius
esset sine dolore, ob materiæ frigiditatem
siccita-

284 DE MULIERVM MORBIS,
 siccitatemque; dolorem iam sentiat, ob calidi-
 tatem & humoris acrimoniam facientis can-
 crum. Sentitur durities in vtero, qualis erat
 in scirrho, & citra magnam vteri molem. Est
 autem cancer duplex; vlceratus, & non vlcera-
 tus. Vterque incurabilis est, quia abscindi non
 potest. Cum incipit negligitur, quia magnam
 molestiam non adfert, quo tempore posset pro-
 hiberi incrementum medicamentis, & optima
 victus ratione. Satis à nobis fit, si prohibeamus
 non vlcerat, vlcerationem, & vlcerati incre-
 mentum. Verùm cum istæ duæ mulieres pri-
 mùm neglexissent curationem, non magni fa-
 cientes malum, nec Medicos in principio vo-
 cantes, vbi eò malignitas progressa est vt cancer
 vlceratus accesserit, etiam ipsa palleatio non ad-
 modùm diu vitam conseruare potuit, quanquam
 ad menses aliquot protraxerit. Vera enim cura-
 tio hîc locum non habebat (vt in Scholio latius
 dicturi sumus) & si blandiendo caueatur ne vl-
 terius procedat vlceratio, & vita prolongetur,
 tamen moriuntur: cum vera curatio consistat
 in vrendo & abscindendo, quod hîc fieri non
 potest.

SCHOLIA.

Cancer
 vteri.

CANCRORVVM vulua alij, inquit Paulus lib.
 3. cap. 67. cum exulceratione, alij citra vlcus
 inuadunt. Sic & Aëtius lib. 16. cap. 96. De canceris
 vteri, ex Archigene: Quidam cancroforum tumorum
 vlcerati, quidam non vlcerati sunt; quemadmodum
 in

i loco de mammillis prædiximus. Non ulceratus ma- Non vlcera-
 na ex parte, ut Rondeletius censet, fit in corpore tus.
 teri; ulceratus in collo vel in orificio interiori. Causæ.
 Causas iam diximus; cum fiant ex humore atrabi-
 ario, qui intus vi caloris effertur & excan-
 lescit. Et ita ex atra bile oritur, ut Gal. lib. De diff. Notæ non
 nob. ex se etiam, ut dictum est, vel à scirrho. Hoc si ulcerati.
 non ulceratum est, moles pondere grauis percipitur,
 tumorq; durus colore subliuido. Cancrigo non vl-
 cerati (inquit Aëtius) huiusmodi notis indicantur:
 tumor induratus circa os vteri inuenitur tactui re-
 sistens inaequalis, crepidinosus, colore sæculentus, ru-
 ber, subliuidus, vehementes dolores inferens, vsque
 adinguina, sumen, pectinem, & lumbos, progredien-
 tes, manuumq; attrectatione, & medicamentorum Signa vlcera-
 varietate excitatur. Eadem habet & Paulus. Exul- tati.
 ceratum verò carcinoma, ut nomen, malignum est,
 ita præter ceteras notas, labra habet prætumida ac
 dura, atque ex concreta illuue sordida, & liuida: sa-
 nie quoque id manat graueolente, tenui, & nigra,
 vel etiam fulua. In exulcerato, inquit Paulus, præter
 dolores, durities tumoremq;, vlcera erosa ac inaequa-
 lia conspiciuntur, plurima ex parte sordida, labris
 prætumidis, albicantibus, concreta, colluue humorum
 ingrata. Eadem ferè habet & Aëtius. Erosa enim
 sunt aut defossa inaequalesq;, vlcera partes: per spe-
 culi artificium percipiuntur, quarum pleraq; sordida
 sunt, crepidinosa, albescentes, præter vehementiam
 doloris, tumorem & duritiem: quibus si medicamen-
 ta repurgando idonea applicentur, antiqua quedam
 faculenta, rubra, sanguinolenta, deferuntur. Ab vl-
 cere autem sanies tenuis aquosa, nigra, ignea & sæ-
 rida

Differentia
ab inflam-
matione &
scurbo.

Curatio, seu
potius pal-
liatio.

rida iugiter excernitur. Loca enim muliebria ad de-
fluxum nata sunt peculiariter. Reliquas notas quæ
vterum affectum sequi solent, paulo suprà de inflam-
matione recensuimus, eadem & Paulus adiungit. Ab
inflammatione tamen hic affectus seiungitur, quod
diuturnus sit, dolorq; minus lancinans, & febris non
perinde ardens. à scurbo, quod calore doloreq; fati-
get. Malum id, ut Aëtius simul ac Paulus referunt,
teste Hippocrate, insanabile est; abscindi enim non
potest. Cancros enim occultos, ac potissimum confir-
matis, aut ulceratis, melius est non curare: quia in
quibus non curantur, diutius viuunt; ut Gal. in Com-
ment. 38. lib. 6. aph. Lenire tamen possemus, iuxta
Paulum & Aëtium, in se sibus ex scœnug. malua, ac ca-
taplasmatibus similibus, quæ & leniunt solantq; in
accessionibus, ex malua aut althæa in malsa liquefa-
cta, & rosaceo paulum leuigata illitaq;: vel ex carycis
seu ficis siccis, meliloto, rata, thure, buniade herba di-
ligenter cum oleo contusa: vel ex palmulis in passo co-
ctis, quibus adiecta sint ouorū lutea, polentaq;. Idem
possunt pap. capitula trita & cribrata cum polygoni,
vel seridis, vel coriandri succo: vel solani tenera folia
cum lacte muliebri apposita: vel solanum in rosaceo
cerato exceptum. Hac in doloribus vsui sunt. Deinde
ceratū iniiciatur cum rosaceo aut myrteo, cum pal-
mulis in passo decoctis. Præuatim maleficis ulceribus in-
uenit (teste Aëtio) quod è face in corinis abenis ba-
neorum calidam continentibus inuenta conficitur. ea
enim fax sub prunis, quousq; ignescat occultitur, dein-
de teritur & in rosaceū ceratū assumitur. Hac igitur
extra sinum ad vteri orificiū apponitur; in ipsum verò
sinum muliebri aut a sinini lac, aut plantag. succus le-
uiter

inter tepefactus, præcipuè si ab ulcere sanguis erūpat,
 vel polygoni succus cum modico thure insūdatur. Me-
 dicamentū ex cancris tribus vel quinq. (impares enim
 esse volūnt) sub prunis vstis cum oleo ligustrino tritis,
 cum penna illinitis. Reliqua vide apud Aët. & Paulum.

OBSERVATIO XLVII.

De Cancro uteri.

ADRIANA Nicolai, mulier annorū 50. pro-
 les octo numero habens, multis mensibus
 Delphis decumbebat. Primò inciderat in longū
 & diuturnū menstruorū profluviū rubrum;
 deinde etiam in album, seu muliebrē fluorem:
 quibus tandem & hæc symptomata accesserūt:
 Dolores circa inguina & coxam adeò atroces, ut
 multis deinde diebus neque dormire neque in-
 ambulare potuerit. Hæc autem quatuor mensi-
 bus continuīs alterius Medici opera v̄sa fuerat,
 qui omnibus modis menstrua constringere &
 compescere, ac omnino stupefacientibus dolo-
 rem intensum sedare studuit. Exhibuerat aquā
 nenupharis & plantag. cum syr. nenuph. ac pap.
 adiecto ꝑ. opij. Vnde sensu obstupefacto ad
 tempus, per vnum diem dolor quidē conspie-
 batur, sed paulo pōst multo vehemētiore redibat.
 Vsus certē opij mihi semper fuit suspectus. nam
 cū & alteri in Nosocomio decūbenti opium
 exhibitū fuisset, altera die mortua inuenta est. In
 hac autē muliere dolorē quidē sedabat, sed cau-
 sam morbi augebat. Vnde & Gal. I. 2. De com-
 pos. medicamentorū sec. loc. disputans contra
 Apolloniū, dixit, non debere exhiberi opium ni-
 si in doloribus, in quibus vel mortē vel syncopē
 expectan-

288 DE MVIERVM MORBIS,
expectamus, ad quam syncopen sequitur mors.
Ergo vidi quendam, inquit Montanus cap. de
De doloribus cap. supra Rhaf. lect. 5 ex opio ex-
hibito interiisse. Periculosa, ait, sunt ista stupe-
facientia, præsertim per os exhibita: quoniam
nihil aliud faciunt, nisi mortificare. Vnde nun-
quam ad philonium accedit Galenus, nisi cum
timet mortem; sed ad theriacam nouam & dia-
spermaton, neque vnquam vsus est opio. Ab
eo mortuus est ille infelicissimus Cassius Gym-
nasij Patauini splendor & decus. Ita & Auicen-
na prouocaturus somnum, non transibat papa-
uer album. Rhases proponit opium: at præstat
eum non sequi. Sed in hoc potius imitemur
Galenum, qui in inflammatione aurium, acci-
pit opium correctum cum duplo castorij; &
nunquam administravit opium, nisi cum me-
dicina calida. Hæc ferè Montanus. Ceterùm
ad mulierem vt reuertamur, cum dolor rediret,
& perpetuò eidem adhæreret, tandem mense
Octobri anno 1563. Medicus prior incidit in
morbum articulare, & amplius eam inuisere
non potuit; & sic ego ad ægram vocatus fui.
Eam inueni tunc laborare ex prægressis aliis
causis, his symptomatibus præsentibus; tumore
præter naturam; & in vtero perfectè cancerum
vulneratum habere, ex dolore continuo in pube,
& duritie manifesta; quam exterius percipie-
bam magis in inguine sinistro, cum intenso
dolore coxæ. febricitabat quoque nonnihil sub
noctem: nam & vigilæ immoderatæ aderant,
& aphthæ subsequutæ sunt, & profluvium illud
aquosum,

aquosum, seu muliebris fluor, retentum erat; sed manifestè emanabat sordities & colluvies ingrata, pessimè olens, etiam nigra, acrimoniā & dolorem exedendo adferens. Quatuor, inquam, mensibus ante me vocatum decubuerat. Erat igitur hic cancer ulceratus ex melancholia adusta: quod & sanies nitrosa acris effluens ostendebat. Et ita huius mali procatarcticā causam hanc esse putabam; præterque cibum & potum, ac alias res non naturales procreantes melancholiam adustam, ignem calidum etiam ad hoc iunisse: perpetuè enim exercebat artem culinariam, ita ut iugiter foco ac igni adhereret, etiam dum sana existeret: in ea enim domo habitabat, ad quam carnes assandæ deferabantur: unde & præ ædibus inter signum artis culinariæ, seu assatoriæ propendebat. Ex illa caliditate puto in principio purgationem menstruam fuisse concitatiores; tum ob continuos labores, & continuū motum apud ignem. Et quia fluxus ille fuit diuturnus, tandem hepatis fortè refrigeratum fuit ex longo fluxu, & ventriculus affectus: hinc & succi aquosi generati sunt; atque huiusconsequo fluxus quoque muliebris aquosus ebortus etiam diuturnus. tandem eo constricto, materia fuit inculcata & incinerata, ex atra bile fortè post tumorem scirrhosum: vel sanè ex se ipso cancer ulceratus tandem obortus est. quem quoque incurabilem esse pronunciauimus, ut calumniam declinarem. Interea palliatione tantum utendum esse diximus. Quare ne vlcus magis procederet, &

T

ut

290 DE MVLIERV M MORBIS,
vt dolor, quantum possibile esset, magis miti-
garetur, inhibuimus omnem cibum melanco-
licum sanguinem gignentem. sanguinem non
detraximus, quia ipsa debilis, & principium
iam diu progressum erat. Verum materiam
melancholicam leuiter & frequenter primò
minuendo, inde eam concoquendo & va-
cuando, in hunc vel similem modum pallia-
tionem instituiamus: R̄ elect. lenitiui, diacatho-
lici, añ. ʒ ij. confect. hamech ʒ j. β. cum sero
lactis fiat potio brevis. deinde concoquatur
hoc modo: R̄ syr. de bugloss. de fumaria, de
epithymo, syr. viol. añ. ʒ j. aquarum borag. lu-
pulorum, solani, intybi, añ. ʒ iij. fiat iuleb pro
quatuor dosibus. Commendatur à quibusdam
hoc sequens: R̄ quinque herbarum capilla-
rium, herbæ Roberti, chelidonij minoris, ver-
basci, buglossi cum rad. summitatum lup. sa-
lictarij, fumariz, añ. m. j. foliorum solani,
(proprietary occulte discutit humorem cancri)
intybi satiui latioris non loti añ. m. j. β. vuar. pas-
sul. mund. ʒ j. trium flor. commun. añ. p. j. β. po-
lypodij quercini ʒ j. folior. senæ oriental. ʒ vj.
epithymi ʒ iij. (hæc humores vltos mūdificant)
decoquantur in ℥. q. aquæ ad usq. dimidij con-
sumptionem; accipiatur iuris decocti lib j. β.
saccharo dulcedo inducatur, fiat que syr. medio-
criter coctus; depuretur, & adiectis ʒ ij. santali
citrini, & ʒ j. pul. diarod. abbat. suauioris & sapo-
ris & odoris reddatur. Eo vtetur ieiuna manè
diebus quinque. Est autem hoc apozema ad
humores accommodum. Cùm autem sæpius
pur-

purgata esset à Medico præcedente, cum quo
hoc tempore dulcia non ferret, infundi iussi-
us folior. coluthæ ʒß. epithymi ʒij. seminis
nethi ʒß. in aquis fumarie, buglossæ aut bo-
rag. & solatri: cuius medietatem cum accepis-
set, dictu mirum, cum facilis solutionis esset &
lebilis, octo secessus habuit. Et capiens omni
mane cyathum. vnum seri lactis, satisfaciebat
etiam ad acrimoniam humoris contempera-
dam. Si ita debilis non fuisset, iterum purgassem
cum diacatholico exiguo, adiecit. confect. ha-
mech, vel pilulis indis. sed quia nonnihil fe-
bricitabat, serum lactis, etiam exiguo subinde
epithymo injecto vel infuso, satis ad rem facie-
bat. Interim pro aphthis os abluibat decoct.
hord. plantaginis, mal. & sem. coton. & facile
curabantur. Sed, quod præcipuum erat, ad
mitigationem doloris, foris fiebat per chirur-
gum Petrum Fredericum, compatriam meum,
& cognatum ipsius ægræ, cum spongia ma-
defacta ex malua, fœnugræco, althæa, foliis so-
lani in lacte decoctis, etiam adiecto subinde
lacte muliebri: nam cum perpetuo decum-
beret, in seculo uti non poterat. Subinde & suc-
co solatri in mortario plumbeo, cum pistello
plumbeo ad consistentiam linamenti humi-
dioris, intus mulier ipsa muliebria illinebat,
& cum lacte muliebri mixtum subinde in-
fundebat. Ad duritiem & dolorem exterius
imponebatur pectini cataplasma ex rad. al-
thææ, foliorum maluæ, floribus & foliis me-
liloti, & foliis solani, cum farina hordei,

292 DE MULIERVM MORBIS,
& sem lini, & oleo viol. ac rosi ad flacciditatem
prius decoctis. Chirurgus per speculum ma-
tricis conspexit in orificio vteri adesse magnam
duritiem, & intus rimas quasdam corruptas, ex
quibus modò materia alba, modò nigra fœcu-
lenta copiosè cum pessimo odore emanabat.
Tandem tota matrix effecta est dura, cum tanto
dolore, vt similem nunquam viderim. Ex mu-
cagine sem. fœnug. malua, & cremore hordei,
adiecta axungia recenti caponis, gallinae, anatis,
anseris, butyri recentis, cum oleo cheyrino,
amygd. dul. & cera alba fiebat linimentū molle,
ad duritiem ac dolorem, & cum bombace im-
ponebatur subinde. Modò & hoc vnguento
molliori utebatur: ꝛ plumbi vsti, thutiae præ-
paratae añ. ʒ. j. ꝛ. cerusae ablutae ʒ. ij. succi solatri
ʒ. iij. succi granat. ʒ. j. camphorae ʒ. j. olei rosi &
ceræ albæ q. s. ducantur in mortario plumbeo
cum pistillo plumbeo ad modū vnguenti mol-
lioris. Sed cūm omnibus parū proficeremus, &
vito dixissemus quòd tandem moreretur, licet
dolor iisdem remediis subinde mitigaretur;
posthabito nostro consilio, me reliquit, & totam
curationem Empirico cuidam glorioso, sanita-
tem promittenti, commisit, qui, prius extortis
aliquot nummis, pactum cum ipso inierat,
uxorem breui ad sanitatem se deducturum:
quamuis vix paucis postea diebus, hæc ipsa mi-
serè cum intensissimo dolore, vt prædixeramus,
mortem obierit. Idem contigit calcearij vxori,
prope templum antiquum habitanti, quæ &
cancrum vlceratum in vtero habebat: quæ cūm
infusio-

infusionibus aptis ad palliationem vti non vellet, ex nostro consilio, etiam morbum incurabilem prædicenti, cum fidem mihi non haberet, me reliquit. Et Empiricus lithotomus postea sanitatem promittens, ab ea extorsit 12. florenos; quamvis non diu post etiam moreretur. Quemadmodum & vidua illa Leonina, Francōis dicta, quæ multo tempore aliis Medicis vsa fuerat antequam me vocaret: & hæc quoque miserè obiit, multo antè tempore hoc malo afflictæ, & omnino macie confecta ac doloribus fatigata. neque hæc iniectiones admittere voluerat, vti præcedens.

SCHOLIA.

VTERQUE cancer (vt diximus) siue non ulceratus, siue ulceratus, in fundo vel imo vtero existens, incurabilis est, quia abscindi non potest. Cum incipit, vt antè quoque retensimus, negligitur; quia in principio subinde magnam molestiam non adfert, quo tempore posset prohiberi incrementum, medicamentis & optima victus ratione. Satis à nobis sit (inquit Rondelerius) si prohibeamus non ulcerati exulcerationem, & ulcerati incrementum. Prohibemus autem canceri generationem sanguinis missione è brachio, vel ex poplite, apertione hæmorrhoidarum, vt auertamus in partem proximiorē melancholicum sanguinem: frequenti insuper purgatione, quæ non multum calefaciat, & euacuet atram bilem, aut crassam pituitam: medicamenta denique quæ cap. De fluore muliebri à melancholia dicta sunt, erunt

Quibus modis prohibetur canceri generatio & incrementum.

T 3

valde

valde oportuna. Extrinsicis & intrinsicis frigidis
 medicamentis & adstringentibus eius incrementum
 prohiberi potest, ut oleo ros. omphac. myrt. vel succis
 folarii, plantaginis, cum paucis aceto. Permiscuntur
 succi cum oleo, & fiunt embrochationes, vel vnguen-
 ta; vel excipiuntur farina, & applicantur supra par-
 tem, vnguenti modo. Aquæ vel succi herbarum ini-
 ciuntur. Si autem exulceratio fuerit, metallicis est
 utendum, & vng. diapompholigos, emplastro de ce-
 rusa, emplastro nigro, & quacunque parata sunt
 ex antimonio, plumbo, cerusa, thuria, vel pompho-
 lyge: & ut breuiter dicam, quacunque circa mor-
 sum refrigerant & exsiccant. Quare neque lachry-
 ma, neque alia medicamenta aut attrahentia, aut di-
 gerentia admiscenda sunt; ut thuris, myrrha, galba-
 num, assa fetida, cinnamomum, spica, & huiusmodi.
 Sunt diligenter leuiganda, ut collyria, deinde abluen-
 da diligentissime, & ex illis vnguenta paranda cum
 succis, oleo, & cera alba, vel seuo hirci. Nam aliæ
 axungia putrefaciunt. Attamen Aëtius videtur adipe
 porcino in hunc modum: R. spuma argenti lota ℥vj.
 thuris masculi, æsypi, adipis porcini recentis, butyri
 noui, añ. ℥ij. rosacei ℥iiij. seruatur medicamentum
 in plumbea pyxide: quod si exaruerit, rosaceo dilui-
 tur. Sequens autem iniectio vlcera cancro maxime
 conuenit: R. herba Roberti, verbasci, scabiosæ, chelido-
 ni minoris, anethi, stercoris humani, añ q.v. combu-
 rantur: de cinere autem accipiantur ℥ij. aqua sola-
 ni ℥vj. excepta in mortario plumbeo, pistillo plum-
 beo agitentur; deinde in vterum inieciuntur. Oleum
 ouorum frequenter ductum & agitatum in morta-
 rio plumbeo, donec spissum reddatur & plumbi colo-
 rem

Chelido-
 nium mi-
 nus, alij
 scrophula-
 riam appel-
 lant.

rem contraxerit, efficacissimum est medicamentum. Cinis cancerorum fluuiatiliū locus in aqua solani permixto pul. ex plumbo, vel antimonio, vlceratum cancerum curare dicitur, & creditur. Quod si non curat, saltem mitigat, exiccat, & depascentem cohibet. Nam difficillimum est partem iam induratum emollire, & pristinae sanitati restituere. Sed metallica omnia partim repellendo, partim digerendo, citra morsum morbum leniunt. Hac est cura, quam vocant palliativam. Cibus dabitur, iuxta Paulum, qui facile in corporis membra queat distribui, boniq; succi, vinum paucissimum, aquosum: acrium esus, & repletio omnis vitanda est, ut quibus cibi promptè corrumpantur.

OBSERVATIO XLVIII.

De ulcere matricis.

MATRONÆ nobilissimæ ex utero sanies effluebat, cum ardore & inflammatione; & cum subinde leuem febrem sentiret; cognovimus, in ea uterum exulceratum esse: nam in affecta parte punctorium dolorem percipiebat; & per intervalla, humor diuersus cum magno dolore excernebatur; modò paucus, cruentus; modò feculentus: qualia videlicet inflammato ulcere Paulus apparere dicit lib. 3. cap. LXVI. De uteri ulcere. Igitur cum hîc ardor, calor, & inflammatio aliqua simul adessent, prius assumpta ʒj. cassiæ in bolo, adiecto pul. sem. berberis ʒj. saccharoque asperso; cum in vere essemus, & sanguis videretur nonnihil abundare, sanguinem

296 DE MULIERVM MORBIS,
nem detraximus ex vena basilica; & altero die
ex saphena, sed in pauca quantitate; ob febre
inquam, & inflammationem, cum non diu la-
borasset. Arabes verò in vlcerum locellorum
principio sanguinem demunt ex vena axillari,
altero die ex saphena. Id tamen faciendum iu-
dicio oculati Medici; potissimum vbi calor &
inflammatio simul adsunt cum vlcere. Aënius
tamen nec Paulus de venæ sectione mentionem
faciunt. Vnde quoque, si ex apostemate vlcus
fit, & prius facta est missio sanguinis, tunc mi-
nus conuenit, & multo minus in vlcerato inue-
terato, nisi mulier admodum sanguine laborare
videretur. Postea autem cum hinc sanies exiret
cum acrimonia, & materia esset acuta corro-
dens, syropos præscripsimus bilem contempe-
rantes & acrimoniam restringentes: & syr. viol.
nymphææ, ex infus. ros. (propter abstersionem)
an. ʒj. decoctionis solani, lactucæ, intubi, lupu-
lor. fumariæ ʒvj. fiat syr. pro ij. dosibus. Deinde
ita illam purgaui: & folior. senæ ʒij. β. rhab. op-
rimi ʒj. epithymi ʒiij. sem. anisi ʒβ. schœnan-
thi ʒβ. infunde per noctem in ʒv. aquæ solani,
facta leui ebull. manè fortiss. express. adde syr. ex
infus. ros. pallid. ʒvj. fiat potio. & alius satis
fuit soluta. Deinde ad ardorem & intempe-
riem atque acrimoniam tollendam imperaui,
vt succum butyræ pastoris & plâtaginis aliquan-
do iniceret cum lacte muliebri, & exterius cum
iisdem succis lauaret, vel cum panno lineo ap-
plicaret. Nam supposito ibidem calore & do-
lore, Valescus vtebatur aqua frigida: Noui
enim,

enim, inquit, aliquas mulieres sentientes se habere eiusmodi vlcera : lauabant ea cum aqua frigida, mūdabant deinde, & cum pannis lineis exiccabant, & in matricem mittebant frequenter: atque iisdem præsidiis sæpe mutatis, hæc ipsa sæpe per se ad integram curationem sufficiebant. Ablata intemperie calida, & febre iam diminuta, ad vlcera detergentibus & exsiccantibus curanda accessimus, corpore etiam cum manna & cassia adhuc semel repurgato. Multum autem hîc resiccare oportet, tam ob partis naturam siccam, quàm ob recrementa, quibus pars illa abundat; vt latius in Scholio dicemus. Inter medicamenta detergentia vlcera, in quibus acrimonia puncturæque sentiuntur (vt hîc erat) cum sine morfu esse debeant, optimum hoc sequēs mihi esse videbatur, quod primò solummodo ex sero lactis constabat cum pauco saccharo; quod vt iniiceretur, iubebam ad vlceris deterfionem; postea etiam adiecto melle & syrupo ex ros. siccis. aliquādo vt etiam iniiceret consului decoctum lentium & plantaginis, quibus aliquando adiciebant folia myrti, oleæ, vel oleastri, ceterach, agrimonîæ, in decocto præcedente: nam hæ herbæ, tum aliæ amaræ, sine magna calfactione iuuant. Quare absinthium, & similes herbæ calfacientes, hac in causa conuenire non possunt; sed potius in sordidis vlceribus, quibus alia mulier magis afficiebatur: ad quam curandam, iussi mulierculæ Adrianae Bieselingiæ, quæ tales curabat, vt post purgationes aptas totius corporis, pituita

T 5

salsa

298 DE MULIERVM MORBIS,
 falsa & materia crassiore sordida prius digesta,
 deinde euacuata cum decoct. senæ, epithymi,
 agar. pauco adiecto diaphœniconis, vt, inquam,
 iniiceret hydromel cum decocto ireos, absyn-
 thij, agrimonix. In vlceribus certè sordidis &
 pituitosis tales iniectiones fieri possunt, ex de-
 coctione apij, centaurij minoris, fabarum, lupi-
 norum, orobi; quæ magis detergunt. in iis ali-
 quando etiam dissoluimus parum Ægyptiaci,
 vel vnguenti Apostolorum in principio, cum
 vlcus obductum est multo pure & carne putri-
 da. Ceterum in hac prima muliere, de qua nunc
 agimus, cum & vlcus per aquam hordei & mel-
 le rosato satis abstersum foret, neque sordidum
 vlcus esset, mandauit vt vnguentum conficere-
 tur ex thutia abluta, & præparata, partibus dua-
 bus, cadmiæ, litharg. argenti, sarcocoll. añ. p. j.
 cum oleo ros. vel cum aqua plantaginis inun-
 gatur, & pars eius aliqua iniiciatur. Ita, vlcere
 sufficienter deteriso prædictis iniectionibus,
 commodè dissoluimus myrrham, aloëm, iri-
 dem, & alia sarcotica, trochis. albos Rhaf. De-
 mum ad vnguenta partem resiccantia est deue-
 niendum, vt ad vnguentum pompholigos, de
 cerusa, de plumbo, & de aliis metallicis insigni-
 ter resiccantibus. Et sic nos imperauimus vt
 collum vteri vlceratum inungeretur vng. dia-
 pompholigos; &, vt etiam ad fundum perue-
 niret, vt aliqua pars cum decocto ros. rub. &
 plantag iniiceretur. Egregiè illis medicamen-
 tis, cum non diu hoc malo laborasset, curata
 fuit. Si verò eiusmodi medicamentis non pos-
 sunt

int talia vlcera euinci, tunc alij iubent, & ten-
dum esse scribunt, vt fumigio pars exsicce-
ur. Faciendum autem id est ex sarcoticis, &
uliginem generantibus, vt lachrymis resinis-
que, aliis quibusdam permistis, vt sandaraca,
auripig. cortice thuris, ladano, hypocisthide.
vt: ꝛ thuris, mastiches, ladani puri, myrrhæ,
styrac. rub. añ 3 iij. marcas. & lapidis pyritis, au-
ripigmenti rub. añ. 3 ij. excipiantur terebin-
thina, & fiat fumigium. Quodd si mulier fæto-
rem ferre non possit, optimum erit parare aliud
magis odoratum hoc modo: ꝛ aliptæ moscha-
tæ 3 j. beniouin, styrac. ladani puri, añ. 3 iij. ma-
stich. thuris, & cort. eiusdem, añ. 3 β. cum mu-
cilag. gummi tragacanthi fiant trochis. quibus
vtatur vt dictum est. Iohannes Tiengius, Me-
dicus Amsteldamensis, cuius secreta à genero
ipsum mihi aliquando communicata fuere, no-
bilem se matronam hoc modo ab vlcere vteri
satis restituisse dicebat. Dabat ex præscripto
Placentini de quarto in quartum diem 3 v. de-
coct. senæ, epithymi, ros. rub. myrobal. Indæ-
rum, saccharo dulcoratæ. & clysterem subin-
de in partem affectam iniici mandabat ex
aqua tepida decoct. senæ, epithymi, fuma-
riæ, florum chamæmeli, ros. cui terebinthina
exigua, mel rosaceum & hordei farina iniecta
erant. Deinde pessos in vterum, seu os vteri po-
nebat: ꝛ mellis rosacei lib. β. farinæ lupino-
rum, siliginis, fœnugræci, sarcocollæ, ana
3 β. fiant pess. Si pruritus aut ardor adesset,
iusdem addebat semen papaueris, hyoscya-
mi,

mi, & caphuram. atque hæc etiam soluta subinde in vterum per obstetricem iniici iubebat, vel cum aquis conuenientibus. Facta repurgatione & mundificatione, commodè hoc medicamento utebatur, quod incarnabat, & exsiccabat, & consolidabat; valet enim ad hæc omnia post vniuersalia remedia, corpore prius ac vteri vlcere repurgatis: & aloës, thuris, lapid. hæmatitid. pul. cartæ combustæ, pul. cucurbitulæ combustæ, añ. 3 ij. puluerisuntur, & cribrentur, cum pellis imponantur, aut cum aquis appropriatis iniiciantur.

S C H O L I A.

Causæ.

EXVLCERATUR subinde vulua ex infelici partu, aut foetu excusso, aut corrupto, vel ex medicamento acris, vel fluore, vel abscessibus diruptis, aut fluxione erodentium succorum; vt & Paulus ac Aëtius testantur; quandoque etiam ex abortu, vt Erotis cap 9. De pass. mulierum refert. Sic igitur fiunt vlcera post alios morbos, vt inflammationem, vel abscessum; vt antea etiam ostendimus, & post fluxus muliebres acres, & post medicamenta acra apposita vel iniecta, & pessos acres in vuluam subditos. Fiunt aliquando per se incipiendo, ex materia calida acuta corrodeute, vel ex phlegmate salso, adusto, aut aliis humoribus adusti; vel consequuntur apostemata vteri, post suppurationem & rupturam; etiam aliquando præcedente solutione continui ex vulnere, percussione, aut casu. Fiunt & hoc tempore etiam vlcera ob contagionem luis Venereæ; aut propter recrementa

crementa recenta, & putrefacta circa pterygia vteri. Deprehenduntur faciliè à dolore, recrementis & dure reiecto. Ex Aërio dignoscemus vterum esse exulceratum, quoniam pars agra & affecta dolorem percipit punctorium; & ex intervallis foetidi ac saniosi humores ab ulcere sordido prodeunt; & consequuntur etiam alia vtero affecto peculiaria symptomata, velut est capitis, ac praesertim sincipitis dolor, ut de inflammatione vteri prius dictum est. item dolor ligamentorum & radicis oculorum, qui ad manus usque ad digitos se extendit; & reliqua supra de inflammatione vteri prius dictum est. item dolor ligamentorum & radicis oculorum, qui ad manus usque ad digitos se extendit; & reliqua supra de inflammatione vteri prius dictum est. item dolor ligamentorum & radicis oculorum, qui ad manus usque ad digitos se extendit; & reliqua supra de inflammatione vteri prius dictum est.

Signa vteri exulcerati.

16. Quod si prompta in conspectum exulceratio venerit, specillo oriculario, quod *διότρηστρον* vocant, deprehenditur: sin aliè defecerit, vel in loco recondito, ex recrementis humor enim diversus excernitur: inflammato quidem ulcere (ut precedente Obs. quoque diximus) paucus, cruentus, aut foeculentus, cum magno dolore euacuabitur: at si sordidum, copiosior humor & sanies cum miro cruciatu profluit: si depascens, foetidus, niger, cum doloribus vehementioribus, aliisque inflammationis signis. praeterea qua laxant medicamina, hoc irritant, contraria leniunt. Si ab inflammatione, signa adsunt communia inflammationis, dolor, pulsatio in vtero, & effluxus saniei & virulentiae, apostemate aut abscessu perrupto. Si vero per se incipiant, aderit priuatio signorum inflammationis, aut apostematis in matrice. Ceterum licet causas ipsas singulas iam dictas faciliè ex loquela, vel earundem agrotantium percipiemus, partim etiam ex nobismet ipsis ea qua praecesserunt & qua comitantur considerantibus: tamen prius distinguere oportet

Signa colli vteri exulcerati, & quando in profundo haereat.

Signa sordidi ulceris.

Ab inflammatione.

Signa à se incipientis.

Signa causarum.

161

Quibus
differant
vulnera vteri
à vesicæ.

Signa pro-
gnostica.

et ulceris naturam; quam deprehendere poterimus ex causis non tantum, quæ præcesserunt, verum etiam ex victus ratione, & totius corporis natura: nam etiam à lue Venerea factum fuerit. Quæ post abscessus frigidos fiunt, solida esse solent: quæ post inflammationem à sanguine, & quæ post erysipelas, virulenta & depascentia fiunt: si post scirrhum, gangranosa: quæ post luem Veneream dyssepulotica & chironia. At hæc quoque animaduertenda sunt signa quæ vlcus vteri ab aliis affectibus distinguunt: quoniam si vlcera sint in matrice, apparebunt recrementa excrementa separata ab urina, & dolor sentietur in profundo pectinis, & minorabitur color albus. Si verò sint in vesica, apparebunt excrementa mixta cum urina, & dolor sentietur magis apud anteriora vuluæ, & multiplicabitur color albus in rebus excrementibus, & cōcurrent alia accidentia superius scripta de scabie vesicæ, eiusque vlcere. Iam quoque cum vlcus est in utero, adest ardor in vulua, & sentitur cum pruritu, primò quidem titilloso (ut dicebat Bertrutius) quemadmodum & in satyriasi: postea, dum sortificatur, est cum pruritu acuto & pūgitivo: & si tunc nihil egrediatur, tum potius dicuntur rhagades & fissuræ; de quibus postea. Et si egreditur sanies nigra, viridis, liuida, cænosa, fœtens, tunc vlcus appellatur: si verò sanguis niger & crassus, tunc hemorrhoides matricis, seu vteri, vocantur. Quod ad signa prognostica attinet, nullum verò vteri vlcus contemnendum est, sed quam primum fieri potest curandum. Nam cum vterus totius corporis recrementa excipiat, atque nervosa substantia sit, haud facile curationem eius admittant vlcera; præsertim si diuturna fluant. Ex iis tamen ea quæ in conspectum veniunt, promptius, quam quæ in profundo

undo sunt recondita; & quæ pura, aut etiam simpli-
ter sordida existunt, facilius quàm depascentia, me-
dicamentis cedunt. Rarius verò, secundùm quosdam,
sunt consequendo; ut plurimum autem per se inci-
iendo. Sollicitè statim sunt curanda: nam si perdu-
auerint, fistulam periculosam, imò hecticam febrem
inducunt, ut sæpe vidimus, & tandem mortem. Vlcera
quoq. matricis in principio prohibent conceptionē; &
i prægnanti superuenerint, abortum inducunt, nisi ilico
succuratur: quoniam scilicet virtutē expulsiuam sti-
mulant, quemadmodum & tensesmus. Quouis modo
sunt, agrè semper curantur, quia pars illa, ut diximus
multa recrementa colligit, quæ vlcus consolidationē
retardant. Si igitur inflammationem experitur vlcus,

Curatio.

is quæ ad illam scripsimus sub finem Scholij Obs. 44.
huius libri, tum quæ apud Paulū lib. 3. c. 65. De vuluæ
abscessu scripta sunt, utendū est. Si verò ex redūdavi-
bus, & vitiosis ac erodentibus succis exulceratio vteri
fuerit orta, purgātibus medicamētis prius erit utendū,
præsertim vbi alterati, ac preparati fuerint qui redun-

Purgatio.

dant humores: & deinceps ad vlcus curationē con-
fugiendum. Interea quantū ad principalē huius mor-
bi curationem, diata sit ciuili, sine mœrore atque ani-
mi sollicitudine quiescat ægra, atq. somnū capiat mo-
deratum, in contrariam vlcus partem. Plenum effu-
giat locū, humidū præsertim, balnei vsum, crurumq.
frictiones. In cibis acria & amara vitāda sunt, vel sal-
sa, nimirumq. dulcia, ut quæ ex melle & saccharo con-
ficiuntur. Vetustiora vina & dulcia damnantur, sicuti
& aquæ puras potus. Panis siligineus utilis est sine sale,
auicula & hædina caro. Siti ac fame vincitur id malū
(ut quidā afferunt) modò debiles non sint: humida esca

Vicus ratio.

inusi-

Topica.

Si vlcus pu-
rum.Si sordidum
fuerit vlcus,
curatio.

inutilis habetur. Frigida igitur ac sicca profunt, & initio quæ abstergunt eliguntur; demum quæ cicatricem inducunt offerenda sunt. Et, vt summarim dicam, ea victus ratio instituat, ac eadem exhibeantur medicamenta, quæ in reliquis exulcerationibus, renum potissimum & vesicæ, à nobis fuere cōscripta. Quantum verò ad topica medicamenta spectat, si purum fuerit vlcus, leuiter astringentibus atque exiccantibus medicamentis vtendū erit: quod vbi conspicuum erit, eisdem illinatur vlcus. Si verò profundum existat, infundere ea oportet per instrumentum ad hoc appositum: quare rosaceum aut tetrapharmacum basilicum cum butyro recenti infundatur, iuxta Paulum. Eluantur item loci decocto rosarū aut lentium, aut ptisanæ seu plantaginis succo: præstabit etiam portulacæ, aut polygoni decoctum cum rosaceo. Verum vbi sordidum fuerit vteri vlcus, detergentibus medicamentis vtendum erit; veluti est ptisanæ cremor cum melle; vel mulsa in qua scænug-sis decoctū, aut malua, aut fursures, aut lenticula cui cortex sit detractus. Porro, quo magis expurgetur, etiam martubium, aut erium, vel melli adiuncta erui farina, vel iris, vel alumen rotundum, vel aliquid simile iniiciatur. Hac ipsa etiam extrinsecus ex mulsa macerata illinantur. Peculiaris est medicamentum, crocus leuigatus, cum lacte muliebri, deinde exceptus cerato rosaceo, cum adipe anserino: inungitur linteo- lo. atque hoc efficacius ad dolores. Capita papaueris in passo temperato madescunt diebus tribus, deinde in- coquantur donec emollescant, postea teruntur cum folior. ros. ʒ v. croci ʒ iij iure capitis pap. admissi, inde cera cum rosaceo liquata denarij duo ipsis superfun- duntur,

duntur, ac pessulo apponuntur in rosaceo tincto. Et illud salutare est, ex ouis, croco, rosaceo, adipe anserino, cerui medulla, preparatum. Utendum quoque ad sordida vteri vlcera eo medicamento, quod ex melle, terebinthina, rosaceo, & butyro, constat: cui aliqui etiam parum croci addunt. Efficax est & iris imposita cum melle; & aristolochia decoctum per se, vel cum melle infusum, teste Aëtio. Vbi pascendo serpunt vlcera cum inflammatione, illinitur panis egelidamaceratus ex hydromelite, oleo, alibea, sanug. palmulis pinguibus. Ceterum plantaginis succus, solani, polygoni, sercos, indetur, primum per se, mox cum vino austero, aut aceto. At citra inflammationem serpentibus robustiora iniiciuntur; veluti decoctum malicorij, rosar. summitatis olea, cupressi, malorum coroneorum, rubi, myrri, lentisci fruticis, rhus coriarij, ex vino astringente: postea verò aluminis, acaciae, lycij, hypocistid. Ex eisdem verò decoctis, iubente eodem Paulo, parabitur etiam infusus. Si nihil proficiunt, non alienum fuerit ex carta medicamen cum posca primum demittere, deinde cum aceto, aut anthera, iisdemq; liquoribus & ceteris quae dysentericis congruunt.

Vlcera serpentia, seu depascentia, cum inflammatione, quomodo curantur.

Citra inflammationem serpentium curatio.

OBSERVATIO XLIX.

De antiquo vteri vlcere & lethali.

MARIA Iacobi, mulier licet crassa, satis tamen prolifica, quæ in paruo Speculo apud pontem cespitarium Delphis habitabar, vteri vlcere admodum maligno, cum insigni dolore, vsque ad profundum vteri procedente,

V

cūm

306 DE MULIERVM MORBIS,
 cū a'iquamdiu laborasset, ex Chirurghi consilio
 variis vtens remediis, semper peius habuit. Ad
 quam tandem & ego accitus, animaduertens
 quòd vlcera essent depascentia & efferata, post
 purgationes totius corporis cōuenientes, impe-
 rari ex autoritate Aërij, vt iis topicis medica-
 menti vteretur, quæ ipse ex Aspasia lib. 16.
 cap. 94. ad vteri depascentias collegit. inprimis
 vt vlcera asinino lacte, vel equino, recēter mul-
 to ablueret, & hoc ipsum ad duas heminas re-
 cēns coctum, mellis hemina dimidia adiecta,
 & quatuor drachmis iridis farinae inspersis, ca-
 lidum vt saepius singulis diebus per mulierem
 Medicam infunderetur, præcepi: interdum &
 aqua malsa, in qua absinthium aut chamæme-
 lum incoctum erat. & vbi quod infusum esset,
 fuisset excretum, vt protinus loci malua deco-
 cto eluerentur; deinde pessus subderetur ex
 farina, erui, iridis, añ. 3 ij. cum melle subactus.
 Ceterum nullo modo voluit admittere iniectiones,
 vel alia à nobis apta præscripta remedia:
 ita vt miserè diu superuiuens, cum vehementi
 cruciatu tandem, viribus consumpta, cū ali-
 quot mēsis hoc malo detenta esset, interierit.

SCHOLIA.

CANONES hīc quosdam canones ante vlcis
 vteri curationem præponunt: vt: Quanto vl-
 cus vteri fuerit humidius, tanto medicamenta sic-
 ciora adhibenda, & apponenda, cū & siccus me-
 dicamentum per se eidem conueniat. Volunt q̃, re-
 motionem materiae antecedentis & peccantis cum ca-
 ribat.

Canones
 obseruandi
 in curatio-
 ne vlcis
 vteri.

hærticis, & victum optimi succi, haud minimam
urationis partem in se continere. hisdem itaque in-
rimis conueniunt abstergentia, detergentia, & mun-
tificantia, & cōsequenter exsiccantia: sub finem verò
incarnantia & cōsolidantia. Tam internas quàm ex-
ternas partes colli vteri mandas tenere cum pannis
ineu puris, & albisimis, & ab omni sorde immunes
ac securas, conuenit. Si itaque ab humore acri, mate-
riam digerimus, seridū, cichorij, lupuli, lactucæ, sola-
ni, aquæ, vel decocto, addita viola, nymphaea, ac tribus
santalini; syr. etiam viol. pap. nymphaeae alijs re adiectis.
Præparatam materiam euacuamus manna vel cassia,
vel syr. ex infus. ros. pallid. Phlegma salsum præpara-
mus decoctis & syr. è bugloss. fumaria, polytricho,
adianto, scolop. chamæpit. chamædr. & rad. apij, pe-
tros. scæniculi, polypodio adiecto cum saccharo, & vi-
no mali punici. Digestam materiam subducimus dia-
phœn. cum agar. epithymo, & senæ fumariæq; deco-
cto. Ab his, si corpus sanguine sit repletum, cubiri ve-
nam & tali, si opus est, secamus. & ubi expedit, di-
gerentia & cathartica reperimus. aliqui & vom-
itum laudant ad auertendam materiam. Ab his, quæ
vlcera abstergunt infunduntur; mox quæ persanant.
Interea si qua inflammatio fuerit, quæ calorem mi-
tigant imponimus. Syr. ex pap. iuiub. damas. luuani &
insestiones, ac vnguenta refrigerantia; vel tepidum id
infusum ex quatuor ouorum albis quassatis, succo se-
minis melon. pepon. cucurb. cucumeris rotundi ac ma-
gni, ex aqua viol. addito muliebri lacte. In vehementi
cruciatu, & aqua virgæ pastoris, siue polygoni, aqua
hordeacea, añ. lib. ꝑ. in ea semen psilly maceretur,
& panniculo compresso; addatur ouorum candidum

Ab humore
calido acri.

A phlegmā-
te salso.

Abstergen-
tia.

Topica.

cum pap. & hyoscyami seminis succo, ac muliebri lacte. & si opus est, in ea mixtura exiguum caphura, opij, croci, addatur. Extrinsecus solanum imponitur, vel cotyledon, vel lactuca, pap. aut hyoscyamus. Quae verò repurgant subinde iniicienda sunt; ut caprinum serum, & aqua hordeacea in qua glycyrrhiza incōcta sit, vel saccharum. alij oleum cucurbit. viol. cum amylo & cera confecta, soluta cum lacte muliebri aut asinino iniiciunt. At deplorata vlcerum mitigatio-
 rius (ut diximus) infusionibus mitigantur. Putria ve-
 rō mulsa prius purgantur; mox adiecta iride ac ari-
 stolochia absterguntur. Vetiustati vlcerum vehemen-
 tiora conueniunt; ut decoctū iridis, hyssopi, aristoloch.
 rotunda, artemisia, admixto melle, & virili vrina.
 Repurgato vlcere, sanandū erit medicamento litharg.
 cerussa, sarcocolla, ex oleo ros. & cera composito, cum
 alijs glutinantibus & consolidantibus, superius dictis;
 quae ex aloë, myrrha, draconis sang sarcocoll. ac thu-
 re cum plantaginis succo bene irita imponuntur.
 Tunc etiam agra boni succi cibis vinoq; refici debet,
 quo caro statim procreetur, ex Pauli sententia. Dein-
 ceptis his vtendum quae ad cicatricem perducunt; pri-
 mō mitioribus, deinde efficacioribus; etiam de foris ad-
 hibitis, abdomini videlicet & vteri regioni. Nam
 quemadmodū cataplasmatum, ita etiam emplastro-
 rum facultas per latentes meatus traducitur, ut idem
 inquit Paulus. At vteri fistula sanari non possunt, si-
 cuti & quae in alio sitae sunt. Si autem vlcerum vteri
 à lue Venerea facta fuerint, vtile erit malam illam
 morbi qualitatem in toto corpore euincere & aufer-
 re, prouocando sudorem vel stuphis, vel iniectioni-
 bus, vel vsu guaiaci, vel similibus, & vnguentis prae-
 dictis

Putria vl-
 cera.

Consoli-
 dantia.

Fistulae in-
 curabiles.

Curatio vl-
 cerum vteri
 à lue Ve-
 nerea.

Etis argentum viuum addere, & fumigio parato ex cinnabari vii. Tunc videlicet fumigiis dictis Obs. 48. ad finem addenda erit ℥ j. cinnabaris, & per embolum, ut ibidem dictum est, fumus recipiendus. In omnibus his vlceribus vsus stupharū est vtilissimus, quia corpus vniuersum exiccat. Sic post decoctum guaiaci, liquando curauī vlcera in vulua vnguento Aegyptiaco soluto cum aqua plantaginis, etiam leuiter attingendo ea quæ in ore vel in parte exteriori conspicua forent. Vidi Chirurgum cum pluma attingentem cum aqua plantag. aut solani, iniecto exiguo puluere præcipitati, tamen non sine magno dolore. Verū de his latius, De lue Venerea, suo loco.

OBSERVATIO L.

De pruritu vuluæ.

VETULA mulier Alcmariana, cū pruritu vuluæ intolerabili afficeretur, ex materia biliosa, acri & salsa, multumque pungente, ad me consultandi causa venit anno 1555. Quæ equidem paupercula existens, istis remediis ab illa molestia liberata fuit. Eramus in æstate: & fumatiæ, acetosæ, lapathij acuti, cum rad. summitat. lupul. bugloss. cum floribus, añ. m. j. coquantur in sero lactis, adiectis xv. prunis; eoque bis utebatur in die. Deinde, ut magis purgaretur, adieci ℥ j. foliorum senæ, sem. acetos. & anisi añ. 3ß. Ut vuluam lauaret præcepi cum aqua plantag. quæ cū non satisfaceret, hoc decoctum præscripsi: Folia plantag. lapathij acuti, cum rad. coquantur in aqua plantag. Post lotionem,

V 3

tionem,

tionem, hoc linimento inungatur: & lithargy-
rij auri per diem ac noctem in acerrimo aceto
macerati ℥j. olei viol. q. s. fiat linimentum mol-
le. Ita à fœda illa passione liberata est. Fuit hoc
secretum præceptoris mei Elidei, Medici insi-
gnis; modò accipiendo ℥ß. litharg. ita in aceto
acerrimo macerati, addendo olei viol. modò ℥j.
modò ℥ß. Hoc eodem remedio per me curata
fuit & alia post vniuersalia remedia, à pruritu
vulvæ vnà cum satyriasi, anno 1560.

SCHOLIA.

GUAINERIVS in Commentariolo suo De agri-
tudinibus matricis, cap. 11. sub vno capite tra-
ctat de pruritu matricis, & priapismo. Forè intelli-
git pro priapismo satyriasi. Pruritus tamen matri-
cis potest esse etiam absque satyriasi. Priapismus verò
est proprius morbus mentula, vt ad longum docui-
mus Obs. 9. lib. 26. & in eiusdem Scholio; & satyria-
sis similiter, vt Scholio Obs. 27. eiusdem libri osten-
dimus: quamuis inter se modò conueniant, modò dif-
ferant, vt ibidem ad longum explicauimus. Satyria-
sis tamen, vt ibidem quoque diximus, etiam mulie-
ribus accidit, ex mente Aëcij lib. 16. cap. 82. ad quam
etiam sequitur ingens pudendorum pruritus cum do-
lore; ac eadem adsunt signa quæ ponit Guainerius de
pruritu matricis. Potest tamen aliquando esse pru-
ritus ex humore bilioso, falso, adusto, sine desiderio
coëundi. Satyriasi, vt Moschio cap. 4. Harmonie Gy-
næciorum, tum Aëcius reserunt, à Satyris nomen
antiquitas dedit, quòd illi, vt in fabulis est, proclues
in Vene-

in Venerem essent. In mulierum certè satyriasi adest
 parium pudendarum prurigo cum dolore, ita ut im-
 patienter manus suas illuc mittant, cum insatiabili &
 stabili virorum desiderio, amissa scilicet omnis pudor-
 is verecundia. Si quidem enim res hæc, quæ *matricis* Moschio,
 consensum habeat, & verecundiam eis confundat ac
 tollat, & aliquantulum eas delirare satiat. Hæc Mo-
 schio. Noui ego vetulam quandam, cuiusdam sacer-
 dotis famulam, hoc vitio adeò impudicam ut satiari
 non posset coitu, quo imò magis inflammabatur; quæ
 ad hæticam febrem quasi peruenerat antequam cu-
 rari posset. Huius mali curationem diximus ex Aëtio
 Scholio Obs. 27. lib. 26. Addit Moschio, curam ean- *Curatio*
 dem esse cum feruore. Potest tamen, vti dixi, esse pru- *pruritus.*
 ritus, absque desiderio coitus. Interea si à bile vsta,
 quod ex colore luteo seu citrino cognoscitur, ea ipsa
 contemperanda cum syr. viol. nymphaeæ, & aliis cum
 aquis refriger. ut dictum est saepe, & cum infus. rha-
 barb. oxyphœnico, & syr. ex infus. ros. purganda.
 Si à sanguine color erit rubens, fiat venæ sectio si sang.
 sit adustus. Si sit à pituita salsa, contemperetur similiter
 & euacuetur cum cathol. & diaphœn. Deinde topica
 remedia adhibeantur. In materia calida succus solani,
 aut lactucæ, portulacæ, iniiciantur; vel eo vterus la-
 uetur, vel hoc: R. succi foliorum salicis, succi lactu-
 cæ, añ ʒ iij. stercoris muris ʒ ij. misce, & in vterum
 mittantur; vel betæ succus. & si adest simul satyria-
 sis, pul. nymphaeæ ʒ j. excipiat syr. de pap. aut
 succo foliorum salicis, & ante pastum bibatur:
 vel succi portulacæ cum saccharo & similibus fiat
 syr. Lauentur cum decocto lapathij acuti, fumarie,
 maluæ, oxalid. solani, scabiosæ, betæ, & pentaphylli.

Apiruita salsa, valet hoc vng. & litharg. cerusa lota,
 añ ʒ iij. plumbi vsti, scoria argenti, añ ʒ j. ʒ. masti-
 chis, olibani, añ ʒ j. ʒ. pulueriscentur in mortario plum-
 beo, & pistillo plumbeo agitentur, adiectis oleo ros. &
 aceto albo, non simul, sed alternis repetitis vicibus,
 donec vng. formam induat: deinde quidam addunt
 argenti viui, hominis ieiuni salua extincti, ʒ iij. ster-
 coris muris ʒ ij. Accipiatur huius vng. ʒ ʒ. stercoris
 muris ʒ iij. dissoluantur in ʒ vj. decocti suprascripti;
 eo pruritus lauetur, tum vulua ipsa; & si opus est,
 in vterum iniiciatur, ut pruritus simul & satyriasis,
 si illa adfuerit, tollatur. Renes quoque inungantur
 cerato albo, adiecta exigua portione caphura, & la-
 mina plumbea perforata super renes feratur; & vi-
 tex, tum alia per cubiculum spargantur, qua ad
 compescendam Venerem scripsimus valere: & si sim-
 plex sit pruritus, absq; desiderio coeundi, vtere vn-
 guento illo ex lithar. cum oleo viol. ut nos vsi sumus.

OBSERVATIO LII.

De vuluæ excoriatione.

MULIERI excoriationem vuluæ habenti,
 cum ardore, post exhibitam cassiam cum
 fero lactis, mandavi, ut folia salicis, maluæ, viol.
 & solani decoqueret cum lacte, & eo sæpe loca
 excoriata ablueret, & deinde vng. ros. & de ce-
 rusa & albo caphurato simul mixtis inungeret;
 continuò bibendo lac ebutyratum cum foliis
 acetosæ coctum. Quibus cessauit. Alteri ex lo-
 tione sequenti intra biduum cessauit: & capri-
 folij, bursæ pastoris, caudæ equinæ, plantag. sem-
 perui-

peruiui, saniculæ, bugulæ, añ. m. j. trag. gummi Arab. añ. 3 ij. spodij, granor. myrti, añ. 3 ij. sem. & corr. pap. albi 3ß fiat decoctio in aqua planrag. caprifolij & scabiosæ. Valent & ea quæ mox de rhagadibus & fissuris vteri dicturi sumus.

SCHOLIA.

EXCORIATUR vterus, teste Gilberto Anglico lib. 7. sui Compendij, cap. De excoriat. eiusdem, interius. imò etiam aliquando exterius, ex bile lateribus eiusdem inbarente: & aliquando in eius concavitate; ut per puncturas & ardores resudante humiditate citrina cognoscitur. Imò patitur subinde & scabiem ac pustulas; ut pruritus indicat, cum superfluitates ab utero emanantes aut vulua. Digeratur oxyfacih. & purgetur elect. de succo ros. & fiat balneum ex herbis refriger. & si opus est, vena saphenæ secetur; & temperetur licium cum lacte, ac immittatur. Vel pap. alb. gummi Arab. trag. terantur, & fiant trochis. ponderâtes 3 j. vnum dissolue in lacte, & iniice. Quæ ad vesicæ excoriationem valent, & hic locum habent. Adici poterit medulla vituli & ceruina; & ita scabies pruritusq; soluetur. Interea studendum vteri repurgationi, ne post istas iniectiones sempiterna inducatur sterilitas; & ideo à violentis iniectionibus abstinendū. Si exterius sit excoriatione, foras & vnguenta iam dicta ad pruritū vulua, exterius adhibenda. At si vulnus sit in utero, utuntur recentibus succis arnoglossæ, solatri, cum album. oui & succo portulacæ; & in venis corrosis, succo centaurij, sang. drac. bolo Arm. aristoloch. rotunda, lycio,

lycio, acacia & similibus; & pessu ex litharg. capb.
& albo oui, & oleo ros. Sed de his satis. Nunc ad rhagades, quæ similè serè curatione obviunt, accedamus.

OBSERVATIO LII.

De uteri rhagadibus ac fissuris.

MULIER aliqui honesta & pudica, ex defluxu acrium humorum in orificio vulvæ rhagadas seu fissuras patiebatur. Adhibita purgat. ex infusione senæ & rhab. cum syr. violaceo, commodè oleum rosaceum cum vng. de cerusa adhibuimus, prius tamen ablutis locis cum sero lactis. Ita & Rhas. ubi calor adest cum acuitate, oleum rosaceum, cum vng. de cerusa capit. In altera & hoc nutritio commodè vti sumus: & olei myrrini, rosacei, añ. ʒj. β. succi plantag. & consolidæ, vel polygonij, añ. ʒj. lithargyrii ʒiiij. cerusæ lotæ ʒij. plumbi vsti, anrimoniij, boli Armenæ, añ. ʒβ. tritarentur subtilissimè, & reducantur ad formam nutriti.

SCHOLIA.

Rhagades.

Causæ.

Notæ.

IN vulvæ ostio rimæ, quas Græci rhagadas vocant, ex enixu violento fiunt, teste Paulo lib. 3. cap. 75. & iuxta Aëtium lib. 16. cap. 109. Etiam circa os uteri, ob acrium humorum defluxum, loca effringentem & exurentem, fieri solent. Primum sanè latent, iuxta eosdem, cum recentes adhuc ex partu sunt dolores: postea verò paulatim percipiuntur, aliàs manu, aliàs in coitu. nam & propter affricationem cruorem reddunt: certius tamen speculo deprehenduntur: sinu enim dilatato, disruptiones fissuræq; in ostioli circinibus oculis

oculis patent, vel in ambitu oris vulvae visuntur. Et sic rhagades propriè sunt fissuræ, quæ fiunt in collo *Differentia.* vteri, recto intestino, & labiis aliquando, ob ariditatem, vel ob condylomatum inflationem; & inflammationem; quamuis condylomata à scissuris, ut postea dicemus, differant; licet quidem aliquando simul, aliquando seorsim spectentur. Et sic quoque rhagades vlcera sunt vteri & sedis diductæ in fissuras. Sed alia humida & saniosa, alia callosa, quedam cancrofa sunt. Humida & saniosa detergentibus & *Prognostica.* exiccantibus citius curantur; callosa difficilius; cancrofa sunt maligniora. In eiusmodi ergo (iuxta Aëtium) muliebribus locis chirurgiam atque omne mordicans medicamentum effugere oportet: nam talia inflammationes & conuulsiones afferunt: ergo simplicioribus, etiam Paulo admonente, in scissionibus pessulūq; utemur, velut ad vlcera superius memorata. Prodest etiam tetrapharmacū dilutum. Ad rha- *Curatio.* gadas quoque utitur Aëtius hedricis medicamentis, præcipuè iis quæ è pompholige, stibio, & plumbo vsto conficiuntur Asclepiada. At nos etiam hoc vii poterimus: R. vnguenti pompholigos ℥j. alumini ℥j. misce. Si saniosa, abluuntur à quibusdam sero lactis, deinde tetrapharmaco dissoluto in rosaceo illinantur. postea utuntur medicamentis consolidantibus, quæ parantur ex lithargyrio. Si fiant ab humoribus acribus, purgandæ sunt medicamentis præscriptis ad fluorem muliebrem à bile, & optima victus ratione acrimoniam remperare oportet, & illas humectare cibo & potu; atq. illos fructus edere, qui acrimoniam humorum frangunt, ut pira, poma, iuscula cum lactucū. Supra partem vnguentum resiccans,

ut

ut in vlceribus, applicandum, quale iam diximus. Dum curantur abstineant à coitu, & pars diligentissime obtegatur, ne ab aëre frigido laedatur. Callosæ egent mollientibus, æsypo, radice lilij, terebinthina, admissa parte iridis Florentina; tum veniendum ad ea topica quæ scripsimus Obser. 10. lib. 23. De ani affectibus, & in Scholio eiusdem Obser. Vide plurima remedia etiam ad rhagades callosas apud Paulum & Aëtium locis citatis. Si cancri suspicio sit, valent & illa paulo antè descripta ad canerosos vteri affectus; & diapomphol. cum cerato liquido rosaceo.

OBSERVATIO LIII.

De condylomatibus vteri.

CONDYLOMATA (de quibus etiam diximus Obs. 8. & Scholio eiusdem, lib. 23.) sunt velut hypofarcoses, quæ in collo vteri, etiam in sede fiunt, post aliquam vlcerationem vel inflammationem; quemadmodum & Aëtius lib. 16. cap. 108. ex Aspasia annotauit. Condyloma, inquit, est rugæ excresecntia: rugæ enim circa os vteri existentes, dum inflammationem patiuntur, incuruantur & indurantur, & enersio- nem quandam & crassitudinem in locis efficiunt, præcipuè verò in mensium excretionibus, & post partiû turbulentias attolluntur, facileq; tactu noscuntur. Eiusmodi excresecntias duplicatas & complicatas in vuluæ labiis, versus collum vteri, mulier quædam patiebatur. Cum autem caro esset fungosa, & vrticis marinis similis, adhiberi iussi fomenta exiccantia & astring-

astringentia ex decocto gallarum, aluminis, & malicorij. Memini me quoque felicissimè vsum fuisse vnguento Ægyptiaco & Apostolorum, vt arroderentur & detergerentur. Aliquando etiam sumsi sublimatum in aqua ros. vel puluerem præcipitatum cum decocto plantag. infundendo elychnia, & pannum lineum in ea decoctione, & supra partem adhibendo. Aëtius rectè iubet vt fomenta astringentia adhibeantur; & eiusdem facultatis suppositoria applicentur, quæ suprâ ad sedis condylomata memorauimus; maximè quod è malicorio & butyro, aut quod è lycio Indico, & æsypo conficitur.

SCHOLIA.

DICTVM est prius quòd in vtero fiant rhagades & condylomata, modo simul, modo seorsim. Curantur verò primùm condylomata, deinde scissura, si simul fiant, vt sunt magnæ ex parte. Imò scissuræ veteres, seu rhagades, aliquando in condylomata degenerant: quæ vbi contigerit, exscindere iubet Paulus, atque ad cicatricem duci. Cùm enim condyloma sit hypofarcosis, siue carnis additio, ablationem sui indicat, tanquam aliquid redundans à toto genere præter naturam. Sed quia condylomata sunt in vna tantùm parte, veluti verruca pendentes, filoligantur, & sic alimento destituta decedunt, vel absciuntur nouacula. Sanguis sinendus est aliqua parte fluere, vt pars leuetur sanguine crasso attracto, ex quo fiunt condylomata. Cùm autem fiunt in circulo ani, (de quibus antea dictum est) vel in circuitu
ani

ani totius, eminentiora & maiora sunt auferenda
 chirurgia: minora verò, si ferre possunt, medicamen-
 tis facillè resiccantibus, cum quadam astrictione. Vel
 si hac non proficiant, arrodentibus sunt auferenda, vt
 emplastro diachalcitidis dissoluto in oleo rosaceo, re-
 duplicata quantitate chalcitidis. Pulueres autem vi-
 dentur magis conuenire ad exiccationē, qui parantur
 ex resiccantibus, arrodētibus, cōstringentibus: quia hac
 caro flaccida exiccanda & cōstringenda est. Quòd si
 dura esset, & ad naturā duratū verrucarū accederet,
 absissione est potius curanda, vel emollientibus, & po-
 stea detergētibus exsiccanda, vt facere solemus in scir-
 rho. Sed magna ex parte caro illa est fungosa. Ideo
 pulueres actu sicci & facultate meliores sunt, vt: R.
 sabina exiccata, & tenuiss. pulv. ℥j. hermodact. v. flo-
 rum & myrtill. v. florum, añ. ℥ij. chalcitid. aluminis,
 añ. ℥ij. auripig. rubri ℥j. reducantur in tenuissimum
 puluerem, qui supra partem adhibeatur. His pulveri-
 bus nonnumquam vtile est, vt in collyriis, admiscere
 parum rad. mandrag. aut opij, ob sensum partis, quæ
 medicamēta exiccātia cum morfu aut arrodētia dif-
 ficillè fert. Laudat & hic Rondeletius, vbi magna co-
 pia sanguinis apparet, prius mittere sanguinem è bra-
 chio, deinde è poplite; aut cucurbitulas in coxis, vel
 natibus applicare, cum profunda scarificatione in na-
 ribus, & leui in coxis, ad sanguinis deriuationem, in
 ea parte redundantis. Aut quoque vomitum esse con-
 uenientissimum, & purgationem leuem, aut leni-
 tionem ventris. Huc etiam pertinent scirrhomata
 miliacea vteri, ex Aërio 16. lib. cap. 110. pudendo
 innata, quæ tactui occurrunt, vel certius speculo de-
 prehenduntur, solentq; veneris præcipuè confricatu
 menses

Scirrhomata
 miliacea.

mensēs & conceptum interciperē. In hīs alius primō
purganda, deinde linteolo locus abstergendus, & ex
carne carycarum pinguium & alumine scissili impo-
nenda, vel pessus ex alumine & felle, aut medicamen-
ta maturandis discutiendūq; panis idonea illinenda:
collutionesq; ex aqua mulsa, aut quopiam aromaticum
decocto, faciendæ. Iam quoque in pudendo & uteri
ore (eodem autore cap. vii.) scabiose pustula exoritur
tur, furfuraceas squamulas emittentes, pruritusq;
inferentes, & calida aqua persusione gaudentes: ad-
uersus quas aluum asinino lacte purgare, à cena ro-
mere, in balneo sudare, aquam calidam ingredi, vino
cum nitro calfacto, & post vitum, aqua calida col-
lui oportet, lociq; licium indicum, aut amurcam,
aut butyrum cum sulphure, aut ceratum myrri-
num cum spuma argenti, aut alumen rotundum
cum melle, aut malicorium cum myrrino oleo &
melle, illinere. Squamas autem & formicas exte-
rit cyclamini radix cum melle illita. Ceterum ab
omni acri, salso, acido, in alimentis cauendum.

Scabiose
pustula
vicia.

OBSERVATIO LIII.

De sycosi uteri.

DIXIMVS lib. 23. Obser. 9. de sycosi &
thymis. Iis rustica mulier in puden-
do laborabat ex lue Venerea: quamvis
etiam eiusmodi excrecentiæ etiam sine ista
lue contingere possint: quemadmodum eue-
nit matronæ nobilissimæ, quæ ficus nonnul-
las habebat in orificio exteriori ipsius vulvæ,
cum intensissimo dolore, ita vt quiescere

non

320 DE MULIERVM MORBIS,
 non posset. Huic consului, quo ab hoc fædo
 malo liberaretur, cùm non esset grauida, vt ex
 talo vena secaretur; vt ita sanguis fœcalis, etiam
 digesto humore melancholico, deinde ater ille
 humor, expurgaretur. Venit mihi in men-
 tem historia Guainerij, qui ita mulierem, post
 vniuersalia remedia, curauit: Capiebat picem
 Hispanicam, & puluerisabat in terreo vase, su-
 pra quam laridam ignitum inflammatumque
 guttatim stillare fecit, vt sic pix liquefacta in
 formam vnguenti coiret: eo oblinebat vteri hæ-
 morrhoïdes, & ficos ac dolorem sedabat. Mo-
 dò accipiebat butyrum recens, & in mortario
 plumbeo cum pistillo plumbeo ad formam vn-
 guenti cogebat, eoque mirabiliter dolorem se-
 dabat; etiam appposito succo herbæ Sancti Petri
 dictæ. Et vbi ardor insignis esset cum dolore,
 hoc vnguento commodè utebatur: & vng. pop-
 pul. ʒ iij. croci ʒ ij. opij ʒ j. vitellum vnius oui
 recentis: incorporentur simul, & locus affectus
 inungatur. Magna admiratione dolorem se-
 dat. Consului vt hæc matrona iisdem remediis
 vteretur.

SCHOLIA.

GUAINERIVS in Commentariolo suo De agri-
 tudinibus matricis, sub vno cap. nempe 12. tra-
 ctat de hamorrhoidibus matricis, moris, & ficos, cla-
 uis, siue verrucis, & carne addita. Alij de his seorsum
 tractant. Huc etiam pertinent thymi, excrescentia
 eurgida; de quibus diximus Scholio Obs. 9. lib. 23. à
 corymborum montana herbæ similitudine sic dictæ
 sunt,

sunt, vt etiam refert Aëtius lib. 14. cap. 4. De thymis, sycoſi, formicis, verrucis, clauis, reliquisq; eminentiſſiſſimiſque, quæ etiam in pudendo mulierum ſiunt. Quibus autem à ſe inuicem differant, iam diximus Scholio Obſ. 9. lib. 23. vt non opus ſit eadem repetere. Ibi etiam de curatione harum eminentiarum egimus. Reliqua vide apud Aëtium loco citato, qui curationem longo ſermone proſequitur. Ceterum quod ad præſens negotium attinet, moros ſeu ſicus, ex ſœcali ſanguine ad hæmorrhoides etiam vteri Guainerius refert; & etiam verrucæ ex melancholico humore; veſicales verò & vnales, etiam ſi in ano apparuerint, ex phlegmate vel ſanguine pituitoso fieri vult. Carnem autem additam ex ſucceſſione vlcera rhagadiarum. Refert, excreſcentias tales modò in profundo, modò in collo vteri, ſeu oriſicio, originem ſumere. Profun-

Thymi, ſycoſes, ſeu ſicus, formicæ, verrucæ, clauis.

Notæ.

Curatio.

dæ verò nec comprehenduntur, nec curantur: attamen cognoscuntur apparentes vel tactu vel viſu; honeſtiſſime ex relatu infirmæ. Verrucæ difficulter, aut numquam, iuxta eundem, ſanantur. ceteræ curationem recipiunt, & magis ſi ex retentione menſtruum ſiant, ſanguine melancholico emanante. aliquæ ſerico filo ligatæ decidunt. Inungantur ea oleo ſem. lini ex nucleis perſicorum; & pul. pineæ combuſtæ inſpergatur, & cortex querc. ſpongia, ariſtolochia rotunda æquis partibus in olla ſurno impoſita exſiccantur, ac puluere tali locus affectus cum melle inungatur, puluere ſuper aſperſo. vel hic, qui fortior exiſtit: ꝛ. folior. vitis, ſicus, & ficum immaturarum, añ. m. j. viridis aris ꝛ. j. ſimul ponantur in olla ad ſurnum, & fiat pul. quo locus oleo de ſemine lini perunctus aſpergatur. Succus thapſi barbari cum oleo de

X

ſemine

Hæmorrhoides vteri ex Aëtio.

Calculus vteri.

322 DE MULIERVM MORBIS,
semine lini istas verrucalēs excreſcentias egregiè curat. At Aëtius cap. proprio De hæmorrhoidibus vteri, ex Aspasia, lib. 16. c. 99. Hæmorrhoides, inquit, quandoque in ore vteri, quandoque in collo, quandoque in ipſo vaſe, nonnumquam etiam, licet raro, in pudendo contingunt; quæ quidem interdum tactu, melius tamen ſpeculo deprehenduntur; eademq; omnino accidentia inferunt, quæ reliqua in ſede cœnientes inferre ſolent; ac præterea ſterilitatem, lumborumq; gravitatem purgationis tempore inducunt. Varicoſas igitur & maleficas prætermittere oportet: reliquas non aliter curabis, quàm quæ in ſede oriuntur: duras quidem & modicum cruorem emittentes, neque vaſis annexas, conſeſtim amputando. Quæ verò cruorem affatim fundunt, eas circa baſim orbiculatim ſcarificabimus, deinde voſſella ſuſpendemus, ſcarificationiq; nodum innectentes constringemus; quas poſtea paulatim extenſas amputabimus; atque inde antherum medicamentum aridum applicabimus. Quòd ſi abſque chirurgico opere malueris hæmorrhoidas arefacere & excacare, huiusmodi arida appones: ſpodium, roſ. ſiccas terito, & inſpergito: vel acaciam cum vino auſtero ſubactam, vel Lemnium ſigillum cum aceto illinito. Si plura deſideres remedia, eundem conſulito. Idem cap. ſequenti facit mentionem de calculo vteri. Sed quomodo is extrahatur, potius ad chirurgiam ſpectat. De thymis & formicis vteri, & de verrucis, quomodo tales excreſcentiæ cum chirurgia & ſine chirurgia curentur, & de nymphotomia, & cauda vteri, quæ ſimiliter ad chirurgiam ſpectant; vide apud eundem Aëtium lib. 16. capp. 105. 106. & 107.

OBSER-

OBSERVATIO LV.

De utero imperforato.

QUÆDAM à natiuitate (inquit Aëlius lib. 16. cap. 98.) imperforatum vuluæ meatum habent, idque tripliciter contingit. Quibusdam enim extrinseca figura solidâ validaq. membranâ, vel carne agnatâ conglutinatur; aliis sinus ipse; aliis vteri os obstruitur. Hanc membranam ipse specillo dissecat donec figuram ad naturalem dimensionem duxerit, postea linamentis, quæ ex diuulsi linteoli filis conficiuntur, sectionem replet & aprè deligat; tum curationem puri generando idoneam, & cataplasmata aliquot diebus adhibet; & reliquam curationem aptis medicamentis absoluit, ut loco citato videre poteris: mulierem interea supinam, puluinar intra femora habentem, usque ad cicatricem inductam, seruat. Si in sinu sit caro innata, quomodo ea manu chirurgi curari debeat, ibidem docet. Sic filiola illius obstetricis Quirinæ dictæ Alcmarianæ, cum naturalibus feminarum clausis nata erat: quæ septem annos cum nata esset, mater pro re monstrosa id mihi ostendit. Pinnacula autem sibi cohærebant, & erat parua rima, per quam lotium reddebat, & videbatur tantum membrana coaluisse, quæ facillè incidi poterat. Consului ut ensiculo acuto & paruo aperturâ faceret; deinde quæ ad cruenta valerent medicamenta adhiberet. Mater tamen medicastra & obstetrix

eo tempore non ausa fuit incisionem tentare. Sed tandem post aliquot annos filiolar suæ misera, incisionem fecit, & filiam viro aptam reddidit: vti postea Delphis Alcmariam redeunti mihi narrauit, insignes quoque gratias agens, quòd incisionem eidem commendaueram. Cùm autem hæc puella ad me veniret, memini illico puellæ illius quæ naturalibus quoque clausis incisione à Beniuenio curata fuit, vt haberetur cap. 28. De abditis causis morborum: è qua, membrana incisa, statim tanta tam ingenti impetu nigrior materia profluxit, vt grande lumen, quod tunc minister admonerat, extinxerit. nam menses intus retenti fuerant, fuitque dextrè ab eo curata. Hæc autem natu maior erat quàm nostra puella.

SCHOLIA.

ἀτρήται.

TALES ex Moschione dicuntur *Atreta*. Fit tribus modis: *pinnaculis* sibi coherentibus: vel, ipsis patentibus, in medio sinu muliebri pulpa vel membrana innascitur: vel etiam sinu patente, orificium vteri clauditur. Vbi pinnacula coherent, ad tria officia mulieres impediuntur; ad vsum Veneris, purgationem, & conceptum: si in medio sit clausura, communicationem viri, & conceptum; siquidem menstrua liquari possunt per cauernam, qua etiam vrina concluditur: si orificium fuerit clausum, non purgantur, nec concipiunt, virum tamen sustinent: si verò cauerna, conceptus sit, partus tamen denegatur. Secundùm eundem, clauditur & feruore; aliquando sicatrice, precedente scilicet vulnere, aut durissimo callo

callo. Dicitur & phymos, vel phymosis, iuxta *E-* Vteri clau-
sura seu
phymos.
ginetam lib. 3. cap. 73. Muliebrium locorum clausu-
ra; quæ etiam in pene fieri potest, vt aliàs diximus:
cuius & exemplum apud Amatum habes curat. 24.
cent. 1. de quodam cui glans penis non erat à natiui-
tate perforata, sed circa testes foramen, per quod
vrinam reddebat. Iam & ano clausa natos quosdam
Beniuenius refert. Ita quandoque vitia quadam ho- Curatio.
minibus connascuntur, quæ arte subinde corrigi
queunt: vt in hac puella, tum illa muliere apud Be-
niuenum euenit. Quandoq; tamen corrigi nequeunt.
Vnde Paulus loco citato: Loci muliebres circa ipso-
rum os clauduntur, vel ex precedente exulceratione,
vel durata illi inflammatione. Curabuntur tunc in-
sesibus, qui emolliant, ex hydrelao, & fœnug deco-
cto, consimilibusq; cataplasmatibus & pessulis. Porro
si malum inueterauerit, suffimentis vaporibusq; aro-
matum vtendum erit. Iam verò soluit etiam hoc vi-
tij, si nihil aliud sit quàm vuluæ ostioli astrictio, pessu-
lus ex hyssopo, nitro, resina & terebinthina. At si pin- Ex Moschio-
ne, in parte
Harmonie
posteriori,
cap. 15.
nacula sint clausa, vel membrana, facillè curari pos-
sunt, vt in priori puella. Membrana enim facillè tolli-
tur & aperitur incisione, & sanguinis meatum non
habet, nec aliquando renasci potest. Sed durissima
pulpæ cum ingenti difficultate præciduntur, molestè
sanguinant; & si non sollicitè fuerint curata, citò re-
nasci possunt. Harum curationem vide chirurgicam
per incisionem apud eundem, & Aëtium loco citato.
Quemadmodum sit clausura vteri, vel vuluæ quoq; Hiatus ostij
vteri.
nimia aëritudo: ita sit & nimius hiatus ostij vteri.
& quæcunque ad hiatum vteri commendantur, ea-
dem valent ad violatas ne cognoscantur: quale est

Ad virgini-
tatem post
stuprum
mentiendā.

perclysina ex Prisciano, alumen scissum, galla cum vino & ammeo trita ac decocta. Vel si eadem trita feruesceris, suffitu mentiri virgininitatem efficit, vt docet Galenus. Alij corticem mali Punici in vino nigro austero discoquant, alumen quoque adiciunt, & lana pessi modo inuunt. Sic Erotis cap. 35. De modo coarctandi matricem. Nisi de restrictione amplitudinis vuluæ propter honestam causam liceret tractare, nullam de ea mentionem faceremus: sed cū per hanc impediatur aliquando conceptio, necesse est tali impedimento subuenire hoc modo: R̄ sang. drac. bol. arm. corticis mali granati, aluminis, mastiches, gallar. añ 3j. in pul. redige. & omnia simul in aqua calfacta consiciantur; & de hac confectioe pone in matricem. Vel hac, aut similia coquantur in aqua pluuiali, & hac decoctione pudenda fomententur. At quibus modis virginitas cognoscatur, lege Gilbertum Anglicum. Virginum quoque probatio habetur in libro maritici, ex lapatho trito carbonibus inuncto & suffumigato: si se comminxerit, virgo est.

OBSERVATIO LVI.

De puella ab hernia inguinali curata, si nupsierit, num sterilis sit futura, per modum Consultationis.

QUÆRITVR à me, nonquid puella 22. annorum nubilis, statura mediocri, bona habitudine, quam tamen non viderim, si nupsierit, sterilis sit futura, ob herniam inguinalem probè tamen curatam? Et, si non sit futura
steri-

sterilis, nunquid etiam ob eam causam in partu periclitatura sit? Omissis aliis causis sterilitatis, tam viri, quàm mulieris, pro hoc tempore, quæ si abfuerint, quantum ad herniam curatam, videtur mihi quòd ob eam causam solam non erit sterilis: quia illa incisio non peruenit ad matricem aut collum eius, nec ad membra generationi deputata; ut constat ex Aëtio lib. 16. cap. 103. de inguinalis ramicis curatione per chirurgiam. Ideo cùm membra iam dicta in tali operatione non læduntur, nihil obstat quin concipere poterit: & cùm cicatrix in puella trium annorum cùm ab hernia curaretur, iam dudum coaluerit, & rectè sit curata, non rumpetur, & per consequens, ubi conceperit, ob hoc non periclitabitur in partu. Non tantùm ratione id constat, sed etiam experientia; cùm tales mulieres & proles conceperint, & retinuerint, & feliciter sine periculo pepererint. Id multis herniosis contigisse, non solùm nos nouimus, sed & mecum vidit Nannius me senior, Medicus ille insignis quondam apud Amstel-damenses, mihi quoque intimus & familiaris. Et, quod magis admiratu dignum est, nouimus nos mulierem quandam Alcmarianam à fratre transfossam per ventrem paulo infra umbilicū, ut totum ventrem cultro aperuerit, aded ut intestina per vulnus propenderent, factaque per chirurgos maiori incisione, ut viderent num intestina essent læsa, iisque rectè repositis in locum, quæ quidem virago ipsa conspiciebat; eandem, inquam, rectè conualuisse, & post an-

328 DE MULIERVM MORBIS,
nos aliquos viro nuptam, & tertio anno filiam
quoque peperisse; nec ea in partu periclitata est:
quanquam hæc quasi virago post filiam illam
non amplius conceperit. Hæc igitur causa de
qua quæritur, conceptionem non impedit, ne-
que periculum etiam in partu adferet. Quam-
obrem me puto huius viri doctissimi ac consu-
laris, qui hanc quæstionem mihi proposuit, po-
stulatis puellæ nomine satisfacisse. Faxit Deus
Opt. Max. vt illa ipsa mater fiat multarum pro-
lium, tam ad corporis quàm animæ salutem.
Delphis, ex nostro Museo, anno 1558. 19. die
Aprilis.

Petrus Forestus Medicus
ita sentiebat.

SCHOLIA.

FEMINA (inquit Galenus) maris imperfectior est,
quoniam & frigidior: etsi interea partes genita-
les cum venis & arteriis omnibus, per quàm similes
esse videantur, ea videlicet duntaxat differentia, quòd
hæc intus, illa foras promineant. Nulla sanè prorsus
in viris pars est, quæ in feminis eadem per resectio-
nem non videatur: verùm imperfectiora omnia mem-
bra existant, minùsque calida. Et quamuis mas &
femina principium conferant generationis: tamen
initio generationis, sicut maribus contingit, non pro-
diere partes ipsa mulieri, virtutis imbecillitate. Sed
expedit vniuerso, imperfectum cum imperfectiori co-
puletur, ex quibus alii progenerarentur. Ita à sum-
mo Creatore constitutum est. Nam si femella natu-
ra calidior esset, maris semen protinus feruor absu-
meret:

meret: quod in bonum propterea cessisse videtur, ad generis humani propagationem. Et quia membrum id intus collocatum est, ob eam rationem & testiculos habent & minores & frigidiores; unde semen frigidius ac humidius prouenit, ac pariter imperfectius. Sed matricis situs intus est, cauus, ut semen virile suscipiat, atque contineat: propterea in viris colus figura oblonga est, ut semen longius emittat; quod crassum & calidum esse constat. Hinc duo motuum principia cernuntur: nec tamen alterum sine altero, hoc est, maris semine efficere potest; sed ea pariter misceri atque confundi necesse est: etsi de cetero agere, donec animal perficiatur, tum sanguine menstruo opus est, ad conceptus nutritionem. Femininum semen per se perficere semen nequit, & ex ambobus moribus, vnus exultat communicans motus. Est hoc (inquit idem autor) in gallinaceis conspicuum: concipiunt enim oua, quae hypneumia dicuntur, hoc est, subuentanea, vel Zephyrina inania oua, sine galli semine orta, quae foetum nunquam excludunt, sed incubatu corrumpuntur ocyus: album enim ac luteum ex femella habetur: deest tantum gallinacei seminis calidioris perficiens virtus. Ex albo pulli membra constituantur; ex luteo, quo perficitur animal donec excludatur, alimentum capit. Sic in muliere conceptus mensium facultate, donec in lucem edatur, nutritur. Nam & quas molas vocant (de quibus postea) in seminis carnis frustra inertis naturae informis, ouis subuentaneis similes esse putant: ad id vsq; ad eò procedere femininum semen volunt. Quid natura, si fieri potuisset, maximè optasset suum opificium esse immortale, nemini in dubium venit: verum

cum per materiam non liceret (nam quod ex arteriis, venis, nervis, & ossibus, ac præterea carne est compositum, incorruptibile id esse non potest) subsidium quod potuit ipsi ad immortalitatem est fabricata. Propterea mirabilem quandam rationem invenit, quomodo in demortui animalis locum, novum aliud sufficeret, quo nullum animalis genus pereat, sed incolume semper sit, & quasi immortale. Qua de re omnibus animalibus concipiendi instrumenta natura instituit; ad generis, inquam, instaurationem. Hæc cum communia sint, cum viris, tum mulieribus; ea propter, eisdem quandoque oblaſis, contingit, aut viri, aut mulieris, aut utriusque ratione, conceptionis impedimentum; quod quidem sterilitas appellatur.

Sterilitas
quid.

Nam nihil aliud est sterilitas, quam privatio conceptionis, tempore potissimum quo eandem perficere deberet. Pars igitur genitalium, tum etiam membrorum generantium, tam in viris quam mulieribus hæc

Pars affecta.

affecta esse potest. Sic etiam in muliere uterus afficitur tamquam concipiendi instrumentum: quod ex eiusdem uteri propria actionis seu usus læsione cognoscitur: ita quoque ut si partes genitales virorum generationi deputata fuerint oblaſa. Et sic affectus præter naturam sterilitas est symptoma in genere noxa functionum ablatarum, vel in membris generationis virorum, aut mulierum, aut utriusque. Et sic omnino abolita est propria ipsius uteri tamquam instrumenti actio; concipiendi, inquam. atqui cum sterilis est, non concipit eo tempore quo concipere debet. Ita quoque sentiendum de membris viri generationi deputatis, si eorum actio fuerit læsa & abolita. cum & plures huius affectionis causæ esse possint, restat Aristotelem

Quis affectus præter naturam sit sterilitas.

Causæ secundum
Aristotelem.

tele

tele 2. De generat. animal. cap. 5. Nam & à primo ortu natura locis ad coitum commodis oblaſis, & mulieres & viri redduntur, ut altera non pubeſcant, alteri non barbeſcant. Aliis in proceſſu ætatis idem accidit affectus, aut propter corporis nutrificationem pleniorẽ, aut ex morbo. Viris humidum, frigidumq; emittitur ſemen, mulieribus purgationes vitiantur. Sic & Aëlius lib. 16. cap. 26. Sterilitas aut viri, aut mulieris, aut utriusq; ratione contingit. A viro quidem eſt cum ſemen eius vel ſeruidũ, & veluti torrefactum, vel frigidum, vel tenue, aquoſum, languidũ, quale decrepitorum eſt, vel craſſius quàm oportet, emittitur; vel quod viri ſemiſpadones ſint, penemq; breuiſſimum habeant, ut in vulua reſeſſum ſemen iaculari nequeant. quod etiam interdum nimia obſeſitate contingit: tales enim aded ventricofi euadunt, ut ſemini iaculatio ad profundiores vteri partes impediatur. Iam & qui immodico pene longiſſimoq; procreati ſunt infæcundiores eſſe traduntur; teſte quoque Ariſtot. Ceteris quibus mediocris, propterea quod ſemen frigidum infæcundum eſt: refrigeratur autem, quod longè admodum fertur. Sic etiam Paulus lib. 3. cap. 74. Neque pingues liberis procreandis ſunt idonei, eo quod genitalibus mutuo ſe contingere haud poſſint commodè, tum quod momentum ſemini emittunt. Neque tamen nimis extenuati liberis operam dare feliciter queunt. Ita ex Cleopatra & Moſchione: Maſculi valerudinarij, partes conceptui neceſſarias impeditas habentes non concipiunt; neque frigidi, quibus ſemen extinguitur; nec nimium calidi, aut luxuria ac frequentiore Venere enervati, & ſine viribus, ac ebriofi. Erotis quoque: Semen viri ni-

Cauſæ cur
viri & mu-
lieres non
generant.

Cauſæ ſte-
rilitatis viri.

mis

332 DE MULIERVM MORBIS,
 mis tenuē infusum matrici, liquiditate sua, inquit,
 foras labitur: & viri testiculos habentes frigidos, ra-
 rō aut nunquam generant. ita & spado factus & te-
 sticulus catens, non generat. Et sic causæ internæ ste-
 rilitem inferunt, testes vitiosi, aut colis vitium, re-
 stium abscessus, & simile quid; vlcus, calculi renum
 vel vesicæ extracti, & inde natum vlcus, colis longi-
 tudo, breuitas, foraminis obliquitas, penis mollities,
 conuulsio, vlcus, verruca in meatu virgæ vt semen
 eiaculari non possit, qualis à me curatus fuit, vt su-
 perius dictum est. Sic quoque noui pistorem, cui penis
 à natura aded breuis, vt pollicem non excederet.
 numquam u genuit. Tumores itaque præter natu-
 ram & peni & testium sterilitatem quandoque ad-
 ferunt. Sed inter omnia membra, cerebri infirmitas,
 iecorūq; aut renum, sterilitatem adfert. & quibus
 post aures vena perfecta fuerint, vesica tum aliis
 membris communicatione lafis, non generant: & qui
 capthuram quoque edibunt, aut hyoscyamo cicutave
 testes illitos habent, sterilefcunt. Ita & virile semen,
 si nimium vitiatum fuerit, mulieris temperamentum
 corrumpit. Nam utriusq; sexus nimia dislemporan-
 tia conceptum inhibet: qui si sortē disiungantur, co-
 pulata quadam cum alius naturæ germanitate, pro-
 lem facile suscipiunt. Fœcunditatis primariam præ-
 rogatiuam possidet natura æqualitas & tempera-
 mentum. Senectus quoque modò non generat, quod
 ex sexagesimo anno plerumq; contingit. Tempestate
 tamen nostra, inquit Benedictus Veronensis lib. 25.
 cap. 11. quidam Germanus nonagenarius prolem sus-
 cepit ex casta coniuge, quem vidimus. Eadem de
 Masinissa accepimus. Glaciales aquæ gelida conce-
 prum

ptum inhibent, autore Aristotele. Sic causa externæ multæ, ær̄q̄, frigidus aut calidus impensè, exercitium vehemens, animiq̄, affectus, inærores gaudium, coitus superfluus, tum aquæ potus, ac alia innumera aliquo modo sterilitatem inferre possunt, ut latius apud Medicos tum veteres tum neotericos, videre liceat. Sed nunc præcipuas causas adferamus quæ peculiariter ad mulieres pertinent. Mulier (inquit Aërius loco citato) sua ipsius ratione non concipit, quod utrum habeat vel calidum & igneum, vel frigidum & humidum, vel squalentem & aridum, vel carnosum & pinguem, vel excarnatum & gracilem, vel debilem, vel angustum, vel breuem; aut quod vasa eius clausa obstructaq̄ sint, aut cicatricis superuentu excacata; aut quod membrana ostium uteri obstruentes nullum foramen relinquant; aut quod eiusdem uteri cervix in obliquum ducatur; aut quod ostium sit vel nimis angustum, vel nimis amplum; aut quod quispian alius affectus eorum de quibus superius diximus, & qui infra dicuntur ab ipso Aërio, vulvam impediat: sed & inuiti concubitus inanes ac steriles sunt: amor enim genituram conciliat; ideo semina amantes creberrimè pariunt. Noui nihilominus aliquas per vim stupratas, semel tantum coeuntes, prima vice inuitas concepisse. Sis Cleopatra: Corpus habentes siccum, & tennes existentes, ac macilentæ, & phibificæ, & contra pingues, crassæ & iracundæ, furiosæ, non concipiunt: partibus autem mulieres impediuntur, quoties non purgantur, aut orificium matricis obductum habent, vel contortum, aut membrana vel aliqua re aliena clausum; aut callositatem, aut duritiem, aut vulnus;

Causæ sterilitatis mulieris.

aut

Erois-

Ex Hippoc.
& Gal. Cau-
sa Sterilita-
tis.

aut si in communicatione viri semen non emittunt. Eros quoque inquit: Habentes matricem leuem & lubricam, semen receptum non retinent: suffocat quoque semen viri aliquando sua humiditate. Verum enimvero in ipsis mulieribus nonnullæ ipsius vteri præter naturam dispositiones possunt esse causa sterilitatis, & præsertim eiusdæ intemperatura, quemadmodum & ab Hipp. & Gal. aph. 62. 5. libri scriptum est. Namq. bene temperati vteri ad conceptionem sunt idonei: malè autem temperati si parum à bonitate recedunt, difficulter concipiunt: si verò nimium mulieres steriles fiunt; & proinde mulieres esse fecundas sine ambabus bonis temperaturis est impossibile, ut inquit Galenus in Comment. Appello ambas bonas temperaturas, mediocres scilicet, tum ex calidi & frigidi, tum etiam ex humidi & sicci commixtione; cum fieri possit, ut secundum vnam oppositionem bene temperatus sit vterus, secundum alteram verò malè: propterea Hippoc. dicebat: Quæcunque verò ex virisque mediocrem habent temperaturam, ea fecunda sunt. Nam ne mulier concipiat, potest altera efficere intemperatura, ut inquit Galenus, modò nimium à bonitate recedat. Hac enim ubi frigida fuerit immodicè, aded quòd ex ea vterus spissior efficiatur, sterilitatem efficit. Nam angusta quidem erunt supra modum ora vasorum, quæ ad ipsum pertingunt vterum, aded ut neque secunda possint adnasci ad iam dicta ora vasorum: neq. si hoc fiat aliquando, potest bene nutriri conceptus; cum vel nullo modo fiant hisce mulieribus purgationes, vel omnino pauca, & ea ipsa vitiosa, solo tenuiore ac aquosiore sanguine perlabente. His item eadem ora facile ob-
struun-

struuntur, & propter naturam angustiam, & quoniam magna ex parte hæ mulieres humorem aggregant pituitosum, siquidem corpus totum ferè est vtero simile. Ad hæc in talibus vteru constringit etiam maris semen refrigerari, nisi natura sit calidissimum. His itaque de causis vteri nimia frigiditas conceptionem omnino impedit, ac mulieres steriles facit. Ex nimia quoque humiditate vteri mulieres non concipiunt, ut paulo antè dictum est, cum genitura in his exinguatur, quemadmodum in terra palustri cerealia semina; ex Galeni testimonio præcitato aphorismo: calida quoque, veluti calida terra si semina committantur, ut in aestibus sub cane, iuxta eundem. Item sicciores vteri non concipiunt: nam in ipsis tale quid accidit, quale ubi aut arena, aut argillosa terra, aut petrosa mandantur semina, eodem Gal. teste. Pingues nec macilentæ concipiunt. Accidit quoque ex vitiosorum humorum abundantia, quod mulier non concipit, ob cicatricem inductam si vasa fuerint excacata; ob vlcera membranam osculum vteri obstruantem; vel eiusdem angustiam, vel amplitudinem, ut dictum est. Si etiam menses mulieri non omnino prodeant, aut pauciores quàm debent, aut plures quàm oportet, non concipiunt, ex Hippoc. auctoritate lib. De sterilibus. Flatus quoque in vtero existentes impediunt conceptionem, & assumptum pharmacum; coitus inuiti & inanes. Etas etiam vel iunior vel proeclior conceptum intercipit. Propterea nunc primum pubescentes à Venere arcere oportet, ita ut vir trigessimum annum, mulier decimum octauum attingat. Præcipuè verò inepta mulieris forma sterilitati occasionem præstat. Fæcunda enim mulier habere

bere debet proceritatem corporis moderatam, lumborum & suminis latitudinem, nates eminentes, commodam alui molem, pectus angustum, mammillas amplas: eiusmodi mulieres fecundae, his verò oppositae steriliores sunt. Potest quidem, praeter enumeratas causas, alia quaedam magis recondita superesse: sed totidem ferè sunt quae noscuntur. Et sic mulier infecunda est propter affectus eosdem vteri praeter naturam, tum seminis sui, tum testiculorum in ultimis cornibus sitorum: si semen sit calidius, frigidius, siccus, humidus, ob similem corporis totius & partium principium, & potissimum testiculorum. Sic & virago, mulier barbata, audax, virilis, voce graui, infecunda est: quia calor multus sanguinem dissipat. Meretrices, quibus attritu multo partes sunt callosae, non concipiunt, vel raro; cum & lubricae sint partes, unde vasa spermatica infirma sunt. Omnes vteri affectus superius descripti, phlegmone, erysipelas, vlcus, abscessus, cancer, vteri procidentia, scirrhus, fluores muliebres, & alia antedicta conceptionem impediunt; & semen viri ac mulieris diuerso tempore emissum. Intempestiuus etiam congressus causa sterilitatis est, cum conceptionis tempus sit, vel incipientibus vel cessantibus mensibus. Reliquo autem alio tempore toto expurgationis, licet aperta fuerint vteri venarum ora, non tamen tunc concipere mulier vlllo modo potest, cum semen nequeat in vulua remanere, sed ab influentis sanguinis copia eluatur. Cessantibus autem, vel incipientibus mensibus, & ora aperta sunt, & menstruum non multum, neque vniuersum, sed paucum & paulatim effluit; unde efficitur ut ob asperitatem vuluae semen adhareat, satisq; alimenti ex sanguis.

sanguinis confluentis paucitate habeat : ante etiam quam menses veniant , conceptus fieri propterea non valet , quia & alimento caret semen , & adhaerentiam nullam inuenit , cum eo tempore occlusis vasis leuis vulua relinquitur : defluit itaque semen , neque vniri cum tunica eius potest ; siquidem aspera magis idonea sunt quam leuia ad coalescendum , ex sententia Gal. lib. De dissectione vteri , vt etiam à Donato citatur . Nam si leues fuerint vteri , mulier in ventre non concipit , quoniam licet genituram suscipiant , foras tamen emittunt , vt testatur Hipp. eodem lib. De sterilibus.

OBSERVATIO LVII.

Num vir aut mulier sterilis sit , per modum Consultationis.

CVM variæ sint causæ , vir nobilissime , difficultatis imprægnationis , vel sterilitatis , quæris ex me , eò quòd ab vxore tua generosa prolem non suscipias , quamuis ipse ante coniugium proles ex concubinis susceperis , nunquid causa hæc ad te vel vxorem sit referenda . Intellexi autem ex te , coniugem tuam nobilissimam multum iam pridem vteri fluori , seu muliebri , fuisse obnoxiam , etiam aliquot annis , ita vt illa ipsa , doctissimorum Medicorum consiliis , thermas naturales accesserit , licet nondum aliquid commodi ex iis acceperit . Ego tamen ex vsu aquæ Porretanæ , nobilem Matronam Bononiensem ex consilio Elidei præceptoris

Y

ptoris

338 DE MULIERVM MORBIS,
ptoris mei charissimi, ob humidum vterum
sterilem existentem, noui tandem concepisse.
Ideo verisimile mihi videtur, quòd ob phleg-
maticas humiditates matricis (vt magna ex
parte fieri solet) vxor tua charissima non con-
cipiat, & quòd causa sterilitatis potius penes
Dominam sit, quàm penes te. Nam & humi-
dum vterum habet, in quo genitura facilè ex-
tinguitur, multoque magis cùm fluore vteri
laboret. Hanc autem temperaturam humidam
vteri, indicant, teste Paulo Ægineta, in coitu
humor destillans tenuiùs, & copiosum men-
struum, multoq. magis album profluuium, ideo
ait Benedictus, Medicus Veronensis insignis,
lib. 25. cap. 12. De sterilitatis & fœcunditatis
notis, quòd illæ quibus alba profluvia fiunt,
rarò concipiunt. Et propterea cùm generosa tua
vxor iis fuerit remediis vsa quæ ad fluore mu-
liebrem conferant, nec ab iisdem adhuc probè
curata fuerit, in dubium vertitur nunquid ab
ea sterilitatis causa amoueri poterit. Et quia hæ
causæ potissimum impediens conceptionem
valde sint diuturnæ, ideo & curatu difficiles.
Mulier enim facilè lassatur in sumendis medi-
camentis, & victus rationem strictè obseruan-
do. nam iisdem ad minus per annum esset in-
sistendum. & nunc maximè coniux tua tædio
medicamentorum affecta est, quia iam variis
& multis vsa est remediis, etiam Medicorum
excellentium, quæ nihil tamen profecerunt.
Attamen iisdem adhuc esset insistendum, si re-
ctè curari vellent: nam continuata viget, inter-
cisa

isa verò percunt. Ideo in primis fluor ille albus
esset curandus. natura enim humens à mulie-
ris purgatione ac lubrica si fuerit non concipit;
tam facile semen excidit. Præterea ante cura-
tionem quidam certis experimentis periculum
faciunt, num mulier sterilis sit, necne. Et ita
sterilitatis, vt tradunt, indicia deprehendun-
tur. In olla hordei plena vrina coniicitur; deci-
mo die quod erumpit fœcunditatem arguit.
Alij fursures imponunt, & vrinam infundunt;
ubi vermes progeniti fuerint, sterilitatem indi-
cant. Mulier pariter circumpositis vestimentis,
abditæque fumigatione, si ad nares nidor de-
fertur, fœcunda creditur ab Hippocrate, ob
peras videlicet naturales vias. Nam & virgi-
num futura fœcunditas eodem modo speratur.
Verùm vt sterilitas amoueri queat, causa om-
nium primò auferenda erit; præter ea quæ ad
uorem muliebrem valere scribuntur. Hic ita-
que & vteri ratio huius nobilissimæ Dominæ
habenda est, & ideo cùm eius humiditas causa
est, quo minus concipiat, aridioribus alimen-
tis (vt Aëtius etiam docet) vti oportebit: pluri-
mum exerceri ac perfricari: & euacuationis
inversionisque causa interdum pransam, inter-
dum ieiunam euomere; & cibi parsymonia de-
recari, carnesque potius rostas vigentium ætate
animalium, quàm elixas, ac pisces solidiores
comedere, vinumq. potens meracius quidem,
sed parcius bibere. Arida præterea fomenta
rebrò, at balnea perquàm rarò adhibenda sunt.
Qui verò statim à principio desiccantia & ad-
strin-

stringentia vtero apponunt, non parum laedunt. Cohibita enim materia ad principes partes recurrit. Sed vbi totum corpus purgatum fuerit, tutius deinceps vtero adstringentia & firman-
tia medicamenta applicabimus. Verum cum & his adsint pituitosi humores, laboribus quidem, vt etiam Paulus suadet, vacuare, sudoribus & vomitu, vel per inferiora, expediet. Et sic materiam pituitosam prius paratam cum decoctis calfacientibus, mox educemus cum diaphœnico, agarico, & similibus, vel pilulis fœtidis, & de agarico, añ. 3 ℥. vel cum Indo maiore. deinde post euacuationes conuenientes, danda erit 3 j. theriacæ; & conueniunt medicamenta descripta apud Guainerium & Fontanum lib. 3. morb. inter. cap. 27. De œdematis vteri curatione. Quæ valde calfaciunt, & potissimum quæ exsiccant, egregiè his conueniunt. Nam & Paulus ex medicamentis epithymum, euphorbium quoque, piper, dauci semen, petroselini semen, omnia contrita denarium duum pondere potui dat. Sed modum pro corporis viribus, propter euphorbium, obseruandum putamus. nam humorem alui turbat, & vterum validè calfacit. At medicamentum ex aloë picra satis erit, etiam à Galeno commendatum ad fluorem muliebrem. vel dentur turpeti selecti ʒ ij. ℥. sacch. 3 ij. redigantur in puluerem, qui iure cicero rubrorum exceptus appetente diluculo sumatur. valent & hîc quæ ad hydro-
pem vteri valere Veteres scripserunt. At corpore bene purgato, resiccantia ac astringentia commo-

commodè vtero applicantur. Huiusmodi sunt, inquit Aëtius, lentisci decoctum, item myrti, ros. foliorum rubi, vel tenerorum virgultorum rubi, rhus coriarij, mali punici, florum & gallarum, pillularum cupressi: ex quibus infusus, irrigationes, fots, cataplasmata, iniectiones, pessi formari poterunt. Adhibet idem & mala cotonea similiter palmulis excepta. Ad nimiam quoque vteri humiditatem huiusmodi portiones conueniunt: Myrti baccas, aut malicorium punici dulcis cum vino terito, & exhibeto: aut auellanas nuces vstas, cum vino tritas propinato, ex eodem auctore. Interea vtendum iis quæ propriè ad conceptionem faciunt, quibus antiqui utebantur; vt pastinacæ erraticæ foliis, vel semine. Leporis vterum aridum tritum vtrique dari iubet idem Aëtius. quin ad vuluæ fluxiones seminisq. incontinentiam cerebrum leporis assum assumunt. iam & leporini coaguli, ac eiusdem fimi pares portiones ex melle coguntur in pessos. Donatus pro remouenda sterilitate pluribus vti consuevit, potissimum vbi orta sterilitas non fuerit ex immodico vteri calore; id quod perrarissimè accidit: quorum primum est: & testiculi apri siluestris exsiccati in vmbra, scobis eboris, añ. ʒ j. testiculorum vulpis ʒ j. β. matricis & coaguli leporis, añ. ʒ ij. sem. melon. ʒ iiij. cum saccharo dissoluto in aqua ros. & melissæ fiant morsuli. Vel: & sem. seselios, scobis eboris, & matricis leporis in vmbra exsiccata, añ. ʒ j. diambra seu eclegmatis de xyloaloe ʒ j. β. cum saccharo in aqua ros.

Y 3

disso-

342 DE MULIERVM MORBIS,
dissoluto figurentur morsuli quibus vtatur mu-
lier cum paucō vino albo aut aqua melissæ seu
florum citrangulorum, per plures dies, ante viri
congressum: quo etiam tēpore pessi adhibean-
tur ex coagulo, matrice & stercore leporis, ca-
rycis pinguibus, adipe anseris, paucō croco, aut
moscho, figurati; qui etiam in linteo serico in-
uoluti, & oleo irino, seu liliaceo intincti sub-
dantur. Habemus & portiones, & pessulos, &
suffumigia innumera apud Aëtium lib. 16. cap.
33. Sed hæc pauca remedia nunc dicta suffi-
ciunt. Interim vngula aromatica, spica, aut cy-
perus eisdem permisceri poterit. A quibus, desi-
nentibus iam mensibus tempore (quod tempus
optimum est) mediō, mutuo amore (nam amor
genituram conciliat, vt inquit idem Aëtius)
Venus incunda est. Sed & virum strenuam
operam nauare oportet; interimque à Venere
abstinuisse, & boni cibi succis nutritum esse, ex
eiusdem Aëtij decreto; corporisque temperies
tum viris tum mulieribus seruanda, & sine
omni excessu. Atque his puto me satisfacisse
tuæ petitioni, Vir nobilissime. Faxitque Deus
optimus maximus, vt his remediis aptis vxor
proles ex dulcibus amplexibus, quique Vene-
rem & amorem incitant, assequi possit. Vale,
10. die Feb. anno 1570.

Petrus Forestus, reipub. Delphensis
Medicus, tui obseruantissimus.

SCHO-

SCHOLIA.

CAUSIS sterilitatis Scholio precedente enuclea-
tis, harum signa diligenter excutienda sunt,
antequam vera curandi methodus instituat. Ve-
rum cum aliqua causa ad virum pertineat, alia
verò ad mulieres; de viris sterilibus, & quomodo co-
gnoscat, primò dicemus; deinde verò de mulieribus.
Effeminatū virum sterile iudicabimus eum, qui timi-
dus existat, actusq; muliebres plurimos habeat, & vo-
cem muliebrem; quales eunuchi sunt, barba carentes,
& frigidum temperamentum habentes, quod partes
circumpositæ testibus glabræ cōmonstrant. Sterilita-
tis plerunq. indicia sunt, si semen genitale frigidū sen-
tiatur, & tardius exeat; pauca adsit voluptas, nullaq;
coitus appetentia. nam quibus colis vix tumet aut eri-
gitur, totumq; membrū sit remissum, piliq; sunt exi-
les, vel glabrities est circa testes, quiq; rubore in cœtu
mulierum suffunduntur, imbarbes, tales intempe-
riem frigidam testium habent. Quibusdam testiculi
cōulsi sunt, paralytici, ulcerati. Aliis maligna aliqua
agritudo præcessit. Quibus & venæ circa aures præci-
sæ, aut qui in principe aliquo membro agritudinem
tibi notam habeant, vel antea passi sint, vel quibus ni-
mis brevis est virga, vel nimium extensa, aut fora-
minis adeo tortuosus, vel ex quibus lapis chirurgia
extractus, testesq; intus latent, vel partes genitales
ignave sunt; quæ omnia visu vel relatu agri cognos-
ces, quæq; ex penis ac testium (de quibus antea di-
ctum est) propriis locis petenda sunt; ij, inquam, num-
quam, aut raro generant. Sterilem verò, qui ex forti

Signa steri-
litis, quæ
ex viro su-
muntur.

aut potenti calore suo generationis materiam exterminat, ex habitudine eiusq; robore comprehendens: ac eum pariter qui pinguedine nimia sterilis factus est. Nam ab excessu sex rerum non naturalium, sum ex agri ac astantium sermone, diligenti examine plura innotescunt. Calidius siquidem temperamentum viri facile deprehenditur ex pilorum copia, potissimum verò nigrorum in partibus genitalibus, & omnibus quæ circumstant, supra quidem vsque ad media femora. Petulca est etiam hæc temperatura, & ad libidinem prona: statim verò satiatur. Reliqua vide de testium temperatura, apud Galenum in Arte parua, & De sanit. tuenda, & Method. medendi. At verò mulier sterilis dicenda, cuius crassa vox est, piliq; multi & duri rigidiq; pubem obsepiunt, mystacem mentumq; barba circumdat; quæq; plurimorum virorum amplexus experta est, neque concepit. Vterorum frigiditatem coniectamus ex suppressis mensibus: neque enim præ nimia crassitudine commodè feruntur: sed & stupidus sensus circa pectinem, lumbos ac crura percipitur. aliqua etiam crurum impotentes sunt, victus quoque præcessit frigidior, ac crassi succi. At si prorsus perfrigerata fuerint, ne Venerem quidem appetunt; uteri osculum contractum habent, ut ex Aëtio cap. 27. lib. 16. & Paulo cap. 78 lib. 3. liquet. Menses his aut suppressuntur, aut parcè fluunt; suntq; decolores, & menses albicantes, non rubri; fluxiles & aquosi, à liquidiore pituita. Coniectatur autem uteri caliditas ex reliqui corporis caliditate; & ex mensium paucitate cum dolore prodeuntium; ita ut pudenda mulieris exulcerent; sed & quæ prodeunt nigriora sunt, & ob
nimiam

Signa ex
parte mulie-
ris.

Signa uteri
frigidi.

Calidi.

nimiam puncturam nullum ordinem seruant. Sequitur etiam ad hanc temperaturam insignis salacitas, & totius corporis siccitas, celeris excretio seminis: his adest audacia, ira, sitis inexplata, & ad omnia promptitudo; pulsus celer, vrina flaua, menstrua pauca, crassa, calida, flaua, aut ex adustione nigricantia. Signa humidi iam diximus Obs. precedente Humidi. & quomodo curetur. Adest videlicet hic saepe vterinus fluor, frequens lumborum & pubis grauitas. Arabes addunt pilos molles, Venerem sopitam: quae si conceperint, in incremento foetus abortum patiuntur; habentque oculos lachrymosos assidue, vt Erotis ait. cum enim matrix cerebro per neruos alligata sit, necesse est vt cerebrum matriçi compatiatur. Vnde si matrix nimiam in se habet humiditatem, ex ea cerebrum impletur, quae ad oculos redundans, eos inuoluntarie cogit emittere lachrymas. At in vtero sic- Sicci. cior humor in coitu ex eisdem haudquaquam destillat: exiguum quoque ac crassum erit menstruum, aderitque totius corporis exsiccatio. paucus enim adest mensium fluxus, os siccum, labra scissa; coitum appetant, vt sicca terra rorem; facile irascuntur, corpore tenues sunt, in actu Venereo nihil fere seminis emittunt. Si quando vero praedictae simplices temperature inuicem misceantur, ex earundem indicis manifesta erit earum commixtio. Et ita frigidior & humidior ostendet reliquum corpus molle, tactu frigidum, aliosum, fluxus muliebris, perpetua vuluae humiditas in coitu, plurima, & viro molesta, semen aquosum, quod nequit continere; menses multi, fluxiles, aquosi; facultas retentrix imbecilla ob frigiditatem & humiditatem; vnde facile abortiunt, teste

Y 5

Hipp.

Frigidior &
humidior
vterus.

Hipp. Frigidiorē & sicciorē indicant menses pauci, rari, crassi, semen paucū, appetentiā coitus maior, quā in praeedente; os vteri collum siccum, & ob siccitatem rhagadibus obnoxium. vide aph. 57. lib. 5.

Et abundancia humorum.

Si simul ex abundantia humorum vitiosorum, dignoscēs ex iis quae de mensum suppressione scripta sunt. Breviter, si ex sola causa calida sine humore, id per calorem in fundo vteri, per punctiones oculorum, palpebrarum, & amaritudinem oris, sitimq; continuam percipies, & per exiguam mēstruorum educationem, per appetitum coitus & delectationem.

Signa si à pinguedine, vel nimia macilentia.

Si cum humoris vitio, aderit pondus & grauedo, & ita in reliquis ex gravitate, cum signis praedominantis ipsius humoris, de quibus ad nauseam iam saepe dictum est. Si enim ex pinguedine, vel nimia macilentia, ex te ipso dignoscere valebis. Pingues enim, ut diximus ex Paulo, liberis procreandis non sunt idoneae, eo quod genitalibus mutuo se contingere non possunt. Macilenta momentum seminis tantum emittunt, neque extenuata materiam habent. Crassarum habitudo facile nota est: è pinguedine enim comprimuntur, & eorum orificia clauduntur. A flatu vteri etiam conceptio impeditur, quem insequitur pectinis & imi ventris tumor, extensio, dolor pungens, etiam ventus inde erumpens, ut antea de spiritu incluso dictum est prius. At si per aliquod assumptum pharmacum, vel pessos iniectos, mulier non concipiat, ex eiusdem mulieris loquela, aut astantium, percipies. Si locellorum vitio eueniat à carnis excrescentia, tuberculo, resolutione, conuulsione, ulcere, apostemate, aut quouis alio vteri vitio, ex propriis locis cognoscuntur. Ita quoque si ob mem-

A flatu.

Ab assumpto pharmaco.

Ex vitio locellorum ac vteri.

branam

branam osculum vteri obthurantem fiat, vel ob nimiam eiusdem angustiam, vel amplitudinem, vel quod ceruix vteri obliqua sit, ex obstetricum relatione tum mulierum querimonia percipies. Quibus addas experimenta per aromata, iuxta Hippocratem precedente Observatione dicta, & apud Gal. Comment. aph. 62. lib. 5. Vel allium expurgatum pefi modo dormitura subdatur: si odor vel sapor ad os pertingat, fecunda est: sin minus, sterilis. Hæc ad prognostica pertinent. Si medicamenta sterilitatem inducentia vasa vteri excacant, incurabilem plerumque affectionem faciunt: licet quadam potiones cecitatem curabilem inducant, cui si protinus subvenias mederi possis, ex Aetij testimonio. Quod verò quæcunque præter naturam crassæ sunt, priusquam extenuentur non concipiunt, quod orientum iis os vteri comprimat, constat ex Hipp. auctoritate aph. 64. lib. 5. & aph. 44. lib. 5. Præterea menses iis pauci feruntur, quod potissima alimenti pars in pinguedinem conuertatur, ut Aetius refert. Quæcunque præter naturam tenues existentes vterum gerunt, abortiunt priusquam crassescant. Quapropter prius eas rescicere oportet. Atque hos duos habitus præter naturam sterilitatem efficientes ex te ipso facile dignosces. Similiter ex Galeno liquet quod malè temperati vteri, si parum à bonitate recedunt, difficulter concipiunt; si verò nimium, mulieres steriles fiunt. Si vlcera in vteris fuerint etiam oberta, & si menses sano modo prodeunt, plerumque incurabilia sunt: & propterea in ventre tales non concipiunt, quàm diu vlcera habuerint; ex sententia eiusdem Hipp. citato lib. De sterilibus. Mulier puerpera, vel quæ vte-

Signa prognostica.

rum

rum gerit, sepe sanior est, iuxta Auic. sed imbecilla
 & cito senescit. Sterilis contra est valetudinaria, ve-
 geta diu & florens. Si mulier post menstruam pur-
 gationem humida manet, in vtero lubricat semen.
 Quae uteros habent calidos, frigidos, humidos, siccos,
 non concipiunt nisi ex contrario semine; aph. 72. lib.
 3. Nec viri qui semen habent calidum, frigidum,
 humidum, siccum, generant, nisi in contraria vteri
 temperatura. Galenus tamen hunc damnat aphor.
 asseritq; non esse Hippoc. Sterilitas ex occacatis ori-
 ficis vasorum in vtero, & in vteri paruitate, penis
 breuitate, longitudine, insanabilis. Ex lapide dissecto
 curatu difficilis, nisi roborantibus partem emende-
 mus. Os vteri durum, callosum, compressum, quia
 claudi exacte nequit, conceptum impedit; aut si clau-
 so eo conceptus sit, partum, qui dilatari nequit, sup-
 primit. Durum autem sit aut a tumore praeter natu-
 ram, ut dictum est ex Hippocrate, Quibus os vteri
 durum est, &c. aut a frigore; ex mora longa in aqua
 frigida, aut sessione longa supra lapidem: aut a ci-
 catrice, post continuitatem solutam: a partu diffi-
 cili, vel defloratione puellae iunioris: a balano penis
 enormiore. Quae duos aut tres menses a Venere ab-
 stinent, conceptui aptiores euadunt; & viri conti-
 nentes aliquamdiu generationi. Ait Gordonius, si se-
 mina vtriusque prouocantur in vas plenum aqua fri-
 gida: si supernatet, sterilis est; si fundum petat, fe-
 cunditatem arguit. Haemorrhoides & excrescentiae
 in vtero non videntur recipere curationem; nec fora-
 minis tortuositas virgae virilis, & paruitas virgae no-
 tatu digna curationem non admittit. Mulier quoque
 cicatrice e vulnere obducta non curatur: & si concipi-
 at,

piat, metus est de morte matris, cum collum dilatari non possit in fœtus exitu, ita ut oporteat chirurgia aperire, non sine vitæ periculo. Sterilitas vel difficultas impregnationis ex verruca, apostemate duro, cancro, non curatur, quia causa remoueri non potest. Sed ob fluxum menstruum assiduum, vel retentionem, curatur per eorundem curationem. Quæ ex lubrica vulua, difficulter concipit, ex leui causa abortit. Vidi tales quæ quatuor vicibus admodum breui tempore abortum passæ sunt. Caueant sibi à statione, multa vociferatione & sorti, à pondere eleuando, cibis vinctuos, vtantur exsiccantibus. Ad 60. annum mares plurimi gignunt. compertum tamen est (vt superius diximus) ad 70. nonnullos ad 75. & 80. sobolem procreasse, sed perpaucos, & valentissimos. Quin etiam Masinissam regem post 86. annum filium, quem Methimathuum appellauerit, Catonem Censorium octogesimo exacto è clientis sui filia Salonij, generasse clarum est. Mulieres verò ad 45. magna ex parte fœtificant: etsi nonnullæ annos sexaginta natæ, validiores tamen, pepererint. Noni mulierem, cum in Gallia essem, quæ anno ætatis 53. peperit, quæ adedò fecunda dicebatur, vt 23. proles pepererit. At viri (teste eodem Aëtio) qui ob deprauatam viuendi rationem semen corrumpunt, ad magis compositum salubrioremq; victum conuersi genitura fecunditatem acquirunt. Verum qui alienis feminis oblectati cum propriis vxoribus non conueniunt, seruata pudicitia generabunt. Qui feminis fluore laborant, curati fecundi fiunt. Sic nouimus mulieres alias sexdecim annis viris copulatæ, alias octodecim annis quasi steriles, tunc prius concepisse. Ita noni & honestam

Curatio.

Frigidi vteri
curatio.

nestam matronam, que cum ex primo viro non concepisset, postea alteri valde secundo nuptam, neque tunc secunda fuerit: verum tertio marito copulata, tunc demum concepit. Quod ad curationem attinet, unicuique cause sua propria debetur curatio. Si ex mala intemperie, ea ipsa auferenda erit contrariis, eaq; inclinanda seu flectenda ad oppositum temperaturæ sui paræ. Si simul adsit humor, uq; concoctus, purgandus erit. Si verò aliud vitium vteri fuerit, hoc ipsum propriis remediis remouendum. Nuda intemperiei sufficiunt alterantia & roborantia. Iam dictum est quomodo curantur si ob humiditatem vteri non concipiant. Si ex frigidityte, vniuersa victus ratio ad calidum vergat: cibi sint boni succi, attenuantesq;, ac omnibus alimentis admisceantur, quæ purgationes irritare possunt, veluti sunt olera odorata & acria; scandix, inquam, crythmon, fœniculum, gingidium, apium, smyrnium, tum alia: ac speciatim victum præscribendo, qualem diximus de mensium suppressione ex frigidis succis. Reuocabimus & calorem fomentis, & potionibus, iuxta Aëtium lib. 16. cap. 26. ex castorio, cumino, aniso, pulgione; & lumbos inungemus irino & amaracino vnguento; & pessis utemur è myrrha, ruta, galbano, & castorio. Vel validioribus etiam, felle bubulo adiecto, molli lana inuolutis, ut sine corporis erosionem attractionem perficiant: neque difficile est eorum quantitatem metiri. Pro affectuum magnitudine, & diuturnitate medicamentorum, vires augebimus, eisdemq; insistemus, vel contra minuemus, breuiq; tempore applicabimus. Sunt tamen sæpe causa impediētes conceptionem ut plurimum diuturnæ: ideo obnixè
persua-

persuadendum ne mulier, aut vir, si in causa sit, citò
 medicamentorum tadiis afficiantur aut lassentur; &
 curandum ne Medicus in iis administrandis deficiat.
 nam res aliquando eò deuenit, vt per integrum an-
 num vel duos, vterque desistere non debeat; vti Va-
 lescus rectè annotauit. Verùm vbi frigidi etiam &
 crassi succi cum frigida vteri intemperie redundarint,
 post eorum coctionem ac preparationem, purgante
 medicamento vacuandi sunt: quorum copiam etiam
 loco iam citato inuenies, tum apud Aëtium loco citato,
 & cap. 31. Laudat is & vomitum per intervalla;
 postea adhibet iam dicta: qualia & Paulus etiam
 præscribit, vt ad longum videre licet lib. 3. cap. 74.
 Verùm si caliditas vteri sit in causa, humidiora ali-
 menta conueniunt; vt malua, lactuca, bliti, cucur-
 bita, atriplex, portulaca, cucumeres, vinum album
 & dilutum, somnus, ac dulcium aquarum balnea.
 Lumbis verò ac sumini refrigerantia adhibenda
 sunt; vt solani aut vmbilici Veneris succus rosaceo
 admixtus, ac lana exceptus; quem etiam in sinum
 pudoris vtiliter imponemus: mercurialis præterea
 lumbis & pubi illita calidioribus vteris confert. Idem
 potest spuma argenti; & cerussa, si ex aqua teran-
 tur: quorum omnium quantitatem, inquit Aëtius, re-
 ctè metieris, si semper singula quaque multum posse
 arbitreris: ita enim refrigerationis nimietatem ca-
 uebis. Quòd si cum calida vteri intemperie, calidi ac
 vitiosi redundarint succi, iidem etiam prius purgan-
 di sunt, concoctis ipsis ac preparatis, seu à natura
 deuietis; vt exemplo mox ostendemus. Nam quoad
 menses morbofi fuerint, siue biliosi, siue pituitosi ex-
 isterint; mulier non concipit, vt liquet ex Hippoc.
 eodem

Si ex calidi-
 tate vteri,
 curatio.

Si propter
siccitatem
uteri, non
conciat,
curatio.

352 DE MULIERVM MORBIS,
eodem lib. De sterilibus. Mulieri verò qua ob uteri
siccitatem non concipit, constat ex Aëtio lib. 16. cap.
30. humidiora alimenta offerenda esse: toto enim
corpore humefacto, uterus quoque eiusdem qualita-
tis particeps erit. Valentq, balnea, inunctiones, cata-
plasmata, infusiones, & omnia humectandi vim
habentia. Sed, antequam ad alias causas amouendas
procedamus, exemplum sequens interponamus.

OBSERVATIO LVIII.

*De difficultate imprægnationis in duabus
mulieribus, una pituitosa, altera
biliosa.*

QVIDAM differentiam faciunt (ut Guai-
narius) inter sterilitatem & difficultatem
imprægnationis. Voluntque, sterilitatem esse
dispositionem quandam à generatione vel tem-
pore acquisitam, per quam vir siue mulier ad
producendum sibi simile impotentes sint. Im-
prægnationis difficultatem aiunt esse disposi-
tionem in viro aut muliere ex tempore aut à
principio generationis acquisitam, per quam
etsi eo tempore ad sibi simile generandum im-
potentes fiant; tamen beneficio Medici, vel
alia re, talis impotentia remoueri potest. Vide-
mus enim aliquando quòd habitudinis disso-
ciatio, sterilitatis, vel potius imprægnationis
difficultatis, principalis causa existat. Hinc, ut
diximus, bis coniugio copulati viri, aut mulie-
res, primo sæpe sunt steriles: si inde vir cum se-
cunda

cunda copuletur, generabit aliquando; aut mulier secundum nupta concipiet. At quamuis propter causam corrigibilem, difficultatem imprægnationis vocant, easdem tamen causas cum sterilitate ponunt; vt Guainerius facit in suo Commentariolo de ægritudinibus matricis: de quibus nunc satis tam ad virum quàm mulierem pertinentibus diximus. Interea tamen si virumque sterilem nouerimus, procreandæ prolis nulla spes habebitur: eorumque curationem relinquimus: quamuis vna haberi potest, si fiat coniugij mutatio, vt contingit in maleficiatis. Quòd si sola mulier in causa fuerit, diligenter eandem considerabimus. Ita istis diebus mulier pituitosa cùm ob humiditates & succos pituitosos imprægnari non posset, consultandi causa me accessit. Signis iam probè inuestigatis, cùm intemperies minimè simplex, frigida & humida, vteri adesset, verùm etiam cum humoribus pituitosis; consului vt hoc apozemate digerente, vel simili, primo vteretur: & rad. brusci, asparagi, fœniculi, cyperi, rubiæ tinctorum, añ. ʒj. artemisiæ, betonicæ, sabinæ (quia aderant humiditates pituitosæ instar fluoris albi) menthæ, melissæ, maioranæ, añ. m. j. rad. inulæ, asari, añ. ʒij. sem. anisi, seselis, dauci, añ. ʒj. flor. anthos, stœchados arab. añ. p. j. calami arom. incisi ʒij. passul. ʒj. glycyrr. ʒij. fiat decoct. in aqua communi pro lib. j. β. dulcoretur saccharo & melle; fiat ad modum syr. longi, & arom. cum paucis cinnamomi & nucis moschatæ. Materia parata purgetur cum pilulis fœtidis,

Z

dis,

354 DE MULIERVM MORBIS,
dis, dando ʒj. vel cum diaphoen. & elect. Indi,
añ. ʒ iij. ʒ. cum aqua artemis. ʒ iij. Vel detur
diacarthami solidi ʒ ʒ. in tabul. A ventris de-
iectione quidam & hñc balnea naturalia com-
mendant: quæ si desunt, fiant ex herbis iam di-
ctis, & radicibus; vt de superfluitatibus, humi-
dis matricis, & fluore muliebri antea diximus.
In exitu detur ʒj. theriacæ. & vbi non amplius
fluunt humiditates, tunc vtendum exsiccanti-
bus, adiectis in balneo balauſtiis, mentha, cor-
ticibus olibani, mastiche: fiantque pessi ex
myrrha, alumine, aloë, & storace calamita.
Deinde veniendum ad ea quæ matricem præ-
parant ad conceptionem, vt fumigia ex lada-
no, myrrha, galbano, baccis lauri: quorum cõ-
piam inuenies apud Guainerium De iis quæ
extra adinora ad conceptionem præparant.
Habet idem multa remedia, sed superstitiosa.
Etiam eo tempore quæ ad coitus delectatio-
nem faciunt non omittenda: qualia diximus ad
Venerem sopitam conuenire, & virgæ erectio-
nem; vt sunt oscula suauia, suctio labiorum,
amplexus iucundi, & alia apud eundem Guai-
nerium descripta cap. 24. quibus etiam simpli-
cia Venerem instigantia addere possemus, vt
apud eundem Medicus domesticus legere po-
terit. omnia hñc recensere non opus est. Ideo &
hñc auxilia tam viris quàm mulieribus commu-
nia adhibenda, vt corpora in quodam tempe-
ramento, cibo, exercitationibus, seruentur. In-
uant calefacientia; ex oleribus, cruca, erysimon:
vitanda ruta, & calamintha. prosunt & redo-
lencia

lenticia olera, scandix, marathrum, apium, smyr-
 nium. Cōceptus adiuuare creduntur pastinacæ
 erraticæ folia & semen, & caucalis potus. Ma-
 rem præterea concipi putant, si vulua leporis in
 cibo sumatur, & testiculis & coagulo epoto. Al-
 tera verò mulier biliosa, cū difficulter impræ-
 gnaretur, me quoque consuluit. hæc enim pro-
 pter humiditatem biliosam, cum acrimonia ex
 succis biliosis concipere non poterat. Cū le-
 uiter plethora, sed exigua laboraret, vt venam
 ex talo seu saphena incideret iussi, sed in exigua
 quantitate. at si sanguinea fuisset, & maiori ple-
 thora laborasset, venam prius basilicam, deinde
 ex talo incisam, magis commendassem. Qua-
 lia autem sanguineis conueniant, quæ difficul-
 ter imprægnantur, vide apud Guainerium li-
 bro citato, cap. 27. Ceterū in hac muliere, vt
 materia biliosa victu humectante & refrigeran-
 te moderatè contemperaretur, præcepimus: iis
 adhibitis quoque quæ præcedente Scholio dixi-
 mus caliditati vteri conuenire. Interim cum
 syr. & decoct. ex viol. lactuc. end. scariola, &
 similibus materiam paratam euacuari iussimus
 cum cassia & manna & syr. ex infus. ros. pallid.
 cum rhab. modò etiam cum pillulis de rhab. &
 aggreg. deinde & corroboratione facta cum
 tribus sant. & similibus. Etiam si balneo vii
 vellet, quale descripsimus de fluore bilioso, con-
 cessimus; & vt hoc pello vteretur, qui proprie-
 tate sua abundantem in superfluitatibus bilio-
 sis matricem ad conceptionem præparat: &
 medullæ cruris vituli, cerebri cerui, butyri vac-
 cini,

cini, adipis caprarum, seminis mercurialis, añ.
 ʒ β. acaciæ, hypocist. sandal. rub. storacis liqui-
 dæ, cornu cerui vsti, añ. ʒ ij. cum oleo ros. in-
 corporentur, & fiant pessi filo appenso, vt ex-
 trahi possint. Deinde adhibeantur ea, quæ ab
 autoribus descripta sunt valere ad conceptio-
 nem. hoc tamen semper præmonito, quòd mu-
 lieres, quas ad conceptum facilitare volumus,
 sint curandæ euacuando medicamentis leuiter
 laxantibus, abstinendo ab opiatīs resiccantibus
 multum & semen absumentibus. Sunt autem
 nutriendæ alimentis Venerem excitantibus, quæ
 tardiores sunt. Hoc tantum (vt dicebat Ron-
 deletius) remediis addere oportet, quòd eis
 pessaria alia conficienda sunt post exactam vte-
 ri purgationem, os vteri interius dilatando (mi-
 nus tamen in biliosis, vbi acrimonia humorum
 adest) exterius constringendo. Dilatatur au-
 tem vterus vnguento ex adipibus à Rondele-
 rio descriptis cap. De mensibus retentis, aucta
 dosi rad. iridis, & additis ʒ ij. styracis, & ʒ j.
 tereb. abietis. Sed magis in frigidis, & post
 vsum illius vng. vtitur nascali, seu pessa ex fel-
 libus hirci vel lupi cum moscho, castorio & zi-
 betto. Hæc enim omnia laxant, & vterum deor-
 sum trahunt, calfaciuntque, Venerem stimu-
 lant, vt & stercus murium. minus tamen, vt
 diximus, in biliosis. Exterior pars constringi-
 tur fotu parato ex rad. herbis, floribus, & aliis
 constringentibus odoratis. vt: & rad. bistortæ,
 quinquefolij, & cyperi, añ. q. j. ros. rub. cum
 calicibus, corticis mali granati, & balaustio-
 rum,

tum, añ. ʒj. suberis ʒß. hederæ m.j. fiat deco-
ctio in aqua & pauco vino adstringente. Fouea-
tur pars in introitu lecti. Post mensium purga-
tionem, & vsum aliorum remediorum, paulo
antequam congressura sit cum viro, quia ma-
gna ex parte mulieres non concipiunt, cum se-
men non trahunt, aut tractum non retinent,
emplastra supra vterũ & renes ponenda erunt.
His quæ non trahunt semen, emplastrum ce-
roneum, & alia quæ ex gummis aliisque attra-
hentibus conficiuntur, erunt ex vfu. His verò
quæ non retinent, emplastra constringentia,
vtcunque calida, quale est comitissæ, pro ma-
trice, de pelle arietina, de mastiche, additis rad.
bistortæ ʒij. ladani, hypocisthid. añ. ʒj. Misce,
fiat emplastrum; quod gestent, donec apperat
tempus alterius purgationis. Eo enim tempore
amouenda sunt emplastra astringentia, ne men-
ses retineant; nisi in quibus maior sanguinis
copia fluit, quàm pro corporis habitu conue-
niat. Si mulier non concipiat ob salacitatem,
& nimiam ad Venerem propensionem, quod ob
acrimoniam seminis, & caliditatem fit, vt in
hac vltima nostra muliere, alenda est crassis ali-
mentis, quæ sanguinem inspissent, & semen
crassius reddant. Vfus fructuum est utilis; vt
pirorum, pomorum, castanearum, quæ crassos
humores, & crassos gignunt flatus, impetum-
que illum retardant. At stuphis vtuntur mulie-
res humidiores; balneis verò durum habentes
vterum, aut frigidum: sed his vtendum paulo
antequam fluent menses. Si mulieres sint val-

358 DE MULIERVM MORBIS,
de obesæ, extenuandæ sunt vſu medicamento-
rum calidorum, & incidentium, & aperien-
tium; & tenui victu diu, antequam vrantur re-
mediis ſupradictis. Poſtea illas optimis cibis,
multumque ſanguinem generantibus, oportet
rurſus nutrire; & imperare frictiones, cucurbi-
tas, aliaque remedia, quibus uſi ſumus ad ſan-
guinem deorſum trahendum. In illis conſtrin-
gitur os vteri, ſi credimus Hippocrati ab epi-
ploo, quod ad os uſque pubis deſcendit. In fri-
gidioribus ergo & humidioribus mulieribus, ut
in priore hac noſtra muliere, vtile erit uti hac
opiata, ſiue humiditas ſit in toto corpore, ſiue
in vtero tantum: ꝛ conſer. iring. & cort. citri,
añ ʒj. conſer. anthos, zinz. conditi, añ. ʒj. ꝑ.
cineris priapi tauri, & cineris vteri leporis, añ.
ʒꝑ. pul. diagal. diamoſchi dulc. vel diambrae,
añ. ʒij. pinear. & auellan. añ. ʒiij. ſacch. pa-
rum; cum ſyr. conſeruat. cortic. citri fiat opiata:
de qua capiat ad magnitudinem auellanæ lon-
gè à paſtu, cum ibit dormitum. Hæc opiata
magis conuenit frigidis & humidis toto cor-
pore. Nam ſi vterus tantum frigidus & humi-
dus ſit, & totum corpus calidum & ſiccum, ſa-
tius erit fumigio per embotum recepto exſicca-
re, ex odoratis reſiccantibus & leuiter adſtrin-
gentibus. ut: ꝛ nucis moſchatae, macis, benio-
uini, ſtyrac. añ. ʒij. caſtor. ʒꝑ. aliptæ moſchatae,
vel galliæ moſchatae ʒij. caryophyl. ladani pu-
ri, añ. ʒj. zinz. cinnamomi, folij ſpicæ nardi,
añ ʒij. excipiantur omnia terebinth. & fiant
trochiſci, quibus fumigetur manè & ſerò poſt
men-

menſium purgationem. Illis opiata utilis erit, ſi augeatur doſis pinearum & auellan. in lacte ſimul, & pauco melle mixtis; ſubinde remo- uendo lac, ne aceſcat, & recens infundendo. Talis reficiet corpus exſiccatum, & copiam ſe- minis generabit. In iſtis opiatis adduntur mul- ta alia exſiccantia, quæ ſi per ſe ſicca assume- rentur, potius impedirent, quàm inuarent. Sed quia permilcentur ſyr. & rebus dulcibus tem- perantur, conueniunt: & raſura eboris, & cor- nu capræ, ſemen ſeſeli, medulla ſeminis fraxi- ni (linguam auis vocant:) addentur & paſſe- rum cerebella, quamuis magis in cibo ſint aſ- ſumenda, quàm vt præmiſſis miſceantur. Nam iuuant, quòd multum ſeminis generent: id non poſſunt facere, ſi in pauca quantitate aſſuman- tur. Satiùs erit cerebellum porcelli, & porci, diligenter coctum cum pauco origano, poſtea frixum in ſartagine, edere. Multum enim nu- trit & ſemen auget. Opiata ad mulieres ſala- ciores confici debet ex leuiter aſtringentibus, & copiam ſeminis generantibus, parum cali- dis. vt: R^z myrobal. condit. embl. & cheb. añ. n. ij. corticis citri conditi cum ſaccharo (in aliis melle) ℥ j. pinearum infuſ. in lacte, ſemi- nis fraxini eòdem modo infuſi, añ. ℥ β. ſyr. de pomis redolentibus fiat opiata, additis raſ. eboris & cornu capræ, añ. ℥ ij. capiat ad quan- titatem auellanæ. Quæ minus propenſæ ſunt ad Venerem, geſtent ambram vel moſchum, vel chirothecas odoratas: & maximè noctu ha- beant ſub puluinariis, niſi obnoxia ſint ſuffo- cationi

360 DE MULIERVM MORBIS,
cationi vteri. Tunc enim melius esset illa odo-
rata coxis alligata habere; vt egregiè iam pri-
dem Rondeletius admonuit.

SCHOLIA.

SATIS iam constat quibus modis intemperies vteri
simplex, vel cum humore, si causa sit sterilita-
tis vel difficultatis impregnationis, sit curanda. In-
temperie itaque illa, & humoribus purgatis, ad re-
media quæ proprie ad impregnationem faciunt ac-
cedimus. Eorum alia id qualitate præstant, vel per
delectationem vteri in actu coeundi adferendo; vel
actiuam vim eiusdem excitando: alia quidem id
præstant quadam stipticitate roborando vim reten-
tiuam ad conceptum. A proprietate valent, vt etiam
antè dictum est, coagulum leporis, stercus vulpis,
medulla ossis cerui vel vituli, vterus leporis, & alia
multa à Medicis descripta. A qualitate verò con-
ferunt, vterum delectando, & vim attractiuam ex-
citando, cinnamomum, cubebe, masticata & cum
salua virga inuncta: zibettum, moschus, foramini
virga impressa ante coitum, & oleum balsami, si
habeatur. Quæ autem vterum qualitate roborant,
exsiccant, retinent, sunt balnea stiptica, aromatica,
& fofus, ac fumigia, quorum exempla plurima, præ-
ter iam dicta, apud auctores inuenies. In omni cu-
ratione oportet vt causa amoueat: quæ cum varia
sit tam in viris quàm in mulieribus, ea ipsa semper
corrigenda. Ita in viris si longo morbo detineantur,
nisi ab illo curentur, non possunt generare. Sic ali-
quem noui, qui, cum duobus annis ex quo vxorem
duxerat valetudinarius fuisset, curatus postea sin-
gulis

Causa diffi-
cultatis im-
pregnatio-
nis seu ste-
rilitatis om-
nium primò
amouenda.

gulis annis ex vxore prolem suscepit, vsque ad numerum vigesimum. Si igitur debilitas corporis in causa sit, corpus cibis resumptiuis reficiatur; & si adsit frigus neruorum virga, eiusq; mollificatio, curetur vt paralytis: alioqui si sperma ipsum vel genitalia frigore laborant, vtantur vnguentis calfacientibus. Si adsit paucitas inflationis, quæ Venerem incitent & inslent, vt fabæ, præscribantur. Si siccitas sit in causa, humectentur; & si caliditas, infrigidentur. Et si virga nimis curta est, (non enim turpe est Medico teste Auic. cap. 44. de his loqui) in coitu ipso crura mulieris eleuentur, vt semen recipiatur. Frictio cum adipibus calidis, & cibis multiplicant sanguinem, magnificat virgam. Si nimis magna, vt tota virga non immittatur, iubet Gordorius vt mulier strictam cum manu teneat, ne semen in via infrigidetur. At si adsit phymosis, quomodo curetur, prius dictum est. Ita in muliere, si collum vteri clausum est, vel callosum, relaxantibus pessis emolliendum: de quibus videas Cleopatram cap. 3. de Harmonia gynæciorum. Si adsint alia vitia in vtero ex supradictis, prius tollenda. Angustia ipsa in seßionibus, somentis, persusionibus curanda cum emollientibus. Nimia apertura constringenda. Ita & Aëtius cap. 31. lib. 16. De diuersis affectibus vteri curandis quorū ratione mulieres non concipiunt, inquit, Clau-
 sos vteros odoratorum persusionibus, & mollitoris
 ex anserino adipe confectis aperire oportebit: prius
 tamen à mollioribus in seßionibus & ablutionibus in-
 choabimus, sicut è sænugr. sem. lini, oleo probo, in-
 terdum & melle preparatis. Postea ad validiora
 pergemus, vt artemisiam, conyzam, calamintham, pu-
 legium,

Ad vteros
clausos.

Ad vteri os
nimium de-
hiscens.

Ad vteri
auersiones, si
non concipi-
ant.

Si mulier ob
humorum
crassitudi-
nem non
conci-
piat,
quid facien-
dum.

Si à flatu
vteri conce-
ptio impe-
diatur, quid
agendum.

legum, amaracum; his etiam adicientes irinum
ligustrinumq; vnguentum: & mel, myrrha, aut tro-
glodytica, terebinthina, nitrum, casia, carycarum
carnes, vnguentum amaracinum, & huiusmodi,
supponantur. At his quæ ob vterum, seu vteri os ni-
mum fatiscens, non concipiunt, aridus victus, ari-
dique fomenta conueniunt, medicamentaq; astring-
gentia, quæ supponantur, vt hians ostium occlu-
datur: qualia sunt gallarum decoctum, cytini, len-
tis, rub. rad. myrt. & eiusmodi. Postremo vteri
auersiones mollientibus fomentis dirigemus: id enim
fomenta maxime possunt. sed & mollitorq; pessuli
vtiliter supponuntur. imò specillo & digito corre-
ctionem interdum tentabimus. Præcipue vero pu-
legij, & artemisia, decocta, & castorium è posca
bibitum, vtero auerso conferre solent: omninoque
rota curatio declinationis huic vsui accommodabi-
tur. At si ob humorum crassitudinem mulier non
conciat, humorem (inquit Aëtius) spectare oportet:
ac mordicantem quidem feri lactis heminas quin-
que paulatim exhibendo contemperabis; cibosq; boni
succi offeres; vomitumq; ex interuallis prouocabis.
Pituitam verò & aquositatem laboribus exerci-
tiisq; plurimis, & in sudorem resoluentibus, cre-
broque vomitu absumes; atque agræ interim suffi-
ciet castorium iugiter bibere, ac suffimentis so-
ueri. Sed quoniam flatu quoque vteri concep-
tionem impediunt, & flatu ab imperfecta coctione
fiunt; primò quidem parcitas cibi adhibenda est,
deinde quæ expellendo flatui conueniunt; sicut ru-
ta, cuminum, ac reliqua consuetæ semina & aro-
mata: quæ etiam supponi possunt, præcipue ruta
cum

cum melle & modico nitro: atque ex iisdem fomen-
ta confici possunt, & cataplasmata, ac cerata, ubi
applicanda. à leguminibus autem, dulcibusq; edulis,
& flatuosis omnibus abstinendum. Sed si medica-
mentorum violentia sterilitas inducta fuerit, eius
medicamenti facultas noscenda est, nunquid attra-
ctione semen eluerit, an flatuum multitudine eie-
cerit, an multa astrictione os vteri obstruxerit, ge-
nituraq; aditum interceperit; & inde singulis erro-
ribus occurrendum perfusionibus & insectionibus,
prout unicuique congruunt: quæ præcipuè vtilis
erunt, si fortè os vulvæ & acetabula adstricta sint.

Pingua etiam cuncta & fomenta adhiberi oportet,
ac quæcunque humiditates attrahere possunt. Me-
dicamenta sterilitatem inducentia si vasa vteri ex-
cæcent, insanabilem plerumque morbum efficiunt.
Ea tamen medicamenta non statim omnes penitus
vires adimunt: quedam enim potiones locis dem-
ptilem cecitatem asserunt, cui si protinus occurras,
interdum mederi poteris. quemadmodum enim le-
thalia venena statim vomitu, aut clysteri, aut
congruo ad eos usus medicamento exsoluuntur;
temporis verò progressu nullo consilio emendari
queant: ita quæ valide sterilitatem inducunt, si il-
lico aggrediaris, licebit quandoque depellere; sin diu-
tius perseverauerint, insanabilia reddentur. Hæc
quoad istas causas. Ulcera autem vulvæ, & inflam-
mationes quemadmodum curare oporteat, & quo-
modo carnis excrescentias, thymos, & tuniculæ au-
ferre, singula in propriis locis seriatim declaravi-
mus. proin superuacuum est eadem sæpius repetere.
Si verò nulla re infesta, vel in vtero, vel in

reliquo

Sterilitas à
medicamen-
torum vio-
lencia indu-
cta, quomo-
do curetur.

De his quæ
non concipi-
unt ob
medicamen-
tum ad steri-
litem indu-
cendam
assumptum.

Curatio earum
in quibus
nihil in-
fensum ap-
paret.

reliquo corpore apparente, incompertum sit, cur mulier non concipiat, eam asinino lacte purgabimus, cibisq; boni succi alemus, ac fomentis suffumigantib; odoratis, & pessulis os vteri aperiemus, & sanguinem euacuabimus, Veneremq; per duos aut tres menses (inquit idem Aëtius) prohibebimus. Ita & de aliis omnibus causis statuendum. Si habitus sit gracilis, reficiatur: si sit obesus, extenuet; si sit vlcus, cicatrix, membrana os vteri obthurans, mensium suppressio, seu immodicus fluor & intempestiuus, curentur singula vt propriis locis dictum est. Nos multas vidimus mulieres quæ ob menses retentos non concipiebant: sed iis ex consilio nostro arte, vel natura, apertis, facile imprægnabantur. Ita quoque quædam usdem nimium fluentibus restrictis, tandem concēperunt.

OBSERVATIO LIX.

De dubia conceptione, vel imprægnatione.

MULIER annos 34. nata in pago Egmondano, Houzo dicto, prope Alcmariā, multis symptomatibus affecta decūbebat, anno 1557. Alij grauidam esse, alij verò non concepisse dicebant: aderant & qui molam in vtero habere suspicabantur. Cū ad eam 14. Aprilis accederet, quatuor iam vel quinque diebus suppressione vrinæ laborauerat, cui & ventris tumor ac pedum aderat, & facies inflata: quæ licet in prægnante aliquando adesse solent, sunt tamen etiam in mola vteri, quam iecore refrigerato hydrops subsequi solet. & ipsa quoque
ad

ad hydropem tendere videbatur. Constanter tamen modò se gravidam esse dicebat; postea rursus dubitans, idem negabat. Afficiebatur intensissimo dolore circa imum ventrem, vrina in totum suppressa, vt per quinque dies neque dormire, neque quicquam edulij sumere potuerit; licet minimè febricitaret. Sed & hoc malum accesserat ab obstetrice imperita, quæ medicamenta per os nescio quæ exhibuerat, vnde & vomitus enormis processerat. Quartus erat mensis quòd se rursus gravidam esse diceret. Sed pectini apposita parietaria decocta cum vino Rhenano, pauco adiecto oleo scorpionis, & assumpto decocto parietariæ, maluæ cum radicibus, adiectis granis aliquot alkekengi, & cumino, cum liquit. minxit, & dolor sedatus est. & quanquam Oribasius ex Galeno dicat, cuminum menses prouocare, hîc tamen prius maceratum in aceto gravidæ mulieri obesæ & pituitosæ nihil obfuit. Postea tamen iterum rediit dolor 21. April. ac me rursus vocauit. præscripsi clysterem in hunc modum: & maluæ m. ij. meliloti m. j. cumini, sem. lini, fœnug. añ. ʒ. β. carui, ammeos, añ. ʒ. ij. β. fiat decoctio in lero lactis (nam feces erant valde induratae) pro lib. j. adde olei oliuar. ʒ. j. β. sacch. rub. ʒ. ij. duo vitella ouor. salis communis ʒ. j. β. tepidè iniectum fuit; & multis ventositatibus reiectis, liberiùs mingere potuit, dolore etiam iterum sedato. At postea curationem reliquit, cùm paupercula esset. Verùm post aliquot dies iterum iisdem doloribus affecta, cùm illam in-
uisere

misere non possem, Alcmariam venit, vt integrè curari posset. Fœtum tunc nullo modo sentiebat, putabatque esse mortuum, vel molam esse, ventre tum cruribus magis intumescens. Sed inuestigatis signis fœtus mortui, cùm ventrem duriorẽ sumenq. calidum more solito haberet, vt tactu percipiebam, neque anhelitus eidem fœteret, nullo modo fœtum mortuum esse referebam; neque molam vteri adesse, cùm antea perfectè motum fœtus sensisset. Verùm vt hæc certò mihi constarent, obstetricem peritam vocari iussi; cui mandabam, vt digito molliter os vteri cõtingeret: quod cùm molle diceret, mulierem concepisse, vt latius in Scholio dicturi sumus de signis conceptionis, dixi. Obstetrix addebat fœtũ ad ostium vteri subsidere: quod neque credebam: faciliẽ enim abortus subsequutus fuisset. Atque adedò mirum erat aut fœtus non mortuum esse, aut abortum non subsequutum; quum prior obstetrix medicamentum vomitorium mulierculæ propinasset, atque illi imperasset, vt anhelitum eo tempore comprimeret, vnumque pedem supra alium poneret. Abhorrendũ profectò consilium. Sed ego priore experimento contentus eram: cùm os vteri occlusum esset, & molle. Alius tamen Medicus accersitus dicebat illam minimè grauidam esse; & proposuit, medicamenta esse propinanda quæ euocarent menses, & abortum facerent, cùm molam vteri esse contendere. At ego rationibus firmis persistebam, illam grauidam esse, cùm & mamillæ

mane-

manerent dura. Quare usus sum lenioribus remediis, ad cachexiam valētib; ut rad. & sem. fœniculi cum parietaria, cerefolio & alkekengi, cūm difficulter meieret, in vino Rhenano decoctis: quibus tandem facies tum crura detumuerunt, & urinam liberè reddere potuit, licet ob imbecillitatem fœtum non ita sentiret. Tandem ita procedendo usque ad mensem Maium, paulatim omnia accidentia dicta cessarunt, & fœtum viuum naturaliter se sentire dixit; & dolor in totum ablatum est, & crura pristinae sanitati paulatim restituta, ut nunc rectè inambulare potuerit, quod antea facere minimè poterat: atque ita, etsi grauida existens, omnibus admirantibus, perfectè curata fuit, & nono mense completo feliciter peperit.

SCHOLIA.

CAPVT allij integrum depurgatum ac derasum ad uterum quidem apponunt, & postridie vident an per os oleat; & si oluerit, concipiet; sin minus, non. Si verò velis cognoscere an mulier concipiet, vel non, butyrum & lac mulieris masculi alentis bibendum dato, & si eructauerit, concipiet; sin minus, non. Item anisum in aqua tenuissimè tritum bibat, ac dormiat, & si quidem pruritus ipsam circa vmbilicū corripuerit, concipiet; sin minus, non; ut liquet ex Hip. in lib. De sterilibus. At si velis dignoscere num pragnas sit mulier, mel & anisum tenuissimè terito, deinde in aqua diluito, ac exhibeto, & dormire finito; & si quidē tormen ipsi fiat circa vmbilicū, pragnans est; sin minus

Num mulier cōcipiet.

Signum num mulier pragnans sit.

Nota con-
ceptionis ex
Aëtio lib.
16. cap. 26.
sub finem.

minus, non est, vt liquet ex eodem, citato loco. Item cum dormitura est, aquam mulsam potandam da, & si alui tormina patitur, concepit; sin minus, non concepit, vt liquet aphor. 41. lib. 5. At conceptionis nota erunt, iuxta Aëtium, si os vteri claudatur, & desiccetur, atque à pudendo recedat. Imò peritiores femina post seminis ingressum, vterum moueri percipient. mouetur enim genituram circumplexurus. Quibusdam ilia exultant, alijs cordis dolor & exolutio cum quadam voluptate superuenit. Nec paruum, prater reliqua, indicium est, si mulier quopiam vrina stillicidio vexabitur: quod præcipue patiuntur, quæ tunc primò concipiunt, & quæ menstruas purgationes integrè non exegerant: quamuis idem ceteris quoque vsque ad VII. diem quadantenus accidat. post septimum verò obscura quedam picæ signa oboriuntur, acidorum salforumq; desideria, vertigines, pallor, somni longissimi. constat & eodem tempore menses sine molestia detineri. Ita ex Moschione: Quoties in fine coitus horror quidam mulieri accidit, ipsumq; orificium vuluæ concludi & conduci sentitur, nihilq; reliquum seminis sinum mulieris humectat, & valde modicum remanet. Secundum Priscianum, si collum calidum & dorsum frigidum habuerit, concepit; si verò æquale est corpus, non differunt tamen inter se, conceptio, generatio, & imprægnatio: Nam conceptio est attracti à locellis seminis commistio, in sanguinis menstrui puriori parte, in quam locellorum calor natiuus ita agit, quòd viuificato, demum fœtus generatio sequitur. Moschio autem interrogatus, Quid est conceptus? inquit, Ingenti corporis labore & tormento perfer-

Conceptio.

Generatio.

perfertur: successione, autem plusquam necessarius;
 unde & retentio perseverat: animal verò aliud, cum
 naturali ratione & necessitate efficitur. Embryonis
 verò, vel, ut alij, fœtus generatio, est virilis seminis
 cum menstruo sanguine tam diuturna actio, quoad
 materia illa formam recipiat humanam. Impragna-
 tio tantummodo ex parte mulieris se tenet; quæ est
 aliud nihil quàm conceptio, & embryonis generatio.
 Simul ac genituram intra se uterus traxerit, uniuersum
 alueum, se supra duo semina colligens, ac vndiq.
 ea comprehendens, ita contrahit, ut nulla penitus,
 siue multum, siue parum seminis iaculatum fuerit,
 vacuitas relinquatur: atque aded os sigillat obsepitq;
 uti etiamnum deductissimi corporis acies neutiquam
 ingredi queat: quod Hippoc. (quem ceu alteram re-
 bus humanis lucem Deus dedisse videtur) ita prodi-
 dit. Sed primis diebus lactis similitudinem semen
 utero detentum refert; novem diebus sequentibus in
 sanguinem vertitur; duodecim aliis diebus caro effi-
 citur; decem tandem & octo diebus reliquis mem-
 bra omnia formantur.

Embryonis
 vel fœtus
 generatio.

Impragna-
 tio.

Hippoc. lib.
 1. apho. 1.

Sex in lacte dies; tres sunt in sanguine terni;
 Bis seni carnem; ter seni membra figurant.

Vel, Iniectum semen sex primis certè diebus
 Est quasi lac, reliquisq. novem sit sanguis; at inde
 Consolidat duodena dies, bis nonaque demum
 Effigiat, tempusque sequens producit ad ortum.

Aegidij ver-
 sus, qui
 etiam reci-
 tantur à
 Guainerio.

At Erotis: Primo mense fit purgatio sanguinis; se-
 cundo fit expressio sanguinis & corporis; tertio un-
 gulas & capillos producit; quarto motum, & ideo
 nauseant mulieres; quinto accipit fœtus similitudi-
 nem patris vel matris; sexto nervorum constrictio-

A a nem;

Quo tem-
pore infans
mouetur.

De die natali
cap. 12. ex
Tythagora.

nem, septimo ossa & nervos confirmat; octavo mo-
uet natura, & infans rerum beneficio repletur; nono
à tenebris procedis in lucem. De his plura vide apud
Ludouicum Bonaciolum, Muliebrium lib. 2. cap. 3.
Anima autem creatio à Deo est: sed quo tempore
corpori infundatur, furor est ac stultitia id inquirere,
tum quomodo in corpus descendant anima, & qua
parte cœli descendant; ac denique in iis quæ cum in-
diuisibilibus atque materia prorsus immunia sint, nullo
situs clauduntur, situm inquirere, vesanum est. Sat
nobis est cum Augustino, animam à Deo unico pro-
creari & infundi. Triginta igitur dierum spatio ef-
formatus est. iis sexaginta adiectis, nonaginta (tres
constituentes menses) soles consurgent: hoc ipso mo-
uebitur tempore: & sic variis pro efformationis va-
rietate, temporum impendiis corpus fiet. Sic Hippoc.
lib. De pueri natura, Puerulum dierum triginta tra-
ctu, femellam quadraginta & duobus consingi, pro-
nunciauit. Hæc quidem quartum sui motus men-
sem, illi verò tertium præsignauit. Et sic quidem ma-
res circa quadragesimum solem, feminas circa nona-
gesimum moueri, complures diligentissime explora-
tum habuere. De his varias vide opiniones aucto-
rum; & cur septimo mense nati viuant; & qui octa-
uo, moriantur. Astrologi octauum mensem ascribunt
Saturno. Tamen octauo mense natus aliquando
vixit, auctore Aristotele. lib. histor. animalium 2. De
partu septimestri & octimestri, vide Hippocratem.
Quia autem nono mense partus naturalis est, ideo
aliqui duos partus generaliter dixerunt, ut Censo-
rinus; alterum minorem, quem vocant septimestrem:
alterum maiorem decimestrem, qui edatur die 274.

Mensis

Mensis tamen, vt Ophusius, praeceptor meus Mathe-
 naticus, auctoritate Cardani, & aliorum Astrono-
 norum, referebat, ad Lunam refertur. Primus &
 tribuitur Saturno, secundus Ioui, tertius Marti, quar-
 tus Soli, quintus Veneri, sextus Mercurio, septimus
 Lunae, & tunc perfectus est fatus & viuere potest,
 octauus Saturno, & moritur si producat; quan-
 quam, iuxta Aristotelem, aliquando viuat: nono
 mensi Iupiter praest, vitae amicus, quamobrem par-
 tus ille laudatissimus censetur. Mars decimo mensi
 dominatur, vna qualitate amicus vitae: natus igitur
 in hoc mense puer interdum viuere. Sol rursus vnde-
 cimo praest, & vitam nato influit; sicq; in ipso na-
 tus viuere potest. Si ad duodecimum mensem pueri
 natiuitas protendatur, quamuis nunquam id vide-
 rim, iuxta illas rationes, quia Venus dominatur, ali-
 quando viuere posset: sed rara auis. Appellamus au-
 tem mensem lunarem, reditum Lunae ad eundem lo-
 cum; numerando, vt habetur apud Cardanum Segm.
 1. aph. 47. dies per reditus Lunae ad circulum hori-
 zontis, diebus viginti sex, horis nouem, minutis 30.
 & secundis 15. Vel crassiori calculo capimus men-
 sem pro diebus viginti octo; vt quatuor septimanae
 mensem constituent. Nam vt secundum ipsum, Lu-
 na primo mense materiam conceptionis preparat, &
 membra adaptantur, vt deinde secundo mense à
 Mercurio formam accipiant, & tertio mense à Ve-
 nere sexum virilem; tum semineum foetus acquirat;
 quarto mense à Sole vitam, quinto à Marte robur:
 (nam is firmat creatura, potissimum nervos, suo robo-
 re) deinde sexto mense Iupiter gubernans sortum
 disponit, omnia confortando; deinde ad Saturnum

Ratio Me-
dicorum,
cur septimo
mense fœ-
tus expulsus
viuat, &
octauo mo-
riatur.

Signa im-
prægnatio-
nis cur dili-
genter no-
tanda:

septimum mensem referebat: qui tamen computa-
tione incidebat in sextum mensem Medicorum. Sed
eorum opinione qui octauum mensem attribuunt Sa-
turno, vt dictum est prius, isto mense vel mortuus
producitur infans, vel non diu vitalis: Septimo verò
viuit, iuxta astrologorum rationem. Medici, vt &
Auienna, aliam rationem adferunt: Fœtus aiunt
septimo perfectè completus, auræ seu nutrimenti de-
fectu petit exitum; quòd si tunc in radice sortis fue-
rit, nascitur, & viuit. si autem virtutis impotentia,
aut cotyledonum resistentia, nasci non possit, maxi-
mè debilitatur: quare si in octauo tunc nasci contin-
git, eidem aduenit quod qui laborem secundo aggre-
ditur, à primo nondum releuatus: etiam in tantum
in secundo illo motu debilitatur, vt natus viuere non
possit. Sed eadem ratione nec in decimo mense aut
vndecimo natum posse viuere argui queat. At Astro-
logi moras fœtus in vtero distinctas inuenerunt; maio-
rem scilicet, mediam, & minorem. Maior siquidem
existit 288. dierum, qui menses nonem & dies 18.
constituunt. Media dierum 273. existit, quibus per-
ficiuntur menses nonem & dies 3. Minor dierum est
258. menses octo & dies 15. perficientium. Sed hæc
ad Astrologos pertinent. Istis ergo omisso, diligenter
oportet distinguere notas conceptionis & impræгна-
tionis, ne error contingat: cùm aliqua mulieres vir-
gines se fingant, licet grauidæ sint, vt Medicos de-
cipiant: quod aliquando euenit Medico licet peritissi-
mo, qui puellam grauidam hydrope fingentem se la-
borare curabat, etiam adhibitis multis medicamen-
tis. Ad hanc ego noctu euocatus, animaduerti quòd
conceperat. Cùm autem famula esset, neque domina
ipsum

ipsius aut astantes gravidam tam esse suspicarentur, ipsa acriter id negabat. Ego nihilominus perstabam, & obstetricem accersendam dixi. qua praesente, feliciter peperit, dolo iam omnibus aperto. Tam scelestæ est hæc puellarum quarundam impostura, ut etiam Medicos, maximè nihil tale suspicantes fallat. Præter autem signa conceptionis iam dicta, statim hic post conceptionem vteri os retrahitur & occluditur, ut diximus, etiam Veneris actus prægnanti languescit, & menstrua purgatio præter consuetudinem subsistit. Nec tamen hoc postremum statim tempore procedit: si enim vteri acetabula secundarum adhaesu obturentur, & os ipsum interius coniuueat, nihil sanguinis ex vteri capacitæ elabatur. at quibus fortasse sanguis primis mensibus, aut etiam postremis, effluerit, ex iis venis quæ ad vteri cervicem pertinent, quemadmodum & virginibus, emanat citra ullam fœtus offensionem. Mense secundo, etiam si menstrui aliquid profluat, quia tamen provida solersq; natura sanguinis nonnihil reponit in mammas superioresq; sedes, pectoris venæ impleri, mammae verò turgere ac durescere incipiunt. Fœtu grandescente latera lumbiq; expanduntur, dilatanturq;, ac venter citra manifestam gravitatem intumescit. Quibusdam tum temporis in facie citrinæ vel lividæ maculae, ut in puella quam Medicus pro hydro-pica curabat. Iam & lentigines quoque efflorescunt, vel oculorum ambitus liuescit, aspectu languido, & alia symptomata vrgent; de quibus dictum est prius. quibus & illa addere posses quibus virgines probari diximus. Plura de his habes apud Bonaciolum lib. I. Maliebrum cap. I. Quo examine grævda cognosci-

Quomodo
prægnanti-
bus sangui-
effluere po-
test ex vteri
cervice.

tur. At signa ex vrina sola desumpta saepe fallunt, quamuis aliqui, vt & Fernelius, & Guainerius, & Auic. velint esse subsidientiam tenuem, dissectam carminato gossypio perquam similem. Verum illud, vt in lib. nostris De incerto vrinarū iudicio, contra Vro- uantes, patet, saepe Medicum fallere potest. Sed quibus modus fœtus & gestatio discernatur à mola, mox dicemus. At qui putant in parte vteri dextra semper mares constitui, in sinistra feminas; ex animalium resectionibus (inquit Benedictus Veronensis lib. 25. cap. vii.) facile redarguuntur: tum saepe numero euenit, vt eadem in parte vteri gemini, vias & femina generentur. Idq; satis inspeximus in viperis pedestribus. Quod igitur mares semper in dextra, & femina in sinistra parte concipiantur, mera somnia sunt. Nam cum etiam gemini gestarentur, mas & femina, marem in leua, feminam in dextra contineri conspectum est. Qui verò testem dextrum marem generare arbitrantur, facile, inquit Aristoteles, serpentum argumento conuincuntur, qui testibus carent; in quo genere & mares & femina conficiuntur: sed à partibus dextris vel sinistris qualis exeuntis seminis non sine aliqua ratione calidius, ex quo mares progenerantur. Alij, si à parte dextra auulsum semen est, & descendit in vuluam, aut locos, masculus gignitur: femina, cum id quod à sinistra: alijs propter propriam seminis commistionem, vel propter caliditatem, vel frigiditatem gigni. Calidius verò semen marem progignit, frigidius feminam.

Gemelli, & tergemini. Gemelli & tergemini secundum aliquos, generantur propter calidum semen in locum contractum, atq; ibidem decisum. Alij autem comprehensiones causantur.

fantur. Nos verò dicimus quòd si decisum sperma defluxerit in locos binos, tunc gemellos; si in trinos, tunc tergeminos nasci. Alij quædam experimenta addunt num femina masculum vel feminam gerat; vt ad longum videre poteris apud Guainerium: vide & ea quæ Priscianus & Erotis in Harmonia Gynaeciorum scripserunt. At Aëtius inquit: Hippocrates ceteriq; asseruerunt, marem futurum iudicari, si prægnantis color iucundior, facilioresq; motus fuerint, & dextra mamma amplior tumidiorq;, ac præcipuè pupilla, apparuerit. Contrà pallidus color, mammaq; sinistra & pupilla tumidior feminam indicat. Sed & in maris conceptu, dextræ partis vasa, venæ, inquam, & arteriæ, magis intumescunt, præsertim quæ sunt in lingua: sicut in conceptu feminae oppositum conspicamur. Certissimum verò ac minimè fallax masculi fetus indicium est, si prægnans dextræ manus pulsum validiorem, velociorem, maiorem, duriorioremq; habuerit: ac femina, si talis sinister fuerit. Nunc ad molam nostra vertatur oratio.

Num mas
vel femina
sit futurus.

OBSERVATIO LX.

De uteri mola.

RVSTICA mulier in Waterlandia, cùm Alcmariæ medicinā adhuc facerem, multo tempore carneam molam gestabat in utero, aliquot etiam annis, plus minus sex; ita vt tandem in hydropem conuersa fuerit; doloribus tandem superuenientibus: Iis illa tamen remediis quæ ad menses euocandos faciunt, tum hydropem,

à me curata fuit, carneamque molam excreuit. Ita etiam per me curata fuit, cum praxim in Gallia Pithueris exercere, & altera mulier, quæ prope Pithueros habitabat, quæ per triennium molam gestauerat. Neque illud admiratu dignum, cum & Dodonæus, amicus noster referat in suis Obser. cap. 49. viduam quandam in utero olim gestasse molam annis plus minus quindecim. Existimabat uterum prolapsum, quod in ostio uteri propendere aliquid sentiret; profluebant statis temporibus menses (quod tamen nostris agris non contingebat) & subinde copiosiores, quam par erat. Tandem quodam tempore, superuenientibus nonnullis partus dolotibus, rudem excreuit & informem carneam molem, pedem ferè longam, latam semipedem, tres quatuorve digitos altam.

S C H O L I A.

EA est nature providentia, ut calor opifex & formator eorum qua operantur, nunquam sit otiosus; sed quælibet materiam in opus aliquod miro artificio ducat, qualecunque tandem sit. Sic ex putredine Aristoteles vermes generari scribit. Sic ex materia quam pro arbitrio tractare non possit, quia aut capiosior, aut minore copia, aut ex diuersis generibus constans, minusque sequax est, monstrum generat; siquidem aliquid perfectius non licet. Ita materiam intractabilem si reperiam ex viriusque semine, in utero fatiunt, pulcherrimum ad utriusque exemplar æquum fabricantur, et tunc magis quam alteri similem,

similem, pro ratione materiae & viribus imaginatri-
cis facultatis, tanquam optimi moderatoris. Si verd
ipse imbecillior sit, materia autem subiecta quali-
tate, quantitate, consistentia, aut mixtione alicuius
extranei, vt sanguinis craffi, aut alterius succi vi-
tiosi, ineptior ad tantam perfectionem, aliquid ta-
men, ne nihil, generat, siue animatum, siue rude &
expers vitæ. Sic Hollerij interpres vidit mulierem,
quæ cum nouem mensium spatio vterum gestasset,
omnibus quæ in legitimo partu euenire solent, mirifi-
cè respondentibus, tandem nihil aliud præter ani-
malia quedam ranis haud absimilia, cum multis pur-
gationibus cruentis & corruptis, in lucem edidit. Re-
fert & de alia cui carnea moles informis cum fœtu,
veluti superfœtatione quadam, exiit. Et ego mu-
lierem rusticam noui, quæ cum grauida putaretur,
animalculum peperit instar limacis. Dominus Vale-
riola multas habet & admirandas in eiusmodi partu
observationes, curationemq; pulcherrimam de mola
cui partus quatuor mensium erat alligatus, cum ipsa
iam pro vero fœtu nouem mēfib; in vtero latitasset.
Ceterum mola, de qua nunc dicere cepimus, diuerso
modo sumitur: nam Molam vteri, quidam omnem
rem præter naturam, quæ pondere grauat, & mole
extendit vterum, nominant; vt Rhases; vt videan-
tur caput de falsa conceptione fecisse. Sed Auicenna
etiam extensionem flatuum sic nominari vult, dum-
modo cum suppressione malum sit. Paulus lib. 3. cap.
69. De mola, omnem duritiem comprehendit, vt &
scirrhus: sic enim scribit: Mola quoque induratus
est tumor, interim in vuluæ ostiolo, interim in tota
quoque prominet, vnde in tophaceam quoque duri-

Historia
mulieris pa-
tientis ani-
malia ranis
similia.

Mola vteri
diuerso mo-
do sumitur.

A a s tier

Mola vnde
dicta.

Barbaram
sectantes
medicinam,
multiplices
molas fa-
ciunt.

tiem occalescit, tum ea quæ superiacent contrahuntur. Nam & inter propria quoque vteri vitia connumeratur id quod à Grecis Μόλη, à Latinis Mola nuncupatur, nomen sumens à motus, tum difficultate, tum grauitate, vt Aëtius refert cap. 80. lib. 16. Nam veluti mola ipsa grauis atque difficulter mouetur; ita & affectus hic mola appellatur ad eius similitudinem, & grauat & difficulter mouetur, licet non nisi per accidens, vt dicemus; quemadmodum & ipsa mola. Hanc molam induratum esse vteri tumorem, qui modò in vuluæ ostiolo, interim in tota ipsa prominet, Aëtius citato loco, & Paulus cap. 69. libri 3. fatentur; etsi idem Paulus in fine citati capituli aliorum quorundam autoritate asserat, molam carnem esse informem, ipsis vuluæ tunicis adhaeresceniem, ac factus modo in lucem edi. Barbaram sectantes medicinam cum etiam triplicem molam faciunt, nonnulli & quadruplicem, carneam, humoralem, ventosam, & aquosam. De mola ex flatu extat apud Valescium exemplum lib. 6. cap. 15. Ego, inquit, tempore pueritiæ meæ dum addiscerem artes liberales Vlissoponæ, vidi quòd quædam Iudæa credidit se prægnantem, cui fuerunt preparata omnia quæ sunt necessaria, & dum obstetrices matricem tractarent, tanta ventositas sine vllò alio liquore exiuit à matrice, quòd fuit mirum: & hoc per totam ciuitatem Vlissoponæ, & per totum studium fuit diuulgatum. Id quoque à Dodoneo scribitur obseruatum cap. 49. & eiusmodi inflationem efficaci remedio ab ipso curatam, prodeuntibus per pudendum, veluti per anum excerni solent, ventis. Aqua collectionem ipse etiam in vidua quadam vidit; quæ, defuncto marito, cum se graui-

gravidam relictam aestimaret, nouem mensibus ad-
 impletis, superuenientibus partus doloribus, non nisi
 aquosos humores enixa est, à quibus liberata, lacte
 vbera repleta habuit, haud aliter, quam si foetum
 peperisset. At eodem quoque autore in Scholio, hæ
 quidem mola ventosa & aquosa cognominata, à
 Græcis & veteribus Medicis pro molis non agnoscun-
 tur. Flatuum in vtero collectionem *ἐμπνεύματος*
καὶ φέτας, Inflationem vteri, & posteriores Inflatio-
 nem matricis nominant; de qua dictum est antea; &
 curatur vt vteri inflatio. De aquosi humoris in vtero
 collectione meminit Hippoc. in lib. De natura mulie-
 bri; tum & Aëtius, qui vteri hydropem appellat; de
 qua prius quoque diximus. Hippocrates aquæ in vte-
 ris collectionem gravidis superuenire affirmare vide-
 tur: Aëtius tunc humoris copiam in vterum confluere,
 quando menses suppressi sint, & imprægnatio impe-
 dita. Vtrumque nobis, inquit Dodonaus, obseruare
 contigit: memini enim nonnullis vnà cum foetu copio-
 sum aquosum humorem ex vtero processisse, foetu de-
 bili ac non vitali. Id etiam nos aliquando vidimus.
 Sed vidua altera de qua scripsit, quæ existimabat
 gravidā se relictam, solum aquosum in vtero gestauit
 humorem. Sed & Neoterici quidam barbaram fa-
 cientes medicinam, ipsi Mola quoque varia nomina
 & diuersa imposuere. Nam à Gordonio cum sit fru-
 stum carnis informis & sine figura, vocatur Pecus;
 alij verò vocant Fratrem Lombardorum; quem, in-
 quit Gilbertus, mulieres Salernitanæ tempore viuifi-
 cationis nituntur occidere potu succi apij & porro-
 rum. Sed apium foetui epilepsiam generat. Alij, eodem
 Gordonio teste, vocant Harpyiam. Intelligendum
 enim,

Diuerfa
 Mola no-
 mina.

enim, inquit, quod vermes, reptilia, harpyia, & Frater Lombardorum possunt generari in vtero. Sed vermes raro: quia in intestinis generantur ex superfluitate multum impura; rarissime autem in matrice: sed aliquid enorme, ut mola seu harpyia, ex semine mulieris corrupto, & ex carentia spermatis viri, & ex calore innaturali. Sed frequentius in mulieribus Lombardia (hinc forte quoque nomen Fratris Lombardorum assumpsit) aut quia magis laborant, vel magis his subiecte sunt, propter corruptionem nutrimenti, sicut in Apulia. Vnde communiter dicitur, Italas mulieres pessime viuere ex fructibus & herbis, at bene se induere. Azaranius Molam ad similitudinem lapidis molaris dictam putat, ex pondere & grauitate contingente in ventre mulieris, tamquam ibi lapis molaris esset; etiam ex motu huius materie per ventrem, dum mulier se reuoluat; vel quod ventrem comprimat ad similitudinem lapidis se mouentis. & Valescus dicebat ex pondere aggrauante dictam esse. Verum cum alij triplicem molam faciant; melius tamen est seorsum curationes variorum affectionum ponere, neque confundere; & molam eam solam & proprie appellare, quam dixerunt talem veteres, Aristoteles & Galenus, sic definiens: Mola est caro inutilis & informis in vtero genita; quae & aliquando breui emittitur, aliquando vero diu durat per annos. Et ideo, quidquid praecitati auctores afferant, nos cum Iacchino & Donato Galenum sectantes, dicimus cum eo, molam esse carnem informem, quae in mulieribus vtero gestatur; ut 14. Method. med. ab eo scriptum est. Vel, molam esse carnem quandam inuilem atque informem; eiusdem Gal. senten-

Mola est
caro infor-
mis atque
inutilis in
vtero ge-
nita.

Mola quid
sit, ex Ga-
leno.

sententia 14. De usu part. Quapropter non omnem induratum uteri tumorem molam esse fatemur, ut Paulus & Aëtius sentire videntur; sed inutilem illum conceptum carnosum atq. informem, qui etiam vtero gestatur. Inutilis namque est, cum sit à natura aliena caro illa, nec utilis mulieri; cum & ipsi grauet, ac laborem inferat, impediatq. mensium purgationes. Nec etiam utilis pro generis propagatione, veluti naturalis conceptus est. Est item informis caro hæc, cum artificiosa forma & humana careat, licet quandam figuram contineat: quinimo diuersasfigurationes suscipit, pro diuersitate materiae, ex qua generatur, similiter & agentis, à quo figurationem recipit. Quod verò sub conceptu mola contineatur, licet idem imperfectus, atque inconcoctus sit, confirmatur ab Aristot. 4. De generat. animal. cap. 7. dum dixit: Cum igitur ex humore concoctu difficili conceptus consistit, tunc gignitur quod mola dicitur: afficitur enim conceptus eo modo, quo ea, quæ inquinari dicimus cum elixantur. Portatur etiam seu gestatur vtero conceptus hic qui mola appellatur, & non est uteri tumor induratus in eius substantia ortus, quoniam interdum factus modo in lucem editur. Pariunt enim quandoque mulieres carnem hanc, quam Molam vocamus, ut testatur idem Aristot. eodem loco & Aëtius aliud, quorundam auctoritate, confirmavit citato loco, cum dixit: Quidam verò tradunt in quibusdam mulieribus carunculas ad inglandis magnitudinem per pudendum excretas esse, aliquando singulis mēsis, aliquando bimestres aut trimestres. Præterea Gal. eodem 14. De usu part scriptum reliquit, mola conceptum euo proportionem respondere, quamuis

quamuis non perfectio, sed subuentaneo: at oua animalium partes non sunt, nec eorundem tumores præter naturam, sed proportionem respondent iis quæ adnascuntur, vt liquet ex eodem Galeno 11. De simpl. med. facul. Quare & mola in numero eorum, quæ adnascuntur existit, non tamen familiarium; & vtero gestatur, at non ipsius induratus tumor est. Hinc quoque patet eorum error, (vt paulo antè diximus) qui volunt molam esse in multiplici differentia. Nam præter hanc quæ carnosæ existit, quampiam etiam stultitiam esse fatentur: quoniam nisi caro sit inutilis, atque informis, quæ in mulieribus vtero gestatur, haudquaquam mola appellari debet; vt paulo antè recensuimus ex Arist. & Galen. Quod verò vterus afficiatur in hoc vitio ex mensium suppressione, præter naturam tumore, ac ipsiusmet vteri dolore percipitur. Affectus verò morbus est in compositione, speciatim in numero, ac inter eos, qui toto genere præter naturam existunt; velut est lapis in vesica, iuxta Galeni sententiam eodem 14. Meth. med. Quamquam Aristot. velit, quod nec perfectam, nec alienam omnino habeat naturam mola ipsa. Atqui Gal. propterea toto genere præter naturam eam esse fatetur, veluti in vesica calculus, hypochyma, & myrmecia, quoniam omnia talia tanquam molesta, & inutilia, in totum submouere properamus; & non quod in eius generatione seu substantia nihil sit eorum, quæ secundum naturam sunt, quæ de re ab Aristotele non discrepat. Sed hæc exemplis subsequenti- bus multo clariora patebunt.

Error quorundam de Mola.

Quod vterus afficiatur.

Quis affectus præter naturam sit mola.

OBSER-

OBSERVATIO LXI.

De mola reiecta quasi oculos multos habente; & de aliis diuersa forma.

A N N A Iuonis, vxor Bartholomæi Simonis Mercatoris dicti, mulier si quæ altera valde obesa, attamen fecunda, quæ Alcmariæ habitabat, in platea vulgo *houil* dicta, cum aliquot mensibus sese putasset grauidam, postea cepit dubitare: cuius causa me vocauit. Ex signis dictis animaduerti illam mola laborare; ex tumore videlicet duro circa vteri partes de- tractione, seu contractione partium superiacen- tium; deinde, cum illa ex natura crassa & obesa esset, quod corpus gracile euadebat, deinde ap- petitus prostratus esset, mensesque non solum suppressi, sed & colore vitioso afficeretur; & quamuis mammae intumescerent, manus tamen pedesque molliores gracilescebant, incessus gra- uior erat; ac oculi labiaque tumebant, & facies pallefcebat, stomachusque subuertebatur, lum- bi grauabantur, venterque attollebatur; adeo ut primum conceptus veri de se signa præbe- ret; quod etiam peritissimis imponere potuif- set: verum temporis progressu apertius dis- cernebatur; cum & dolor punctorius adesset, nec motum vllum sentiret: nam molam dolor punctionis sensum inferens subsequitur, nec in ea motus vllus, velut in vteri conceptu percipitur, nisi

nisi quod per compressionem dextrâ & sinistrâ mouetur, cùm manibus mola comprimitur, & ex accidenti quoque cùm mulier de vno latere in alterum vertitur. Cùm hæc adessent, & postea, toto corpore imminuto, venter ampliaretur, existimauit se hydrope laborare. Præfert quidem per se postea hydropis imaginem: tamen ab illa discernitur per tumoris duritiem, & quòd tumor hic ad digitorum compressionem, ac pulsationem non cedit, neque tympani sonum veluti in hydrope edit; & quòd neque ad manus contactum vlla fluctuatio percipitur, quanquam temporis progressu (vt sæpe vidimus) quandoq. hepate perfrigerato hydrops ei superueniat, vt liquet ex Paulo & Aërio. Quòd igitur hinc neque tympanitis modo venter sonabat, neque ascitis modo ad manus contactum fluctuabat, molam esse percepi ex signis iam dictis. Primò autem nostris monitis non auscultans, multa ac varia remedia apud illam tum diuersa tentata fuere, tam per obstetricem quàm per alias mulieres. Verùm cùm non proficeret, denuo me vocauit. Cui vt minus tædio medicamentorum afficeretur, vt nostra tum remedia tum præcepta diu diligenterque obseruaret, neque à curatione desisteret, valis fuit hæc historia Gradi de Medico qui breui tempore molam se curaturum promittebat. Noui, inquit, ego Medicum præstantis famæ, qui mulieri patienti molam à multis mensibus, promittebat, intra duas vel tres horas curationem. Verùm ipsa animaduertens quòd emitteret frustum

flum carneum magnum durum, idque per
duas horas quibusdam medicamentis adhibi-
tis; prudentior ipsa admodum appositè & fac-
tè suo Medico respondit: Bone domine mi, si
ista materia crassa per tot menses generata est
in ventre, seu vtero, & continuò etiam augmen-
tata in tanto tēpore, quia iam transit annus &
amplius quòd hac mola laborauerim, quomo-
do tam exiguo tempore poterit educi, nisi cum
maxima violentia? Ego, inquiens, non volo li-
berari tam subitò & repente cum medicamen-
tis ita violentis: nam timerem quòd citius me
interficerent, quàm curarent. Et ita cùm prius
hunc Medicum virum doctum & peritum esse
existimabat, eundem nunc minimè doctrina
præditum iudicabat. Verùm hæc nostra agra
tandem totum negotium mihi commisit; donec
ab illa molestia, & graui malo liberari posset.
Ideo cùm aluum lenem non haberet, omnium
primò exhibui lenitiuum medicamentum ad
vnciam vnā. & quamuis hîc sanguinem mî-
tere iubent, si adsit plethora, & mulieres ferre
possunt, vt adimatur alimentum; tamen hîc
non conueniebat in pituitosa & crassa muliere,
frigidis & crassis humoribus abundante. liq̃ ita-
que prius præparatis & purgatis, eodem modo
quo faciendum docuimus ad menses suppres-
sos; medicamentis deinde tam intus quàm ex-
tra, quæ laxandi ac molliendi & mitigandi vim
haberent, vsi sumus; etiam subinde aluo irrita-
ta, si illa durior esset, per glandes acutiores.
Inprimis ventrem inum oleis dictis sæpe fo-

B b

ueri

ueri iussimus, anethino, chamæmelino, & li-
liaceo, tum ob dolorem quàm emollitionem.
Hoc quoq. decoctum saepe ebibit: & rad. brusci,
asparagi, añ. ʒ j. malua cum rad. parietariae, viol.
(ad emollitionem) sabinae viridis, stœchados
Arab. florum chamæmeli Romani, cassura, for-
niculi virid. saxifrae. cum rad. pulegij, artemi-
sia, añ. m. ʒ. glycyrr. ras. ʒ vi. ruta, anethi, añ.
p j. sem. anisi, carui, foeniculi, añ. ʒ ij. coquan-
tur in aqua & vino Rhenensi pro lib. j. ʒ. stent
per noctem supra herbas, colaturæ addendo
syr. de stœchade, de artemis. de calaminth. añ. ʒ
ʒ. mellis ros. colati ʒ ij. ʒ. arom. cum ʒ iij. cinna-
momi electi; fiat apozema ad modum clareti.
bis eo utebatur. Ruta & anethum hîc maximè
commendantur. Sic Philosophus (teste Aëtio
lib. 16. cap. 82. De mola) Desentis, inquit, vxo-
ris amici menstruis, primò eam concepis-
se arbitrabar, postea exaucto magis tumore, hydro-
pem suspicari cepi, quòd totum corpus ac pe-
des tumefieri cernerem: at tandem ubi id esse
morbi genus deprehendi, quod alij Plinthum,
alij Molam appellant, rutam & anethum in
vino antiquo rusto odorato decoxi, atque inde
herbis abiectis vinum calidum propinaui, pro-
pe aquæ loco huiusmodi offerens, statimque
mulier, excreta cruentis copia, salutem adepta
est. Sed ut reuertar ad nostram agrotam, postea
dabam has pilulas subsequentes: & trochis. de
myrrha ʒ j. euphorbij gr. j. cum syr. de artemi-
sia fiant pilulae ix. dentur iij. omni vespera. Po-
stea decocto superscripto addebam folior. senæ

℥ j. & ℥ ij. agarici optimi, & zinz. ʒ j. Deinde iterum pilulas dedi, ventri cataplasmate sequenti imposito & pectini ipso: & rad. althææ mund. ℥ iij. folior. maluæ, althææ, & rad. maluæ, añ. m. j. coquantur in aqua communi, ad mollitudinem pistentur, adde mucilag. fœnugr. seminis lini, añ. ℥ β. pul. sem. anisi, fœniculi, añ. ʒ j. farinæ seminis lini, fœnugræci, añ. m. j. butyri recentis, olei liliorum, añ. ℥ j. olei chamæmelini ℥ β. fiat cataplasma. Alij addunt aquam mullam & paucum vinum odoratum, & inde cataplasmata conficiunt. Pessis quoque utebamur ex œsypo, butyro, adipe anserino, medulla, cum oleo sampsuchino, & intus oleo liliaceo oblinebat. Aëtius & ex iisdem pessos subiecit, vel ex medulla aut cerebro ceruino, mello, carycis pinguibus, passulis, cum oleo antiquo ligustrino, irino, sampsuchino, susino. Verùm cum nostra mulier etiam interiora vuluæ digito inunxisset sequenti linimento: & olei lilior. ʒ j. moschi optimi gr. vii. croci orientalis ʒ β. tandem, his remediis reiteratis, molam carneam reiecit quasi multis oculis refertam, rotundam, multo ampliorem palma manus, imò ad duas ferè excedentem. Noui & aliam mulierem, quæ nullo modo nec medicamentis poterat curari, & valde de vita periclitabatur, cui consultum fuit à vetula, ut fumigium ex anetho & cumino super prunas iniectis sub vestibus fieret, vel sub tella perforata: illudque recipiens, molam carneam cruentam & satis magnam excreuit, & conualuit. Ita & alia, cui em-
 B b 2 plastrum

388 DE MULIERVM MORBIS,
plastrum ex fimo bouillo pectini appositum
fuit. Venit & mihi eo tempore quo præceden-
tem mulierem præ manibus haberem, in men-
tem historia Antonij Betti, Medici Bononien-
sis præclari, quam ex Cronenburchio Medico
Colonienfi, qui ante nos Bononiæ eundem
Bertum subinde in praxi sequutus fuerat, ac-
cepimus. Anno videlicet 1538. mense Februa-
rio, vnâ cum Betto Medico, vidit mulierem
quæ mense tertio abortiit, & vnâ cum foetu hu-
mano perfectè & rite figurato molam carneam
ad magnitudinem ferè gallinæ, eiecit: in qua
caput erat configuratum cum rostro in simili-
tudinem aquilæ, sed aduncum non erat; rictus
cartilagineus vtrimque diduci poterat, ocu-
lorum loca expressa erant informia, à latere
membranz carnosæ, cuiusmodi in effigie scul-
ptæ quoque erant. Cronenburchius cum con-
discipulis causam inquirentes, quæ huiusmodi
figuram, seu formam materiæ impressisset,
offenderunt in cubiculo, vbi decumbebat puer-
pera, ad focum in cantino sculptas monstrosas
imagines, inter quas duæ sibi ex aduerso scul-
ptæ, exquisitè, perfectèque capita ad humeros
vsque isti monstro à puerpera edito similia præ-
ferebant. Iudicauit cum illis præceptor, vehe-
mentem earum imaginum in phantasia im-
pressionem, causam fuisse, vt in semen virile
copiosa materia menstrua monstrosam for-
mam induxerit; aut virtute formatiua seminis
virilis debili existente. Hoc ipsum confirmat
Galenus libro De theriaca ad Pisonem pag. 77.
histo-

historiam narrans de deformi quodam puellam
 pulchram procreare cupiente, qui depinxit in
 ato ligno elegantem puellam, dicebatque mu-
 ieri, vt inter coeundum in illam inspiceret.
 Betrus huic mulieri ad secundinam propocan-
 dam dedit hanc compositionem: ꝛ pul. cassiæ
 lignæ, cort. interioris cassiæ fistulæ, rubiæ tin-
 ctor. croci, sem. porri, trochil. myrrhæ, añ. ʒ
 ꝑ. misce: dosis erat ʒj. in iure gallinaceo aut
 carniū; & contulit. Eiecit autem postridie
 molam dictam quum hunc puluerem ad se-
 cundinam depellendam sumplisset. Tandem
 compositionem in pilulas formauit, ad elicien-
 dos menses, atque in 12. pilulis formato pul-
 uere, dedit & manè tres ante potum cum de-
 cocto cicerum & capill. ven. Vidimus Cydone,
 inquit Benedictus Veronensis lib. 25. cap. 34.
 De mola ex Aristotele, mulierem quæ octauum
 antè partum gestauerat, & cū insequenti se
 etiam concepisse putasset, & iam decimum
 mensem attingeret, vna nocte ei sanguis con-
 gij mensura rubicundus effluit. Vidimus mu-
 lierem, quando eo trepido profluuiū omnes
 territi fuerant: eius labra animaduertimus ru-
 mentia, ac oculorum genas, facie de cetero
 pallecente; brachia præter consuetudinem ma-
 cilentia videbātur: ventrem deinde detumuisse,
 & in eo pondus molestum sentire se aiebat:
 proinde in vtero molam esse omnino adiudi-
 cauimus. Obstetrix clausam esse naturam nun-
 ciauit: coniectis inuicem tribus pessis ex gal-
 bano, bdellio, ac opopanace compositis, iam

naturalia ora patefacta sunt, miro naturæ opere; molam subinde extraxit obstetrix in tria frustra discerptam, quæ subinde confuta molam integram rotundam constituere, superstitione quadam, ad auertendam talem molam, & infumari camino iusserunt. Ea informis erat, cute humana obducta, intus materia sine ossibus, sine corde, sine iecore ac intestinis; sed confusa quædam caro erat mollis, venis conspersa pluribus, cucumeris magni rotundi modo; ea duritiem nullam adhuc contrahere poterat. Huius rei infinita penè exempla sunt. Vidimus Genuensem mulierem ad vitæ usque exitum gestare vêtosam; ac aquosam pariter ad quintum decimum mensem; cumque omnia ex ratione cõceptus veri venissent, præter quòd in ventre punctiones crebras submordentes patiebatur, soluto demum exiguo aquæ, cetera per se subsedere. His tamen vera mola & carnea non erat. At vera mola, vt idem refert lib. citato, cap. 36. De molæ generibus & signis, Apoliam infestat, ac ora maritima Italiæ circa Pisanum agrum; plures enim molas simul parere visuntur. Nam quibusdam in locis superfoetant, bubonis similitudinem, & animal dirum pariter cum partu humano edunt. Interdum harpyiæ (vt dicunt) forma viuere subinde eas dicunt, ac per cubiculum volitare, quæ sæpe in vtero partum necauere, aut rostro infesto, aut compressu. Et ego audini (inquit Gradus) mirabilia, sed non vidi, de animali generato in vtero cum alis, quod cum exiret matricem, volauit:

lauit: multa tamen dicuntur quæ non semper sunt vera. At Benedictus Veronensis inquit: Eam vim astro attribuunt incolæ philosophantes: propterea fera illa belua appellatur. Vidi-
dimus & retentis menstruis, ad quintum deci-
mum vterum gestasse mulierem, quæ medica-
tis locis spirauerat, vno & continuato proflu-
uio exonerata est, vnde molam sanguineam vo-
cabant. Filia Gualtheri, nuper nupta, apud
Amatum, cum omnium opinione prægnans
diceretur, loco fœtus quatuor animalia ranis
simillima peperit, & optimè valuit: sed postea
circa pectinem dolorem sentiebat, quem pau-
cis adhibitis remediis sedauimus, & pulcherri-
mè viuit. Similiter mulier Dionysij Pinti, cum
puerum optimè peperit, inter secundas animal
ranæ simillimum eiecit, & ipsa & puer pancrea-
ticè habent. Mercatoris quoque qui ex Anglia
venit vxor abortiuit, & secundo die post abor-
tum simile quoque animal peperit; vt multis
aliis euenisse vidimus, præcipuè Anconitanis.
Debet verò animal hoc inter molæ genera ad-
numerari; quale etiam illud quod altera post
abortum pepererit frustum quoddam carnis
galli cristæ cum rostro gallinaceo similitudi-
nem habens.

SCHOLIA.

ARISTOTELES igitur ait, molam esse inchoa-
tam fœtus formationem, sed nunquam abso-
lutam, vt carnis genere deficiat generatio, ad genus

B b 4

verò

Femina
aliorum ani-
malium ab
homine non
patiuntur
mola.

vero animalis peruenire nequeat. Hæc ergo aut bre-
ui paritur, aut toto vita tempore seruatur, atque in-
terim durefcit adeo, vt nec ferro quidem difcindi
poffet; vt nos aliquando etiam fpectauimus. Quod
verò poffit diu durare, caufa eft, quoniam non pror-
fus præter naturam, vt corrupta: eft enim inchoata
actio. Quod verò durefcit, materia cruda eft in
caufa. Causa autem cur ad perfectionem non ducatur,
eft debilitas agentis, qua materia generationis
non bene concoquitur, fed fémicocta remanet, vnde
& opus imperfectum facit, rerum inftar, quæ ob de-
bilitatem perfici nequeunt. Cur verò hoc in aliorum
animalium feminis non accadat, caufa eft (inquit)
quod mulier plurimum abundat menftruis, & affi-
citur vtero, id eft, patitur affectus, à quibus impe-
ditur actio concoquendi, vnde massa fémicruda per-
manet. hæc ille. Et eft eadem ratiocinatio, qua de
menftruis agit 4. De generat. animalium 3. Cum
enim agens non fuperat, motum non attingit: fed
vel extraneum à fimilitudine parentum gignit; vel
etiam animal folum, id eft, monftrum, vt paulo antè
dictum eft; vel etiam carnem informem, id eft, non
animal, fed viuens. Galenus eadem via ingreffus 14.
De vfu part. & cuncta in agentis debilitatem refert.
Primum igitur generationem hanc fimilem facit, vt
paulo fuperius dictum eft, generationi omni fubuen-
tanei: hoc verò vno difcrepare ait, quod illud fine
maris confuetudine gignitur; at mola non nifi mu-
lieribus concumbentibus. Aliis enim nunquam (vt
& Iacchinus teftatur) vifa eft eueire. Vnde con-
cludit Galenus, in hac conceptione, dimidium agen-
tis, & imperfectius concurriffe, id eft, fermen femina:

At

t quod viri est, minimè, vel protinus restitutum.
 Igitur itaque concoquendo sanguinem menstruum, &
 n quandam carnis speciem ducendo, sed animal de-
 ineare nequit sine ope maris. Relinquitur igitur
 corpus viuens, & vegetans caro, quæ in nulla specie
 erit, nisi vt imperfectum ad genus perfecti reduci-
 tur, id est, ad genus carnis humanæ, sicut & em-
 bryo ad genus hominis. Coitus autem non iuuat ad
 hoc vt semen maris in generationem deducat: sed
 quia in coitu ob voluptatem mouetur naturali motu
 semen mulieris ad vterum, atque admiscetur san-
 guini menstruo, vnde & concipit. Quod verò dures-
 cat, mora fortè in causa est, vnà cum materia cruda
 & crassa, vt Aristot. dixit. Ita & Fernelius molæ *Causa.*
 causam efficientem dixit esse non solum sanguinem
 menstruum, aut muliebre semen, sed viri semen, idq;
 corruptum, aut quouis modo inualidum, quod ali-
 mentum quidem trahere, nihil verò conformare po-
 test. Rondeletius putat, tam informem carnem,
 quam durum tumorem esse in ostio (iuxta Aëtium &
 Paulum) fieriq; primum ex semine veluti duram
 tunicam, & è sanguine crasso spissoq; calore concre-
 to, quæ nullam formam habet, & velut parenchyma
 quoddam vtero alligatur, & quod sic tumor apparet,
 ob inuolucris duritiem, ideoq; tumorem durum dixe-
 runt; informem autem, quia nullam animalis figu-
 ram habet. Fit autem secundum ipsum à semine &
 à sanguine multo crasso, spisso & concreto, quem im-
 modicus calor cogit & in carnis formam transfert.
 Nam id euenit, quando plus sanguinis menstrui in-
 fluit, quam sit necessarium pro fœtus formatione. Spiri-
 tus autem genitiuus, aut qui opificis vires gerit, vt

Contra Aë-
cium.

Materialis
causa mola.

ait Galenus, non potest tantum materia elaborare,
& ex ea foetum formare. Nam ad foetum utrumq. se-
men sufficit. Sanguis verò menstruus ad nutrienda
illa semina vel augenda trahitur. Donatus tamen
aliā generationem suscipere ait secundum quos-
dam, & quod haec non (ut Aëtius asserit) aliquando
prægressa inflammatione succedit; nec aliquando
post locale vlcus cui caro supercreuit, velut ea, quam
ipse tumorem vteri induratum appellat: nec ex se-
minis muliebris, & plurimi sanguinis menstrui
affluxu, ac in vtero retentione, quem cogit calor im-
modicus, ac in carnis formam transmutat, genera-
tionemq. suscipit: sed aliā tum materialem, tum
efficientem quoque causam habet, ut ex Hippoc. Ari-
stot. & Gal. auctoritatibus (inquit ipse) demonstra-
bimus. Ait enim Hippocrates lib. De sterilibus: Mola
porro conceptus causa haec est, cum multi menses mo-
dicum & morbosum semen contemperint, neque con-
ceptus rectè sit, & venter plenus est, velut pregnan-
tis: quibus verbis clarè ostendit, materialem causam
ipsius mola esse menses multos cum modico & mor-
bofo semine commixtos, semine, inquam, maris, &
non femine. Nam si de femineo semine intellexisset,
frustra modicum & morbosum adiecisset, quum quan-
tulumcunq. & qualecunq. tale semen esset frigidius
& humidius existens, atque imperfectius viri semine,
mola conceptus non sequeretur. Addidit etiam, Neq.
foetus rectus sit, quasi imperfectus conceptus sit in mola
ex paucitate & vitio seminis ortus: namque ex eius
mediocri multitudine ac salubritate foetus rectus ge-
neratur, si cum moderatis mensibus fuerit permixtum.
Quod verò idem sentiat Aristot. (addit Donatus)
lib. 4.

lib. 4. De generat. animal. clarè patet. Nam quarens
cur ceteris animalibus mola non generetur, nisi quid
admodum lateat, sed mulieribus duntaxat, respon-
det, eam inter animalia affectionibus uteri obnoxiam
esse, & menstruis abundare: quibus verbis menstru-
rum copiam necessariam esse pro mola generatione
fatetur. Quod verò necessarium quoque sit viri se-
men, eodem loco ostendit, cum dixit: Iam accidit
cuidam mulieri, ut cum concubisset, & se concepisse
putasset, primum ventris moles augetur, & reliqua
ex ratione venirent: quæ demum difficultati intesti-
norum implicata, eoque modo periclitata peperit car-
nem, quam molam vocant. Quid clarius quod semen
viri simul cum sanguine menstruo concurrat in mola
generatione? Galenus autem lib. 24. De usu part. ad-
uersus eos, qui volebant femina semen conferre ad
fœtus generationem tamquam motus principium
quoddam, hæc protulit verba: Si igitur eò usque vo-
lunt semen feminae progredi, primum quidem quod
parum artificiosam actionem ei tribuit, quæ utique
vel soli menstruo fortè affuerit, nemo est, qui ignoret:
secundò autem quod mentiuntur etiam in his quæ
accidunt explorandis. non enim sicut gallina sine ma-
ribus oua pariunt, ita mulierem aliquando vident
sine viro, vel molam, vel huiusmodi quippiam aliud
concepisse. Cum igitur in femineo semine nullum ad-
sit motus principium, neque perfectum, neque imper-
fectum, licet ad animalis generationem aliquid con-
ferat, aut saltem si quid haberet, non nisi cum maris
semine habere putandum est; ut in eiusdem Galeni
doctrina sæpius legitur: absque controuersia censen-
dum erit, neque perfectum fœtum, neque etiam mo-
lam

Efficiens

causa.

Concludi-
tur modus
generatio-
nis Mole.

lūm citra viri semen posse generari, vt quidam ad
 pauca respicientes falsò putarunt. Ceterum quòd
 efficiens mole causa non sit immodicus calor, sed po-
 tius eiusdem caloris imbecillitas, ab eodem Aristot.
 citato loco scriptum est. loquens enim de mole gene-
 ratione sit ait: Afficitur enim conceptus eodem modo,
 quo ea, quæ inquinari dicimus cū elixantur; nec
 p̄r calorem, vt quidam volunt, sed potius propter ca-
 loris debilitatem. natura enim de vita certare vide-
 tur, nec posse perficere, sinemq; apponere generationi.
 Et demum subdit: Causa namque duritiæ cruditas
 est; quippe cū inquinatio quoque cruditas quadam
 sit. Nam loquens de ouis, quæ subuentanea nuncu-
 pantur, quibus proportionē mole respondent, asserit,
 ea propterea esse imperfecta, & ex ipsis animal gigni
 non posse, veluti ex aliis ouis, quoniam vt perfician-
 tur à masculo solam desiderant caliditatem. Ergo
 veluti ex diminuto calore subuentanea fiunt oua, ita
 & mole, quæ eisdem proportionē respondet, ex imbe-
 cillo & non immodico calore ortum ducit. Erit autem
 eius generationis modus talis, quòd cū in concubitu
 multa copia sanguinis menstrui in vteri cavitāte con-
 tineatur, proiecto à mare modico, eoq; morbofo se-
 mine, ac eadem sanguini menstruo commixto ex im-
 becillitate caloris, præcipuè ipsius seminis, & secun-
 dario fortè ipsius sanguinis menstrui, viroque tamen
 in vnum motum tamquam vno principio conspirante
 non potente eandem materiā perficere, ac concoquere,
 cū sit humor concoctu difficilis, vt inquit Aristot.
 neque finem generationi apponere, carnem hanc inu-
 tilem atque informem, quam molam vocant, idem
 imbecillus calor procreat, quæ interim per annos tres
 aut

int quatuor, quandoque tota vita perdurat, adeo
et consenescat, ut inquit Aristoteles. Hæc satis de
causis mola vera. Nunc aliud exemplum profera-
mus. Sed illud prius addere libet, quod Amatus cen-
tur. 4. curat. 3. idem sentit. Cum enim monacha ex
iis quæ religiose & secretè à turba viuunt, malè ha-
beret, & intra corpus motum persentire se diceret,
vnde ceteræ monachæ illam molam intus habere con-
tendebant; & cum illud fieri non posset, consuluit
Amatus ut rem aut occultarent, aut alterius morbi
genus asseuerarent. Quod Auerroës testatur, ex se-
mine viri in balneo relicto mulierem pregnantem
fuisse, quod & ante eum Hebræi testantur, qui ex
filia Hieremia propheta natum esse Benzynam tra-
dunt, virum doctissimum & sapientissimum, id Ga-
lenus 7. Meth. med. cap. 6. & aliis locis non admittit.

OBSERVATIO LXII.

*De mola instar accipitris caput rostra-
tum habente, eiecta.*

GERTRUDIS, mulier si quæ altera procera
& pulchra admodum, & fecunda, quæ
Delphis pro ædibus corui insignium habebat,
cum se gravidâ putaret, vndecimo mense per-
acto, molam se habere suspicabatur. quanquam
aliquando contigerit, post decimum & vnde-
cimum mensem peperisse; ut etiam Amatus re-
fert centur. 1. curat. 27. de partu decimestri, &
de molæ generibus ac matricis varietate. Anna,
inquit, consanguinea, Stephani Pyrii vxor,
cum

cùm exactè conceptionis tempus obseruaret, post decem menses & vndecimi tres exactos dies puerum optimè peperit: vterum enim gessit decem mensibus & vndecimi tribus diebus. Vnde Plinium verum dixisse lib. 7. naturalis histor. cap. 5. deprehendi, inquit, vbi præter Lucij Papirij prætoris opinionem affirmantis, homini nullum esse pariendi statutum tempus, homo vsque ad initia vndecimi gignitur mensis. Vndecimo verò ab hora conceptionis mense Salomon Hebræorum sapientissimus in lucem prodit; vt ipsemet testatur cap. 7. Primogenitus quoque Domini Herculis Ferrariæ illustrissimi Ducis decimestris est, vt omnes ibidem norunt, & Brasauola scripsit: quem terminum Hippoc. tantùm lib. De natura pueri prope finem signare videtur. Sed de iis, & eorum causis, Leonardum Fuchsiũ Germanum legere est, qui, Amati sententia, præ ceteris melius & accuratius lib. 6. Epid. ea differuit. Ceterùm mulier illa de qua nunc dicere cepimus, cùm non amplius se grauidam esse putaret, molam caput rostratum instar accipitris habentem cum vi quadam & maximis torminibus peperit, quam molam vidimus, adeò duram vt ferro incidi non posset; & post eam reiectam subsequutus est ingens fluxus menstruorum, ita vt omnino ad deplorationem decumberet. Mulierculæ vulgari nomine hanc beluam appellabant *een zuyger*: verùm vbi carnea est quidem spongiosa, & non ita dura, cum oculis referta, & mollior, solent suo idiomate appellare lingua Germanica

panica een manendracht; quamuis eadem etiam
mola existat quæuis caro informis. Ceterum
luxu enormi adeò subsequente, ut ipsa in syn-
open inciderit; hoc præscripto condito, seu
opiata, viribus refocillatis, & fluxu paulatim
inhibito, cum pro mortua satis haberetur, præ-
ter opinionem astantium conualuit: & confer-
ros antiquæ seu veter. ꝯ j. diacydon. sine spe-
ciebus ꝯ ꝯ. trochis. de carabe, de terra sigillata,
de spodio, cum sem. acetos. cornu cerui vsti,
añ ꝯ j. manus Christi cum perlis ꝯ ꝯ. rasuræ
vnicornu gran. iij. cum syr. cydon. & mentha-
ceo q. s. fiat conditum. eoque cum videretur ad-
libitum, tandem fluxus cessauit.

SCHOLIA.

SIGNA mola iam ex parte diximus Obs. 61. præ-
cedente, & quibus modis ab hydrope & conce-
ptione distinguatur, & quod deprehendatur graui-
tate vteri, & tensione maiore quam in vera impræ-
gnatione: sequiturq; mensium suppressio, decolora-
tio, appetentia deiectio, mammarum inflatio; & ut
breuiter rursus dicam, omnia quæ in vera impræ-
gnatione solent accidere, nisi quod grauitas corporis, de-
coloratio, & appetitus deiectio diutius durant. Quod
verò accidentia eueniant conceptioni similia, in cau-
sa est, quod vterus occluditur, non secus ac su-
per factum, non discernens initio vtile ab inutili:
vnde retinentur menses. Sed post tractum tempo-
ris, cum solent fetus copiam absumere, mulieres me-
lius habent: hic verò semper deterius; quoniam
semper

Signa molæ
& quibus
modis differe-
rat à conce-
ptione, &
in quibus
cum conce-
ptione com-
municet.

Signa di-
stinguentia
a concep-
tione.

semper causa malè habendi abundant magis, id est, retenti menses: vnde & cachexia fit, & tandem hydrops. Signa verò distinguuntur à conceptione, saltem post tempus: quoniam vbi concipiunt leniri in utero solent; hic ingrauescunt, & multo deteriora sunt de gravitate, colore. Ex motu quoque, quoniam velut pondus iners debilitatur: quod si moueatur initio, ut non consequitur augendo corpus in tempore, quo fetus augeti solet. Addunt Arabes, monstruis propriis ordinatè fluentibus imprægnatio vera fit; mola nunquam. Ante mensem tertium motus in matrice sentitur in vera imprægnatione nunquam. Quod aliqui dicant molam viuere etiam post partum, id ego non vidi: at Gradus scribit bis aut ter se videri, frustum carnis quod mouebatur vixisse per horas, cum tamen mulier se credebatur prænantem verè; sed eo emissio cessauit prægnatio cum accidentibus eius: quanquam alij etiam harpyias volitasse scripserint, ut antea dictum est, easq; partum necasse aut rostro infesto, aut compressu. Verùm hæc nostra mulier, de qua nunc diximus, solam illam molam rostratam peperit sine fœtu alio. Præterea distinguitur mola ab iisdem, quod in ea alius citissimè in tumorem tum venter attollatur, & velocius incrassetur, imò sepe in tempore non perceptibili: fœtus quoque dextrorsum sinistrorsumq; mouetur: contra mola nisi comprimatur, aut mulieris motu excitetur, non mouetur; vel compressione violenta manu, eaq; amota, ad pristinum locum redit. Fœtus quandoque ex tali compressione mouetur, quandoque minimè. Prægnans quoque agilior quàm molam gerens. in mola alius tactu durior reperitur, in vteri gestatione tracta-

tractabilior. Quamuis his modis cognoscatur, ut apud Guainerium ad longum quoque docetur; tamen aliquando ita signa obscura sunt, ut saepe fallant etiam Medicos peritos; ut contigit Grado in propria sua vxore; cuius historiam hic libet adferre. Vxor mea (inquit) atatis annorum 33. vel 34. bona habitudine, sanguinea, bona etiam compositione, postquam habuisset prius, dante Deo, tres filios; at filius postea orbata, & tali, tertio nempe filio, annorum 14. mediocri ingenij & bona spei, adeo vehementer mater pra tristitia continua per tres quasi continuos menses quasi amens & debilis discursus effecta est. Tandem ei successerunt signa vera impragnationis, unde incepit leniri de afflictione mentis ob defunctum filium; incepit quoque in operationibus animalibus & naturalibus rectificari; restrictis mensibus venter paulatim intumescere, & crescebat, cum bonitate caloris matricis, & aequali quasi pondere ventris & dorsi, & cum reliquis accidentibus, quibus ipsa olim pragnans afficiebatur: saluo quod in singulis temporibus debita suae menstruationis ordinatè parum & valde modici sanguinis & menstrui manifestabatur. Cum tamen ante apparitionem signorum impragnationis copiosè multum menstruabatur. Succedente tertio mense ad finem, vel in principio quarti, percepit ipsa motum quasi concepti, ut alias consuevit tempore pragnationis, cum accidentibus reliquis, & appetitu, & bonitate coloris ad melius conuersis: & ita successiue indices amplius manifestabatur motus, ita quod 7. & 8. mense, & manifestius in 9. mihi saepe palpani manibus supra ventrem eius obiciebatur motus velut infantis, cum inspissatione, ali-

Historia
Gradi, quo-
modo fuerit
deceptus in
propria sua
vxore, in
falsa impra-
gnatione.

C c

quoties

402 DE MVLIERVM MORBIS,
quoties impetuosè sub manu comprimente, & ani-
pius saepe etiam, ipsa & iacēte & aliquoties stante,
manifestabatur visu situalis motus rei globosa in
vtero, à dextro aliquoties versus sinistrum, & quasi
depressio, crescentibus semper in ea accidentibus ad
bonum; & de appetitu & bonitate coloris: crescente
sola grauitate ex pondere circa partes inferioris ven-
tris, & inhabilitate ad motum progressiuum, vt in
reliquis communiter verè pragnantibus euenire solet
in dictis mensibus. Ipsa tamen aliquoties leniter du-
bitante de vera pragnatione, propter id solum quòd
singulis suis tēporibus parcissimè menstruabatur; cum
tamen aliàs, cum esset pragnans, nullo modo men-
struaretur: hoc tamen & mihi & alijs quibusdam
doctissimis viris ad augmentum fidei pragnationis
faciebat, vt idem faciet tibi, si considerabis quae dicta
sunt. Et ita his signis confirmatus sum in opinione
verae pragnationis, cum iudicio etiam multarum ma-
tronarum in his expertarum. Ipsa etiam annuente,
accepimus in domo vnā nutricem in principio noni
mensis, quae erat proxima ad partum, & infra octo
dies peperit vnā filiam, & eam tradidi vt nutri-
retur sub alia nutrice, sustinendo lac enixa cum alijs
aduentitijs lactantibus & sugentibus lac eius; hoc fine
tantum, vt purgato lacte eius tempore partus vxoris
fœtus haberet sibi nutrimentum conueniens. At tan-
dem transiuit 9. mensis, 10. & 11. cum continua
expectatione futuri proximi partus. tandem transiuit
12. & 14. continuatis semper accidentibus apparen-
tis verae impragnationis, & reseruando nutricem in
domo, vt dictum est. Post x1. tamen cepit spes minui,
& diffidentia intendi: ita quòd expedito 14. mense,
sublat a

sublata mihi omni spe, dixi ego consorti meae, non amplius sperandum de pragnatione, cum nusquam legissem veram pragnationem ultra 14. mensem extendi posse; imò raro ultra 9. & rarius ultra 10. licet aliquoties mulieres cum sunt mola affectae in primis mensibus aut duobus vel tribus mensibus, si impra- gnantur post vera impragnatione: quod possibile est, sicut possibilis superimpragnatio, de mente Philosophi & aliorum: & tunc cum pariunt in 9. mense, & simul cum partu naturali emittitur sola mola, saltem si fuerit menstrualis; dicunt tunc mulieres se peperisse in 12. licet partus in veritate fuerit in 9. Verum tandem sic nos delusi de ista pragnatione. at ex vna parte dubitabam de mola vera animata, & sic quasi de impossibilitate cura: ex alia parte, cum operationes omnes essent in ea incolumes, & naturales, & animales, praeter motivas, insurgebat dubitatio, quod ibi non esset aliquid tale innaturale. Nam in tanto tempore debuisset communicare nocumentum hepati & reliquis membris, &c. Et ita in facto fuit: quoniam intra mensem, sine medicinis aliquibus acutis, sed cum solo usu pilularum elephanginarum, semel in hebdomada, remota est omnis detumescencia ventris, & inhabilitas motus, & remansit perpetuo sana. Neque verecundor ego dicere, me casum illum non intellexisse: quoniam & sapientiori Medicorum Auenzoari, cui non essem dignus soluere fimbrias calciamentorum, idem contigisse legitur de quadam pragnante. Nam, ut ipse refert 36. Theisis, erat in domo Haly filij Ioseph mulier quae conceperat, quod mihi erat incognitum, ut dixit, cui dedi medicinam mirabilis fortitudinis, in qua nullus posset existimari

C c 1 euadere,

euadere, sine abortu, bibendo etiam paruum eius mensuram: & tamen nihil perturbationis & malitiae pertulit, & in debito termino peperit infantem à leſione immunem. Dolui errando quòd illi dederim medicinam talem, contra mandatum artis; sed feci deceptus, id est, ignorans. Subiciamus ergo ceruices nostras, & superbiam nostram: neque existimemus nos omnia posse scire; non propterea desistamus à studiis continuis. Hactenus Gradus. Diligentes igitur simus ut rectè molam à conceptione distinguamus.

Mola vera
distinguitur
à non vera;
nempe
aquosa, &
ventosa.

Verùm quod ad alias species attinet, quæ propriè non sunt mola vera, etiam doctiores de iis mentionem faciunt, ut Benedictus Veronensis: At aquosus (inquit) interdum sanguis vitio iecoris in matricem transmittitur, vnde aliud mola genus concipitur: venter gravidarum more tumet, sed mollior; præcordia plurimum veluti hydrops hyderos suppressit; vnde difficulter anhelant, & cum supina mouentur, sonitum intus cum murmure seu fluctuatione edunt. Simili modo & ventus concipitur, qui per naturalia ingreditur; quod percussione quandoque euenit, frigore, cibo inflante, vel crasso in vtero humore, qui in spiritum versus inflat, is saepe per crepitus emittitur: tum tympani modo sonat percussus venter, vnde tympanica hyderos à nonnullis putatur; nam præcordia, ilia, inguinaq; non sine cruciatu extenduntur. Prima pertinet ad hydropem vteri ut diximus: secunda ad vteri inflationem. Nam in vera mola carne pondus maius quàm in prædictis sentitur, & motus est ex compressione ad latera. in aquosa est maior grauitas, quàm in ventosa, sed durities minor & quasi nulla; quamuis in utraque venter vndique extendatur, &

ita

ita grauantur partes diuerse, sed in ventosa pondus extendens & grauens dorsum. Hæ rursus distinguuntur ab hydropo: quoniam in vera hydropo inter intestina & peritoneum colligitur aqua, & motu sentitur, ex fluctuatione: ita in tympanite vndique venter inflatur. Verum cum hac non sit vera mola, recurrendum ad ea quæ de inflatione vteri diximus, & de hydropo matricis. Restat vt sola signa prognostica de vera mola addamus. Cum ergo interditur hic affectus in aquam subtercutem degenerat, nonnumquam etiam insanabilis magna ex parte redditur: quibusdam & sanguis erumpit, Paulo auctore. Hanc affectionem alij velut incurabilem penitus reliquerunt, alij incipientem tantum curari posse confidunt. Negligenda eius curatio non est; sed omnia quæ conuenire videbuntur facienda, vt asserit Aëtius. Quanquam Hippocrates lib. eodem De morb. muliebribus sic de ea scripserit: Hanc igitur maximè quidē ne curato, aut certè cum prædictione. Addunt Neoterici, si initio deprehendatur, non expectandum tempus partus; sic enim sæpe incurabilis est, aut onere grauata natura propulsatur, sed exeundo interficit, aut dolores acerbissimos, symptomataq; periculosa inuehit. Perpiniani (inquit interpretes Hollerij) vidimus mulierem nobilem interiisse, cum molam gestasset duodecim mensibus. Onanis, inquam, mola (teste Guainerio) siue pauci siue multi temporis, difficulter curatur: nam plurimi Medici, dum dubitant de signis imprægnationis, timentes abortum, partus naturalis tempus expectant: eaq; de causa fortè in principio curationem facillè recepisset, nunc autem cum difficultate curatur. Alij verò qui præter car-

Signa prognostica.

406 DE MULIERVM MORBIS,
 neam molam veram, alias species constituunt, dicunt
 humoralem difficilius curari ventosa, carneam diffi-
 cillimè. Iam & mola innumeros Medicos aberrare
 fecit. Antiqua hydropem ascitem inducit lethalem,
 vt postea exemplo docebimus: tympanitem quoque
 periculosam, si inflatio perdurans vterum infestave-
 rit: sed illa vera mola non est, vti diximus. Post
 molam rarò rursus imprægnantur, & si conceperint,
 facile abortum patiuntur, aut morbosum fætum pa-
 riunt, propter vteri vehementem debilitatem post
 molam relictam. Mola quoque indurata, siue id per
 congelationem acciderit, seu per adustionem, diffi-
 cillimè emittitur.

OBSERVATIO LXIII.

De mola post fætum perfectum reiecta.

MARGARETA Cornelij, vxor Haiweri
 mercatoris Delphenis, quum anno
 1559. nono mense peperisset, eam eo tempore
 à secundina reiecta liberauimus. Hæc ipsa rursus
 anno 1562. 29. die Maij, qui Veneris erat, cum
 feliciter peperisset masculum, bene deinde ha-
 buit. Die autem Dominico (qui erat vltimus
 Maij) subsequente, cum paulum vini sumpsisset,
 horrorem experta est, ac parum febricitauit, &
 capite dolebat. Die verò Martis magis febrici-
 tauit, in ventre ac lumbis admodum torque-
 batur, molamque carneam reiecit. Et tunc ad
 illam vocati sumus. Mola autem, vt vidimus,
 erat instar volæ manus rotunda, dura, carnea,
 qualem

qualem etiam tertio die à partu nobilissimam matronam reiecisſe vidimus, vt antea dictum eſt. At hæc mola de qua nunc loquimur, erat partu quaſi ſecundo vel ſecundina interueſtita, ita vt pars ſuperior magis neruoſa propenderet iſtar ſecundinæ, adeò vt mulieres aſtantes ſecundinam ipſam membranam fœtum inuoluentem eſſe putarent, & obſtricem inculparent, quòd puerperam à partu ſecundo ſeu ſecundina reliquerat. Sed ea aduentante, Heyla nomine, in arte obſtricandi gnara, vt ſæpe vidimus, molam quoque eſſe affirmauit, nobiſcum ſentiens, nec ſecundinam eſſe, licet membrana ſecundinæ inſtar carnea illa mola veſtita erat; cùm in principio partus ſecundinam ipſam vnà cum partu excepiſſet. Cùm autem molam hanc pareret, plurimum angebatur, cum ventris dolore ac lumborum acerbifſimo. Sed quia purgatio non ſatis ſubſequebatur, niſi ſordido quid ac malè olente emanante, ventrem vndiq. inferius inungi iuſſimus oleo liliaceo, & pro febre quæ tunc continua erat, piſanam ex hordeo & glycyrrhiza pro potu bibendam conceſſimus: nam cereuiſia ad caput ferebatur, & facilè paraphrenitidem induxiſſet. Sub noctem verò Cornelius Leydius, collega meus me ſenior eo tempore, vnà ad eam vocatus fuit: ſed nescio qua de cauſa noluit venire. Quare vt glans iniiceretur iuſſi, cùm aluum non depone- ret: at cùm & Hugo Nieuenius, Medicus Haganus, eius mariti ſororius, expectaretur, id diſtulerunt in diem ſequentem. Mane ſequenti

408 DE MYLIERVM MORBIS,
summo diluculo Hugo accessit vnà cum Cor-
nelio Heydio. Communi consilio tunc glans
indita fuit ex pul. spec. hier. 3 j. salis exig. cum
melle parata; atque conclusum, si aluus à glande
non solueretur, potionem sequentem exhiben-
dam esse: & elect. lenitiui 3 vj. cum decoct. ci-
cerum rub. propinetur. Verùm à glande co-
piously satis aluum deiecit; ac dolore ventris
nonnihil sedato, potio exhibita non fuit. Inte-
rim vt purgatio magis succederet, & menses
magis fluere, ac in partu probè purgaretur,
excrementis communibus nunc à glande edu-
ctis, pul. hic præscriptus est: & nucleor. persica-
rum, rasuræ dactylor. añ. 3 ij cinnamomi electi
3 j β. sem. viol. commun. seu carulearum 3 ij.
misce, fiat pul. & diuidatur in ij. partes. hic enim
pulis nec febris oberat, & post partum febrici-
tantes puerperas egregiè purgat, & menses in
febricitantibus euocat, vt sæpe experti sumus;
ac idipsum pro arcano habemus. Vnam do-
sim manè dedimus, alteram hora quarta po-
meridiana. Menses satis fluxere, & à partu op-
timè purgabatur, & febris minuebatur. Hor-
deatum pro cibo dedimus. Sub noctem vbi
rediuimus, venter minus dolebat, & lumborum
dolor magna ex parte cessauerat: licet in vertice
capitis nonnihil doleret ad frontem & oculos
dolore tendenti. Quare hic sacculus capiti ap-
positus fuit: & flor. nymphae m. j. β. corticum
cap. pap. albi 3 ij. flor. viol. m. j. coriand. præ-
par. & modicè contusi 3 j. in sacculum corona-
lem vt artis est redigantur. Die Iouis Febris
mul-

multum sese remiserat, & omnis dolor in ventre ac lumbis sedatus est, nec amplius caput dolebat, ac bene in partu purgabatur: hoc tantum restabat quod nocte non dormierat; & hoc ex hordeato venisse putabat, inquit, si lac acetosum vel ebutyratum cum oño bullitum comedissem, ut in puerperio aliàs solita fui, bene dormiuissem. Tunc iterum iniecta glande, & ut illud lac sumeret admissio, amplius non febricitavit, sudavitque egregiè; & purgatione menstrua optimè procedente, septimo die à partu computando, à febre libera, rectè deinde valuit.

SCHOLIA.

QUIBVS modis mola vera curetur, exemplis dictis, & postea etiam vno subsequenti, satis constabit. Attamen pro eius curatione, si non sponte reiciatur, curabimus ut agra decumbat in domuncula angustiore, minus luci exposta, modicè perslata, cubili immobili, sed ita ut pedes habeat elatiores quietosque, motus enim quamlibet fluxionem concitat, ut testatur Paulus. Itaque aer temperatus in actius, Curatio mola. aut modicè ad calidum & siccum vergens eligatur, Ratio victus. somno moderato utantur, exercitium potissimum partium infernarum fugiant; quandoque verò moderata deambulatio confert: sit alius lenis quotidie, & immodici animi affectus omnino vitentur. Cibi tribuantur quantitate moderati, ac boni succi; sitque vini odorati, optimè diluti potus: cum quibus interim ea quæ laxandi viribus prædita sunt, permisceas, & ea etiam quandoque quæ extenuandi vim habent,

C c 5 Vbi

De venar
sectione.

Vbi corpus plenum, in principio, vt diximus, venam secare iubent Paulus & Aëtius, ac alij, si nihil prohibeat, venamq; cubiti secant: interim quoque, praesertim circa initia huius affectus, malleolorum venam secare conuenit, multo sanguine abundante post sectionem venae cubiti. Alij inprimis corpus purgare iubent cum propriis preparationibus, respiciendo excrementa quae magis abundant, ne copia trahatur ad vterum: quo facto, si ferat agra, venam secant tali; ob has cucurbitulas cum multa flamma pubi apponunt. Haud tamen multa copia sanguinis extrahenda est; quin potius, vbi opus fuerit, reiteranda.

Purgatio.

Verum si frigidorum crafforumq; humorum copia adsit, ij parati purgandi sunt, vt alias diximus de suppressis mensibus. Deinde particularem curationem absoluemus, iuxta Aëtium & alios, per cataplasmata relaxandi vires habentia, fomenta, collationes mitigatorias, pessos mollitorios, qui ad durities vteri ante descripti sunt, in sessiones eiusdem facultatis, cerata ex althæa & diachylo supponemus; deinde (vt Aëtius inquit) cucurbitulas cum scarificatione apponemus. Hæc quidem in ipsis exacerbationibus admittere oportet: in intervallis autem corpus reficiemus iis quæ ad hunc vsum conueniunt, vt gestatione, deambulatione, balneis, idoneis cibariis, ac vini potione. partibus etiam affectis dropaces illinemus, & nitrum cum sale inspergemus, easdemq; insolabimus, & medicamento è sinapi & carycis rubificabimus: mollitoriis præterea è seminibus, & baccis lauri & polyarchio ac similibus utemur: sufficimusq; vapore marinae aquæ. Primò tamen sessionibus emollientibus locos, vt facile mola excutiat,ur,

iis

is utemur quæ etiam ad partum facilitandum postea dicemus conducere; atque iisdem quæ valere diximus ad osium uteri clausum relaxandū & aperiendum; quemadmodum etiam vtilia scripsimus in virginibus, in quibus de angustia uteri nobis suspitio erat, ut sunt decocta althææ, fœnugræci, ficuum: è quibus etiam emplastra imò ventri convenientia parari poterunt. Sed sessiones magis sunt vtilis; etiam ex decoct. maluarum, althææ, chamæmeli, sem. lini, fœnug. meliloti, anethi, in aqua vel hydreleo. Osculo præterea uteri cerata mollientia vnctionesq; admovebimus, ut œsypi ceratum, adipēs, & medullas, & cataplasmata apponemus qualia posuimus Obs. 61. & pessos mollitorios ibidem descriptos imponemus. Temporis processu lauri folia vel baccas, pulegium, hyssopum, thymum, saluiam, marrubiū, dictamnū, scordium, polium, centaurium, iisdem miscebimus; vel ex decocto. olla autem cuius operculo perforato arundo commodè inserta fuerit, selle supponetur, atque inde per arundinem vapor excipietur. Ex eorundem quoque decocto, exiguo vino albo addito, fatus cum spongiis fiant: post quos imus venter, pecten, & inguina infra scripto vel simili vnguento perungantur: R. olei irini, lilior. albor. anethini, chamæmel. añ ʒ j. butyri recentis, adipis anseris, añ. ʒ β. ladani ʒ iij. ceræ & vini odorati parum, fiat vnguentum. Adici poterunt cremor sem. lini, fœnug. althææ, ammoniaci, aut bdellij dissoluti in vino paxillam. & pessi subiiciantur ex œsypo, butyro, adipe porcino, medulla aut cerebro ceruino, melle, carycis pinguibus, passulisq; cum oleo antiquo ligustrino. Perseuerante verò malo, acrium eduliorum vsus est admit-

admittendus; inq̃ fontibus calidarum aquarum, & marina, iuxta Aëtium, est innatandum, atque à sumptis raphanis euomendum. Pessos tamen acriores & infesiones acriores euitare oportet, ne loca a fidua eorum vsu vlcerata maleficum morbum efficiant. Quibus peractis frequentissimè plurima atrī & grumescentis sanguinis copia repentè excernitur, & morbus dissoluitur. Neoterici hac addunt, quod eadem ratio curandi hunc affectum & intentio sit mouere menses, planè vt si deberet extrahi foetus mortuus medicamentis, vel cum retinetur secundina à partu. Ontria enim quæ venas aperiunt, & impetum humorum faciunt ad inferna, possunt hac tria facere, sicut & facerent abortum. Priuatim verò in mola tentabimus id potionibus trahentibus ad inferna cōpiam sanguinis, præcedentibus prius purgationibus & remediis vniuersalibus, & demum aperientibus localibus, seu pessi sint, seu balnea, vel emplastra, vel inunctiones: tamen iisdem prius relaxantibus, mitigatoriis, emollientibus vtendo, vt diximus; deinde magis aperientibus, menses euocantibus, & foetum mortuum educantibus: nam postremo loco potionibus rem agemus, & pessi & balneis validè prouocantibus, de quibus etiam diximus in mensum prouocatione. Ad molam igitur, vt nos fecimus, trochiscis de myrrha vtemur. Sed qua intentione? mouendi menses. Sic Rhases propinat in potione trochiscos, quos etiam propinabat supra in mensum suppressione. Etiam priuatim hos trochiscos cum adipe aliquo miscebimus, & pessum conficiemus. Quod si fortias facere libeat, cyclaminis radice vtemur, modis omnibus parata, & in pessa, & in balneo, & emplaistro pubis

pubis: scilla cocta & imposita cum adipe. Iuuant
verò & quæ commotionem multam faciunt, vt ster-
nutamenta, & quæ tuſſim mouent. Vnde Hippoc.
Si secundam procidere vis, sternutamenta moue. Est
autem his omnibus vitiis utilis aristolochia veriusq;
radix, quocunque modo vtaris. Nam ad facilitan-
dum partum eius portione vtūtur, sic & ad secundam
extrahendam, & foetum mortuum. Iuuabit & in-
fessus. Sed secunda sapius retinetur (de qua suo
tempore latius) quoniam in partu vterus est inflam-
matus, ideo extrahi nequit, ni prius inflammatio
soluatur, vena secta, & fotibus, & inedia, & bal-
neis. Solent autem hi affectus periculosi esse ob acutas
febres, quæ hinc sequuntur. Ex compositis etiam lau-
datur in hos vsus elleborus albus suppositus cum sty-
race liquida vel ladano. Rursus sabina herba bibita,
simul & supposita naphtha. Iuuat in his omnibus
casibus item hoc: R. opopanacis, fellis taurini, elle-
bori albi, q. s. misce. Aliud ex scammonio & agarico
& hiera mistis. Aliud simplex, borax dictus ad ℥.ss.
Modus emplastri supra pectinem, cum colocynthide
& cyclamine, & succo rutæ. Sic & Rondeletius ad
molam vtitur aperientibus & foetus mortuos aut se-
cundinam reiicientibus, de quibus multa propriis ca-
pitibus. Componit has pilulas quibus frequenter vtan-
tur manè: R. boracis ℥j. carabes, asari, cinnamomi,
nigellæ Romanæ, & vulgaris, sabinae, añ. ℥j. galbani,
assa foetida, opopan. bdellij, añ. ℥ij. cum melle scil-
litico: de quibus capiat ℥j. (textus corruptus est,
qui habet ℥j.) duabus vicibus, deinde ℥ss. postea
bibat parum vini hippocrat. aut syr. quem describit
cap. De suppressis mensibus. Vtatur frequenter in
cibo

Casus molæ
curata.

cibo apio, alijsq; herbis aperientibus, & incidentibus, ut sanguis concretus dissoluatur eiiciaturq;. Non esset inutile, inquit, cutim, si in orificio appareat, nouacula, aut alio instrumento disseccare, deinde ea ratione curare, qua vsi sumus in secundina adherente, ex putrefacientibus vel arrodentibus, iuxta eundem Rondeletium. Addam hic casum (qui satis erit pro exemplo curationis) Iohannis Tiengij Medici quondam Amstelodamensis, qui anno 1518. in fine Augusti hoc modo mulierem Dauentriensem curauit à mola quam per annum gestauerat. Primò exhibuit ʒj. turbith. & ʒinz. cassie lignee, cinnamomi, añ. ʒ. ʒ. cum decoct. artemis. Post 4. dies idem dedit. deinde omni mane cyathum vnum clareti, quo solitus erat uti pro partu facilitando: attamen prius dederat iuleb descriptum à Nicolò cap. De retentione menstruum. At claretum ita parabatur: R. capill. ven. ʒ. ʒ. verbenæ, artemis. beton. pulegij, sabinae, rad. peon. & sem. eius añ. ʒ. ʒ. corticum cassie, galliæ moschate, añ. ʒ. ʒ. nucis moschate, rasura lapid. dactylor. sem. althæe, fœnug. caryophyl. añ. ʒ. ʒ. croci ʒ. ʒ. dictamni, baccar. lauri, blattæ, byzantie, cubebarū, añ. ʒ. ʒ. ʒ. cinnamomi electi ʒ. ʒ. bulliant in vini Rhenensis optimi ac puri lib. ij. vel iij. cum ʒ. iij. sacchari, & ʒ. j. de corde cerui, fiat claretum. Deinde iussit ut inungeret locellos, ilia, & pectinem vnguento suo molliente, manè & vespere, ita parato: R. olei lilior. amygd. dulc. viol. ping. anseris, gallinæ, añ. ʒ. ʒ. olei chamæmelini, anethini, ping. anatis, mucilag. fœnugræci, lini & althæe, añ. ʒ. ʒ. ʒ. olei cheyrini, medullæ cruris vituli, butyri recentis, añ. ʒ. ʒ. vitellos duos ouorum, cinnamomi electi, galliæ mosch.

mosch. ʒ β. puluerisentur vt docet, & fiat vnguentum secundum artem: quandoque addebat parum pulueris pconia. Deinde aperiri iussit venam saphenae pedis dextri. Et omnibus quatuor diebus dabat turbith modo iam dicto. Postea dedit ʒ j. confectionis suae de assa foetida cum cyatho vno succorum verbenae, praesij, mixtorum cum vino Rhenensi. Haec est descriptio valens ad fetum mortuum quoque educendum: & assae foetidae ʒ β. sem. ruta, cassiae lignae, rasurae lapidis daetylorum, boracis, añ. ʒ j. β. croci ʒ β. myrrhae, theriacae diateffaron, añ. ʒ j. Misce, dabat aliquando ʒ j. cum aqua sabinae. Cum eo (vt idem refert) curauit mulierem quandam quae prius pepererat infantem viuum, sed relicto deinde altero mortuo, cuius caput & brachium detracta ac abscissa erant, reliquiis remanentibus, cum clausum esset os sacrum, & cessassent accidentia partus. Dedit manè & vespere ante cibum ʒ j. donec ab omnibus repurgata & curata fuerit. Idem quoque dedit (vt asserit) aliquando cum decoct. artemisiae, modò cum succo verbenae, & praesio mixtis cum vino Rhenano, & hoc autoritate Nicoli; modò etiam cum vino decoct. verbenae & praesij. & semper (inquit) gratia Dei, bene successit. Sed praeter haec iam dicta, etiam huic mulieri molam habenti dedit omni vespere ante coenam per horam ʒ j. trochis. de myrrha cum cyatho vno clareti superscripti. Deinde etiam peracta phlebotomia, & sumpta cōfectione ac potione, etiam pectinem fouebat, ac loca dicta, fote sequenti: & maluae, parietar. branchae vrsinae, mercurial. añ. m. j. pulegij, sabinae, artemis. añ. m. β. sem. faenug. lini, althaeae, anethi, añ m. β. fiat decoctio,

416 DE MULIERVM MORBIS,
etio, & foru peracto, & corpore repurgato, vnge-
bat vnguento suo emolliente dicto. Quibus praesidiis
fuit à mola liberata & curata. Ac iisdem reme-
diis, vti addebat, curauit illustrissimam Elizabetham
reginam Dacia, cōsultatione ad eandem praescripta.

OBSERVATIO LXIIII.

*De mola aut sanguine crassiore, quem hy-
drops subsequebatur, deinde mors.*

VXOR Domini Gulielmi Cripij, viri con-
sultissimi, & vrbis Delphenis Pensiona-
rij, cognata D. Viglij, cū ventrem tumidum
à puerperio haberet, post duos menses, tumore
perdurante, & magis crescente; ego & Cor-
nelius Heydus, collega meus, anno 1563.
10. die Augusti ad eam curandam acciti fui-
mus. Signis igitur praecedentibus, tum prae-
sentibus animaduersis (vt postea latius dice-
mus) cū à tempore partus praecedentis tu-
mor remaneret, & non satis purgata esset, imò
omnia statim retenta essent, ventre tumido per-
durante; vel molam, vel saltem sanguinem
crassiorem, huius mali causam esse existimani-
mus. Ideo operæ pretium esse duximus menses
aperire cum relaxantibus & emollientibus;
etiam vnguentis per intervalla, & quæ simul
flatus discuterent; primò adhibitis quoque pur-
gationibus aptis, cū alius siccior nequaquam
responderet; etiam externis apposis quoque
emollientibus linimentis, & vnguentis; habita
semper

semper ratione ad fontem illius mali, nempe
vterum. Nam ex eo reliqua symptomata orie-
bantur; vti cachexia, & postea superueniens
hydrops, hepate refrigerato per consensum.
tandem etiam incrementum maius malum ce-
pit. Decimo itaque die Augusti, vtriusque con-
silio, pro fecum communium educatione leniens
medicamentum præscriptum est: & elect. leni-
tium ʒj. dissol. cum ʒij. decoct. pectoralis. Ma-
nè sumpsit hora septima, & fecibus commu-
nibus eductis 11. Aug. potio sequens exhibita
fuit: & corticum radicum fœniculi, petroselini,
cichorij, asparag. añ. ʒβ. sem. fœniculi, pe-
tros. carui, dauci, añ. ʒj. sem. 4. frig. maior.
añ. ʒβ. matricariæ, calaminthæ, artemisiæ,
añ. m. β. capill. ven. polytrichi, ceterach, añ. p.
j. vuar. pass. ab acinis repurg. ʒj. folior. senæ
ʒβ. rhab. selecti ʒj. schœnanthi ʒβ. fiat om-
nium artis ratione decoct. in aqua communi ad
ʒx. col^r addendo ʒij. syr. capill. ven. syr. de ca-
laminth. añ. ʒj. arom^r cum ʒij. cinnamomi
electiss. & fiat claretum pro duabus dosibus,
fuitque ter reiteratum. Ventrem inunxit cum
oleis emollientibus, vt liliaceo, & pinguedini-
bus anseris, gallinæ, & similibus. Postea & hoc
linamento: & olei sabinæ ʒj. olei lilior. irini,
vng. Agrippæ, añ. ʒβ. misce. Die 17. Augusti
& spec. dialacæ, diacurcumæ, añ. ʒj. spec. dia-
cumini ʒβ. dissolutis in aqua artemisiæ, adiectis
ʒij. sacch. fiat confectio in tabulis. diuidatur
in partes sex: capiat vnā ante meridiem, &
hora quarta pomeridiana alteram partem. Ven-

D d

tre

tre modò etiam inuncto oleo liliaceo, & irino
 postea, etiam suprascripto, & post aliquot dies
 sumebat rursus quod sequitur: ꝛ calaminthæ,
 pulegij, nepetæ, sabina, añ. m. j. ceterach, po-
 lytrichi, añ. m. ß. sem. fœniculi, dauci, pastina-
 cæ, añ. ʒ ij. folior. senæ ʒ ß. agar. albi feminini
 leuis, rhab. electi, añ. ʒ j. zinz. albi, schœnanthi,
 añ. ʒ j. fiat decoct. in aqua & vino Rhenensi,
 vsque ad ʒ viii. colꝝ adde syr. de artemis. ʒ ij. fiat
 apozema pro ij. dosibus matutinis, clarificetur,
 & arom. cum pauco cinnamomo ad formam
 hippoc. Semper ter eo ad minus ventrem de-
 ponebat. Eodem tempore accitus est Hugo
 Nieuenius, Medicus Haganus: & rursus com-
 muni consilio fuit repurgata; & puluere diacu-
 mini, dialacæ, diacurc. diagal. rursus exhibito
 & lenitivo, & medicamēto purgante vsi sumus
 ac vng. emollientibus insistebamus, eisdem
 pulueres, vel similes, cum vino maluatico ex-
 hibentes, etiam lotionē pedum vtentes ex flor.
 chamæmeli, meliloti, artemis. pulegij, sabina,
 matricariæ, malua, althæa, fœnug. cumino, &
 pastinacæ sem. in vino & aqua decoct. vt mate-
 ria deorsum detraheretur, & vterus aperiretur,
 etiam subinde claretis supradictis reiteratis, rad.
 iridis adiecta, tum aliis, vt foliis senæ, agar. &
 rhab. vt prius, in maiori dosi. Tandem etiam
 post emollitoria, hoc sub vestibis suffitu vsi su-
 mus: ꝛ myrrhæ, cumini, añ. ʒ ij. calami arom.
 cinnamomi, galangæ, macis, aristoloch. long.
 añ. ʒ j. fiat pul. crasso modo contusus in tres
 partes diuisus: proliciebatur vna pars supra car-
 bone s

bones ignitos, & fumum ac odorem sub vestibus recipiebat. & capiebat hora quarta matutina tres pilulas infra scriptas: ꝛ trochis. de myrrha ꝓj. cum syr. artemisiæ fiant pilulæ ix. Ex istis medicamentis continuatis tantum semel visi sunt menses; sed iis rursus restrictis, nihil subsequutum. Vnde tædio affecta, omnia remedia respuendo, vltius progredi recusauit.

Postea anno sequenti 1564. iterum ego & Cornelius Heydius vocati fuimus, cum per annum curationem intermisisset, & rogatu Domini Pensionarij, eius mariti, hanc epistolam à me tum Heydio scriptam ad Medicos Brabantinos, vt Dominus Viglius à Pensionario efflagitauerat, misimus.

S.P. **I**AM integer annus elapsus est, quod nos ad vxorem Domini Pensionarij vocaremur, vt presentes omnia contemplantes commodius ac firmitus eius incolumitati pro ratione consulereimus. Deprehendimus insignem quendam ventris cum duritie quadam tumorem. Ex Domini Pensionarij matre didicimus, hebdomadas aliquot antè peperisse, vel potius ob fœtus immaturitatem abortum fecisse: & propter partus accelerationem obfetricem non adfuisse in tempore, atque diutius hasse in secundarum extractione. Additum est quoque, in puerperio non satis fuisse expurgatam, & subitò omnia fuisse retenta. Hinc collegimus, crassum aliquem sanguinem in matrice suppressum, & in eo viscere impactum esse, cum admixtione humorum flatulentorum. Et quia negotium nobis videbatur non sine periculo,

D d 2

vocatus

420 DE MULIERVM MORBIS,
vocat^{us} est tertius Medicus D. Hugo Hagensis, vt
communi consilio inuestigaremus quid vtile factu
foret. Primo vsi sumus aperientibus, incidentibus, &
flatus dissipantibus. Deinde moderate purgantibus,
atque incidentibus, per intervalla. Tandem ad ea
peruenimus quæ exterius applicata emolliunt; per
os sinterea administrando ea quæ menses euocare
queant, immixtis semper iis, quæ flatus discutere de-
beant. His remediis effectum est, vt semel visi sint
menses. Ad extremum radio affecta, & medicamen-
torum vsum respuens, vltius progredi recusauit:
tum quod bellè se habere videretur, tum quod vici-
um gerere se suspicaretur. Id quia nobis non appa-
rebat, agerrimè culimus quod à bene captis desisteret.
Interea temporis vterus cum ventre toto molem illam
sibi seruauit in hunc vsque diem. Veritus igitur D.
Pensionarius, ne malum accresceret, ac tandem ad
desperatam aliquam valetudinem deueniret, denuo
nos vocauit ad diem Augusti decimum, vt diligentius
omnia peruestigando de morbo vxoris, tractaremus
necessaria ad salutem. Inuenimus tumorem paulo
maiores quàm anno præterlapso, cum aliqua corpo-
ris macie, sine vlllo tamen pedum tumore. Venter circa
sinistra hypochondria ad ilia vsque nullam præ se
manifestam duritiem ferebat. Totus autem versus
dextra intumescebat, & tribus quatuorve locis dis-
iunctos in scirrhi modum nodos animaduertebamus.
Bene tamen concoquit, & nullum prorsus sentit vllius
membri aut visceris dolorem. Hoc tantum patitur,
quod cōsueti more diuturna exercitia ferre nequeat:
nam solito citius lassitudinem, ob spiritualium par-
tium præ vteri distentione coarctationem, sustinet.

Etiā

Etiā si insignis durities circa hepatis regionem re-
 beriat: vrina tamen optimam indicat tam colore,
 quā substantia ac hypostasi, concoctionem. Pulsus
 minor, crebrior, ac cum quadam tensione, quā
 olim duriore. Suāsimus igitur vt rursus eadem re-
 media quæ aliās, & si res postulet, vehementiora
 pro virtutis ratione adhiberi permittat. Nobis autem
 vsus eorum quæ flatus dissipent & menses euocent,
 placent. Balnea emollientia, aut saltem fomenta
 meatus recludentia non erunt inuilia; adhibitis etiam
 si opus est, metrenchytis. Si hæc omittantur, veremur
 ne temporis tractu in ascitem, ac tandem in mortem
 incidat. Non dissuaderemus interea, vt peritiores
 aliquot medici super hac agitudine consilia sua pa-
 tescerent, priusquam res ad actum deducatur. Nos
 autem accuratissimè omnia perpendimus, & pro arte
 ac conscientia nostra hæc facienda duximus. In rei
 veritatem ac fidei confirmationem, nostrum consue-
 tum chirographum apposimus. Delphis 16. Aug.
 anno D. M. D. L X I I I.

Cornelius Ericius.

Petrus Forestus.

Antequā ad reliqua remedia veniamus, quibus
 denuo vti sumus, libet his subiungere scriptum
 ipsius Cornelij Gemmæ Medici Louanienſis.

*Consilium in casu vxoris clarissimæ
 D. Pensionarij.*

QUANTVM ex narratione vestra, celeberrime
 D. Pensionari, & signis omnibus oratione ex-
 pertiss. Domin. Doctorum luculenta atque erudita

D d 3

admo-

admodum descriptis, consequi licet, omnes sanè me-
cum, vt coram differui, tum in morbi ratione, tum
medendi methodo, atque vniuersali quadam conse-
quendi scopi notione pulchrè conueniunt. Sympto-
mata etenim præcipua sunt, ventrū immodicus tu-
mor; abscessus quidam scirrholes in ipso epigastrio
cum duritie quadam, tensio quoque sub hypochon-
drio dextro, ac mensium suppressio nimis diuturna;
qua tamen non tam symptoma, quàm mali causa
meritò recenseri debet. Verùm quia circuitus quidam
inter causas & effectus apparet, dicimus, factum ex
suppressione mensium, vt ipse uterus inciderit in in-
temperiem frigidam & obstructionem validam; sic-
riq; rursus, velut per circuitum quendam, vt ex flatu
& intemperie frigida iam uterum occupante, causis
quoque morbificis robur accedat, ac menses ipsis ma-
gis magisq; indies obstruantur. Causas externas om-
nino in aëris externi iniurias reici, forsan & in in-
tempestiuam victus rationem, non improbo. Locus
affectus omnino in utero est, si de fonte mali quaestio
fiat: quanquam & per consensum verisimile est, vt,
paulatim ad hepatis regionem affectus & intemperiei
noxa pertingente, paulatim quoque in corpus vni-
uersum deriuari possit, atque (vt clarissimi Domini
Doctores referunt) etiam in tympanitem, atque inde
in ascitem atque hypofarcam permutari. Posset ta-
men ipsam abdomen istiusmodi scirrhis corripì, aut
etiam aquoso tumore repleri, non affecto hepate; vt
aliquando accidisse memini. Verùm tunc potius affi-
citur ea capacitas qua est inter abdominis musculos
& peritoneum, ni humor aquosus abscedat. In hoc
enim casu videtur ab utero refrigerato per venas eò
pertin-

mergingentes paulatim ad venam cauam atque arteriam aortam intemperies frigida processisse : inde però propagines proxima venarum atque arteriarum ad abdominis regionem protenduntur. Et quia non ab ipso fonte sanguificationis, sed alia parte minus principe venæ refrigerantur; ideo nec æqualis tumor, nec æqualiter diffusus, sed, per modum adhuc virtutis validè expellentis, in scirrhus degenerat, exundante eo quod inutile est, & aquosum per orificia venarum in abdomen; ubi rursus à frigore circumfuso concrefcit, &, digesto eo solo per cutem quod tenue est, reliquum magis indurescit. Iam & ex utero affecto, ut dictum est, hepar affici possit; unde timenda ascites, ut Doctores eximij quoque timent, si remedia apta omittantur. Imò, si rem omnem ingenuè fateri liceat, iam & ipsius hydropis, potissimum ascitis, rudimenta ex scirrhuso tumore satis elucescunt: quæ tamen sperarem in ipso mali exordio, si, ut ceperunt eruditissimi Domini Doctores, cum medicaminum convenientium, cum victus probè rationi obtemperet, omnino comprimi & extinguere posse. Causam materiale[m] vniuersim flatu nomine comprehendendo : etsi hic ipse paulatim, maiori oborta refrigeratione, in aquam transmutetur. Causa formalis est distensio uteri à flatu. cui ut causa continens adiuncta est alteratrici facultatis imbecillitas in venis uteri. Morbus autem ipse obstructionis nomine est comprehendendus, cui annexa est causa continens temperies frigida. Cui ut occurratur, omnino in rem fore existimo, ut Doctorum viro[rum] consiliis, quæ experta sit hætenus, audacter obsecundet : sunt enim Methodici, atque experientia non parua, quantum

ex scriptis elicere potui. Sed vt particulariter aliquid ex me depromam, quo humanitati vestra satisfaciam, mihi sanè non inutile videretur, si lenitius medicamento ex rhab. & agar. & folijs sena prius exhibitio, etiam, si opus videbitur, adiecto pauxillo elect. de succo ros. aut consimilis medicamenti, quod eius vim suppleat, ad potum ligni Indici cum vino Pictauiensi & aqua decocti iuxta rationem qua commo- dissima videbitur, velut ad salutarem anchoram, confugiat. Merito enim huiusmodi medicamentum exhiberi debet, quod continua transmutatione corpus afficiat, ac partes affectas vnà corroboret, ipsiq; minimum fastidij pariat. Hac omnia puto esse in ligno Indico: aperit enim potenter cum adstrictione moderata, atque frigidam intemperiem, partium maximè, ad natium calorem reuocat, si pro natura & morbi conditione exhibeatur. Quæ si paulo medicandi ratio asperior videatur, habetis & radicem china, cui etsi molliori, non minores tamen vires attribuant neoterici. Verùm de his vberius atque exactius DD. Doctorum esto iudicium, quibus illam quotidie coràm intueri, ac singula definitius examinare datum est. Ego suaderem, vt semel in mense vteretur hoc infuso: R. rhabar. selecti ℥ ij. agarici optimi ℥ j. folior. sena ℥ ij. anisi, spica, zinç. añ. ʒ β coll gata in puppulam macerentur in lib. j. decocti, in quo sint pruna vj. numero, cuscute, agrimonie, eupatorii añ. m. j. rad. asparag. ʒ β. rad. iridis Illyricæ, gentianæ, cappar. tamaris. cypri, añ. ʒ ij. coletur. adde sacch. optimi q. s. vini Rhenani parum: fiat potio pro iij. dosibus matutinis: puppula infusa per noctem & expressa validè, quod si minus sit efficax, addatur elect.

elect. de succo ros. 3j. Inde verò confugiat ad potum ligni guaiaci preparati secundum artem; vel hoc modo, si consultum ceteris videbitur: R. ramentorum ligni sancti lib. j. ß. minutim concisa maceretur in lib. xij. aquæ fontis per 20. horas, inde bulliant in duplici vase bene cooperto, adiectis lib. iiij vini Rhenensis, circa finem decoctionis; bulliant per xij. horas, colentur; atq. ex eo bibat manè hora vj. & post meridiem hora 4. Rursus super iisdem ramentis fiat altera decoctio, adiecta simili quantitate aquæ ac vini; adiiciantur & anisi 3 ij. bulliant omnia per xij. horas. Utatur eadem decoct. loco potus familiaris. Sequatur hanc rationem, si possit, per sex septimanas; sin minus, per quatuor. Quod si ab hoc curationis genere prorsus abhorrebit, suaderem illi vsum huius pulvisculi, aut non absimilis: R. rhabar. electissimi 3 ij. sem. bismalæ, liquir. rasæ, anisi, añ. 3 j. ros. rub. cort. rad. cappar. cyperi, añ. 3 j. granorum paradisi, macis, sem. leuistici, sileris montani, baccarum lauri, galangæ, rad. irid. Illyricæ, gentianæ, salis gemmæ, añ. 3 ß. cinnamomi opt. 3 ß. sacch. diatr. frig. 3 j. fiat pul. dos. 3 j. semel in die sub auroram, cum modico vini Rhenensis diluti aqua cocta, in qua sit modicum sacch. candiæ. Communiter suaderem & hoc elect. frui, præsertim horula vna ante cibum: R. anisi, sem. bismal. glycyrr. rasæ, melon. flor. viol. añ. 3 ß. gran. paradisi, cort. arantiorum, ligni aloës odorati, añ. 3 j. galangæ maior. baccarum lauri, añ. 3 ß. sem. plantag. maior. 3 j. croci, mastiches, cinnamomi, ros. rub. añ. gr. vj. calamintha 3 j. sacch. albiss. dissoluti in aqua ros. q. s. adiecto modico vini granat. fiat elect. in tabul. Vnguentum quo vteretur

D d 5

ad

ad entollitionem & digestionē moderatam, sic parari iuberem: R. vng. resumpt. opt. ℥ ij. olei mastichini, viol. olei de cappar. añ. ℥ ij. mucilag. cydon. ℥ β. comae absynthij pontici ℥ j. flor. viol. ℥ β. styrac. calamita ℥ β. misce. Aut si malit emplastrum: R. comae absynthij pontici ℥ ij. flor. ros. ℥ j. vng. resumpt. ℥ j. adipis equina testibus detractis, aut alterius magis emoll. ℥ β. styrac. calamita ℥ β. cera parum, mucilag. cydon. ℥ ij. misce. fiat emplastrum molle. Utatur familiariter sem. anisi, sceniculi, etiam rad. eringij conditis, quarum ego vim in hoc malo non leuem expertus fui; accedit quod admodum sint delicata. Caueat à vehementer diureticis, nisi adiuncto rhabar. aut aliquo solutiuo, quod crassiorem materia partem ad intestina trahat. Vinum illi potissimum Rhenense exhiberem; sed quia diureticum est; potius cum offula darem excalfactum; idq; pro ientaculo. Vina fulua putarem non obfutura, etiam quae moderatam astrictionem obtinent. Imò ego vidisse memini, quae solum epoto vino Hispanico, quod tincturam vocant, omnino liberarentur, expulso copiosissimo lotio, & mensibus prouocatis; sed tantum utebantur dimidia vncia post meridiem aut à cena intinctis offulis. Facit id compressione quadam & partium corroboratione; nec est quod aluum obstructam iri metuamus. Caueat sibi à caseo, lacte, pinguibus & viscidis cibis, pane recenti, cereuisia male cocta aut crassiore, vino crassiore, terrestri, nimium adstringente, austero, vel acerbo, fructibus omnis generis tamquam à peste, lactucis & omnibus olerum generibus, salsis omnibus, & carnibus porcinis, anatis, anserum, & id generis crassi succi, à frixis in sartagine, aut bis coctis, piscibus

ous lentis, viscidis, duris, atque crassi succi, pabellis, aut leguminibus. Utatur carne porissimum vitulina, agnina, veruecina, pullorum, perdicum, conurnicum, &c. Utatur in cibis calamintha, hyssopo, salvia, maiorana, radice siferis, thymbra, granis paradisi, cinnamomo, macere, nuce myristica, sed moderate tamen. Vitet omnem animi aegritudinem; letetur, otium vitet; fruatur Venere tempestiva & moderata, &c.

Ex animo tuus

Cornelius Gemma.

Secunda verò nostra epistola ad D. Pensionarium transmissa, hæc continebat.

S. P. **S**CRIBIS ad nos, Clariss. Domine, D. Mathisium optare plurimum, ut symptomata explicatius paulo à nobis enucleentur, quo firmitus iudicium de vxoris tue valetudine ferre valeat. Apertè matricarium esse morbum, & nodos illos (qui maioris pile magnitudinem, quod olim non indicauimus, superant) non in musculus sed intus in vtero, ob sanguinis crassioris suppressionem latere significauimus: vnde nullo negotio poterat aut molam esse, aut sanguinem concretum induratumq; (vt malum) colligere. Hypochondria sinistra olim quidem molliora, sed nunc propter abdominis distensionem prorsus indurata sunt. Necdum omnia nobis apparent magnorum vasorum oppilationis indicia: veremur tamen ne propter lienis præsentem duritiem breui adsit. Vniuersi corporis habitus, excepto abdomine, ad frigidam quandam siccitatem inclinare videtur: priusquam tamen nobis innotesceret, calida ad humidum parumper vergentis tempe-

temperiei fuisse putabamus. Hac sunt quæ paucis, ob
tabularij festinationem, ad T. D. exarare potuimus:
pluribus egissemus tecum, si per confratris mei agi-
tudinem licuisset. Existimamus equidem hæc satis
fore, modò accuratius olim à nobis scripta examinare
voluerit. Ego Cornelius, cum hoc mane Domicella
coniunx tua mihi à te scriptas redderet litteras cum
multis lachrymis, ad misericordiam, si tamen ea sic
appellanda sit, inclinatus sum: ut plane nihil atten-
tare audeamus sine Domini presentia, quia visa est
omnino fugere medicamentorum vsum diuturnio-
rem. Obsecramus igitur D.T. ut quàm citissimè, ne
præterlabatur occasionis opportunitas, ad nos huc re-
deat. Id quod enim præter naturam est, siue mola
sit, siue sanguis concretus, statim amoueri oportebit,
ne in hydropem, ut antea scripsimus, vxor tua cha-
rissima incidat. Nam ad eam iam tendere videtur.
Bene valeat Excellentia tua.

Cor. Ericius.

Petrus Forestus.

Missæ fuit hæc epistola in principio Septem-
bris, anno 1564. ad D. Pensionarium, qui apud
Vigiliam Præsidem Brabantia agebat Bruxellis.

*Consilium Mathisij, Medici olim Impe-
ratoris Caroli Quinti.*

DOMINE Pensionarie, legi ea quæ à Doctoribus
Delphensibus prius subscripso addita fuerunt.
Mibi verisimile non sit, molam esse quæ vxor tua la-
borat. Mola enim ex viri semine, aut corrupto, aut
alioqui ad formationem inepto ac inualido, gigni so-
let; quæq; ea laborant, cibum fastidiunt, ad incessum
grauio-

graviiores sunt; artus gracilesunt; extrema adema-
tosa fiunt; denique omnes functiones imbecilliores
fiunt: venter saepe compungitur, & quasi pondus
pendet, quod in decumbente impetu quodam in quod-
cunque latus se vertat deuoluatur; tum etiam ven-
ter durior est, quàm si legitimus inesset foetus. Ex
scripto animaduerto, aliquam esse corporis maciem,
sed sine vlllo pedum tumore. Scribitur etiam solito
cuius lassitudinem quandam sentire, sed bene conco-
quere, & urinam optimam ostendere concoctionem,
tam quoad substantiam, quàm quoad hypostasim.
Posterius scriptum addit, nodos sentiri in vtero pilæ
in modum ob sanguinis crassioris suppressionem; &
hypochondria sinistra æquè ac dextra distendi, & circa
lienem non secus ac circa iecur duritiem sentiri; adeo
ut vereantur, breui adfore vasorum magnorum ob-
structionem ac oppilationem. Ex his colligo, functio-
nes naturales probas esse, & in prima ac secunda
concoctione nihil desiderari: verùm animales, quod
lassitudo illa facile indicat, imbecilliores esse. Et quod
primum scriptum habeat, pulsus minorem, crebrio-
rem, & solito duriores esse in præsentia, videtur
vitalis facultas non admodum esse robusta. Sunt
hæc difficilia iudicatu, & quæ præsentiam agræ om-
nino requirunt: alioqui vix est ut accuratè aliquid
aut certò statui possit. Secundùm tamen ea quæ
proponantur, ita iudico, vim illam naturalem, etiam-
num vigentem, in agra omni diligentia esse conser-
uandam in suo robore, & nihil propinandum esse
medicamenti, quod ipsam possit prostrernere. Siqui-
dem hæc iacente, nihil proficietur. Itaq; si quid me-
dicamenti est exhibendum, ut per intervalla omnino
opus

opus est, sit illud clemens, naturam non admodum fatigans, quale possit esse rhab. aut agarici dilutum senna infusum, & syrupus ille ros. medicamento sus. & qui de cichoreo Nicoli nuncupatur. Cibi interim offerantur medicamentosi quidem aliquid obtinente: sed gustum non offendant; qui cuiusmodi sunt, non est necesse doctis. Medicos docere. Nouerunt enim ipsi, incidendi, attenuandi, & abstergendi quapiam vi praeditos debere esse; & temporis longinquitatem constante functione naturali, morbum euicturum esse. Quae licet sit molesta, est tamen tuta, & hic ut existimo, necessaria in agra quae medicamento rum usum auersatur. Nodos & scirrhosos illos tumores, quos Medici in utero statuunt, ego autem dubito annon potius in mesenterio aut pancrea subsint, cum emollientibus & discutientibus oppugnandos esse censeo. quae emollientia & discutientia ita temperabuntur, prout ipsorum in progressu usus indicabit. Fotus eiusmodi & illinitiones non est mihi necessum ascribere. Sic illas hypochondriorum durities tractandas esse putarim: & externis auxiliis maxime est fidendum, non neglecta, ut antea memini, recta victus ratione; sine qua in vanum omnino laboratur. Et cum dico rectam victus rationem, omnia ea complector, quae Medici non naturalia nominare solent. Equidem scio, vterinos morbos, & praesertim chronicos, difficiles plurimum esse: atque ea propter agra adhortanda est, ut pertinaciter consilio sibi adesse & opitulari velit. Nam ubi tria sunt, morbus, natura, & Medicus naturae minister; si victoria speranda est, necesse est ut agra naturae eiusque ministro faueat & adsit. Alioqui si agra morbum fouet, &

Medi-

Medicam naturam inferuentem, & manum adiutricem porrigentem non audit, verendum plurimum est, ne natura subsidio destituta ut undique compressa concidat. Vides, mi Domine Pensionarie, me quoque in externis auxilium multum spei ponere, atque in iis potius, quibus Medici quoque tui probant esse insistendum, quàm in iis quæ per os solent magna cum instantia, & ægra stomacho, obrudi quotidie. Non quoddam horum aliquando, sed clementiorum, non sit vsus; sed cum prudentia & per intervalla ipsorum auxilium sit inuocandum. Reliqua Medici præsentis pro suo iudicio & rerum usu moderabantur. Ipse autem Deus opt. max. suo favore & gratia pro sua erga nos *φιλανθρωπία* cuncta secundabit. Bruxellis 14. Septemb. 1564. raptim & persunctoriè.

D. T. paratissimus

H. Matthiæ.

Ceterum Cornelij Gemmæ consilium, tum Matthiæ quoque scriptum Dominus Pensionarius nobis tradidit. Quoddam autem Matthiæ molam ob hoc esse non putaret, quoddam semper à viri semine corrupto aut inualido gignatur, id quidem & nos facile admittimus. Interea fieri potest uti vir validus, optimo semine præditus, molæ causam generet. quemadmodum contigit in muliere illa valde prolifica, de qua paulo antè diximus, quæ tamen postea rursus imprægnata, præter fœtum etiam molam peperit. antea quidem semen in viro ipso fuit validum; at nunc cum molam conciperet, non est dubitandum quin tunc semen fuerit vel inualidum, aut nimis frigidum, aut nimis calidum,
aut

aut nimis paucum, aut nimis multum, vnde
mola generata, & post partum quoque reiecta
Ita & hinc fieri potuit. Nam, vti ex obstetri-
etiam postea intelleximus, licet tempore parien-
di fœtus, non tempestiuè adfuerat, tamen i-
secundina parienda adfuit; post partum æqu-
tumido permanente ventre: quamuis primùm
putabat fœtum secundum adesse; postea verò
cùm partus alius non subsequeretur, & statim
purgatio non procederet, & omnia retenta man-
nerent, existimabat vel molam adesse, vel san-
guinem concretum, aut aliud quippiam etiam
purgationem solitam impediens. Quòd si mo-
la non fuerit, saltem sanguis ille menstruus con-
cretus & crassus in utero procul dubio aderat
ita vt verisimile sit, totum mali fontem ex utero
venisse; eoque refrigerato, reliqua viscera po-
stea læsa fuerunt: vnde & hydrops metebatur
cuius rudimenta iam aderant, quasi quæ &
molam subsequi solet diuturnam; postea quo-
que crure dextro œdematoso superueniente
licet bonis remediis, vt dicturi sumus, detu-
muerit. Sanguis autem ille ex consueta purga-
tione retenta, si non fuisset adeò crassus, facile
educi potuisset remediis ad menses euocando
valentibus. Ideo fortè ob suam crassitiem quasi
molam sanguineam contraxisse, verisimile quo-
que esse videtur; vnde durior, & minus putre-
dini obnoxius consistentiam parenchymatis
acquisiuit. Nam mola aliquando, vt Ronde-
letius refert, quemadmodum & superiùs di-
ximus, ex sanguine crasso spissoque calore con-
creto,

retero, quæ nullam formam habet, velut paren-
chyma quoddam vtero alligatur, & sic tumor
apparet durus: qui etiam hîc in principio in re-
gione vteri sentiebatur. Potest & talis sanguis
in menstrua purgatio non subsequatur, frigore
concretescere & durior euadere. Quanquam me-
mini filiam seniore[m] Domini Comit[is] de Eg-
mont, quæ nupserat Domino Houtkerchio,
cum in puerperio existeret, & suffocatione
vteri aliquando laboraret, à qua tamen subse-
quente mediocri purgatione menstrua vtcun-
que curata fuerat, vt me relinqueret, postea
diebus aliquot intermissis syncope præhensam
cum in Haga Comit[is] ageret, subitoque extin-
ctam fuisse, vt tempus me rursus vocandi non
superfuerit. Verùm cadauere postea dissecto,
cum balsamo, per me & Huernium, Medicinæ
professorem, cadauer condiretur, sanguis ad-
huc leuiter concretus in vtero inuentus est, quasi
putrefactus, ex quo fortè vapores ad cor ascen-
dentes, causa syncope, deinde mortis fuere.
At in hac nostra ægra cum, vt verisimile est,
durior & crassior fuerit sanguis in vtero, minus
corruptus, talia accidentia non adferebat. Ideo
quamuis Matthi[us], Medicus excellentissimus,
subdubitabat sanguinem concretum, vel nodos
villos scirrhosos, potius in mesenterio seu pan-
crea subsistere, & non in vtero; minus credere
potuimus, ob consuetam purgationem in vtero
retentam, quæ post partum subsequi solet. In-
terea tamen vnà sentiebat, qualiscunque is tu-
mor esset vel sanguis, semper iisdem remediis

E c

quibus

nos vſi fueramus, eundem amoueri debere, & emollientibus & diſcutientibus. Ita & Cornelius Gemma noſtrum proceſſum curationis non ſolũ laudauit; ſed quòd iſdem remediis inſiſtere deberemus conſuluit: quod etiam expertiſſimus ille Medicus ſenior fecit Baeldorpius quondã etiam ipſius Imperatoris Caroli Quinti Medicus, quem & conſuluerat Penſionarius. Et ideo cũ morbus ex ipſo vtero fontem haberet, prius curandus erat; aliis viſceribus per conſenſum tandem oblæſis minimè quoque neglectis. Quare hic ſanguis retentus & concretus, vnde totius mali origo, ſiue in molam conuerſus, ſiue aliter, tum emolliendus, tum diſſipandus erat, etiam per ea quæ menſes euocant exteriùs remediis iam ſuperius dictis, tum aliis quæ per interualla per os exhiberentur, minimè poſtpoſitis. Quamobrem Cornelius Ericius medicus ſenior, tum ego iterum, cũ per annum curationem intermiſiſſet, eoquẽ malo ob diuturnitatem temporis in peius labente, vocati fuimus anno 1564, vt diximus, menſe Septembri. Iſdem autem remediis, quibus prius vſi fueramus, inſiſtebamus, lenitiuo prius propinato, & aliis vnctionibus exteriùs adhibitis; hoc quoque apozemate rursus præſcripto: ꝛ chamæmel. chamæpit. matricariæ, artemiſ. añ. m. j. ceterach, polytrichi, pulegij, origani, calaminthæ, añ. m. ꝑ. j. ſabina, trium flor. cord. añ. p. j. rad. bruſci, aſparag. apij, añ. ꝑ. j. ſem. aniſi, fœnicul. carui, dauci, paſtinacæ, añ. ꝑ. j. folior. ſennæ ꝑ. j. polypod. quer. ꝑ. j. rhab. ſelecti, agarici

rici fem. añ. 3 j. schœnanthi, zinz. albi, añ. 3
 β. passul. enucl. glycyr. rasā, añ. 3 vj. fiat de-
 coct. in aquæ lib. β. & vini Rhenens. lib. j. ad 3
 x. col^r addendo syr. de calaminth. de artemis.
 añ. 3 j. β. clarificetur & arom^r cum 3 iij. cinna-
 momi: misce pro iij. dosibus. Interea tabul. su-
 prascriptis denuo utebatur, & inuam ventrem
 cum oleo liliaceo & irino inungebat. In Octob.
 decoct. præscript. adiectæ sunt 3 ij. folior. senæ
 & polypod. & hagioxyli artificiosè leuigati 3 j.
 β. decoct. in lib. j. vini Rhen. & 3 viij. aquæ puræ
 ad lib. j. saccharo dulcorabatur, & cum 3 β. cin-
 namomi aromat. ad modum clareti, ventre hoc
 linimento inuncto: & olei lini, lilior. añ. 3 j.
 ping. anat. gallinæ, butyr. recentis, añ. 3 vj.
 Venter æquè tumescebat, & durus erat; ut de
 hydrope magis suspicio incretaceret; postea &
 vmbilico magis eminente, vii in exomphalo.
 Appositum est vmbilico emplastrum ex oxy-
 crocei 3 β. supra corium rotundum firmiter
 ligando, ad aliquot dies retinendo; quo & vmbi-
 licus subsidebat, capiendū tunc 3 j. β. vel duas
 ex rotulis spec. diacum. dianisi, diacinnamomi,
 & spec. diarod. abb. omni mane; & in Nouemb.
 ex syr. magistrali hagioxyli sequente ita parato:
 & calaminthæ, orig. artem. nepitæ, sabinæ, pu-
 legij, añ. m. j. rad. brusci, asparag. apij, añ. 3 j.
 rad. ireos, inula, pæoniæ, fœnic. añ. 3 vj. sem.
 anisi, fœniculi, dauci, pastinacæ, añ. 3 iij. fo-
 lior. senæ 3 ij. agar. femin. 3 j. rhab. electi 3 vj.
 zinz. albi 3 j. spicæ schœnanthi, añ. 3 j. β. li-
 quir. ras. passul. mund. añ. 3 x. hagioxyli 3 iij.

E e 2 fiat

436 DE MULIERVM MORBIS,
fiat maceratio secundum artem, ad spacium 2.
horarum in lib. iij. aquæ, & coquantur in du-
plici vase, vt artis est, ad lib. j. ß. & fortiss. ex-
pressioni adde sacchari q. s. & coquatur ad con-
sistentiam syrupi magistralis: & huius capieb.
subinde cochlear vnũ alternis diebus, ne radi-
medicamentorum afficeretur. Interea & ven-
trem inungebat, ob tumorem durum, sequen-
vnguento: ꝛ gummi ammoniaci dissoluti in ace-
ro ꝛ ij. olei lilior. anethini, añ. ꝛ j. olei sabina
vng. Agrippæ, añ. ꝛ vj. ceræ exiguum; fiat vng.
alioum, vbi opus erat, apozemati superiori ad-
iectis ꝛ ij. hagioxyli, cum foliis senæ, agar. rhab.
& polypod. etiam addita rad. irid. & inulæ: &
post colaturam seu expressionem addebantur
syr. magistralis prius descripti, de eupat. de ar-
temisia, añ. ꝛ j. cum ꝛ iij. cinnamomi electi, ac-
formam clareti. In Decembri adhuc eodem
vel simili utebatur, etiam pro tribus vicibus pil-
lulas sequentes accepit: ꝛ pilul. de hiera simplic.
ꝛ ij. pilul. mastichinar. trochis. alhandal ꝛ j.
fiant pilulæ xv. quinq. pro vna dosi dabantur.
hoc quoq. cerato toto ventri appposito, excepta
regione hepatis, in corio ea parte exciso, ne he-
par attingeret: ꝛ mucilag. rad. althææ, rad. li-
lior. alborum, sem. fœnugr. & lini, añ. ꝛ iij.
axungia porcina recētis, butyri non saliti, ping.
gallina, caponis, anseris, añ. ꝛ j. ß. & sypi humid.
ꝛ j. quibus adde pul. folior. malua, florum me-
liloti, chamæmel. anethi, añ. m. iij. cum f. q.
ceræ, fiat ceratum secundum artem; & coope-
riatur sindone, cum interbastatione (vt ita di-
cam)

cam) vt artis est. Eodem tempore bapiebat sub-
 inde cochlear vnum ex syr. sequentibus: & syr.
 hagioxyli, de calamentha, de eupar. añ. ʒij.
 misce. Anno 1565. adiecimus syrupis dictis
 subinde syr. de artemisia & de praffio: & sa-
 mebat subinde iterum ʒij. confect. in tabul. ex
 diacur. dianis. & rursus decoctum superius
 descriptum, addendo, si opus esset, solia senæ,
 agar. & rhab. vt & in Februariò sine nide. etiam
 condito ex cons. flor. rorismar. absinth. Rom.
 adiect. spec. plirisarcot. sine moscho, addito syr.
 de calamenth. & artemis. Fuitque imo ventri
 appositum aliud ceratum ex diachylo cum gum-
 mis, & mucilag. & empl. de melilot. etiam af-
 sumpto subinde syr. de eupar. & artemis. co-
 chleari vno atque altero cum spec. dialacca, &
 diacurc. idque bis in die. Hoc tempore cepit
 totum crus dextrum à femore vsque ad talum
 intumescere, totumque crus durum euasit, non
 sine œdemate, vt iam de hydropē magis metus
 esset. Pro hoc symptomate totum crus balneo
 sequenti imposuit per duas horas, simul etiam
 fricando: & horum chamæmel. summitat. ane-
 thi, centaurij, absinthij communis, añ. m. 4.
 flor. genistæ p. j. salis nitri, cumini, añ. ʒβ. in-
 cidenda incidantur, & contundenda contun-
 dantur; coquantur in aqua communi pro lib.
 vj. adiciendo m. ij. salis communis. Confert
 hydropi & œdemati, vt aliàs experti sumus, &
 hic adedò contulit, vt totum crus breui detur-
 muerit. Rursus deuenimus ad decocta supe-
 rius descripta ex calamentha, puleg. sabina, &
 E e 3 aliis,

438 DE MULIERVM MORBIS,
 aliis, iam adiect. sem. rutæ, rad. pæon. rhab.
 senna, & agar. vt supra; postea sine iis vt hoc
 clareto vtentes: & calament. puleg. sabina, ar-
 temis. añ. m. j. cap. ven. ceterach, polit. añ. m.
 ß. sem. iuniperi, catui, seselios, rutæ, pastin. añ.
 ʒ ij. sem. genistæ ʒ j. rad. ireos, brusci, aspar. añ.
 ʒ ß. liquir. ras. ʒ vj. coquantur in ij. par. vini
 Rhenensi & vna par. aquæ communis pro lib. j.
 colæ adde syr. de calament. de artemis. añ. ʒ j.
 ß. syr. de eupat. ʒ j. clarificetur & arom^r cum ʒ
 iij. cinnamomi selecti, & ventri inuncto hoc
 vng. & dialthææ ʒ i. olei lilior. ping. gallinæ, olei
 menthini, añ. ʒ ß. pingued. anatis, medullæ cer-
 uinæ, axungia caponis, añ. ʒ iij. misc. & denno
 appposito cerato; etiam pessis ex iisdem pingued.
 mollitoriis vtero impositis. At istis omnibus re-
 mediis nihil profecimus, nec aperti sunt men-
 ses, nec uterus aut venter detumuit. Ideo Pen-
 sionario proposuimus, vt denuo Hugo Niene-
 nius Medicus accerferetur. Qui cum adesset,
 & præscripta remedia laudasset, conclusum fuit
 vt iisdem insisteremus, & simul localibus reme-
 diis propriis ac pessis. Proponebam & ego eo
 tempore infusiones emollientes, deinde pessos.
 At pessii magis placebant & Cornelio & Nie-
 uenio. Clareto autem superiori addebatur rub,
 rinctorum, ad menstrua magis euocanda, ʒ j.
 adiectis passulis mundatis. Pessi & hoc modo
 præscripti mense Martio, anno 1565. & sabi-
 næ, pulegij regalis, origani Hispanici, florum
 rorismar. omnium exliccat. añ. p. j. trochis.
 de myrrha, spec. dialacæ, diacurcumæ, añ. ʒ j.
 fiat

fiat pul. vt alcohol, & cum melle q. s. fiant duo
pelli, in quorum cuspide ponantur gran. ij.
moschi, & sindone rub. cooperiantur, & filum
sericum inseratur, vt ad libitum extrahi possit;
circumlinantur oleo sabinæ & spicæ, antequam
per vetulam quandam honestam imponantur:
idq. in diluculo manè, stomacho ieiuno, quàm
fieri potuit magna cum diligentia, in orificium
ipsius vteri vsq. ad fundum, per tres quatuorve
horas ibi relinquendo. Sequenti die iterum
impositum; deinde quoque adhuc semel sub
noctem, ad sex horas ad minus relinquendo,
vel per totam noctem. Sed vetula, vt impera-
uimus, prius intus vuluam digito hoc sequenti
liquore inungebat: & styracis, benzoini, añ. ʒ
j. cinnamomi electi, nucis moschatae, galan-
ga, añ. ʒ j. moschi gran. iij. fiat pul. vt alcor-
hol, & incorporetur cum oleo spicæ ad vnguen-
ti liquidi formam. aliàs ego commodè vsus
sum in altera vnâ cum Cornelio collega, prius
vtero inuncto cum oleo liliaceo; adiecto mo-
scho, eodem tempore & hoc pello impositor
& trochis. de myrrha ʒ j. ʒ gentianæ, bacca-
rum lauri, aristoloch. vniuscusq. añ. ʒ j. cum
suff. melle fiat pessus sindone inuolutus, &
filo alligatus, vt ex diatellaro theriaca, ita
dicta à quatuor rebus è quibus constat: &
gentianæ, baccatum lauri, aristoloch. rotun-
da, añ. ʒ ij. mellis despumati lib. ij. Sed &
hoc feliciter vsus sum ex succo mercurial. ʒ
ij. salis niri, gemmæ, ana. ʒ j. ex præce-
pto Benedicti Fauentini præceptoris mei.

conuenit & hæc metrenchyta: & succi sabinae
 ℥ iij. succi ebuli ℥ j. croci ℥ j. aquæ matricariae
 lib. β. fiat metrenchyta. At in ægra hac os uteri
 quoque oleo sequenti, tum pessum, antequam
 imponeretur, iussimus inungi: & olei sabinae,
 lilior. sesamini, añ. ℥ j. moschi gran. j. Interea
 rursus utebatur hoc clareto: & pulegij regalis,
 calaminthæ, artemisi. melissæ, sabinae, maiora-
 næ, añ. m. j. ceterach, capill. ven. polytr. chama-
 pit. añ. m. β. rad. fœnic. apij, brusci, asparagi,
 añ. ℥ β. rad. inulæ, pæonia, añ ℥ iij. sem. anisi,
 fœniculi, carui, ammi, pastin. dauci añ. ℥ j. β. li-
 quiritasæ ℥ β. coquantur in ij. partibus vini Rhe-
 nensis & vna parte aquæ pro lib. j. colatura
 saccharo dulcoretur & arom. cum ℥ j. spec. dia-
 calamenthæ & cinnamomi ℥ j. β. & fiat clare-
 tum pro tribus dosibus matutinis. In Aprili
 pessi ter reiterati, & decoct. long. cum sena, agar.
 & rhab. cum suis correctoriis, & herbis supra-
 dictis; & hoc linimentum rursus descriptum:
 & olei irini, liliorum, lini, de meliloto, añ. ℥ j.
 mucilag. fœnug. althææ, añ. ℥ β. ping. anatis,
 gallinæ, añ. ℥ vj. ceræ modicum; fiat linimen-
 tum molle pro toto ventre, rursus appposito ce-
 rato mense Martio descripto. Paulo post pessi
 duo adhuc præscripti: & sabinae m. β. calamen-
 thæ, nepetæ exsicc. añ. p. j. trochis. de myrrha
 ℥ ij. styracis calamitæ ℥ ij. β. rubiæ tinct. ℥ j.
 ladani ℥ β. gummi ammoniaci dissoluti in vino
 ℥ ij. trita cum s. q. mellis fiant ij. pessi vt su-
 præ. Tunc denuo visi sunt menses, & vtcunq.
 fluxere; at venter non detumuit. Postea rursus
 decoct.

lecoct. aperitiua descripta, etiam quæ ad hydropem facerent, adiect. rad. ebulli & aliis in vino, cum rubia tinctorum; & sub finem Aprilis pessi inditi. denuo menses visi sunt in maiori copia. In Maio rursus decocta longa, vt supra, cum rhab. agar. sena, clareti instar descripta, & tabulæ ex speciebus diacal. diacur. dialaccæ, arom. ros. exhibitæ. At in mense Iunio magis ad hydropem inclinabat; & inter nos conclusum fuit vt adderentur non solum ea quæ aperirent & menses ducerent; verum etiam quæ ad hydropem facerent iisdem commiscerentur. & ad maiorem emollitionem abdominis tum ventris inferioris, & vt commodius menses quoque euocarentur, conclusum fuit vti balneo artificiali, quo in hyeme præcedente, ob aërem frigidiorum, minus vti poteramus. Interim cum Dominus Pensionarius Bruxellis esset apud Viglium præsidem, facta est mentio de fonte quodam acido, qui in Spa visitur, de quo Limborchius Medicus libellum scripsit, quem & nos perlegimus. Sed reuerso Pensionario, atque rursus Bruxellas petente, is nobis iniunxit, vt quid de balneo sentiremus, eidem scriberemus. Nam animus erat eò mittere vxorem. Non diu post Dominus Viglius suam misit famulam Delphos, vt vnâ Domicellam ægram Bruxellas deduceret. Postridie litteræ à nobis scriptæ ad Pensionarium per me missæ sunt, omnium nostrorum nomine, cum reuersus essem Brisli: cuius hæc erat inscriptio.

Ec 5

Præstan-

442 DE MVLIERV M MORBIS,
Præstantissimo ac Doctissimo viro Domine
Guilhelmo Cripio, Iurisconsulto pruden-
tissimo, & Pensionario Delphensi.

QVANDOQV IDEM à nobis flagitavit D. Pensio-
narius, ut qua nostra esset de fonte in Spa sen-
tentia, perscriberemus; quemadmodum & Nieuenio
nostro hinc discedens iniunxerat; Anne eius vsus Do-
micellæ vxori sua prodesse queat, ac an inde perfectam
morbi sui solutionem assequi possit: visum est nobis
pro ratione respondere, fontis illius naturam nulla
alia vi notam nobis esse, quàm quatenus scriptis &
sermonibus aliorum nobis innotuit. Cum igitur no-
uerimus, tam lenis, quàm vteri scirrho laborantes
eius vsu curatos, non videretur nobis alienum, si &
illa quoque experiretur; modò prius balnei emollien-
tis ac calfacientis vsus tentaret, quàm ad exsiccan-
tia animum applicares: cum videlicet fons ille ex mi-
nera ferri & sulphuris constet. Nam si tum aquam
hanc assumeres, melius omnia succederent: quia (ut
auctor quidam enarrat) egregiè vrinam prouocat;
& per consequens ea quæ vrinam solent euocare,
matricis obstructioni quoque succurrere, tum menses
educere consueuere.

Huc vsque litteras conscripseramus; & an-
tequam obsignaremus, alias à D. Pensionario
& Mathisij Doctoris sententiam de Spa simul
accepimus. quare epistolæ nostræ hoc accesso-
ritum sequens adiecimus.

Dubitamus tamen, non satis fore potentem ad
abdominis & vteri duritiem depellendam, nisi simul
emollientibus cum menses euocantibus vi studeat. Ce-
terùm

erum ubi inter nos conuentum esset, accepimus & legimus tuas & D. Matthijs Medici literas, quæ seruolum quendam animo nostro iniecerunt; quia idem ille D. Matthijs fontis esse affirmat eluere, aperire, utque nimium ab obstructionibus excelsa refrigerare: at vxor nimio ac vehementi calori non est obnoxia: sed potius duris ac concretis in vtero ac frigidis humoribus vexata; qui potius hepar ipsum à iusta sua temperie ad frigiditatem, ac tandem, si vel exiguus comitatur error, in hydropem deducunt. Ab usu igitur huius balnei existimamus ac statuimus è re vxoris esse, si bituminosa illa ac sulphurea balnea inuisat tandem, qualia sunt balnea Aquisgrani. Nam inde speramus multo maiorem fructum, quam ex ullo alio remedio; modo ea quæ prius scripsimus de emolliente balneo, præcedant. Hoc tamen nulli ratione negligi debet, ut corpus tum paretur, tum vniuersaliter expurgetur. Cui rei non dubitamus Dominum adhibiturum peritum aliquem, ac in arte nostra versatum Medicum, qui pro ratione ac rerum usu moderabitur omnia recte. Quod D. Pensionario maturius non scripsimus, causa est, quod cum vxore mentem nostram transcribere volebamus, quæ cum discederet, nemo nostrum aderat. Doctor Hugo Nieuenius apud D. de Somerdijk, Cornelius Heydius Roterodami, ego Brilius, agebamus. Erant tamen litteræ paratæ, præter hoc accessoriũ literis tuis adiectum. Hisce vale. Raptim, Delphi 19. Iunij anno 1565.

Hugo Nieuenius. Cor. Heydius. Petrus Forestus.

Litteræ verò Crijp ad nos scriptæ, ita sese ad verbum habebant.

Clarissi-

Clarissimis ac Doctiss. viris D.D. Cornelio Heydio & Petro Forestio, ciuitatis Delphensis Medicis Pensionariis, Dominis suis atque amicis singularibus.

S.P. **C**LARISSIMI Domini Doctores, D. Praef. Viglius mandarat D. Matthysio Medico ut virtutem Aquarum earum Leodiensium, quarum tam celebris fama est, paucis describeret, ut ex ea vos, qui longius ab iis abestis, num salutare ea uxori meae futura sint, statuere possitis; quod ipse cum agris aliquando eo profectus, vires earum & efficaciam perspectas habere videretur: in qua quidem re ille minime se difficilem praeiuit. Sed quantum angustia temporis patiebatur, paucula vobis sufficere existimabat, quae in hanc quam vobis mitto schedulam, coniecit. Rogo itaque vos, ut perpensa diligenter aquarum earum vi, morbiq; natura, num profectura illi videantur, dispiciatis. Et si, quod futurum existimo, viles futuras iudicetis, illi diligenter persuadeatis, ne se difficilem ad proficiscendum praebeat. Decreuit quoque D. Praefes, post earum aquarum usum, si ea vel nihil vel non omnino eam iuuent; inde ad thermas Aquisenses mittere. De hoc quoque vestrum iudicium perscribatis velim, idq; primo quoque tempore. Valere Clarissimi ac Doctissimi viri, & D. Hugoni Nieuenio, lectissimo atque clarissimo viro, plurimum à me salutem nuntiate, atq. in deliberationem, si, quod futurum credo, apud vos sit, vel aliqui profectio uxoris moram patiarur, adhibete. Bruxellu postridie Idus Ianij, anno 1565.

Vester, si quis alius,

Guilhelmus Cripinus.

Hac

Hæc erat schedula Matthijsj ad nos
missa.

AQUARVM acidarum in Agro Leodiensi sca-
turientium natura ferrea est à prædominio
um parte sulphurea, & non sine suspitione quadam
balcanthi, si eius sapor accuratius expendatur. Ita-
que facultas earum est aperire, eluere, refrigerare
quoque nimium ab obstructionibus excelsa, corro-
torare; ita tamen, ut progressu temporis excelsa
non nihil & ficare valeant. Euacuant præterea alios
multo sudore, nonnullos crebris deiectionibus, plerosq;
vomitu, & plurimos copioso lotij profluvio, prout
subiectum corpus ad hoc aut illud euacuationis genus
magis est propensum. Omnibus certè utiliter bibitur,
quibus aliquid ex prædictis contingit. Illis tamen
obest, quorum meatus adstringit, & quando per-
meare nequit. Vnde patet, si cum recta vita ratione
& corpore preparato ad potationem, bibant, multa
inde sequi postea commoda, quare ipse rei euentus
declarabit, pro ipsius potantis ὑποστυγασίας. Quare
in hac re prolixior esse nolo, ut cui satis fuisset dixisse,
ferreas esse à prædominio, cum subdominante sul-
phure, & fortassis chalcantio. Nam qui horum vi-
res expendit, & facultates inde enascentes, probè
animaduertere valet (porissimum si cum his conferet
proprium & priuatum corporis temperamentum)
is facile diiudicare potest, cui affectui prodesse aut
obesse valent. Braxellis, 1565.

Matthijsus.

Matthijsus

Matthiſius hic doctiſſimus Medicus nihi
 noui nobis ſcripſerat, præter ea quæ ferè ac
 verbum Lymburchius Medicus in libello
 De eodem fonte habet. Quare cùm episto-
 la noſtra ſupradicta ſcripta propemodum eſſe
 (vt diximus) præter acceſſorium quoddam
 quod poſt acceptas literas Domini Perſonarij
 tum hanc ſchedulam, adiunctum fuit, & ita
 miſimus. Eſt itaque Domicella hæc Bruxellas
 profecta, deinde ad fontem acidum in Spa.
 Ceterùm ea ipſa ſub finem Septembris anno
 1566. domum rediit, neque ab iſdem fontibus
 vlllo modo in melius profecerat, neque Mat-
 thiſij opera, alioqui præſtantiſſimi Medici, Bru-
 xellis venter detumuit. Qui Matthiſius, certè in
 artis operibus exercitatiſſimus & magni nomi-
 nis Medicus, eodem ferè tempore cùm hanc
 nobilem matronam curaret, ab equo calcitrone
 inopinatò percuſſus (vt nobis relatum eſt) mi-
 ſerè, proh dolor, vitam finiit. Quare cùm ne-
 que alij Medici Bruxellenses, alioqui in re Me-
 dica verſatiſſimi, in curando Cripij noſtri vxo-
 rem quicquam proficerent; cum morbo multo
 validiore quàm antea, etiam hydropica, do-
 mum reuerſa, nullam adhibens poſtea curatio-
 nem, octauo die Decembris ad ſeptimam ferè
 horam, noctu cùm animam ageret, ego, vt pote
 vicinus, ſubitò accitus ſum, ſed morte inſtante,
 eaquæ à me prædicta, eodem tempore, anno
 1566. obiit, proba me hercle matrona, cum
 multis lachrymis ipſius mariti.

OBSER-

OBSERVATIO LXV.

De citta, pica, malacia, pregnantium.

Vxor Augustini Teylingij, Iusta dicta
sen Iodoca, matrona admodum hone-
ta, socrus mea, mulier admodum fecunda,
quæ & viginti proles peperit, hæc ipsa cum gra-
vida esset, ac Amsteladamum nauigio iret cum
uo marito, cumque ad pagum *Saradamum* di-
ctum peruenissent, maritus nautam interro-
gavit nunquid edulij penes se haberet; qui cum
obtulisset aliquid halecis iam nouiter saliti,
uxor ipsa duodecim comedit, nec quicquam
inde mali sensit. Erat autem hæc citta circa ci-
oum haud innaturalem: quemadmodum al-
teri mulieri etiam Alcmarianæ contigit, quæ
ad forum veniens, anguillam coëmtam statim
crudam deuorauit: alia verò (vt nobis quoque
relatum est) etiam pellem ouillam vnà cum
lana detractam deglutiuit. Altera quoque pi-
cem liquidam cochleari excipiens, nec offensi
quicquam accepit. Eua Teylingia, vxor mea
charissima, filia Iustæ superscriptæ, cum graui-
da esset, domi seorsim sportulam cerasis ple-
nam habebat, quam & sæpissimè salutabat, at-
que ex ea carptim subinde cerasa clam, ne quis
animaduerneret, sumebat. Sed hic appetitus
non ita innaturalis erat, vt quarundam mulie-
rum, quæ & carbones, cretam, aliaque absur-
da comederunt.

SCHO-

SCHOLIA.

Symptoma-
ta quæ præ-
gnantibus
euenire so-
lent.

Citta præ-
gnantium.

QUOMODO citta non solum prægnantibus, sed
& viris quoque, tum aliis etiam puellis con-
ringat, diximus cum de malis ventriculi ageremus
lib. 18. Obser. 7. & Scholio eiusdem: ubi & huius
symptomatus causam, signa, & curationem recen-
suimus, ut non opus sit de nouo repetere. Verum tamen
cum nunc de mola sermonem absoluerimus, pauca
hic quædam de citta aliisq; symptomatibus, quæ graui-
du euenire consueuerunt, interserere libuit. qualia hæc
præcipua sunt: citta, cibi fastidium, flatus, atque
ventriculi dolor ex flatu, cibiq; reiectio, cordis saltus,
syncope, crura inflata. Urina difficultas, eiusq; de-
stillatio & incontinentia, renes ex calore debiles, ac
alii suppressio; quibus & addunt pilorum defluuium
aut incrementum insolitum; lac in grauidis effluens;
mensesq; grauidarum, & superfætationem, citta
(ut etiam alias diximus) ab hedera dicta existimatur,
quæ quicquid inuenit, fortiter amplectitur; mulieres
mollitiem seu malaciam vocarunt. Secundo mense
prægnantibus incipit, modò citius, modò tardius,
Moschione teste, quibusdam ad partum perseverans.
Galeno à 2. mense & 3. & quod quarto quiescit,
partimq; vomitionibus humoribus vitiosis expurga-
tis, partim concoctis. Si fieri potest, interponenda
est vnius diei abstinentia: sin minus, parcus cibus de-
tur. Moschio aquam prius dat, deinde vinum, cibosq;
constringentes. os inungit oleo mastich. ex cotoneis,
adiectis pul. caryophyl. mentha, corall. rub. & simili-
bus cera exceptis. dat acida, & post cibū pira, cydonia;
& ventriculum roborat. Vide quæ lib. 18. scripsimus

Scholio

Scholio Obs. 7. Fastidium eo tempore pręnantibus, *Fastidium.*
 quo fętus germinat capillos, contingit: tollitur cibus
 austeris, acidisq; & sale modico cibo adiecto. conue-
 nit panis sine fermento, auicula. pinguis deest an-
 tur. Noui ego pręnantes aliquas adeo cibum pro-
 prium fastidentes, ut alienos tantum vel emendica-
 os ederent. Valent pruna, sorba, pira, coronea, mala
 unica, olea alba ex dura muria, & cappares cum
 aceto. Flatus in ventriculo & alibi discuties, ilia & *Flatus.*
 luum inungendo oleo lilino, seminibus fęniculi, anisi,
 umini, & aliis etiam dolorem ex flatibus tollentibus.
 Cibi reiectio, punice coniectis vel cydoniis in vino, vel *Cibi reie-*
 orbis assumptis, curatur. Cordis saltibus, ut quidam *ctio.*
 olunt, aqua calida vberim pota opitulatur. ego *Saltus cor-*
 ommodę ad palpitationem cordis vtor conserua me-
 ssa. A syncope releuantur sale in os posito. Hoc mo-
 o Margareta Nannia, uica mater charissima, quę
 septemdecim proles peperit, semper restituebatur.
 am si altius sederet, ea corripiebatur. Pedum tu- *Pedes in-*
 mores Egineta illinit cimolia cum aceto mixta. *flati.*
 ietius perfricat cum rosaceo & aceto, sale etiam ad-
 iecto. brassica folia late distensa vel cocta cum vino &
 aceto emplastri modo imposito. Ad vrinae difficulta- *Vrinae diffi-*
 tem pręnantium millefolium tritum ex aceto, iuxta *cultas.*
 uosdam, bibitur. Ad incontinentiam vrinae, vngula *Incontinen-*
 ori vel suis cinis potioni inspersus iuuat; leporis cere- *tia.*
 rum ex vino potum, vel eiusdem testiculi rosti si
 lantur; anserum trium lingue in cibo sumantur. Si *Ad renes*
 nes ex calore debiles sint, inungantur vnguento *calidos.*
 os. detur conserua ros. Ad alui suppressionem, pruna *Ad alui sup-*
 iunis edantur; iura pinguis sumantur, cochlea & *pressionem.*
 strea, saxatilesq; pisces, panisq; fermentatus. Si
 F F pili

Ad defluui-
pilorum.

De lacte gra-
uidarum ef-
fluente, &
de mensibus
gravidarum.

Superfœta-
tio.

Hercules &
Iphiclus na-
ti ex super-
fœtatione.

pili defluant, valet adeps vrsinus, & quæ de alopecia diximus. Si gravidis lac vltro effluat, fœtum imbecillum esse notatur ex Hippoc. & timendus est abortus, ideo fœtus roborandus, & ea præscribenda quæ abortum impediunt; de quibus suo loco dicturi sumus. Ita quoque si & menses gravidis fluant, fieri non potest ut fœtus bene valeat: tunc enim menses, si fieri potest, retinendi sunt, ne abortus subsequatur. Est autem superfœtatio, quæ tamen vteri symptoma non est; sed res potius naturalis, iuste Aristotele. Nam & vtero gravidas superfœtare, neque fabulosum, neque nouum est; quoniam omnium maximè animalium mulier & equæ gravidæ initum nouere. Cetera (utpote quorum natura more leporis superfœtare recusat) ubi gravidæ existerint, mares contemnunt. Verùm equam haud vnquam superfœtasse cognitum est. At mulieri, quamuis rarò, interdum ut superfœteret, euenit. Ob id qui longioribus temporum impendit, post concepti sunt (altero iam pridem concepto) nihil quicquam proficere queunt: sed dolorem, quo & ipsi, & primus partus intereat, præmaturius continuant. Olim ut vnde tredecim, superfœtata puerperia, corruptione peracta ederentur, incidit. At verò si à primo conceptu secundus proximè secutus sit, paululumq; temporis inter eos intercesserit, quod superfœtati (quasi gemini nasci videantur) absolutum edique potest. Quomodo & Herculem & Iphiclum conceptos esse fabulantur. Sed id etiamnum ex adultera quadam, quæ alterum marito, alterum adultero persimilem peperit, compertum est. Et item Proconesia ancilla eiusdem diei concubitu, alterum domino, alterum procuratori eius perquam similem egegit.

Insuper

insuper quum geminos quadam ferret, tertium superfoetavit, quumq; iustum pariendi tempus instaret, primos vitales edidit, secundum qui obiter diem unum obierat, mense quinto elusit. Altera quum primum inuitalem mense septimo peperisset, mox geminos mensum numero vitæ compotes enixa est. Et adhuc alia iusto partu vnam, alterum quinque mensem emisit. Compluribus etiam id euenisse liquet, et si octauo mense concubuerint, partus mucore opletus exierit.

OBSERVATIO LXVI.

De muliere quinto mense menstruas purgationes habente, grauida, in qua metus erat de abortu; per modum consultationis.

NOBILI matronæ ad quintum mensem grauidæ existenti menses in copia fluxere, quæ aliàs leuissima ex causa etiam primo, secundo, & tertio mense conceptionis abortum passa fuerat; de quo etiam nunc magis metuebat: ideo obstetricem ad nos misit, vt abortus impediri posset. Huic igitur idem consulimus quod etiam aliquando filia Ioannis Theodori Larpardi, Consulis Delphensis, quam etiam molera difficillima laborantē cū metus esset iam de abortu, curauimus; vt videre licet lib. 18. obs. 48. Consulimus, inquā, vt quieta se teneret, & in deliciis versaretur, & vt graueolētiam, onitusq; horribiles euitaret, & res immundas conspectu arceret, & odores graues: nam &

F f 2 abort-

452 DE MVLIERV M MORBIS,
abortum facere tradunt nidorem extinctæ can-
delæ aut lucernæ: tanta est natalium nostrorum
imbecillitas; quibus & obest formido, subitusq.
metus, intemperataque iracundia. Rectè enim
iussit Aëtius lib. 16. cap. 12. de studio prægan-
tibus adhibendo ex Aspasia, Vbi prægnantes
nuper conceperint, obseruabimus ne timore,
mærore, nève vlla validiore mētis perturbatio-
ne afflictentur. Curruum præterea gestationes,
violentaque exercitia, vehementesq. spiritus de-
tentiones & coxendicū percussiones prohibe-
bimus; nec graue onus tollere, nec saltare, nec
duris sellis insidere permittemus. Sed nec acria
flatuosaq. edulia, nec clysteres acutos, nec cibi
& potus vel indigentia vel redundantiam con-
cedemus. Sanguinis etiā defluxus siue à naribus,
siue ab hæmorrhoidibus, siue ab alio quocunq.
loco prægnantibus periculū affert: ideo non sine
ratione metuebat hæc matrona nobilis ob mē-
ses fluentes: nam menstrua purgatione, ita &
fluxionibus albis fœtum in vtero sæpe dimo-
ueri vidimus; vti & saltu, petulanti coitu, ster-
nutamentis, luctu, & similibus. Sed de his la-
tius in Scholio, cū de omnibus causis age-
mus. Alimentis (vt idem Aëtius refert) ergo
vtendum moderatis, & stomacho congruis, le-
cticæ gestatione, leui deambulatione, molli fri-
ctione, lanificio circa octauum mensem, qui
omnium molestissimus est; alimentum contra-
here oportet, & vehementes motiones prohibe-
re: & si alius detineatur ob intestini recti an-
gustias, edulia offerenda erunt ventri subdu-
cendo

endo idonea, veluti ptisanæ succus, ru-
 lixus, malua, lactuca; & mense nono, relaxandi
 corporis gratia, balneo frequentissimè utimur,
 omninoque providebimus, ut paritura futuros
 dolores validissimè toleret. Hæc Aëtius. Sed quia
 hic in quinto eramus mense, fluentibus men-
 truis, maximus metus erat de abortu: ideo eam
 in quiete detinendam esse imperavimus: & ab
 omnibus iam dictis, casu, percussione, pedum
 elevatione, aut brachiorum nimia extensione
 esse caueret iussimus: nam nostræ Batauræ mu-
 lieres nimis ædibus purioribus conservandis
 lectis, & tabularum frictionibus, & ut telæ
 araneorum, tum alia amoveant, curiosæ sunt.
 A publicis item choreis, balneis, nisi in fine,
 tum tussi caueant; & à frigore externo rebusque
 vaporulentis custodiendæ, ne in destillationes,
 rauces, sternutamenta incidant. Ceterum
 cum huic Dominae menses fluere, & aliis so-
 litis esset abortire, præstabat hanc potius esse sel-
 lulariam, quàm ut ambularet. Sed quod ad præ-
 sentem huius matronæ affectum attinet, & au-
 thores, ut Gordonius, si plethora adest in san-
 guinea minus obesse scribunt, nec statim men-
 ses esse constringendos, ubi prægnans non de-
 bilitetur, aut mamillæ graciles non sunt, neque
 motus immutetur: in tali, inquam, casu nihil
 faciendum volunt. Verùm cum hæc nobilis
 Matrona valde debilitaretur, referente obste-
 trice, & mammae extenuarentur, & menses co-
 piosè fluere, nec motum pueri ut antea sen-
 tiret, consului cum Medici præsentis modera-
 tione,

454 DE MVLIERV M MORBIS,
tione, vt menstrua cohiberentur atque restrin-
gerentur. De meo hîc addam, quæ aliàs in casu
prægnantis s. mense fluxu quoque laboran-
tis, vbi metus erat abortus, commodè præscri-
ptissimus, abortu impedito: & coralli rub. boli
arm. veræ, ossium dactylorum, añ. ʒß. detur
cum ouo sorbili duabus vicibus; renes tum-
imus venter inungantur vnguento Comitissæ,
adieccto oleo myrtino, & pauca bolo arm. ad
vnguenti consistentiam. Comedebat dactylos
pingues maturos; & sua viscositate abortum
inhibebant. Pulvere supra scripto adhuc semel
cum vino rubro, exigua mumia adieccta, flu-
xus restringi cepit; nec abortus subsequutus est.
Vel si velint ea sequi, aut processum, quo ali-
quando Bononiæ præceptor meus Elideus in
femina vterum gerente iam per sex menses, cui
vehemens quoque mensium fluxus oborieba-
tur, vsus est, eundem quoque hîc addam.
Primò apposuit partibus infimis mammilla-
rum duas cucurbitulas; nam sanguinem mit-
tere non audebat, iuxta Galenum lib. De cu-
randi rat. per sang. missionem, etiam Hipp.
vetante s. aph. propter abortum. Ex iis statim
menses suppressi sunt, & sanguis fluere cepit è
naribus. Exhibuit tunc haustrum vnum aquæ
portulacæ cum sacch. ros. exiguaque portione
philonij Persici admixta, cuius descriptio est
apud Auic. lib. 5. summa 1. tract. 1. Atque hoc
ad refrigerandum & incrassandum sanguinem
& restringendum, & cessauit fluxus. Viñum
incrassantem constituit, postea eduxit choleram
cum

um rhab. potionem. Cucurbitæ verò sæpius ap-
positæ sunt: sed illa conquerebatur de conuul-
sione mammarum: iussit itaque poni in regio-
ne hepatis. Hæc mulier neque passa est abor-
tum, & tempore postea pariendi completo fe-
citer peperit. At illud non prætereundum
quod Medici aliquando in fluxu isto venam
basilicam incidunt cum foramine exili & paruo,
ut pedetentim sanguis exeat; deinde quoque
ne virtus concidat, & in modico sanguine ex-
eundo magis fiat diuersio. Quomodo autem
etiam in febricitantibus aliquando sanguis mitti
posset, & etiam lenis adhiberi purgatio, aut sal-
tem leniens medicamentum, aliàs ad longum
descripsimus in lib. nostris De febribus. Iam quo-
que cum hæc consulerem, accessit ad me alia
obstetrix cum rustico consultandi causa pro sua
uxore grauida etiam menstrua copiosè habente;
cui ne fieret abortus, imperauimus, ut renes
inungeret vng. ros. imum ventrem vnguento
comitissæ, & ut etiam hac mixtura frequenter
uteretur: & confer. ros. antiquæ, diacydon. sine
specieb. añ. ʒj. trochis. de carabe, de terra si-
gillata, de spodio, añ. ʒj. manus Christi cum
perlis ʒvj cum syr. cydon. q. s. fiat conditum.
Hæc suprâ dicta satisfacere ad rem puto. quæ
si diligenter obseruentur, sperarem, hanc nobi-
lissimam matronâ, Dei nuru, minimè ex abor-
tu periclitaturam, quodque purgationes men-
struæ superflue constringentur, & fœtus reti-
nebitur.

SCHOLIA.

Causæ ab-
ortus.

Exemplum
abortus &
monstrifici
partus.

OMNIA illa quæ à prægnantibus vitanda esse diximus, eadem & causæ abortus esse possunt, quemadmodum sunt incommoda saltationes: nam & pleraque abortum fecere: sicuti scalarum lapsu, velictu, fulgure, tonitru, subitoq; tormentorum sono fit, ac terræ motu; qualis anno 1511. vniuersam Italiam, teste Benedicto Veronensi, à septimo calendis Aprilis vltra quadraginta dies percussit. Pondere item, ac nimia Venere, aut petulanti, partus colliduntur: sanguinis præterea largamissione, vehementiq; ventris deiectione, albi fluxionibus, aut spiritu incluso disrumpente (vt Paulus demonstrat) vulnere item, narium vel hamorrhoidum profluvio, ventris fluxu vel tenesmo. Sape abortum fieri vidimus ardente febre, imbecillitate partus vel puerperij, vel puerpera, vel secundarum angustia, quibus partus strangulatus exit. Vidimus, inquit idem Benedictus Veronensis, anno præterito nobilem Venetam Dionoram Georgiam 7. mense quo partum gestauerat polypum peperisse monstrificum, quem nos dissecuramus: in medio masculinus fœtus integer palmi magnitudine repertus est, quem monstrum illud in sese genitum inter eas angustias accrescere non patiebatur. annexus tamen erat vmbilicus polypo. Fame præterea, vel siti aut crapula, Galeno autore, aut mœrore, plurimas abortum fecisse non dubitamus: balneo item calido, vel nimium gelido partus sape eliditur. Si gemini præterea in vtero sunt sexus diuersi, facile ambo periclitantur, vel saltem quæ femina est, nam imbecillior est: sed plerumque altero enecto, alter pariter

riter menstruali profluvio eiicitur defunctus, ut ali-
quando vidimus. Abortus vel ab evidentibus (inquit *Causæ eui-*
Fernelius) vel ab interioribus fit causis. Evidentes *dentes.*
alia fœtū enecant, ut syncope, timor, & tristitia: &
harū quadam toto genere extinguūt, ut quæ vel suf-
fitu, vel odore, vel substantia venenata sunt. Alia ci-
bum subtrahūt, ut inedia, immoderata purgatio, san-
guinis è naribus, ex hæmorrhoidæ aut aliunde reiectio,
mulier enim sanguine misso abortum facit; idq; magis
si fœtus auctior est. Alia verò acetabula dissolvunt,
per quæ fœtus alimentum capebat: ut violenta ex-
ercitatio, saltatio, durior equitatio, aut vectio, gra-
vioris oneris gestatio, casus violenter concutiens, aut
ventris ictus fœtum contundens: quibus addunt cla-
morem, cursum, coitum ineptum, petulantem, im-
moderatum. Interiores verò causæ sunt cibi immo- *Internæ.*
deratus, & plethora fœtū suffocans, aut extinguens,
mucosus humor vteri implens acetabula, & ligamen-
ta ita remolliens ac dissolvens, ut fœtum continere
non possint. Et huius rei (quemadmodum addit Ron-
deletius) multe possunt esse causæ. Alia enim os vteri
minus claudunt & constringunt, & ob nimiam hu-
miditatem relaxantur. Alia ob sanguinis ferorem
nimis copiosè menses patiuntur, & fœtui adimitur
alimentum. Alia uterum habent minus amplum, aut
quia non potest dilatari vterus pro incremento pueri,
vnde reiiciunt fœtum, alia tercio, alia quarto, alia
quinto mense. Iam quoque cibi mali succi (teste Fer-
nelio) & inde nata cacochymia, ob quam fœtus ali-
menti benignitate destitutus sensim languet & emo-
ritur. Morbus acutus, febris vehemens, tum alia quæ
sæpe fœtum in gravius discrimen, quàm matrem con-
F f 5 iicit,

icit, aliquando simul matrem cum foetu. His addere poterimus vteri affectiones, inflammationes, erysipelata, abscessus, & ulcera. Quacunque igitur mulier citra euidentem causam abortire consuevit, vel totius corporis, vel vteri totius vitio laborat. Id quoque vel ad vterum vel foetum referendum quandoque est: nam penuria, si cotyledones vtero alligatae, aut in dispositione vel impotentia seminis debiles procreatae, & non firmiter ligati foetus vel cotyledones abrum-puntur; & fit abortus, vel ratione vteri ob causas internas, vel oris ipsius; ut ad longum videre licet apud Guainerium in suo commentariolo De aegritud. vteri, cap. 33. De causis & signis abortus. adde quae in Gynaeciorum harmonia habentur. Attamen Bonaciolus videtur distinctionem facere inter corruptiones, effluxiones, abortus, abortus, vel eiectiones. Effluxiones tum corruptiones intra diem septimum incidere ait: tantisper enim genitura instar lactis elabuntur. Abortus primis mensibus conceptu exorso fiunt. Abortus prope pariendi tempus euenit. Quanquam haec quidem (grandiore iam foetu) eiectiones vel eiectiones vuluae dicuntur: illas vero quae intra quadragesimum a conceptu diem contingunt, abortus, illustriores appellare solent. Hinc apud Medicae rei professores haec vocula plerumque confunduntur. Gal. lib. 3. De facul. natural. triplicem causam abortus statuit. Haec quidem, inquit est, aut moles nimia, aut pondus aliquod, aut morsus. Moles, ubi amplius distendi vterus non tolerat: pondus, cum supra vires eius sit quod continet: morsus, ubi vel humores qui prius in membranis continebantur, hincrupti in vterum ipsam sunt effusi, vel etiam totus partus corruptus & putru, ac

Corruptio-
nes,
Effluxiones,
Abortus,
Abortus,
Eiectiones.

Triplex cau-
sa abortus,
iuxta Gale-
num.

in noxiam saniem dissolutus, vteri tunicam eius occasione irritat, ac mordet. Signa abortus praesentis, & quae abortum demonstrant, quamuis sint per se nota; abortum praesagientia interim considerata sunt antequam abortus oboriatur, ut sic abortum deslectamus. Idem rectè dicebat Bonatiolus: Causa quae maturius abortum validè proritare queunt, eundem si praecesserint, futurum indicant. Etenim si mulier saltibus inhumanius iactitetur, desultetq; immodicè, ac potissimum si resiliat, poneq; saltet, aut, ut libuerit, corpore sine ratione & modo moueatur, si immaniter & vastè clamet, si obirascatur, si parcus cibatum abliguriat, si extenuetur, ac precipuè venter, si in balneo calidae aquae vel frigidae moram traxerit; haec tum alia superius dicta si adfuerint & increcant, abortus subsequetur; multoq; certius si iam auctae mammillae detumescent mollesq; fiant, si immites & sine misericordia dolores pregnantem rapiant, si vigor aut horripilatio eandem interdum depræhendat, doleatq; caput, & potissimum oculorum radices: quod si talia quidem satis remissa fuerint, tardè abortum patitur: si intensa valde, & menstrua copiosè erumpant, illico venturum expectato: Lacte ex mammilla continuè effluente, ego in muliere aliquando prognosticum feci, quod hoc argueret foetus debilitatem, paulo post abortum passuram, vti etiam euenit. Futuro abortui (inquit Aëtius) aquea primò euacuatio, deinde saniosa, aut cruenta, & tanquam carniū lotura praecedit: vbi verò planè exolutio, purus sanguis, postea grumi, ac demum foetus ipse vel formatus, vel informis excernitur. plurimis etiam lumborum coxendicūq; grauitas sequitur, nec minus sumi-

Signa abortus demonstrantia per se nota.

Signa praesagientia abortum.

Aëtius lib. 16. cap. 19.

suminis capitis, oculorum dolor, stomachi erosio, extremorum refrigeratio, animi deliquium, febris horrida: quibusdam conuulsiones episthotonica, & epileptica superueniunt; ut nuper vidimus in vxore pharmacopœi abortientis: quanquam & hac præcipuè, iuxta Aëtium, contingunt medicamentorum violentia abortientibus: nam quæ sine medicamentis abortiuntur, præueniunt iis, sicut testatur Hippoc. mamillarum gracilitas præter rationem eueniens, femorum refrigeratio, grauitas lumbos & femora obsidens: omninoq; minus læduntur abortu, quæ saniores, & quæ alui natura laxioris fuerint, & quæ vteri partes humidiores habuerint; quæq; frequenter magnos infantes sine molestia parere consueverint, atque ætate prædicta pauci sanguinis & minimè pingues: sed etiam hæc ad prognostica signa pertinent, vii & hæc subsequentiæ. A coitu si sternuerit mulier, abortiuum est. Ceterum effluxionum prognosticon censetur, si oris vulua labra lauia extiterint, proximè enim seminale excrementum delabi ac effluere præmonstratur. Mulieres solertes post mictionem introsum agunt, labris liquida pice illitis: fœtore namque vterus resiliens attollitur, quo fit vt ostiolum coercetur, sigilleturq;. Abortus verò index equidem euidentis vberum præceps extenuatio, Hippoc. sic dicente: Si mulieri vtero graui mamma subito extenuantur, abortus sequitur: ob defectum alimenti, inquit Galenus in Commenro. Communes quædam vena sunt mamma ac vteris, quæ vbi parum habuerint sanguinis, graciles quidem mammae ostendunt: inedia enim nonnunquam fœtum perimunt, vel ad excretionem excitant. Et ideo

Signa prognostica effluxionum.

Prognostica abortus.

s. apho. 37.

in

in lib. De natura fœtus: Alimentum atque auctio à
 matre veniens non adhuc est sufficiens infanti, quan-
 do decem menses præterierint, & fœtus auctus fuerit:
 trahit enim à sanguine id quod dulcissimum, simul
 autem lactis parte aliqua fouetur. vbi verò hæc illi ra-
 tiora fuerint, & iam infans molem corporis habet,
 plus cibi requirens, quàm illud quod adest, calcitrat,
 & membranas disrumpit. Ita quoq. mulieri vterum 5 aph. 8.
 gerenti si altera mamma gracilis fiat, geminos ha-
 bent, abortit: & siquidem mamma dextra gracilis
 fiat, marem: si verò sinistra, feminam. At quemad-
 modum extenuatis mamillis infans perditum itur;
 sic & perditum iturus est mamma gracilibus exi-
 stentibus, Hippocrate monente: Mulieri vterum ge- 5 aph. 52.
 renti, si lac multum è mammis effluat, fœtum im-
 becillum significat: si verò mammae solidae fuerint fœ-
 tum significant saniozem. Quæ corruptæ sunt fœ-
 tus, his mammae extenuantur. Si verò rursus dura
 fiant, dolor aut mammas, aut coxas, aut oculos, aut
 genua infestabit, & non corrumpet. Vide Galenum
 in Comment. Ita quoque si mulieri grauida men-
 sium purgationes prodeant, fieri non potest, ut fœtus
 bene valeat. Mulieri vterum gerenti si tensio super- 5 aph. 60 1/2
 uenerit, facit abortum: si videlicet circa intestinum 7 aph.
 quod rectum nominatur, tensio sit, seu tenesmus; ita 27 Gal.
 & in difficultatibus intestinorum. nec mirum cum
 & aliis doloribus & moribus soleant abortiri. Ex tem- Quo tem-
pore abor-
tus frequen-
tior.
 pestatibus etiam indicia eleganter trahimus. Etenim
 si hyems australis & pluviosa fuerit, ver autem sic-
 cum & aquilonium, mulieres quibus partus ad ver 3 aph. 23.
 inest, ex quacunque occasione abortiunt: quæ verò
 parient, imbeciles & morbosos infantes parient:
 quare

s. aph. 32.

s. aph. 34.

s. aph. 30.

s. aph. 43.

s. aph. 44.

s. aph. 45.

Soranus, Hip-
poc. lib. De
fœtu.

quare vel statim intereunt, vel tenues & valetudi-
narij viuunt. Causa à Galeno explicatur. Ita & mu-
lier vterum gerens, sanguine emisso ex vena, abor-
rit; & magis si fœtus sit maior. intelligitur de ma-
gna euacuatione. Sed de his latius diximus in lib.
nostro de feb. num sanguinis detractio aliquando
conueniat, & quando noceat. Ita & de purgatio-
ne hunc quoque aph. explicauimus. Mulieri vte-
rum gerenti si aluus plurimum profluat, pericu-
lum est ne abortiat. & quod quarto mense sint
purgandi. Mulierem quoque vterum gerentem, ab
aliquo morbo acuto corripì, lethale: idq; propter fe-
brem fœtum occidentem, & quod tunc ex longis
interuallis cibus datur, ut Galenus longiore sermone
prosequitur: propter morbum acutum scilicet, ut
attonitum, & alios, ob magnitudinem morbi &
acutiem, abortiunt. Sic si mulieri grauida in vtero
sit erysipelas, lethale; nec mirum, cum etiam inflam-
matio id præstet. Rursus quacunque præter natu-
ram, tenues existentes vterum gerant, abortiunt se-
cundo mense, priusquam crassescant. Quacunque
mediocriter corpora habentes, abortiunt secundo aut
tertio mense sine occasione manifesta. His aceta-
bula plena mucoris sunt, & non possunt præpon-
dere fœtum continere, sed rampuntur, sine causa
manifesta, ut sine febre vehementi, alui fluxu, tum
aliis dictis, etiam sine causis procatartictis. Vide
Commentum Galeni. Acetabula autem sunt ora ve-
narum & arteriarum, quæ feruntur ad vterum.
vide Soranum. Certo tempore mulier concipit aut
incipiente semine, aut deficiente. Saltus in primis
septem diebus perimit semen & locellus eicit. Infans
nisi

nisi latum locum habeat, quo nutriatur, agitetur, crescat, macilentum fieri necesse est; utpote qui satis amplum locum ad incrementum non habeat. Eadem ratio est cur modò parui, modò magni nascantur infantes. quemadmodum cucumeres & arbores, & alia quadam germina, si comprimantur, & in angustiis creuerint locis, partim mutila, partim tortuosa proueniunt: ita & fœtus in utero; iuxta ea quæ matri contingunt, vel mutilatur, vel non rectè crescit. Mulier cum concepit, semen extra locellos non exilit; menses non defluunt, siquidem fœtus sanus futurus est, præterquam pusillum primo mense. At quacunque uterum gerentes à febribus corripuntur, & fortiter calefiunt, sine occasione manifesta, difficulter pariunt, & cum periculo, aut abortum facientes periclitantur. Accidit videlicet quibusdam gravidis, in quibus vitiosi humores priusquam cœceperint sunt aceruati, ut nonnunquam à febribus vehementibus corripiantur, ita quòd ex necessitate abortiant: nonnunquam verò mediocribus; sed hæc cum non purgentur, aliquid superest reliquiarum humorum in corpore vitiosorum, ex quibus febres ab initio sunt constitutæ, utpote non potenti- bus Medicis mulieri gravide aliquod forte auxilium adhibere, neque exquisita victus ratione in ipsis vii. Ob hanc igitur causam febris in ipsis frequenter reuertitur, & magna temporis parte grauius se habent. Non sine ratione igitur fœtus aliquando nequit obistere, sed ex febre, & vitio humorum corrumpitur: nonnunquam verò perdurat quidem usque ad tempus partus; sed quum & ipse valetudinarius sit, ut qui longo tempore labora-

Hippoc. lib. De
natura pueri.

5. apho. 55.
Gal.

Numerosi-
tas conce-
ptuum cau-
sa abortuū.

10. partus
minimi di-
giti magni-
tudine.

Que trans-
gressa abor-
tuū faciunt.

laborauerit, & quum matrem habeat imbecilem, non sine periculo paritur. Nam ad bonum partum, duorum corporum vigore est opus, & grauida mulieris & infantis. Numerositas conceptuum, vt recte dixit Bonaciolus, præterea abortum cit. Nam quandam duodecim, alteram duodeviginti, septuaginta alteram (omnibus efformatis) abortiuos abegisse, fabulosum non est. At, quod penitus incredibile censebitur (quamuis Medica rei professus non ignobilis prodiderit) nobilis quædam mulier vna centum & quinquaginta efformatos vitæ compotes, secundis obuolutos, præmatūrè abortu egeßit: quæ cum vermiculos se peperisse arbitraretur, Medicum accersitum iri iussit, quo præsentē diruptis secundis, magnitudine minimi digiti (compluribus motum habentibus) centum & quinquaginta partus connumerati sunt. Sed inter miracula, non sine magna superstitione, Losduyna apud Batauos nostros, prope Hagam Comitibus, ostenditur, comitissam peperisse tot proles, quot numero dies annus complectitur. At cum hoc fabulosum videatur, in omis, in Italia (inquit Bonaciolus) septem, & aliam tres (quod & assidue accidit) quam etiamnum nos ipsi nouimus, abegisse certum est. Sed, quod iam etiam in prodigiosam miraculorum admirationem accessit, viperam mulier prægnans si transcenderit, abortionem sequi produnt. Item amphispbanam mortuam duntaxat: nam viuam habentes in pixide impunes transire, etiam si mortua sit. Et, quo magis miremur, si non asseruatam grauida transcenderit, innoxiam fieri, si protinus asseruatam transcendat. Ouum etiamnum corui grauidis cauendum constat, quoniam transgressus abortus asperas molitur.

molitur. Simili modo castorium fibrumve grandida
 supergrediente, abortum facere dicitur, periclitariq;
 partus si superseratur. Tantum inest semini dracon-
 culi virus, ut olfactum gravidis abortum inferat.
 Plura vide apud Plinium: etiam de rad. cyclamini,
 & quod neutra filix dandi sit pregnantibus; quo-
 niam non solum abortum, sed sterilitatem inducit.
 Ceterum quod mola quoque, ut antea dictum est,
 etiam abortum frequenter inferat, non opus est illud
 repetere. Noui aliquas mulieres humidas habentes
 matrices, decimatertia vice ex tenuissima causa ab-
 ortisse: quod etiam aliquibus contigisse nouimus, qui-
 bus acetabula muco referta erant. hoc est quod Aërius
 lib. 16. cap. 21. De his qui bimestrem aut trimestrem
 abortiunt, dicebat; Quacunque temperati corporis
 mulieres bimestrem aut trimestrem, sine manifesta
 causa, abortiuntur, his vuluæ acetabula muco refer-
 ta sunt; ideo fœtus retineri nequit, sed elabitur, ut
 Hippocrates inquit. Tales antequam concipiant, pur-
 ganda medicamentis pituitam educentibus; & toto
 corpore prius purgato, deinde & utero, victus ratio
 adhibenda est calfaciens & exsiccans, moderata exer-
 citia, & frictiones concedenda, omnisq; refrigerandi
 modus euitandus, ut si ea ratione quoque steriles sint,
 concipiant. & ubi conceperint, ne amplius fiat abor-
 tus, ea quæ semen tum fœtum retineant, etiam ex-
 terius ad vteri constrictionem & roborationem ad-
 hibenda. His verd quæ ob naturalem retentricis fa-
 cultatis imbecillitatem abortiuntur, innata quadam
 proprietate erinacei terrestris corium crematum opi-
 tulatur, si aqua aut vino dilutum propinetur, & pu-
 dendi mulieris orificio illinatur. Idem potest & ma-
 rinus,

Vide Plinium

lib. 23. cap. 10.

lib. 24. cap. 16

& lib. 27. cap.

12. & lib. 29.

cap. 4. lib. 87.

cap. 9.

Quæ abor-
tum inhi-
bent,

G g

rinus,

466 DE MYLIERVM MORBIS,
rius, ac multa viuentes vsta. Item myrri bacca &
vino lentiscinove oleo, aut susino illita: rubi etiam,
myrri, & similium decoctis loca vtiliter irrigantur.
Aëtius præterealapis super ventrem gestatus prægnan-
tes fœtusq; conseruat, nec sinit vuluam emollescere.
Item tritici granum, iuxta eundem Aëtium, quam-
uis superstitiosum, intra panem inuentum sinistro
brachio alligatum. vel sardonius lapis prægnanti su-
mini, vsque ad pariendi dolores, cum filo suspenda-
tur; & vbi partus accesserit, auferatur: vel lapis in
vulua aut corde, aut intestinis ceruarum reperi-
tus pro amuleto gestetur: est enim ad retinendos fœtus
remedium efficacissimum. Easdem vires habet lapis
trunco arboris cunei more impactus.

OBSERVATIO LXVII.

*De prægnante vomitum enormem habente,
unde abortus metuebatur: & de altera
alui profluuiolaborante.*

MYLIERI prægnanti cum vomitum enor-
mem pateretur, ne abortus fieret, de
quo erat metus, omni mane cochlear vnum
atque alterum syr. de ribes, modò de agresta
exhibuimus; ita vt statim sanata, nullo modo
abortierit. Alteri quoque prægnanti cum aluus
multum flueret, & periculum abortus immine-
ret, (ex mente Hippoc. & aph. 3. lib. 5. superius
citato) commodè alicam in lacte caprino co-
ctam dedimus, & panem filigineum nauticum,
tum pira immatura exhibuimus, & casum ve-
tustum,

istum, iecur gallinaceum assum (quod vtiliter
in cibo datur) & merulam, & palumbum fe-
rum ex posca coctum, ouaque dura, & mala
pydonia: iis alius sistebatur, abortu minimè
subsequente.

SCHOLIA.

¶ VM varia sint causa ex quibus abortus subsequi
possit; quantum ad curationem attingit duplex
hic scopus in vnaquaque causa tollenda statim exori-
ur, primò prohibendo ne abortus fiat, si possibile sit.
& hic scopus in se continet pregnantis optimam gu-
bernationem, & conseruationem: de qua ex parte
diximus Obs. 66. precedente, & de victus ratione, &
quibus modis illa ipsa ab abortu custodietur. Enim-
erò aërem temperatum inhabitabit, in primis
mensibus sese custodiendo à laborioso exercitio, ne li-
amenta debilia abrumphantur, & somno temperato
retur. & si alius restricta fuerit, non nisi manna
aut clystere ex iure pulli cum oleo communi vel sac-
charo laxanda: accidentia animi omnia fugienda:
pretiosos lapides apud se porret, sapphyrum, hyacin-
thum, adamantem & turchesiam; fugiendo cibaria
periculosa, de quibus diximus. Et quia in pregnantē ma-
teria corruptæ detinentur, & ad stomachum fluunt,
causam inferunt, & vomitum & inappetentiam;
ventriculi ratio habenda, & is roborandus, ut Scholio
Obs. 65. huius libri diximus, ubi egimus quibus mo-
dis & accidentia pregnantium sint corrigenda & tol-
lenda. Roboratur stomachus, ut ibidem diximus,
oleo maslich. cotoneor. adiect. pul. corall. rub. men-
the, & similibus, cera pro vnguento adiecta; & dia-
G g 2 marga-

margariton, iuxta Auic. & qua simul ad pedum inflationes faciunt in pragnantibus, ibidem docuimus, & ad renum debilitatem, quibus potissimum pragnantes afficiuntur. Secundus scopus potius pertinet ad fœtum mortuum; tunc enim abortus inuandus esset, vel ob matrem, ubi de eius morte timeretur: sed de eo postea. At primus scopus, de quo nunc agimus, maximè nobis utilis est, ut, cognitis causis, ob quas abortiri solebat, eas ante impragnationem quouis modo tollamus, ne ob eas causas impragnata amplius abortum patiatur. Deinde ea ipsa impragnata ne abortum faciat præsueretur. Si igitur mulier propter extenuationem aut debilitatem abortire consuevit, omnibus modis, tum viæ institutione ac victus ratione, ante impragnationem erit impinguanda & roboranda. Eadem quoque impragnata, si metus sit abortus ob eandem causam, vel ob inediam aut famem, resumptiuo victu utatur. Oportet enim pro causarum varietate remedia inuenire, quibusdam quidem ante conceptum, aliis verò post. Si ex nimia amplitudine vteri, quomodo is sit coarctandus suo loco diximus. Si ex intemperie aliqua vteri; nam calida absument nutrimentum, quo fœtus alii debet, multoq; magis sicca; frigida congelat & debilitat fœtum, humida nimis relaxat; quomodo ista intemperatura corrigantur, iam diximus prius, quando de sterilitate loqueremur. Si à ventositate, quomodo evitari debeat abortus, dictum est prius de spiritu in vtero retento & vteri inflatione: cauendo tamen ne valde diuretica exhibeamus, ut superius ostendimus exemplo mulieris impragnata à nobis curata, cum tormina ventris pateretur. Cum enim abortus in

Præseruatio
atque cura-
tio abortus
ab extenua-
tione vel de-
bilitate.

Ex nimia
amplitudine
vteri.

Ab intempe-
ric.

A ventosi-
tate.

tribus

ribus primis mensibus saepe contingat, inquit Alboali
 filius, à ventositate, tunc in cibis utantur speciebus di-
 ctis: & cinnamomi electi ℥j. caryoph. nucus moscha-
 ta, cardamomi, añ. ℥ij. zin℥. ℥β. piperis ℥j. croci
 ℥β. Ventositas ubi multiplicetur, ita ut abortus me-
 tuatur, utatur diagalanga. & ut ad caput ascensus
 vaporum prohibeatur, fructus stipticos, ut pira, coto-
 nea, mespila, & similia in fine pastus semper assumat;
 vel ex confectiōe diacydonite, vel de coriandris sac-
 charo modicè in crustatis aliquid capiat. Si vitio uteri
 abortus metuatur, ex eiusdem ulceribus, abscessu, in-
 flammatione, erysipelate, ob uterum paruum auc-
 densum, ex propriis locis curatio petenda. Ad erysipe-
 las, vel ignem sacrum, terrenos vermes quidam ex
 aceto illinunt, aut oua cocta trita cum oleo impo-
 nunt, & ouorum trium calidam pari mensura amy-
 li. Ad densum quidem & constrictum uterum ea
 quae dilatant, ut balnea quidem relaxantia, conue-
 niunt. sed id ubi in utero gestant, ut dictum est prius
 ex Rondeletio, cum animaduersione, ne talia laxan-
 do abortum faciant: ideo subinde adstringentia ad-
 demus, vel us per intervalla utemur; uti est oleum
 mastichinum, lentiscinum: emolliunt ista quidem,
 sed simul adstringunt. At mulieres quae ob nimiam
 humiditatem solum retinere non possunt, eas ante
 conceptum pilulis ex hiera & de aromatibus purga-
 bimus, & uterum exterius quoque exsiccabimus, pi-
 tuitam digeremus & purgabimus cum pilulis alephā-
 ginis. Insestiones praeterea utiles sunt, quibus conco-
 ptus futurus custodiri potest, & balnea quoque iu-
 vant, qualia in agro Patauino sulphurata, ac bitu-
 minata, vel in agro Bononiensi, vel Alexandrino in

Ad sursum
 humorum
 vapores pro-
 hibendos.

A vitio
 uteri.

Ex nimia
 humiditate,
 vel ex fluore
 albo.

Utum in
gravidis
purgatio vel
venæ sectio
fieri possint.

Liguria: iis certè abortus eua fere plures feminae. Periculum abortiendi initio & sine est maius: à quarto mense ad septimum vsque non metuit Hippoc. neque poriones; ita quòd & quartus & septimus à formidine non sunt tuti: ternis intermediis mensibus, obnixè radicatur fœtus, & secundarum exstantes carunculae acetabulis hærent. Quarto mense vsque ad septimum si materia turget, purgare licet, iuxta Hippoc. sed non fortibus. At utrum alius prioribus mensibus purgatio conueniat, etiam in vltimis, tum venæ sectio, quæstionem hanc lib. 2. nostro de feb. obseruationib. 28. & 29. & Scholiis earundem ostendimus. posse scilicet fieri, auctoritate aliorum, & præceptorum nostrorum experientia, cum mitiora habeamus pharmaca, ut mannam, pruna, tamarind. rhab. quibus & nos, tum alij, re urgente, frequenter vsi sumus sine periculo, semper cum cautione. Sed à casta abstinemus, cum à renibus purget, ut alias diximus. Quare licet Hippocrates & Galenus eo quòd venæ secta in uterum gerente, abortus fiat, à venæ sectione abstinendum dixerant; videmus tamen nostro seculo peritissimos Medicos non solum in 5. & sexto mense venam feliciter in prægnantibus secuisse; sed etiam in primis & in vltimis: quod & nos non semel, sed sæpius fecimus, in pleuritide, angina, peripneumonia, & alijs grauioribus morbis, non modò ut abortum non perpesse fuerint, sed euidentissimam vtilitatem ex venæ secta senserint. Confirmatur proinde auctoritas Benedicti Fauentini præceptoris mei, & Elidei, ac aliorum quoque illustrium Medicorum, Amati ac Iacchini, ut in lib. nostris Obser. De febribus ad longum ostendimus. Adhibenda tamen semper cautio, ne

vires

ires deiciantur in pregnante, maxime in principio
 & fine. à quarto ad septimum minus vereri oportet,
 sanguine tamen in minori quantitate extracto, quàm
 in aliis. vide lacchinum de acutorum morborum cu-
 ratione, qui hanc rem egregie tractat. Quamobrem
 si ob sanguinis acrimoniam foetum reiciant, inquit
 Rondelcius, pargetur ante conceptum rhab. myrob.
 syr. ros. Utatur victu incrassante sanguinem, & ob-
 tundente acrimoniam. Post conceptum inungat par-
 tem renum vng. sequenti: R. olei ros. omphac. cydon.
 añ. ʒiij. cerusa lota in aqua ros. ʒß. rad. bistorta,
 coralli rub. añ. ʒij. sem. berberis ʒj. ceræ albæ q. s.
 fiat vnguentum pro renibus. Hoc ceratum etiam pro-
 batur ab aliis: R. mastiches ʒß. ladani ʒij. ceræ ci-
 trin. ʒij. bistor. nucum cypressi, hypocist. acaciæ,
 sang. drac. terræ sigillatæ, ros. rub. boli arm. añ. ʒj.
 ß. fiat ceratum, adiecto oleo myrr. & tereb. ut me-
 lius adhereat. Valet etiam si ex ea causa timeatur
 abortus. Emplastra tamen hic seu cerata minus con-
 veniunt, quia magis calfaciunt minusq; refrigerant.
 Quæ nimium sanguine abundant, quia natura gra-
 uata quantitate, aperit orificia venarum & multum
 sanguinis reicit, deinde foetus ob penuriam alimenti
 vel moritur vel reicitur, his ergo quæ propter hanc
 causam solent abortire, vtilissimum est sanguinem
 trahere ex vena cubiti interna, & ut minus plena vi-
 ctus ratione utantur, præscribere. Ungantur renes &
 regio vteri vnguento præscripto ad sanguinis seruo-
 rem, ut partes refrigerentur, quæ ob nimium san-
 guinem incalescunt. Sanguinis etiam missio in eius
 seruore & acrimonia fieri potest, sed minori quanti-
 tate, pro ratione habitudinis & sanguinis. Si mulier

Si ob san-
 guinis acri-
 moniam
 fiat abortus,
 quid facien-
 dum.

Si ex nimio
 sanguine ab-
 ortus fiat.

472 DE MULIERVM MORBIS,
multum sanguinis consueuerit reicere tempore men-
sum, plus sanguinis trahere oportet; id tamen non
unica vice, sed interpositis 10. aut 15. diebus, aut
mense vno vel duobus; idq; 4. 5. 6. 7. mense, quam-
uis Hippocrates à quarto tantum mense vsque ad 7.
uterum gerentes purgari posse scribat; quod in mor-
bis acutis faciendum dixit. Neque etiam formidan-
dum quod Hippoc. mulierem abortire ob sanguinis
missionem dixerit; quod est intelligendum de mulie-
ribus habentibus parum sanguinis, aut imbecillioribus.
Nam experientia constat, mulieres, quæ sunt fre-
quenter passæ abortum, hoc remedio retinuisse fœtum.
Non solum autem ad retentionem fœtus (inquit idem
Rondelerius) sed etiam in his quæ difficile pariunt,
sanguinem nisi cum summa utilitate. Nam cum
fœtus abundat multo sanguine, in magnam molem
crescit, maximè his quæ amplum uterum habent, &
postea ob magnitudinem exire non potest. Sed de dif-
ficili partu plura suo loco.

OBSERVATIO LXVIII.

*De fœtu mortuo, cum intensissimo dolore
ventris inferioris, cum stranguria
& dysuria.*

ELIZABETHA Henrici, vxor Magistri Iohan-
nis cognomento Buggen, apud Delphen-
tes cereuisiarij, pro cuius ædibus trifolium in-
signe erat, hæc ad quintum mensem ferè graui-
da existens, incidit in diuturnum fluxum men-
struorum. Pro quo symptomate depellendo
confu-

consultuit Cornelium Ericium collegam meum;
& tandem fluxus ille paulum videbatur repres-
sus; paulo post rediens, innox iterum constructus.
Ea verò debilis existens ex naturali intemperie,
in domo perflatili, vtero iam aperto per conti-
nuam mensium purgationem, circa illos qui
pereuissiam ferebant, valde laboriosa, multos
datus in vterum excepit, ita vt vehementissima
ormina oborta sint, vt abortum metueret, sta-
tim quoque accersita obstetrice. Sed cum par-
us non subsequeretur, dolores paululum sese
remiserunt; attamen motum fœtus vt antea
non sentiebat. Quare cum Cornelius Ericius
beregrè profectus esset ad 11. Octobris diem
anno 1569. hæc ipsa me vocauit. Aderat tunc
dolor rursus intensissimus in imo ventre & vte-
ri regione, & simul stranguria ac dysuria; ita vt
de abortu futuro, vel potius de fœtu mortuo
suspicio esset; quanquam illa hoc tempore di-
cebat, motum se exiguum infantis sentire, at
vix effatu dignum. Sed cum aluum non depo-
neret, neque medicamentum aliquod adhibere
audebam, glandem sequentem ad aluum irri-
tandam subiicere iubeo: & pul. hieræ picræ ʒ
j. pul. cumini, ob ventositatem, ʒ ʒ. salis exi-
guum, fiat glans seu suppositorium. pectinem
pro dolore & dysuria inungebat oleo anchino,
parte vna, & parte dimidia olei amygd. dul.
quibus dolor paululum mitigatus est, & libe-
rius vrinam reddere potuit. At 13. die Octob.
cum rursus lotium cum dolore redderet, potu
sequenti utebatur: & rad. maluæ ʒ ʒ. folior. mal-

G g

uæ

uæ m. j. sem. anisi ʒ j. β. hord. mund. p. j. sem. 4.
 frig. maior. (ob vrinx acrimoniā) sem. pap. albi.
 añ. ʒ j. coquantur in cereuisia communi pro lib.
 j. Dulcia hæc planè abhorrebat, ob metum suf-
 focationis vteri, qua solita fuerat laborare. Ex eo
 decocto dolor nonnihil mitigabatur. 14. die cū
 rursus aluū non redderet, glande leuiter solueba-
 tur. Sed cū in vētre inferiore duritiem quan-
 dam perciperem, hoc linimento vt pecten in-
 ungeretur mandauī: & olei amyg. dul. viol. pin-
 gued. gallinx, añ. ʒ iij. olei ros. ʒ ij. misce. Eodem
 die sub noctem rediit collega, & is iterum voca-
 tus fuit. Eidem, tum mihi suspicio erat de fœtu
 mortuo, cū motum infantis amplius non sen-
 tiret. Ad dolorem tamen sedandum, qui rursus
 vehemens erat, præscripti sunt sacculi duo: &
 maluæ m. iij. flor. chamæmel. meliloti, añ. m. ij.
 seminis lini ʒ β. parietar. artemis. añ. m. j. misce,
 fiant sacculi duo quadrati intersuti latitudine 8.
 digitorū, & longitudine 10. Sed eo tempore non
 vsa est sacculis. 15. Octob. cū valde doleteret in
 lumbis, eos yng. ros. inungi iussimus. nulla ade-
 rat febris. 18. Octob. valde debilis erat, & men-
 strua plus æquo fluxere: exhibita est conser. ros.
 At dolor quotidie magis intēdebatur, & maio-
 rem suspicionem concepimus de fœtu mortuo
 vel corrupto; & cepimus inter nos disserere, num
 prouocandus esset; eoq̃ue magis, quòd aquosa
 materia, quæ partum præcedere solet, & muco-
 sa in lotio conspiceretur, & liquor sanguineus
 efflueret. & ita cognouimus quòd abortiendi
 tēpus instaret, cū aqua primum saniosa pro-
 fluobat

fluebat loturæ carniū similis, deinde cruenta;
hinc purus sanguis, postea grumi; qualia dixi-
mus Scholio Obs. 66. huius libri abortum iam-
iam instantem præcedere. Postea ceperunt om-
nia ingrauescere, ita ut de fœtu extincto vix du-
bitaremus. Quum enim extinctus est fœtus, &
diu in utero subsistit, commemorata omnia, quæ
superiùs de futuro abortu sunt dicta, magis in-
grauescunt, adsuntque stomachi morsus, animi
deliquium, capitis & oculorum dolor, frequens
horror febrilis (qui aderat hoc tempore, & prius
non adfuerat) spiratio fœtida & graucolens,
veter grauis, & quasi procidēs, & qui etiam ad-
mota manu frigidus percipitur. Imò hîc obste-
trix immixtis digitis frigidam animaduertit ute-
ri ceruicem. Interdum conuulsiones oboriuntur
epilepticas finitima. Sed & secundum Guaine-
rium, fœtum mortuū cognosces, eo quod mo-
tus eius non percipitur amplius, ac oculi mulie-
rum profundantur, & fusca eorum albedo fit, &
circa umbilicū dolor atrocissimus ad pectinem
vsque vrget (ut in hac erat) & cum à fœtu ipso
mortuo inferiores partes comprimantur, stran-
guria (qua & hac laborabat) & tenesmus acci-
dit, sæpe rigent, & interdum aures ac narium
extremitas ut labia denigrantur, tumescit facies:
& venter, si fortè non detumescat, mollis fit ta-
men. Quod si ventrē, super latus prægnans dum
iacet, manu compresseris, rem duram de latere
in latus quæ monetur percipies. Similiter & su-
men pectinemque, qui antea calidus erat, nunc
frigidum inuenies: & si fœtus putrefactus
sit,

476 DE MULIERVM MORBIS,
sit, eidem anhelitus olet multum : cum quo si
mulier diebus quatuor vel ultra in partu labo-
rauerit, certior multo fiet, ceteris signis præscri-
ptis diligenter animaduersis. Cùm igitur mu-
cosa & cruenta exirent in hac muliere, & liquor
sanguineus efflueret, ideo statim sacculos supra-
dictos, in vino coctos & expressos, vt appone-
rent suavisimus : sed antequam decocti essent,
paulo post sub meridiem pars caluariae infantis
cum maximo dolore, vnà cum fluxu vehemen-
tiore, profliebat ; indubitatum signum non
solum fœtus mortui, sed etiam corrupti. Ideo,
adhibitis sacculis, & portione sequenti propina-
ta, totum fœtum mox corruptum peperit, vel
abortiuum corruptum : & pulegij regalis m. j.
cinnamomi electi ʒ j. β. daronici Romani, cas-
tæ lignæ, añ. ʒ β. lapid. dactylor. ʒ j. β. intern.
lapidum persicorum ꝑ ij. seminis viol. ꝑ j. re-
rantur modicè, & bulliant in lib. j vini Rhena-
ni optimi pro ʒ ix. capiebat statim cyathum
vnum, & sub noctem alterum; atque hora no-
na sub noctem reiecit fœtum mortuum & om-
nino corruptum. At remansit secundina: quam
cùm parere non posset, decocto superscripto
adiecimus sabinæ m. j. Et 19 die sequenti, post
eiectum fœtum, cùm adhuc secundina rema-
neret, addebamus m. j. foliorum dictamni cre-
tici. verùm secundinam adhuc parere non po-
tuit. Eo tempore Heyla, obstetrix bene ex-
ercitata, nobis narrauit de puerpera cui post
partum remanserat secundina, quòd per partes
sine remediis paulatim corrupta exierit, maiore
tamen

tamen parte in utero remanente; quæ tamen ipsa postea ex puerperio repurgata, & tempore puerperij absoluto templum adeundi, inter eundem ad templum, excidit. Ita & huic evenit. Sumens enim ex potione superscripta, tandem per partes corruptam secundinam reiecit. Sed eodem tempore Cornelius Ericius, collega noster, narrauit, Traiecti mulierem prægnantem fuisse, quæ per nouem annos ossium particulas tum fœtus corrupti reddiderit; ut à Medicis fide dignis accepisse se affirmabat. Neque minus admiratu digna historia memorabilis, quæ annexa est sub finem libelli Observationum Remberti Dodonæi, de muliere, quæ annis tredecim in utero gestauit fœtum mortuum, vel potius sceletum fœtus mortui, quod tactu cum ab ipsa matre, tum ab omnibus illi præsentibus percipiebatur: eaque narratio scripta est ad Matthiam Cornacem ab Ægidio Hertogio Medico. Similiter & altera historia adiecta est, ab Achille Gassaro ad eundem Cornacem missa, de gestatione fœtus mortui, post integrum annum, tempore partus iam præterito. Vtraque tamen postea supervixit. Nostra quoque, de qua nunc loquimur, rectè sanata, etiamnum cum hæc rescriberem, anno 1589. mense Decembri, rectè valebat, & nunc cum recensco, anno 1593. bona utitur valetudine.

SCHOLIA.

VBI timore matris, aut fœtus, vel propter mortem fœtus, aliquando cogamur abortum provocare

Theod.
Priscianus.

uocare, vel *foetum corruptum aut mortuum depel-
lere*; id nunquam faciendum est nisi re urgente in
tali casu. Hinc rectè Priscianus dixit, Abortuum da-
re nulli fas. Enimvero ut ipse Hippocrates attesta-
tur, tam diri reatus conscientia, Medicorum innocen-
tissimum non decet maculari. Sed quando matricis
vitio, aut ætatis propria, frequenter eueniat ut par-
tus aut femina periclitentur; expedit pregnantibus
in vitæ discrimine constitutis, vnius partis sæpe iactu-
ra salutem alterius mercari certissimam: sicut ar-
boribus arescentium ramorum accommodatur salu-
taris abscissio: & naues pressæ onere, cum graui tem-
pestate iactantur, solum habent ex damno reme-
dium. Sic quoque Guainerius ob duas tantum cau-
sas Medicum abortum facere posse iudicat; quando
metus est de matris morte, vel ubi *foetus iam mor-
tuum est*: tunc enim excusatur Medicus pius ab ipso
Hippocratis iuramento. alioqui fas non est *foetum
corruptum aut abortum procreare*. Infinita autem
prescribuntur à Medicis medicamenta quæ abortum
faciunt. eadem enim quæ *foetum corrumpunt, &
mortuum educunt, abortire faciunt*. *Foetum cor-
rumpentia* Aëlius lib. 16. cap. 18. ex Aspasia anno-
tauit, opposita offerens iis quæ de studio pręnantium
egit ut *foetus retineri possit*. Hic videlicet contrario
modo iubet, ut vehementissimis motibus ageretur, ut
saluat, ut grauisima onera gestare enitatur, utq; de-
coctis urinam & menses cientibus, atque aluum sub-
ducentibus iugiter utatur, & acrioribus clysteribus
ventrem abluat, in balneo etiam sumen & pubem
singulis diebus perfricando, in labro tepidiori aqua
pleno diutius immorando, in scenugraci althæa,
artemi-

remissa decocto . emplastra adhibet ex cyclamine,
 remissa, elaterio, & similibus: & carycas cum ni-
 ro, aut simile quippiam, in sinum pudoris ponit: vio-
 lę albe semen, nigrum, & absinthium in vino de-
 cocta præbet: cum alia, ut apud eundem, & Guai-
 acerium, tum alios videre licet; & quæ à Moschio-
 ne, Cleopatra & aliis scripta sunt in harmonia Gy-
 nacisrum. Hæc enim non nisi peritæ Medicis cogni-
 ta esse debent, ut fœtum emortuum expellere sciant
 ubi opus est. quibus illa addere possumus, quomodo
 corrupti fœtus eiectioni auxiliari oporteat, ex eo-
 dem Aëtio lib. 16. cap. 20. Vbi fœtus abruptus
 fuerit, si in uteri collo detineatur, ligustrino oleo te-
 rebinthina admixto in totum corpus, sed præ-
 cipuè in partes utero adjacentes persundi oportet:
 eodem ligustrino oleo, etiam excreto fœtu assidue
 loca irriganda sunt. Si verò id parum successerit,
 mulier aromatum decocto insidebit, atque interini
 sternutare cogetur, ac resina arida, bitumine pro-
 poli & cancris fluuiialibus aridis sufficitur. Hæc &
 alia huiusmodi facienda erunt, si inflammatio non
 obstiterit: nam ea infestante, intra sessiones, quæ re-
 mittendi, mitigandique vires habeant continebi-
 mus; & si fœtus detineatur, quod uterus absque in-
 flammatione oclusus persistat, papyrum quoque &
 spongiæ exurentes, pessuli modo, primò tenuio-
 res, postea crassiores, imponemus, atque extrema
 opoponace, vel radice eius è melle vel terebinthi-
 na trita illinemus. Excreto autem fœtu, si locus
 adhuc non abscesserit, violenter euellendus non est,
 neque tamen umbilicus incidendus, & locus di-
 mittendus: summa enim suffocationes & certa
 perni-

Quomodo
 corrupti fœ-
 tus eiectioni
 auxiliari
 oporteat.

480 DE MULIERVM MORBIS,
perniciēs, si id feceris, consequetur. Sed si tam gra-
ue incommodum protrahatur, vmbilicum incisum
femori mulieris alligare oportebit, omniq, studio co-
nari, vt locus abscindatur; quemadmodum inferius
idem de sectione foetus docet. Verū: cum hac ad chi-
rurgos pertineat, id peritis relinquendum est. cuius
doctrinam quoque si videre libet, lege filium Aboali
21. terij.

OBSERVATIO LXIX.

*De partu facilitando, in nobili Domina
etiam ictero laborante.*

DOMINA de Schagen, cum pręgnans in no-
no mense esset, ac tempus legitimi partus
instaret, & simul ictero laboraret, sine febre ta-
men, ad eam in pago in arce sua Schagenſi agen-
tem, anno 1548. cum Alcmarię tunc habita-
rem, accitus fui. Hoc itaque clareto seu vino
Hippocratico assumpto manẽ & meridie hora
quarta, quinto deinde die post assumptum cla-
retum feliciter peperit, & simul ab ictero libe-
rata est. Claretum, inquam, tale erat: ꝛ capill.
ven. verbenę, artemisię, prassij, pulegij, añ. p. j.
calami arom. incisi ꝓj. ꝑ. croci orientalis ꝑj.
cinnamomi electi ꝓꝑ. cum vino Rhenensi pu-
ro, addendo sacchari ad saporem q. s. fiat clare-
tum secundum artem, pro pinta vna. Illud au-
tem ad partum facilitandum non adhibuissem,
nisi Luna noni mensis præterisset, iuxta præ-
ceptũ Benedicti Fauentini, charissimi mei præ-
ceptoris, qui ita in sua Empirica cap. 45. ad fa-
cilitan-

facilitandum partum, & ad mitigandum do-
 lorem eius, nobis scriptum reliquit: Ad facilem
 partum reddendum consulo, quòd nullus Me-
 dicus se intromittat, nisi posteaquam prægna-
 nsa fuerit lunam noni mensis suæ impræ-
 gnationis.

SCHOLIA.

MULTI morbi (vt hic icterus) cum partu finire Morbi multi
cum partu
liniunt.
 solent, quemadmodum & Amatus refert cen-
 tur. 2. curat. 51. de muliere vterum gerente dysen-
 teria laborante, qua cum gestationis nonum men-
 sem aggredereetur, dysenteria lethali corripì cepit,
 qua nullis prasidiis domabatur. At quum pateret illico
 dysenteria restricta est, & illa paulatim sanitatem
 consequuta fuit. Alteram nouimus, inquit idem, pra-
 gnantem sex mensium, qua cum dysenteriam patie-
 batur, abortiuit, & sana facta est. Dysenteria ante
 partum salubris ab Hippocrate iudicata est: quod ve-
 rum esse historia Amati testantur. Ita & ego ali-
 quando etiam Dominam de Harnes prægna-
 tem dysenteria laborantem habui, qua etiam restituta fuit.
 Ita enim Hippoc. lib. 7. De morb. popularibus memo-
 ria commendauit: Epicharmi vxori ante partum
 dysenteria, dolor, alui egestionis subtruenta, mucosa:
 ubi peperisset, statim sana erat, diuersionis fortè ra-
 tione. Ita & huic nostra Domina de Schagen eue-
 nisse puto icterum solutum post partum, viis iam so-
 lutis ac apertis per diuersionem, materia deinde per
 vterum euacuata. Ad facilitandum partum praeceptor
 meus commendat hoc condimentum alternis diebus Ad facili-
tandum
partum.
 sumptum in cœna: R. gran. iuniperi, granor. lauri,

H h

añ.

482 DE MULIERVM MORBIS,
 añ. nuni. vij. castæ liguæ 3. s. cinnamomi integri 3. j.
 omnia simul ponantur in ventre tartari pinguis &
 carnosus, deinde coquatur in veru cum pinguedine
 pulli, & patienti mulieri pro esu dabis. Memini quod
 ego anno 1554. die 13. Nouembris Christianæ uxori
 Iohannis Philippi de Eide Flandri, Mathematici in-
 signis, cum vir à me consilium peteret pro partu sa-
 cilitando, partu instante, consilium dedi ut quinque
 aut sex grana iunperi cum sicibus darentur: quibus
 eum quinquies aut pluries vsa esset, mox, ut ipsa mihi
 retulit, conamina partus apparuerunt, adeo. (quod &
 dictum mirabile est) illa ipsa cum maxima facilitate
 gemellos feliciter pepererit; & ego eo tempore vnus
 de fonte susceptor fui. Habes apud eundem præcepto-
 rem meum Benedictum Fauentinum vnguenta rela-
 xantia, linimenta, fomenta quoque ipsius pectinis; ut
 apud ipsum ad longum videre possitis. Facilitant quo-
 que partum ea quæ ad difficiles partum præscribuntur,
 ut exemplis subsequenibus clarius innotescet.

OBSERVATIO XXX.

De partu difficili ex magnitudine fœtus.

Vxor Iohannis Reyneri, mulier Alcmaria-
 na, cum anno 1549. mense Martio in par-
 tu periclitaretur, & ob magnitudinem fœtus
 parere non posset, quod id & aliis annis præce-
 dentibus eidem cōtigerat semper dum pareret,
 ab ipsa, tum astantibus mulieribus intelleximus.
 Nam & hoc notatu dignum à mulieribus lon-
 go vsu obseruatum, quod viti quænumeros la-

tos

is habent, plerumq. magnos fœtus generant. Vinc Iodoca Teylingia, seu Iusta, fœtus mea-
 x viginti proles ex marito suscepit, filias
 as collocare nolebat viris humeros latos ha-
 entibus; vti maritus huius mulieris habebat,
 r etiam crassus. At verò proceritatis & impro-
 fa magnitudinis partuum, Medici aliam cau-
 m referunt, vt postea latius in Scholio diduri
 mus. Ceterum ad hanc, cum parere non pos-
 t ob magnitudinem fœtus, accitus sum. Cum
 que aluum duriores haberet, glande eam
 oluebamus. Mox ad ampliandum vterum &
 laxandum, vt oleum sequens per obstericem
 funderetur, & vt intus atque exterius eodem
 leo inungeretur, præcepi: & olei amygd. dul.
 minis lini, lilior. viol. añ. ʒ. j. ꝑ. mīsc. hoc ca-
 plasmate etiam ventri post inunctionem ad-
 o, ac pectini ipso; & farina hordei m. j. ꝑ.
 mucilag. sem. lini, fœnug. althææ, malvæ, añ. ʒ.
 olei amygd. dulc. lilior. viol. añ. q. s. fiat ca-
 plasma; & cum decoctione earundem her-
 arum, addito fœnug. & sem. lini, aliisque vn-
 tuosis, fiat fœtus: quibus partes vteri relaxa-
 antur, & partes inferiores magis subsequen-
 s fiebant. Sunt autem inungendæ partes pe-
 inei & caudæ. Nam eas dilatari ad meatus
 amplificationem oportet, non autem os pubis,
 quod firmiter per cartilaginem ligatum est,
 & per ligamentum transversum parte inferiori
 positum. Sed cauda cum osse sacro articu-
 lata est, vt extra moveri possit, ad ani & vteri
 amplificationem. Quam ob causam mulieres

H h 2

non

non debent inniti illa parte, sed lumbis vel coxis, vel debent sustentari viris fortioribus per brachia. Nostræ Delphenses obstetrices habent mulieres fortes ad sustentationem destinatas, ut prægnantes in sinu sedeant, vel potius libere sustineantur, ut sic facilius parere possint. Nam cum sedent vel decumbunt, illius ossis (ut rectè quoque Rondeletius dicebat) amplificatio impeditur. Vtilissimum est etiam rectum intestinum vacuum esse omnibus recrementis. Quare si mulier non exonerarit aluum, balanis sollicitanda est potius (ut nos in hac fecimus) quam clystere, quia uterum constringere posset. sed balani acrimonia facultatem expultricem mouet, & stercus ac fœtum aliquando propellit. sic mihi sæpe euenit ut solo balano indito mox fœtus subsequeretur, & parerent: uti uxori Alfueri Chirurgi Delphensis. Cum itaque locum iam dicta, perineum & cauda, oleis pinguibus dictis inungerentur ac fouerentur, sternutamenta quoque incitauimus, ut vi illa commodius pareret, & ut potionem infra scriptam simul per os sumeret mandauimus: & ceruicis Anglicanæ, qua delectabatur, cyathum magnum, butyri ℥ ij. ꝑ. olei amygd. dulc. recentè expressi ℥ j. aquæ chamæmeli, lilior. albor. añ. ℥ j. ꝑ. totum tepidè cum ebibisset, maximam partem euomit; at reliquum cum continuisset, non diu post peperit feliciter, cum violentia tamen, infantem magnum ac sanum, & salua euasit; etiã locello vnâ excusso seu secundina: in puerperio porro optimè habens, rectè deinde valuit.

SCHO-

SCHOLIA.

INTER partum naturalem & abortum differentia
est. Partus nominatur quando foetus absolutus ac
consummatus tutus emititur, vel quando hoc ex
tura commodo fit: quando verò non natura spon-
dit, sed violenter incidit, abortus prouocatur, ut liquet
De facult. nat. Appello autem abortum imperfe-
ctum foetus emissionem utcumq. factam, cum Gal.
De morb. vulg. E diuerso autem naturalem par-
tum nuncupamus eorundem foetus consummato-
rum, ac perfectorum naturalem emissionem: qui, ut
loquitur Hippocrates lib. De natura pueri, hoc modo
est: Vbi enim adeò auctus infans est, ut alimentum,
et augmentum, quod à matre descendit, non am-
plius ei sufficiens sit, copiosius alimentum appetens
alciat, & membranas distrumpens initium partus
parri affert. Foetus itaque vehementissimis motibus
succedunt partus, ex Hippoc. sententia. Hoc etiam
tempore uteri, qui amplius foetus grauitatem, ac co-
rum distentionem ferre nequeunt, (Gal. teste eodem
lib. De facult. natural.) nec minus & sentientes in-
terim se morderi à qualitate humoris in se ipsos effu-
si, qui eos molestat, facultate propultrice media ab-
icere properant: nec non & à se ipsis patienter in
hoc præstant opus, non mediis uteris, sed muscularis
qui in abdomine existunt: qui ad deiectionem etiam,
tum ad reddendam vrinam, nobis sunt auxilio. Fit
itaque partus hoc modo. Verùm quo tempore fiat,
non admodum liquet, ut etiam superius diximus.
Modò enim 10. imprægnationis mense, iuxta Hipp.
vel iuxta Aristot. 10. quoque mensibus, ut q. longissi-

Inter par-
tum natura-
lem & abor-
tum quæ sit
differentia.

Quomodo
fiat partus
naturalis.

De tempore
prius dictū
est. sed hic
conciliatur
Gal. cum
Hippoc. &
Aristotele.

H h 3

mè.

me. quamvis & 7. mense & 8. & 9. (quod genera-
liter fit) parere possunt. At foetus qui maturius quam
in septimo mense prodeat, nullo pacto vitalis est: qui
septimo, vitalis quidem hic plurimum erit, sed ma-
gna parte infirmior, ut etiam Hippocrates de partu
septimestri scripsit. Galenus 9. mensibus perfici scri-
bit, & hoc 3. De nat. facul. & 2. De caus. sympt.
confirmavit. Atque hac sunt prout alimentum per-
fecto & consummato foetui ac augmentum à matre
suppeditatur. Diversimodè enim in diversis vterum
gerentibus se habet, si maiorem vel minorem sufficien-
tiam considerabis, prout sufficientes vel paucos men-
ses demittere consueverunt. Similiter & inter se non
parum dissident foetus: nam prout maiores vel mi-
nores existant, aut robustiores vel imbecilliores, plu-
rimo aut pauciore alimento indigent, etiam dum per-
fecti ac consummati fuerint. Propterea Hippocrates
horum haud ignarus, eodem lib. De natura pueri ta-
lia verba protulit. Quin et si alimentum à matre prius
aduenit, & ante 10. mensem puer prodit; & hoc per-
petiuntur magis mulieres primiparae: defuit enim
pueris alimentum, ut ad 10. usque mensem sufficere
non possit. Et demum: Quae verò menses paucos de-
mittunt, ea etiam pueri postremo tempore, ubi iam
maturi fuerint, alimentum rarius exhibentes, ipsos
calcitrare faciunt, ut & ante decimum prodire se-
stinent: modicus enim sanguis à iuenculis ac novellis
matribus procedit. Longissimum itaque tetonimum
naturalis partus conscripsit Hippocrates esse 10. men-
sem, quantum non neget citius contingere posse, ut qui
& 7. 8. 9. mense mulieres asseruit parere posse, &
nonnullas 11. attingere. Et ita puer septimestri partu
natus,

natus, pro ratione natus est, & viuit: octimesis autem natus nullus unquam vixit: nouem verò mensium & decem dierum partus sit, & viuit. In eandem quoque sententiam deuenit Galenus. Nam licet nouem mensibus pariendi tempus præscripserit, illud plerumque mulieribus contingere asseruit, forte quia sic saepenumero obseruauerit, haudquaquam negans in decimo posse euenire: quin imò admittere illud videtur ex eiusdem Hippoc. auctoritate Comment. aph. 37. 5. lib. ac aliis quoque mensibus, pro praedictorum varietate. Cum igitur consummatus & perfectus prodeat, siue 9 siue 10. mense id contingat, & cum adèd miranda pro eius emissionem requirantur; euenit (idq; non raro) vt difficulter edatur in lucem foetus, & sic difficilis fiat parientibus partus. Hunc quidam rursus naturaliter prodire volunt capite prius exeunte, facie versus terram prolapsa, deinde collo egrediente, mox humeris, brachiis, deinde extensis supra latera procedentibus: innaturaliter verò vbi exit resupinus, aut pedibus primò, aut manibus exeuntibus, vel secundum latera: difficulter, vel partum difficilem vocant, quando non potest exire, & laborat mater, & angustiat, ac moratur in illo labore & anxietate longo tempore. Alij verò partum innaturalem etiam ad difficultatem partus referunt: & ita partus difficultas symptoma est sub genere contentorum immodicè: sunt etenim foetus non vtero gerentium partes; sed proportionem respondentis, quæ adnascuntur, familiarium, inquam, quemadmodum & ouis, & fructus, nimirum ad generis propagationem à natura creati ex Gal. testimonio II. De simpl. medic. facultatibus. Et propterea vbi detineantur tempore

Alia distinctio partus naturalis, innaturalis, & difficultis.

Quis affectus sit partus difficultas.

H h

4

quo

Ad quam
noxam se-
quatur.

quo edi in lucem debent, prater naturam detinen-
tur. Consequitur autem hac eorum prater naturam
detentio, aut ad noxam alicuius facultatis naturalis,
retentricis, inquam, aut expultricis, siue ipsius pueri
siue pregnantis. Interim verò citra noxam earundem
facultatum, ad alias consequitur causas, seu prater
naturam dispositiones. Sed antequam ad omnes cau-
sas veniamus, cum hic vnam tantum in medium pro-
duxerimus, nempe quòd hac mulier non poterat pá-
rere ob magnitudinem fœtus; causam prius proceri-
tatis seu magnitudinis, vel improceritatis partuum
dicamus; quanquam aliqua ex parte prius diximus,
exemplo cucumeris & arboris, Scholio Obs. 66. huius
libri, de iisdem. At nostra vulgares mulieres, ex lan-
ga obseruatione dicunt, pregnantes magnos fœtus
párere, quæ nactæ sint maritos platonicos humeros
latos habentes. At Bonaciolus lib. 1. mulieb. cap. 4.
inquit: Quosdam præstanti corporis magnitudine
partus, alios pumiliones, nonnullos proceritate insi-
gnes, improcera facie alios, obesos plerosque, alios gra-
ciles, quosdam inter hos omnes medios, pro locorum
capedine, recrementorum seminalium quantitate,
alimentaria materia inopia, vbertate, affluentia ve,
gigni compertum est. Etenim si vteri spaciositas an-
gusta fuerit, non amplum, sed angustum, quod in
ea procreatur, esse necessum est: instar fructuum, qui
quanquam sua vi suapteq; natura grandiores ado-
lescant, in angusto arctioreq; vasculo in sua genera-
tionis primordio coacti ac coerciti, excrescere ultra
vasculi limites (eo impediante) neutiquam possunt:
planeq; præpetibus hominum inuentis prodigiosis na-
tura viribus abrogatis (cui nihilo secius imperari au-
dacis

Procerita-
ris, improco-
ritatisque
partuum
causæ, & de
mora quo-
rundam pro-
ceritate.

daciū est credere) exoleſcunt. Idem idem & de inchoati
 hominis magnitudine facile eſt cuique arbitrari. Quo
 ſit ut nani pumilive degencres admodum in lucem
 prodeant. ſubriceo Pygmaos ad extremos India fines,
 ternos longitudine dodrantes non excedentes, quos
 etiam à gruibus infeſtari Homerus prodidit: eoſdemq;
 fama eſt, ſagittis armatos arietum caprarumq; dor-
 ſis inſidentes, verno tempore ad mare vniuerſo agmi-
 ne deſcendere, & oua tum pullos quoque earum con-
 ſumere, ternūq; eam expeditionem menſibus perſi-
 cere: alioquin fieri, ut futuris gruū gregibus reſi-
 ſtere nequeant. Contra, ſi vulua aluenus vaſtior ex-
 iſſerit, modò parentes vberiores genituras ſuggeſſe-
 rint, ac deinceps alimentaria muliebria tantisper af-
 fluentiora affatim ſuppetant, maiuſculum procul du-
 bio puerperium efficietur. Sin cauea intercapedoq;
 medium obtinuerit, medios quoque infantes (modò
 cetera reſpondeant) gigni, credi par eſt. Hinc breui-
 res quoſdam patribus parius euafuros diſcas licebit;
 æquiuales nonnullos; longitudine magis eneſtos
 procerioresq; alios: tamen ſi ratio admodum (ſeminum
 vbertatem exuſione conſumente) eam ætate noſtra
 fortunam indepii ſunt. Quandoquidem & Homerus
 vates ille iam ante annos prope bis mille & ſexcentos;
 minora mortalium corpora quàm priſca uſque in id
 tempus conqueri non ceſſauerit. Nonnullos tamen
 patribus maiores exiſtiſſe creditur. Quemadmodum
 olim ille fuerat, cuius corpus (terræmotu in Creta
 rupto monte) ſtans quadraginta & ſex cubitorum
 inuentum eſt. Et adhuc Oreſtis corpus (oraculi re-
 ſoſſum iuſſu) ſeptem cubitorum fuiſſe traditur. Sub
 diuo etiamnum Claudio, Gabbara proceriſſimus ho-

H h s mo,

490 DE MULIERVM MORBIS,
mo, notem pedum & totidem vnciarum ex Ara-
bia aduectus visus est. Et sub dno Augusto Pusorini
& Secundilla duo in priori semipede addito existeret.
Quantos eorum parentes fuisse, nusquam proditum
est. Plura vide apud eundem loco citato. Nunc ad
alia exempla difficultatis partus properemus.

OBSERVATIO LXXI.

*De partus difficultate ob innaturalem po-
sitionem fœtus, ac humore clapso.*

QVÆVIS quantitas cuique in vtero fuerit, in
semet conglobatus homuncio sic gesta-
tur. ut nasum inter genua, super hæc palmas,
super hæc ocellos, aures extra genua habeat, cui
caput primum sursum, facie ad spinam matris
versa, tergore ad lumen est. At cum increuerit,
exitumque appetit (ut paulo antè etiam dixi-
mus) deorsum reclinatur. Egressus huius gra-
tia, rerum parens (quippe qui in caput commo-
dius ederetur) sic inuandum in vtero duxit. Si
aliter exeat, difficilis sit partus; vii euenit anno
1557. mense Ianuario Mariæ Iohannis, vxori
Iacobi Teylingij, sororij mei; nam capite re-
trosum ad scapulas mento incumbibat ut exire
non posset, vii obstetrix nobis ad pragnantem
vocatis narravit. membranis verò disruptis, hu-
more effuso, & enixu partus deficiente, ob lon-
gam moram & debilitatem, matris minus lu-
brica partum adiutare non potuit. Quare con-
sului ut obstetrix ad humectatione oleo amygd-
dulæ

dulcium pinguiſſimè vterum obliniret, & quòd circa claviculam aut os pectoris digito inuncto leuiter cum oleo eodem paululum ſubleuaret, vt ſic caput ad os vteri rectè deſcenderet. quod vbi ſeciſſet, & artemiſiæ decoctum cum vino Rhenano, adiecto puluere cinnamomi calidè propinaſſem, (quanquam prius ebibiſſet cereuiſiam cum oleo amygd. dul. & butyro, quam etiam euomuerat, fœtu nondum egrediente) ilico peperit, deinde poſt partum bene purgata, optimè deinde habuit. Erat autem prius valde meticuloſa, eo quòd octauus partus eſſet, cùm mater eiſdem ex octauo partu obiſſet. illa quidem imaginatione impreſſa, magis ſibi metue- rat. ſed ſchemate optimi partus in rectum diducto, feliciter peperit. Eodem etiam planè modo, meo conſilio, ruſtica feliciter enixa eſt, in pago ad Moſam ſito.

SCHOLIA.

CAUSÆ autem difficilis partus varia ſunt. interea vniuerſæ aut interne ſunt, aut externe. Externe ſiquidem, quæ partus difficultatem inferunt, ſunt aut immodicum frigus quod vterum denſauerit, aut immodicus calor, qui vires diſſoluerit, aut quoddam aliud fortuitè eueniens, vt liquet ex Paulo & Aëtio: Nam & mulieres difficulter pariunt ob aëris præcedentem vel præſentem conſtitutionem, vt Hipp. docuit. Ob eſt aquilonia: Auſtrina inuat ſicca, fœtum & mulieris corpus exſiccant, & difficilem faciunt partum. nimis calida vires reſoluit, vt diximus: frigida

Causæ ex-
terna.

Interius
causae causa-
rum.

Patientis
vicio causae.

frigida partes contrahit. humida omnium apertissima est. Quae modicè calida est, ut veris (quod cum autumno faciliores partes concedat) laudatur. Interna autem causa, aut vicio patientis, aut foetus, aut membranarum esse possunt. sub quibus & alij intelligunt etiam posse fieri ratione vteri, vel partium vicinarum. At patientis quidem, ut si crassa obesaq; sit, vterus exiguus, dolorum impatiens, aut timidiuscula, aut natura imbecillis, ut foetus nequeat propellere, aut etiam si ante tempus pateat, vel inflammationem in locis genitalibus, aliave particala fuerit experta, aut alio quodam modo laborans: ob cernicis vteri obliquitatem, aut ob carnem eidem cernici, vel osculo eius adnatam, abscessum vel duritiem. Potest & difficultas pariendi contingere, si etiam ossa pubis nimium conferta fuerint: quoniam enim ut partem dilatarì non possunt, pariendi difficultatem faciunt: similiter si puerpera vesica calculo laboret, vel excrementorum copia in intestino recto, aut vesica fuerit detenta, siue prouecta aetate fuerit, aut puella nondum virilis, nec vires vigoris adeptae: nec minus ob nimiam lumborum cavitatem vterum comprimantem difficulter pariet. Ita quoque si matris adsit mala confirmatio, statura breuitas: ex vicinarum partium tumore, vel vitio vesicae, aut mustulorum abdominis. Nimia quoque omenti & vicinarum partium spissitudo & obesitas. Nam Hippocrates scripsit, omenti magnitudinem impedire conceptum, os vteri comprimendo: sic & facile partum molestat. In quibusdam enim omentum descendit inter vesicam & vterum, ibiq; spissius fit. Colli vteri longitudo facit quoq; saltem, ut longiori tempore exeat foetus.

Foetus

Fœtus verò vitio similiter difficulter paritur; ut si inu- Ex parte fœ-
tus causa.
 sitate magnitudinis fuerit, ut Obs. 70. precedente
 ostendimus, vel exiguus, & modica gravitatis, seu
 magni capitis, vel monstruosus, vel mortuus; aut
 vivus quidem, sed adeò imbecillus, ut foras non possit
 procedere: similiter si plures fœtus fuerint. Nam He-
 rophilus quinque edidisse mulierem memoria prodi-
 dit. Confirmavit idem Gellij auctoritas, qui, diu
 Augusto imperante, ancillam in agro Laurente quin-
 que pueros peperisse testatur. Vbi biceps prodit diffi-
 culter pariunt, vel quovis alio modo monstruosus, ge-
 mini, vel coniuncti, aut duo vel tres. nam duo corpora,
 teste Valeſco, nata viſa ſunt duo capita habentia, duo
 ora, quatuor brachia, quatuor manus, vnam anum.
 Primus mortuus eſt, & deinde alius longo tempore
 poſt, & fœtente altero. De monſtroſis partibus &
 diuerſis ſchematicis partuum, vide 4. lib. Iacobi Rueſſ
 chirurgi Tigurini: nam & figura ipſius fœtus naturæ
 contraria, ut hoc exemplo precedente oſtendimus,
 difficilis efficit partum; ut ſi obliquus, aut in pedes
 procedat, ex Hippoc. auctoritate eodem lib. De na-
 tura pueri. Naturalis ſiquidem figura prodeuntis fœ-
 tus eſt (ut diximus) ut rectè in caput manibus ad
 utrumque femur extentis prodeat. proxima huic ubi
 in pedes conuerſus eſt, præcipuè ſi manibus ſuper utro-
 que femore extentis prodeat. Reliquæ verò omnes
 præter naturam ſunt, Aërio & Paulo teſtibus: ut ſi
 caput in dextram vel ſiniſtram vteri partem decli-
 net; aut altera aut utraque manus exeritur, & crura
 intus inter ſe diducuntur: aut etiam altero pede
 intus detento, altero prodeant, aut ſi duplicati vteri
 innitantur, aut etiam obliqui prodeant; licet hi mi-
 nus

nus improbandi sint, ut liquet ex eodem Aërio. Quapropter natura diligenter providit, quo pacto foetus qua conveniebat figura ad collum uteri prodiret. Caput etenim eius primum collo matricis indidit, tum per id aliis ipsius partibus viam munivit, ut liquet 15. De usu partium. Procedit autem in caput, si secundum naturam prodierit, ut inquit Hippocrates, quoniam gravissima sunt ipsi supernae partes, si ex umbilico perpendatur. Atqui si foetus obliquus, aut transversus paret egredi, aut si secundum longitudinem quidem, sed non ut nunc, scilicet caput non infereret, quod nonnunquam etiam, sed raro accidit, vel pedem ante caput, vel manum exerens, difficilem aliis membris exitum efficeret, ut eodem 15. De usu partium à Galeno scriptum est. De his vide plura, & quae sint schemata infantis nascentis seu prodeuntis, in Harmonia Gynaeciorum, & quae Moschio ad longum scripsit. Et ita Fernelius breuiter: Quum non rectè in caput fertur, nec manibus secundum latera adductis, sed vel ambos pedes, vel (quod multo operosius existit) alterum duntaxat, vel manus primum exierit, vel duplicatus in nates exit, vel obliquus alterutrum latus, vel pronus ventrem primum exhibet, quae omnium pessima est parienti figura. Difficilis quoque sit partus, si secunda, aut propter crassitudinem non abrumpatur, aut propter tenuitatem antequam oportet, diuellatur simul cum aliis membranis foetum ambientibus; siquidem humore euacuat, infans praesiccitate agrè movetur, ac per os & collum uteri difficulter elabatur: humor enim iste, qui in pueri membranis continetur, nedum eisdem

lubri-

Causa ex
parte mem-
branarum.

lubrificandis confert, sed uteri cervicem ad maximam dilationem reddit facilem: à prædicto namq; humore collum humectatum mollius redditur, dilataturq; facilius, eodem Gal. teste citato lib. 15. De usu part. Difficilem itaque partum in propinquo esse, prænuntiat (inquit Fernelius) humor aquosus allantoide conclusus, totus ante partum effluens, aut copiosior sanguinis eruptio multo tempore factum præcedens. Loci enim sicci manent, destituti eo humore, qui facti transitum facilem & lubricum præbet: languidi dolores ex intervallis longioribus recurrunt, quandoquidem agrè abruptuntur acerbula, vixq; secunda ab utero diuellantur. Sed & hæc signa præter ea quæ superius diximus, proximi partus sunt ex Mosch. Si septimo, vel nono, vel etiam 10. mense, graudo uteri, & ex renum consensu feruor & dolor in clunibus, lumbis & inguinibus erit; ipsius etiam matricis ad inferiores partes discensus cum orificij apertione & humectatione. Cum verò proximatur, superiores partes graciliores fiunt, & extenduntur loca super pectinem & inguina, & frequenter urinae desiderium nascitur. Immissioq; digito ad magnitudinem oui in orificio inuenitur: humor verò qui effertur, primò lentus, postmodum plurimus & sanguineus. Differt autem hic dolor à feruore qui in partu occurrit, & ab inflammatione uteri, eo quòd à feruore dolor cum clausura & siccitate in orificio inuenitur. At iam causa difficultatis partus antequam ad curationem accedatur, diligenter inquirenda, ut sic pro ratione causæ commoda inueniantur remedia. Et licet hoc sint pariendi difficultatis causa, hand tamen agrè à Medico

Signa difficultatis partus in propinquo.

Signa proximi partus ex Moscho.

Dolor parturientis differt à feruore & inflammatione uteri.

Signa cau-
satum diffi-
cultatis
paraus.

à Medico percipi poterūt: externa siquidem ex aſtati-
tium ſeu puerpera ſermonibus innotefcent: interna
verò tum ex ſe ipsis Medici inueſtigabunt, tum etiam
ex earundem parientium loquela. Nam debilitas
agra, macilentia, veluti etiam pinguedo, ex habitu
corporis deprehenditur. Si vteri vitio ſit ex proprio
indicio, ſiue adſit vlcus, abſceſſus, inflammatio, an-
tale quippiam, facile deprehendes. Si quoque à fri-
gore externo, vel calore, parientis indicio habebitur.
Si mater debilis, vel laſſata, vel morbum prius paſſa
ſit, vel ob longam moram magis laſſata, vel famem
experta, meticuloſa, aut in pubertate, vel annofa, ab
ipſa quoque vel aſtantiſus percipies. Ita & fœtus
imbecillitas ex debili & tarda motione habetur. ſi
mortuus, eius ſigna antea diximus: à motu ceſſat,
frigidity ventris adest & lateris, dolor iuxta umbi-
licum grauiſ, febris lenta, faciei decoloratio, fœtidus
anhelitus, aſcenſus vaporum horribilium ad ſupe-
riora, immobilitas ventris, inſtantia vigiliarum. Ma-
gnitudo fœtus ex parentum corporis conſtitutione, ac
ventris parientis mole coniecitur, eaq; grauiter ince-
dit. Quando autem hæc deficiunt, & mater fortis
eſt, facilis motus, & fœtus mouetur ad exitum, &
tamen partus eſt difficilis, tunc ſignum eſt, ſecundam
ſeu ſecundinam eſſe fortem; & tunc non exit aliqua
aquofitas nec ſuperfluitas, & pragnans in enixu plu-
rimum laborat: inde craſſities ſecundæ colligi poteſt.
Et ſiccitas vteri facile cognofcitur per ſiccitatem præ-
gnantis; quia eſt macilentia, ſicca, ſitibunda, agilis,
minimè lubricoſa. Nunc ad ſigna prognoftica acce-
damus, exemplis prius productis de partu valde peri-
culoſo, & de primipara ex partu moriente.

OBSER-

OBSERVATIO LXXII.

*De partu valde periculoso: & de primipara
ex primo partu moriente.*

VALDE periculosum est si puer vel fœtus
super pedes exierit. enasit tamen hoc mo-
do nata Elizabetha Iacobi Teylingij sororij mei
filia. Oportet vt obstetrix pedes impellat sur-
sum, deinde paulatim conuertat fœtum. At si
egrediatur vsque ad corpus, tunc præcipe ei vt
comprimatur, & fac eam sternutare cum con-
diti: sæpe enim, inquit Albucasis, auxilio & gra-
tia Dei, vidimus euasisse incolames & matrem
& fœtum. Et si non egrediatur hoc modo, tunc
obstetrix reducat fœtum paulatim donec repo-
nat eum secundum figuram naturalem. Si ita
fortè reposuerit rectè, facile pariet mulier. Quod
si nulla harum ratio subueniat, fove vtrum
cum mucilagine althææ & oleo sesamino. Puto
autem filiam sororij mei præmissis pedibus,
manibus deorsum ad femora deductis natam;
qualis est prima figura apud Iacobum Rueff in
quo casu obstetrix oleo, conuenientibusque li-
nimentis instructa, exitumque infantis vngen-
do & demulcendo tantum iuuat, ne retro fe-
ratur, sed vti cepit ita rectè pergat. Inprimis au-
tem operam dabit vt vtrique infantis brachia
deorsum porrecta apprehendat, firmiterque
teneat, nec retrorsum deducere permittat; sed
hoc ipso modo ad partum prodire compellat.

I i

& ad

498 DE MULIERVM MORBIS,
 & ad reliqua pergat vt ibidem annotatur. Si
 verò in pedes procidat, manibus supra caput
 surrectis, tunc melius est, partum in vterum re-
 pellere, vt videre est apud eundem autorem
 cap. 2. vel de secunda figura innaturali. Si ad
 genua descendat, facile repellitur. Si in nates
 sedeat, vt contigit vxori calcearij Alemariæ, in
 qua fœtus complicatis natibus exire nitebatur;
 sed manu infante repulso leuiter eductus fuit.
 Vide 9. figuram apud autorem citatum. Sicuti
 forma innaturalis fœtus non careat periculo;
 ita pessima sunt symptomata quæ nos terrere
 debent; & tunc periculum prædicemus, si fe-
 bris inter pariendum præcipuè acuta adfuerit,
 dum diu in excutiendo fœtum laborant, & si
 plurimum sudent pulsusque minuatur, & po-
 stea in totum non appareat, subsequente deli-
 rio. tales aliquando vnâ cum fœtu dum in par-
 tu sunt, moriuntur: vt nuper euenit primipa-
 ræ valde tenuis constitutionis & imbecillæ
 existenti.

SCHOLIA.

Signa pro-
 gnostica.

Ex patientibus ac puerperis maximè laborant pri-
 mipara, propter inexperientiam dolorum: &
 dolent quidem totum corpus, maximè verò lumbos,
 ac coxendices. nam coxendices earum disparantur.
 Verùm experta iam partu, minus primipara dolent:
 quæ verò multoties pepererunt, multo minus dolent;
 vt inquit Hippocrates lib. De natura pueri. Primi-
 para & iuniores difficulter pariunt; ita & seniores
 quæ nunquam pepererunt; & aliquando cum vicia
 peri-

periculo, si mala symptomata accesserint. Et ubi
 obliquus, aut in pedes fortis procedet, nedum mulier
 difficulter pariet, sed multæ vel ipsæ perierunt, vel
 uer, aut simul matres vnâ cum foetibus, ut Hipp.
 a lib. citato scriptum reliquit. Huc referenda sunt
 traditiones habitæ de conceptione: nam & mulier
 post annum 24. primûm concipiens difficulter pa-
 ret primipara. Pinguis mulier sicut difficile concipit,
 ita & egerrime pariet. Si dolor in eas partes ventris
 eruat, cum patientis virium robore, & nulla adsit
 tribuendi difficultas in muliere temperata & æta-
 tis mediocris, bonum est: nam facilitatem partus
 præsignat: etiam cum dolor est propæ vuluam, iam
 dilatatur lacertis per embryonis præsentiam propæ
 autam existentis, & cûd exhibit ille nouus calami-
 osus mundi socius, dicente Valeſco. Quandocunque
 girur dolor declinat versus inferiora & anhelitus fit
 bonus, partus erit facilis. Mulieres, ut dixi, pingues
 magis laborant in partu, quàm graciles aut maci-
 lentæ. Masculus cum minori labore egreditur, quàm
 femina. Si dolor ad ilia & os sacrum tendat, diffi-
 cillimè pariet. aph. 55. lib. 5. Quæcunque vterum
 gerentes à febribus corripuntur, & fortiter cale-
 funt sine occasione manifesta, difficulter pariunt, &
 cum periculo, aut abortum patientes periclitantur.
 Non sine ratione igitur scæus (inquit Galenus in
 Comment.) aliquando nequit obſistere, sed ex febre
 & vitio humorum corrumpitur: nonnunquam verò
 perdurat vsque ad tempus partus; sed cûm ipse &
 valetudinarium sit, ut qui longo tempore laborauerit,
 & matrem habeat imbecilem, non sine periculo pa-
 ritur. Nam ad bonum partum (ut aliàs quoque di-

500 DE MULIERVM MORBIS,
 ximus) duorum corporum vigore est opus. & graui-
 da mulieru, & infantu. Quidam hic adiungunt quod
 ille qua in natiuitate parit, muros edant. vtrum ia
 verum sit dubitamus. Plinius oscitationem in enixu
 lethalem esse voluit, lib. 7 cap 6. Quod verò mulieris,
 qua difficultati parti, sterilitatis superueniens bonura
 sit, decretum reliquit idem Hippoc. aph. 35. lib. 5.
 quoniam vehementiori concussu atque sermone, par-
 tim quidem naturam exiit, partim verò externis
 qua partibus corporis firmiter infixæ adhaerent, ve
 inquit Galenus in Commento. Abscessus tempore
 impregnationis in utero accidens lethale. & hoc quo-
 que prius ex Hippocrate dictum. Partus autem diffi-
 cilior in factu mortuus, quàm viuus.

OBSERVATIO LXXIII.

*De quibusdam mulieribus in partu peri-
 elitantibus, & egregie liberatis.*

CATHARINA, mulier quæ extra portam qua
 Schiedamum itur habitabat, vxor illius
 Iacobi Iohannis, qui vela conficiebat, cum circa
 tres dies in partu difficili hæres parere non pos-
 set nec loquium emittere, ad eam tandem ego ac-
 citus fui, cum obstetrix eandem pro deplorata
 haberet. Ac his infra scriptis remediis anno
 1771. per me descriptis tandem feliciter pepe-
 rit. 24. Febr. caui accessi, & cum aluum non
 deponeret, balanis sequentibus soluta fuit: re-
 pul. hieræ pictæ 3 ij. salis communis, & salis
 gemitæ añ. parum, mellis q. l. fiant duo suppo-
 sitoria.

istoria. Imperavi quoque ut obstetrix ventrem
inferiorem ad pubem usque inungeret, ob hu-
morem effluxum & matricem siccam: & ping-
gallinae, anatis, anseris, olei liliorum, cheyrini,
an. \mathfrak{z} ss. olei amygd. dul. \mathfrak{z} ss. misce pro linimen-
to. interea dum in officio obstetricandi esset,
intus vuluam quoque illinebat oleis sequenti-
bus: & olei amygd. dul. \mathfrak{z} j. ss. olei liliorum \mathfrak{z} ss.
misce. Sacculi quoq. parati erant in vino Rhe-
nано cocti, & expressi calidè pectini admoti
ad urinam prolestandam (cùm ea retenta esset)
& partum facilitandum: & folior. maluae, flor.
chamamel. meliloti, parietariae, an. m. j. arte-
misiae m. ss. sem. anisi. anethi, an. \mathfrak{z} ij. ceteris
m. j. fiat sacculus quadratus intersutus. Interim
& pul. ad prouocandū partum non febricitanti
per tres vices exhibitus est. Obstetrix aliū pul-
uerem pro vxore Cornelij pictoris dederat; de
qua muliere suo loco dicemus; quē citra meum
consilium à pharmacopœo extorserat; sed ni-
hil effecit, cùm casus ab altera diuersus esset.
Verùm hæc subsequētibz pulueribus cum
vino assumptis, & admotis sacculis, ex iis co-
piosè lotium reddidit, & mox feliciter peperit,
& salua euasit, & sana etiamnum viuit. Hic erat
pul. facilitans partum: & cinnamomi selecti \mathfrak{z}
j. ss. ossium dactylor. \mathfrak{z} ss. sem. viol. \mathfrak{z} ij. rad. di-
ctamni albi \mathfrak{z} ss. fiat puluis subtilissimus in tres
partes diuisus. Venit mihi tunc in mentē textu-
ris vxor, quæ cùm octo diebus in difficili par-
tu valde angeretur, à M. Iohanne Tiengio Am-
steldamensi Medico curata fuit, vbi nono die

502 DE MULIERVM MORBIS,
 accepisset 3 j. pil. de assa foetida (de qua superius
 dictum est) cum cyatho vno decoct. sabinae, id q
 ter, post prandium, & hora 4. & sub noctem
 hora 8. quibus eadem nocte, Dei nutu, peperit
 filiam, & salva mansit. Sed & alteri etiam octo
 diebus haerenti in difficili partu, cui ante 4. dies
 matrix aperta humorem mensesque profunde-
 rat, exhibita est 3 β. pil. ex assa foetida iam dicta
 cum vino decoct. verbenae, sabinae & artemisi. &
 liberata est illa nocte, cum bis sumpsisset. Ita &
 puerpera, cui duobus diebus secunda intus per-
 manserat, valde defatigata tertio die extrema
 inunctio adhibita fuit, vt in deploratis fieri so-
 let, sed singulis tribus horis accepit easdem pill.
 ad 3 β. (qua descriptione accepit à Nicolo Flo-
 rentino, authoritate Rhaf. cap. proprio De facili-
 tando partum) exhibitas cum succo verbenae &
 trassij nuxtis cum vino Rhenensi, & fuit liberata.
 Idē viebatur suo clareto & vnguento emollien-
 te, descriptis antea Scholio Obs. 43. huius libri.

SCHOLIA.

Qualis ob-
 stetricis eli-
 genda.

CURATIONEM antequam aggrediamur, de ob-
 stetricis perita ac gnara, & sagaci, ac minime
 remulenta, prospiciendum est, vt per eandem omnia
 illa qua partum difficilem inferunt, recte curare possi-
 mus: nam vt traditur in Harmonia Gynaec. cap. 9. ob-
 stetricis literas nosse debet, cui & ingenij promptum,
 & memoria praesens adesse debent. Ea q, sit studiosa,
 munda vniverso etiam corpore, fortis & laboriosa;
 qua & iuxta Mosch. sit medicinalibus actionibus ex-
 ercitata, providens, iusta, diligens in adiuuando, qua q,
 partes

partes diuidere nouit, & accidentia mitigare, non iracunda, nec turbulenta, compariens, sobria, pudica, arguta, quieta, prudēs, nec auara, atq; in eo munere facilis, audacula, qua animum primipara facile excitet, & qua praparcū animum coarguat, faceta, hilariq; non annosa, quaq; nō solum difficultati partus opportunē expediteq; succurrat; sed etiā cōtra ea (vt Benedictus Veronensis dicebat lib. 25. cap. 25.) quae accidunt ingeniosē agat; & in praecidendo deligandoq; umbilico infans non impigra sit. non dicaculā, sed religiosam esse oportet. Nam saepe infans veluti emortuum enascitur, qui prius quā deligatur umbilicus, cōpresso in utero sanguine, tamquā recepto alimēto, vita restituitur: is alioqui deliquio moritur. At nunc de iis quibus obstetrices indigent, vt est sella obstetricaliū ab ipso Moscho veteribus descripta, instar sellae consoria similitudine lunae praecisa, vt illuc infans cadere possit. Sed quod sinus infident alterius mulieris, vt nostras obstetrices facere diximus, non ad eō incommodum est, quā quod a viris fortibus brachia teneantur: nam quadā vel aspectū virorū dum parturiunt abhorret. Interea Moschio adesse vult ministras vnā cum obstetrice numero tres, ex quibus dua dextra laeuq; ad latera stare debent, inter quas in cubere possit; tertia verō dorsum eius teneat. Sed si in sinu sedeat mulieris robusta, tertia minus opus erit. Interea omnia sint parata quae ad partū sunt necessaria, vaporaciones ex oleis calidis, spongia mollis, lana munda, fasciae, cervicalia, resumptiui odores, & cathedra obstetricalis. Reliqua vide apud eundē, quid facere oporteat antequā in sellā ponatur parturiēs, & quomodo eam collocare oporteat. Etenim si ita fuerit lassā, vt supina sedens in lecto parere non posset, ad sellā eam leuant,

Sella obstetricalis. vide Mosch.

De ministris, tum aliis rebus ad partum necessariis.

Obstetrix
quomodo
sedere de-
beat.

504 DE MULIERVM MORBIS,
vel in mulieris femoribus sedere debet (vt & nos
paulo ante diximus) vt illic pariat. Obstetrix ita se-
dere debet vt vtiliter sit cinctā, auctore Moschione;
& si in lecto partus efficiatur, habeat modicè inferius
obstetrix sedile, in quo sedeat, vt ita facillimè manus
mittere possit. Si verò sedens in sella paritura est, &
sedeat inferius obstetrix humiliori sella, vt possit ex
superioribus partibus infantes adducere, & aliquan-
tulum pedibus suis apertis, plus tamen humiliori loco,
vt eam non impediat, faciem suam auersam auertat,
ne pariens prae verecundia se concludat. Ante omnia
tamen ligamentis omnibus & capillis solutis; quod
propter laxamentum solet fieri. Digito autem sini-
stro oleo calido peruncto, orificium matricis circum-
agendo aperiat, vt chorium illuc cadere possit. Omni
cura circa parturientem satagere debet, & petere
eam vt non clamet, sed omnem spiritum ad inferio-
res partes exponat, maximè cum dolor occurrat. Si
folliculus diu non fuerit ruptus, vnguibus eum rui-
pere, & immisissu paulatim digitu plus adaperire co-
nabitur. Obseruandum est ne infans subito cadat, ne
quassatio capiti & cervici infantis adducatur. Na-
turaliter verò orificium aperitur aliquando, mergen-
tibus humoribus per ipsum. Tunc apprehendere de-
bet obstetrix, & in diuersum adducere huc atque
illuc. Illo tempore quando se matrix aperit, conari
oportet; & quando se concludit, non conetur, ne fer-
uore aut sanguinis fluxu, ipsius matricis adductio
emergat. A lateribus verò ministra sine quassatione,
manibus aptis deorsum deducant. Cum verò exire
fœtus ceperit, manibus pannum habentibus eum sus-
cipiat obstetrix, & id obstetrically quam lenissimè,
vt vna

ut una cum secundis procidat. Quando autem & quomodo umbilicum oporteat praecidere, ex Moschio-
ne sic habeto. Cum modice infans in terra requiesce-
rit, à ventre eius digitis quatuor scalpello aut cultro
acutissimo praecidendus est. Nec superstitionibus anti-
quorum consentiendum est, qui lino aut vitro, vel
canna acuta, aut cortice panis secebant. Cum verò
praecideris, sanguinem, qui in eo remansit, coagula-
tum exsiccabis, & lana torta vel licio ligabis, ne sub-
sequenti fluxu sanguinis infans periclitetur. Sed ea-
dem hora qua natus est, ex utraque parte ligandus
est, & sic in medio praecidendus, ne & ipsa parturiens
fluxum sanguinis patiatur. De regimine parturien-
tium hic ea adiungere poteris, quae & Erotus de passio-
nibus mulierum cap. 16. De regimine parturientium
scripsit. Nunc verò quod ad difficultatem partus at-
tinet, & rationem curandi, variatur quidem iuxta
causarum diversitatem, ut nunc nonnullis exemplis
precedentibus constat, & etiam sequentibus mani-
festius ostendetur, si speciatim eas curare velis: quan-
quam quaedam sint animadvertenda tanquam om-
nibus causis communia, quae primò conscribemus; si-
mal etiam & mentionem facientes quorundam me-
dicamentorum, quae indifferenter omnibus puerperis
difficulter parientibus ex quavis causa adhiberi pore-
runt; hic etiam adducentes tria documenta ab ipso
Donato ab Alcomari cap. De difficultate partus etiam
descripta. Primum est aduertendum quòd puerpera
eo tempore, quo partus instat, non sunt multa ali-
mentorum copia gravanda, neque varia alimenta &
crebrò exhibenda sunt, veluti Neapoli abusi consue-
verunt mulieres, & vetulae, & quidam vulgares
li 5 Medici,

Quando aut
quomodo
oportet um-
bicum
praecidere
ex Mosch.
lib. matricis.

Curatio.

Primum do-
cumentum.

Medici, ut eisdem obsequantur; quod & magis hic apud nostras mulierculas fieri solet. Distrahitur enim calor pro conficiendo multo ac diuersis alimentis, & quia etiam coctioni ac retentioni alimentorum vacat, viriliter expellere nequit, qua facultate tamen ac functione valida eo tempore parientes indigent. Pautā itaq. ac moderatā alimentorum copia tribuatur, sintq. concocti faciles, boniq. nutritiui cibi, ut oua recentia, ac sorbilia, seu tremula, ius pulcorū, gallinarum, phasianorum, aut struthionum, quod ex confusis carnibus fit, & vulgus consummatum appellat; vel etiam eorundem animalium confusa caro, quam idem vulgus tortiliū nominat; aut buccellæ panis in vino. Græci aut alio odorato vino macerata simul cum eodē vino tribuantur. Ita & Benedictus Veronensis: Tum interea (inquit lib. 25. cap. 23.) vitanda sunt acris, appropinquante partu, exiguoq. cibo uti necesse est. qui tamen plurimum alit, vinoq. odorato exinde hera intervallo. Partitura quoq. in aere calido & humido, iuxta Guainerium, collocetur; in cuius domo nulla pira dimittantur, teste Dioscorido, vuluū aperire prohibet: omnes lapides preciosi ab illa amouentur. Ad hac, pro secundo documento, permittendū haudquaquam est, ut obstetrices difficile parientium vterum diutius dilantent, sed leniter, & placide vteri partes cōcedent, dulci interim oleo, aut alio quopiū, eiusdem locos persudentes. Item, pro tertio documento, non illico parturientes in sella collocandæ sunt; sed obstetrices prius os vteri tangere debent, & primum cum in debiscenti modū auctum animaduertent, quod ad factum transiū satū pateat, tunc ut surgat mulier iubere debent, eandemq. in sub-sello collocare, adhortariq. ut ad expellendum factum stre-

Secundum
documentum.

Tertium
documentum.

strenuè se paret, quemadmodū 3. De natura facult.
 à Galeno scriptum est. Spiritum quidem detineant;
 verū non, velut imperita faciunt, ipsum in gutture
 congregare debent; sed ad inferiores partes propulsa-
 re, ex decreto Actij cap. 14. lib. 16. quo tempore, vbi
 partus difficilis sit, corallum aut lapidem aquila, aut
 styracem, coriandrum viride, seu polygoni radicem, in
 dextro crure alligare conuenit. Guainerius ait: Lupi-
 nas carnes paritura si comederit, pariet facilius, &
 incantationes noxia versus illam (inquis) non vale-
 bunt. Conducunt iaspis, smaragdus corā alligatus; &
 cor gallinae adhuc palpitans; & tota ala aquila vel
 penna vulturis pedibus paritura supposita; & vnguis
 milui sub laborantis camisia portata, & magnes in si-
 mistra manu retentus. Insuper, vt etiā Donatus refert,
 & accipitris seu falconis stercoris 3j. cum vino albo
 aut aqua capill. ven. prabe, vel tantundē cinnamomi
 vel casia. Aut hunc in modum puluerem conficias,
 iuxta Donat. vel nostro viere, de quo dictū est prius:
 R. fini accipitris 3j. cinnamomi, casia, añ gr. viij. croci
 gr. iij. misceantur, & cum paucō vino odorato albo,
 aqua capill. ven. aut flor. citrang. exhibeatur. Interim
 quoq. myrrha aut castorij 3ß. aut ʒij. cum gr. qua-
 tuor cinnamomi propinabis. Sunt qui trochis. e myr-
 rha etiā 3j. exhibet. insuper & phaseolorum seu cice-
 rum rul. a: senogr. decoct. cum oleo amygdul. Quod
 si parū cinnamomi, croci, aut casia, seu alterius pradi-
 ctorum permisceas, magis conferet. Excitare quoq. hoc
 tempore sternutamenta conducit, modo non admodū
 imbecilli capitis parturientes sint. Suffitus etiam resi-
 nae, aut cumini, aut pinus corticis, confert, Hipp. aucto-
 re, lib. De morbis mulieb. Verū speciatim vnicuiq;
 cause

Quæ d pro-
 prietate fa-
 cilitant par-
 tum.

308 DE MULIERVM MORBIS,
causa quæ conferunt nunc dicamus, factò initio, si
mulier ipsa, vel uteri vitium aut morbus in causa fue-
rit, hoc exemplo prius interiecto.

OBSERVATIO LXXIIII.

*De muliere obesa in hyeme difficulter
pariente.*

MULIER obesa in asperissima hyeme diffi-
cultius pariebat: nec erat mirum, cum ta-
lis, eo quod esset obesa, vuluam quoq. strictam
magis habebat, tum in hyeme etiam naturaliter
orificium matricis magis strictum habent, ut
Erois dicebat: nam propter frigiditatem tem-
poris & aëris, plus constringitur uterus. Ad
hanc accitus, quo melius pareret, propter fri-
gus condensans, uterum & meatus angustiores
reddens, obstetrici tum astantibus imperavi, ut
parturientem in cubiculo calido ponerent, &
pannos multos calidos simul circa vuluam ap-
plicarent, & eandem, quantum possibile esset,
à frigore externo custodirent, & ut partes ante-
riores & posteriores inungerent cum oleo sam-
pſuchino, & etiam liliaceo. Alij, ut Rhases, in-
ungunt oleo iosephino, ab umbilico infra; etiam
artemisiā contusā emplastri modo ventri
apponunt. Quia autem hæc erat valde crassa ac
obesa, cuius causa minus parere poterat, eandem
in lecto ut ponerent iussimus; nam & pronam,
vultu in terram deiecto, dum in lecto est, eam
figurari volunt. Illud enim & Haly & Auic.
iubent, quemadmodum & Valeſcus refert. Si
mulier,

muller, inquit, fuerit pinguis, iaceat supra ventrem, id est, supra genna sub ventre. Ita positura (teste Valesco) lacerti ventris leuius & facilius stringuntur, & sic mulier facilius parit, si crassa pinguis & obesa existat: & ita pariunt quadrupedia. Iussi deinde vt obstetrix oleo liliaceo, butyro, axungia anatis & gallinae, os vteri lini-
ret; simul propinans, cum non febricitaret, pul-
uerem sequentem: & trochil. de myrrha ꝑ ij.
cinnamomi ꝑ j. fiat pul. Sumpsit cum vino
Rhenano, decoct. attemisae: & tandem præter
spem, in cubiculo ab externo frigore tuta, feli-
citer peperit; & deinde bene purgata, & à se-
cunda vnà cum prole liberata, rectè valuit.

SCHOLIA.

CV MENIM pro ratione causa remedia sunt ad-
monenda, speciatim quod ad mulieres attinet
difficiliter parientes, si ob aëris constitutionem præce-
dentem, vel ab immodico frigore vterum condensante
ac coarctante fiat pariendi difficultas, in aëre medio-
criter calido locanda erit, & in eo gestationem eam
mouere conuenit, modo febris, aut aliud quippiam
non impediat. Nonnulli etiam conuassationes va-
lidas, sternutamentisq; ciendis idonea adhibuerunt,
Paulo & Aërio testibus: quibus etiam opus adferre
oportet laxatione per infusus calidos, & suffusiones,
ac per infusiones oleorum, tum actu, tum potentia
calidorum: itemq; per illinitiones, ac cataplasmata
eiusdem generis. Qua de re infundere oportet lar-
giter oleum dulce, & calidum: item decoctum sœnug.
aut maluarum, vel seminis lini; deinde & pubem
etiam

Si ex immo-
dio frigore
fiat partus
difficilis,
curatio.

eiam cum abdomine & lumbis eisdem medicamentis
illinere, aut alio relaxante medicamento, vt hydrelas
& alia huiusmodi: eadem quoq; laxamenta adhiben-
da sunt & balneis (Valefcus vtiur balneo aqua calida,
cauendo frigus) si non febrū aut aliud quippiam probi-
buerit, ex eorundem autorū testimonio. Si vero ob ca-
lorem immodicū vires exsoluentes parienti difficul-
tas excitetur, condensantibus ac maxime cōstringen-
tibus, seu adstringentibus, & firmitatem inducenti-
bus tam roborare oportet: qualia sunt inspersiones &
insestiones ex myrto, pampinis viris, malis punicis, aut
rosis: nec minus odoramenta fiant ex aqua ros. myrtill.
& nymphaea cum aceto, addendo, si labet, parum san-
tolorum & corallorum rubeorum. Conuenit quoque
vnguentum ex vino & oleo ros. frigidū, vt inquit Ae-
rius: nec minus cibus & potionibus resocillandū erit fa-
cilis coctionis, multū nutritiū, ac modica quantitatē,
permixtis semper quibusdā adstringentibus, vt cydo-
nis, malis punicis, ac reliquis huiusmodi: insuper buc-
cella panis vino imbuta, ad arcendū animi deliquium,
eisdem offerantur, in aëre q; parum frigidiori degant.
Si vero siccitate, vel aliqua re comprimente, partus re-
tardauerit, oleum dulce calidum commodē iunctur
cum decoct. scenneg. aut malua, vel seminis lini, aut ouo
coniecto, nam & plurimum recreat. Exinde ventri,
pubi, lumbiq; cataplasmata ex lini semine imponun-
tur, & hydrelas; vaporationsq; & balnea ex supra-
dictis, modo febris absit; & parturientem in lectica in
conclauis, vt supra, ponemus: Timidis ac puellis mentis
robore admoendum, quemadmodum eis, quae inex-
pertes dolorum sunt, vt validissime spiritum compri-
manti, & ad inguina depellat. Inprimis enim metuen-
tem

Si ex immodico calore fiat, curatio.

Si ex siccitate, curatio.

Si timide, quid faciendum.

tem adhortamur; sicuti inexperiam doloris increpa-
mus: sed precipue spiritum continere & illa conflare,
qua animi defectum pati inceperit: etiam, præter
ea qua diximus, odoramentis recreamus: & ad sensus
reuocamus, exiguo cibo, sed præstanti, reficimus. Sic ut
imida sunt corroboranda, ita & ita cōcitatiores com-
escenda sunt. At si mulier ob virium imbecillitatem
parere non possit, reparanda est imbecillitas illa anse-
mptis patris; aut si imbecillior facta fuerit propter
morbum præcedentem, aut aliquam euacuationem, aut
dissolutionem spirituum, aut propter aliam causam,
alenda est euchymis & multum nutrientibus, ut vino,
succo carnis, testiculis galli, & similibus. Si autem ea
imbecillitas proueniat ob longam defatigationem in ipso
partu, circa insignem sanguinis euacuationem, bonus
erit dare portionem cordialem ex confectione alcher-
mes cum vino, vel cum iusculo; vel parare portionem ex
aliis pulueribus cordialibus, ut: R. diamb. vel diamoschi
3 j. pul. diagalanga & diarod. abb. añ. 3 ss. vini albi 3 q.
aque betonica et meliss. bugloss añ. 3 ij. misce, fiat potus.
capiat ventriculo vacuo, & per duas horas nihil acci-
piat. Quomodo modo igitur imbecilla sint mulieres par-
turientes, ex morbo, temperamento, vel ætate prouecta,
eisdem cibis boni nutrimenti ac potibus reficienda sunt,
vino odorifero, bonis iusculis, adiectis cinnamomo &
croco, sumendo tessellam vnam diamarg. calidi. lucundi
odores, ac styrax calamitu, moschus naribus admovea-
tur; nec verendum, ut quidam sentiunt, matricem, qua
bonis odoribus delectatur, sursum reuocari, sicq; partum
impediri. Nam sævus grauitas vterum deprimis, sur-
sumq; ascendere prohibet, atq; interim bonis illis odori-
bus parturienti vires, & spiritus roborantur, valdeq; iu-
uan-

Si mulier ob
virium im-
becillitatem
parere non
possit, cura-
tio.

uantur. Quod si ob lumborum cauitatem, aut propter
 nimiam pinguedinem, pariendi difficultas contigerit,
 eadem erit curatio quam in præcedente Obs. diximus.
 Puerpera misella prona flexu genibus collocetur, seu
 in lectulo, ut vterus delabens ceruicem rectam ex-
 tendat, atque idem è directo ostioli habeatur; quod
 quidem ceratis, oleis, ac pinguedine delinire digito
 oportet, & sensim aperire. Idem quoque vteri oscu-
 lum, ubi clausum fuerit aut permanserit, pinguius
 medicamentis emolliatur ac relaxetur. Hæc vltima
 causa, sicuti & sequentes, ad vteri vicia pertinet; de
 quibus & nunc etiam speciatim agamus. Si igitur
 contingat difficultas partus ex constrictione orificij
 matris, cuius cura grauior est inter omnes, idèd tale
 subiungimus consilium Eroti seu Trotula. Prouideat
 sibi mulier in tribus vltimis mensibus in dieta, utatur
 leuibus cibis & digestilibus, & per quos membra
 dilatentur, qualia sunt vitella ouorum, carnes &
 iura pullorum & minorum animalium, perdicum, phas-
 norum, & piscium squamosorum cum bono condi-
 mento. Sed hæc subsequenda, instante partu, adhi-
 benda: balneum aquæ dulcis, in qua herbe emollien-
 tes bullierint: sed balneum ærium & stupham
 fugiat. à balneo exiens inungatur oleo seminis lini,
 axung. anseris, vel anatis, vel gallina, ab umbi-
 lico inferius. Aërius lib. 16. cap. 22. paucis verbis
 dicit: Si vteri ostium clausum persistat, pinguius
 medicamentis emolliemus & relaxabimus. Et ita quo-
 que Aegineta: Si ex adstrictione sit, laxatione prius
 opitulandum, infundendo largiter oleum dulce &
 calidum, & decoctum scænuæ. malua, & sem. lini,
 & aliis leniendi facultate præditi: in seffus ex hydre-
 leo

Quomodo
 difficultas
 partus cure-
 tur ex con-
 strictione
 orificij ma-
 tricis.

leo & aliis supradictis. Si vulua paruitas in causa fuerit, loca pingui quopiam etiam inungenda & fouenda erunt, osq; vulua digitis dilatandum, ac sætas violenter extrahendus; idemq; si non successerit, dissectus: quod præcipue facere oportet, si fœtus præ magnus fuerit, vel interierit. sed de iis postea. Si ob alia vitia vteri mulier parere non possit, inquit Aëtius, siue ob inflammationem, vlcus, œdema, duritiem, aut quippiam simile; infestantibus morbis occurremus. Si ob carnem collo vteri innatam, aut tunicam obstruentem, pariendi difficultas eueniat, sicut non perforatis mulieribus accidit; quodcunq; impedimento fuerit, amputabimus. Et si morbus aliquis particulas vicinas obsederit, huic etiam prospiciemus: ut si ossa pubis nimium conferta fuerint, quoniam in partu dilatari non possunt, linimentis pinguibus oleosis ea relaxabimus. ita quoque si vesica calculus affuerit, eum primò propellere oportet: & si eadem lotio oleosa fuerit, idem educendum: similiter si intestinum rectum excrementis plenum fuerit, vel repletum, clysteri, inquit Aëtius, abluemus, vel melius cum balanis, ut prius diximus, & urinam retentam tubulo, iuxta eundem Aëtium, eliciemus. Vtile enim est parturientibus ut quouis modo lotium emittant: imò utilissimum ut rectum intestinum vacuum sit omnino excrementis; sic enim facilius parit, ut longa experientia vidimus, & exemplo antea ostendimus. Nunc de curatione dicamus si ex parte fœtus fiat difficultas: quæ etiam ex parte liquet Obs. 70. præcedente De partu difficili ex magnitudine fœtus, & Obs. 71. ob innaturalem positionem fœtus: tum ex sequentibus exemplis hac curatio multo clarior euadet.

Si vuluæ paruitas in causa sit, quid faciendum.

Si ex aliis vteri vitiis.

Si ob partes vicinas lætas vel impeditas.

K k

OBSER-

OBSERVATIO LXXV.

De partu difficili ob geminos.

MARIA Petri Sasbori diuitis illius Zy-
 thepsie Delphensis filia, quæ in ædibus
 paternis habitabat in Mundi intersignio, ex
 duobus gemellis masculis in partu difficili peri-
 clitabatur. Cùm itaque anno 1566. 25. Octob.
 parere non posset, nec obstetrix, etiam fotu ad-
 hibito ex floribus chamæmeli, artemis. & po-
 lygoni, quid proficeret, cùm prænantem in
 eo balneo pedibus ad femora vsque imposuif-
 set; maxima angustia parturiens correpta fuit;
 ita vt enixus partus qui prius aderant, omnino
 cessarint. Ad quam ego vnà cum Ericio collega
 meo primùm 28. die Octobris acciti fuimus,
 & vnà hæc subsequentiâ præscripsimus: ꝛ pu-
 legij, calamenthæ, hyssopi, añ. m. ꝑ. caput vnum
 radicis liliorum albor. myrrhæ ꝑ. ij. puluerisatis
 adde terebinthinæ & mellis q. l. fiant duo pessi
 sindone serico obuoluti. ꝛ olei lilior. albor. lini,
 amygd. dule. añ. ꝑ. j. olei irini, sabini, añ. ꝑ. ꝑ.
 misce; ac pessi illis oleis tum vulua intus inun-
 gatur: ꝛ cinnamomi electi ꝑ. ij. ꝑ. nucleor. da-
 ctyl. num. ij. casie lignæ, daronici Romani,
 añ. ꝑ. j. sabinæ m. j. fiat puluis pro ij. dosibus.
 dedimus cum vino maluatico, cùm nulla ad-
 esset febris. 29. Octobris: ꝛ cinnamomi selecti
 ꝑ. j. daronici Romani, galangæ, calami arom. añ.
 ꝑ. ꝑ. sabinæ p. j. pul. perlarum subtiliss. tritarum
 (quia

(quia debilis) vnicornu, añ. Ʒß. rasuram nuclei dactyli vnus; fiat puluis pro tribus dosibus; & cum vino maluatico propinabatur. 30. die Octob. cū partus instaret, obstetrix Heyla nomine, alioqui in obstetricandi arte perita, paratam penes se habebat expressionem foliorum lauri, gallitrici, nepitæ, cum vino Rheno, quam propinare decreuerat. At nos, ne caput tentaret, folia lauri amouenda esse diximus, cū herba capitalis esset, & eius loco (ne gloriosæ obstetrici curatio adscriberetur) pulegium viride accepimus, atque illud expressum cum reliquis supradictis, exceptis foliis lauri, propinauimus, & post assumptum hoc medicamentum, hora secunda, eodem die peperit masculum viuum. Interea obstetrici ac astantibus mulierculis mandaueramus, si ob partus angustiam, qui tot diebus enixu lassauerat, in lipothymiam incideret, aut syncopen, vel in fluxum nimium, aut morbum vterinum, quo aliàs laborare consueuerat, à me tamen antea curata, vt ex syrupis qui tunc ad manum erāt cochlear vnumsumeret: & syr. ex ros. sic. ʒij. syr. absinthij ʒj. perlaturum exquisitarum subtiliss. tritarum ʒj. misce. Sed quia syncope illam non apprehendebat, ideo propinatum non fuit. Postea cū secundum fœtum parere non posset, neq. à se excutere, fluxu quoque iam apparente, inhibuimus tunc ne ex puluere superscripto cum vino maluatico amplius sumeret. Deinde quia certis signis fœtum mortuum esse coniciebamus, qui etiam inuersus & cum brachio malè

516 DE MYLIERVM MORBIS,
locatus erat, cum vt obstetrix dextrè reponeret
præcepimus. Interim dum rursus conamina
seu enixus partus intenderentur, refocillatis vi-
ribus optimis cibis, & iusculis, adiecto cinna-
momi puluere, (nam omnibus modis ad par-
tum facilitandum confert) primo die Nouem-
bris, manè hora quarta secundum masculum
peperit, sed mortuum cum brachio & collo li-
uido; obstetrice tamen affirmante, paulo ante-
quam pateret partum vixisse, & in ipso vehe-
menti enixu expirasse. Ceterum cum deinde
puerpera ipsa post duos partus laboriosos ma-
ximo dolore afficeretur, qui plerumque puer-
peras subsequi solent, exhibuimus cereuisiam,
in qua flores chamæmeli decocti erant. Hoc
enim, licet simplici remedio, tanquam tamen
arcano, etiam Alcmæiz, antequam Delphos
venirem, vti solebam; & etiam nunc semper,
cum maximo successu. Proinde eo decocto
sumpto, doloribus paulatim cessantibus, opti-
mè deinde fuit purgata in puerperio, & bellissi-
mè se habuit. Quanquam hæc ipsa post duas
septimanas in puerperio, incidit in abscessum
maxillæ, & denique dolorem haud exiguum.
At cum perciperemus exterius in maxilla du-
ritiem quandam esse, accepimus diachyli cum
gummis ℥ss. supra coria rotunda quatuor eius-
dem formæ, paulo ampliora daleto, inducen-
tes: quorum continua impositione, vnius post
alterum, ruptus est abscessus paulo supra men-
tum; & facta mundificatione, & consolidatio-
ne per chirurgum sine manifesta cicatrice, rectè
fuit

fuit curata. Fortè hunc abscessum contraxerat ex frigore externo, cum octo diebus in difficili partu fuisset, antequam ultimus seu secundus partus prodiret. At cum hæc rescriberem mense Decembri anno 1589. bellè habebat; & etiam anno 1595. quo rursus Alcmariam à magistratu Alcmariano reuocatus eram.

SCHOLIA.

QUÆ verò non vteram gerentis vitio, sed ipsius ^{Si ex parte} factus, difficultatis pariendi causa sunt, hoc ^{factus sit,} modo corrigenda erunt. Si gemini facti fuerint, aut ^{causatio.} terni, aut plures, ac collum vteri obsederint, reliqui ad fundum vteri repellantur, & is qui magis paratus videbitur, prius educatur: sensim autem & circa contusionem omnia fiunt, oleo loco perunctis, ut idem Paulus refert. Et sic ex Moschione: Vbi duo, tres, ^{Si duo vel} quatuor, pluresve simul se ad orificium contulerint, ^{plures, quid} ^{agendum.} in sinum vulva omnes sunt repellendi, & sic sigillatim recipiendi. Et ita si propter ipsius factus figuram, mater naturam, partus difficultas adsit, ad naturam situm reducendus est, quantum eius fieri potest, partim pellendo, partim adducendo, partim flectendo, & partim in rectum agendo, ut inquit Paulus. Et si manum vel pedem pramiserit, ne attrahatur per membrum, nam magis impingitur, aut luxatur, aut etiam abrumpitur; verum digitus humero factus, vel ossa affixis, rursus in convenientem locum introduatur; id quod iam premissum est. Oportet autem hysterice primò vnguidus incisus oleo illiniri, & digitus in vnum conductis, schemata mala infans corri-

gere. Vbi enim valde infixus est, prius eum à loco in-
oportuno euellere oportet. Si rectè positus sit, & ad
manum perueniat, teneat eum, & sic educat. Sin in-
diuexum aut obliquum iacet, iuxta Moschionem,
immissa manu obstetrix eum componat; & si in ca-
put proximum inuenit, ipsum teneat & abducatur. Si
infans caput interius habuerit, & si duas manus eui-
cit, oportet obstetricem prius immissa manu sua ca-
put ad orificium corrigere, & comprahensis manibus
infantis, conari ne caput eius orificium vuluæ obthu-
ret, vt facillimè omne corpus infantis exire possit, quo
prioribus manus exierant. Quoties videlicet manus
emittat, non abducatur, relicto capite intus orificium
matricis obturante; sed potius digitis in humerum
infixu, retrorsum agat, & in capacitatem vuluæ posi-
tum ita componat, vt manus eius erectas lateribus
iungat, & apprahens capite foras conari incipiat,
ne vitiosus, aut manu exarticulata prodeat. Si in pe-
des descendat, vt antea dictum est, age. Si ambos eie-
cerit, duabus manibus suis obstetrix in inguinibus in-
fixis sursum repellat, & compositum foras eiciat. Si
vnum pedem, corrigatur; & si fieri potest, manibus
eius lateribus iungat, & apprahensis pedibus foras
adducere conetur. Si diuisis pedibus duabus partibus
vulua plantas infigat, immissa manu obstetrix eos
iungat ad orificia matricis, eosq; componat, & sic
educat. Si in genua exeat, retrorsum pellendus est,
& correctis manibus, fortè & pedibus, adducendus.
Si in nates, retro infantem impellat, vel repellat, &
correptis manibus vel pedibus educat. Si grande ca-
put habeat vt exire non possit, intrinsecus repellendus
est, & vñctionibus vñcto orificio, immissa manu ob-
stetrix

Si autem
ne-
te
quum
faciat, quid
faciendum.

Si ambæ
manus foras
veniunt.

Si ambos
pedes vel
vnum reie-
cerit, vel di-
uisi sunt.

In genua, in
nates.

Si caput
grande vel
contortum.

obstetrix eum adducat, tenens caput eius, adiuvante etiam conatu suo parturiente. Si caput contortum habuerit, immissa manu id corrigat, & humeris comprehensum leniter adducat, ne matrix ipsa quassetur. Si duplicatus; quod duobus modis fit, quoties nates in orificio inveniuntur, & in interiori parte fiet duplicatio, secundo modo quando caput & planta in orificio fuerint in superiori parte; potest obstetrix ita corrigere, ut plantis revocatis sursum, caput hic teneat, & sic infantem foras adducat. Si in diuexum iaceat, aut supinus, vel in dentes, praeipimus ut in vulva displicitus & apprehenso capite adducatur. enimvero obstetrix leuiter immisisis digitis in latus eum conuertat, & accepto spacio ut vel unam manum immittere possit, eum facillime ad integrum schema componat; & quascunque partes orificio propiores habuerit, easdem teneat, & sic adducat; ita tamen ut maxime caput infantis querat, & ipsum teneat, & sic adducat. Hac autem omnia leniter ab obstetrice & sine quassatione facienda sunt; ita ut frequenter oleum calidum, vel succum foenugraci, lini, & maluae decoctum infundat. Hac enim diligentia & lapsus infantibus praeprarat, ut sani eundem possint, & quae parit, sine vexatione & sine quassatione seruetur. Plures enim infantes post difficultum partum euasisse cognouimus, & vivere vidimus. Si latitudinaliter exeat, pendente una ex

Si duplicatus.

Si in diuexum iaceat, aut supinus.

Exitus foetus latitudinaliter, pendente una ex manibus eius.

sella, & compone fœtum secundum figuram naturalem, adhibita sternutatione, & comprimat se donec egrediatur. Plura de his vide in libris Harmonia Gynæciorum, & præcipuè librum 4. Iacobi Ruef, cum

Si vna cum
fœtus figura
mala, os vteri
compressum
est, quid sit faciendum.

figuris schematum innaturalium partuum. At si vna cum fœtus figura mala, os vteri compressum, seu coarctatum fuerit, prius ab osculo vteri in sublime eleuetur fœtus, & postea rursus ad osculum rectè dirigatur, fiantq; omnia placidè, leniter, ac citra compressionem, oleo assiduè locis affuso: hoc etenim ex salute tum fœtus, tum parientis fuerit, & vterus ita quoque illasus manet. Vbi verò infans pramagnus fuerit, aut rotus, aut ob capitis seu thoracis aut ventris magnitudinem, ea adhibenda sunt tum intus tum extrà, qua laxare ac dilatare vteri os possunt. huius exemplum posuimus Obs. 70. precedente. Ita &

Si infans nimis magnus, quid agendum.

Historia
difficilis partus
ex magnitudine
fœtus.

anno 1561. mense Decembri ad mulierem obesam quoque accitus, cum duobus diebus in partu difficilis fuisset ob magnitudinem fœtus, & variis diuersisq; remediis obstetricis tum muliercularum vsa fuisset, sed aluo duriore existente, vnde vterus magis comprimebatur, glandem immitti iussi, & statim ubi aluum deposuisset, atque vterus per linimenta & olea emollietia relaxatus esset, & puluerem hunc sequentem parturienti dedissem, mox feliciter peperit. Hoc modo à me componitur & in vsu habetur: R. rad. dictamni albi vulgaris ℥vj. ligni aloës, lapidis dactylor. misce, & fiat pul. datur ℥j. cum vino. Est quoque in vsu apud nos pul. partur. ex sola radice dictamni albi, si cum aqua raphani dentur ℥ij. non enim solum vermes, sed fœtum mortuum expellit: etiam in aqua sabina, ut experti sumus in difficili partu
etiam

etiam ad mortuum fœtum expellendum & secundam propulsandam. Sumpserat & hæc pul. dominarum ʒ β. cum decoct. artemisia, flor. chamamel. sabina ʒ iij. & syr. de artemisia. ita in officina paratus habebatur: ʒ cinnamomi ʒ β. ʒinz. galanga, curcuma, baccarum lauri, añ. ʒ ij. caryophyl. nucis moschata, añ. ʒ j. β. croci ʒ j. cumini prepar. ʒ j. β. macis ʒ j. sem. iuniperi ʒ ij. sem. Zedoar. ʒ j. sacch. ʒ vj. fiat puluis, & immissa glande, & irritatione eiusdem, epoto puluere partus, clamabat quod lectum confœdaret, & aluo soluta, muliebribus prius inunctis, enixa est, ut dixi, fœtum præmagnum. At si fœtus magnus eo quo iam diximus nondum procedat modo, aut etiam infans mortuus fuerit, modò spes sit salutis, omnino necessarium est fœtum secare, ex communi sententia tum Aëtij tum Pauli, ut postea dicemus. At si propter fœtus imbecillitatem aut paruitatem difficultas pariendi contingat, præter id quod mulieres sunt hortanda, ut strenuè mediis abdominis musculis eundem fœtum conentur expellere, vinum maluaticum dandum (si nempe motus pueri ob imbecillitatem vix sentiatur) modò non adsit febris; alioqui iuscula ad refocillandum fœtum conueniunt. Si verdè ex parte membranarum contingat pariendi difficultas, ubi secunda solidior ac crassior fuerit, quàm ut rumpi possit, discindatur, inquit Aëtius. tamen, secundum alios, obstetrix prius tentabit nam vnguibus leniter discerpere & rumpere possit. Verùm si propter tunicarum tenuitatem, in quibus humor continetur, difficilis fiat partus, propterea quod humor in membranis contentus ante debitum tempus effluxerit, ita ut vteri sint resicati; eis albu-

Si fœtus sit imbecillis, quid agendum.

Ex parte membranarum si fiat difficilis partus, curatio.

522 DE MULIERVM MORBIS,
mina ouorum cum malua aut fenugr. decocto ex-
colato, aut cum ptisana cremore tepido infundantur,
decreto eiusdem Aëij; cuius exemplum quoque po-
suimus Obs. 71. precedente huius libri. Memini, so-
rum meam mihi aliquando narrasse, quòd Catha-
rina Iacobi, vxor Florentij Teylingij, sororij mei, pro-
pter membranam nimis tenuem statim perruptam
effuso humore, plerumque per sex pluresve dies in
difficili partu permanserit, non sine vitæ periculo,
obstetrice imperita, nec Medicum vocante. Ita enim
obstetrices quadam sunt nimis sciola & obstinata,
attamen planè indocta, vñ nec legere nec scribere no-
runt; quales & nos, prohi dolor, aliquando nouimus.
& præter quòd ipsæmet non sciunt adhibere remedia
ad partus difficiles ob varias causas, ne Medicum
quidem doctum admittunt, vt eas doceat, ac imperet
quid factu opus sit.

OBSERVATIO LXXVI.

*De quibusdam mulieribus, quæ ob mortuos
infantes ex difficili partu laborarunt.*

ANNO 1552. 17. die Martij, mulier Aléma-
riana nobis vicina cùm gemellos mor-
tuos in ventre haberet, & quinque diebus aut
pluribus in partu periclitaretur, nec, vt fieri as-
solet, obstetrix cum omnibus suis remedijs ten-
tatis ab vtero depellere posset; tunc me prius
vocauit cùm mulier partuticiens animam ageret,
humore multis diebus iam effuso. totus venter
frigebat, eratque interstitium in ventre, vt fa-
cile

cilè ibi gemellos mortuos adesse censeremus; quos & ante tres quatuorve dies mortuos etiam esse obitrix referebat. Ego verò tardius vocatus, iussi tamen ventri ut adhiberet linimenta ex oleis relaxantibus calidè, tum fomenta; similiter ut decoct. ex sem. lini, fienogr. malux, vna cum mucilag. & oleo liliaceo vterum intus humectaret; ac eiusmodi perfusionibus relaxantibus, aperientibus, & humectantibus, & moderatè calfacientibus, etiam cataplasmatibus similibus venni impositis vteretur præcepi. dedi per os decoctum antemissæ, sabinae, cum aqua lilior. deinde accepi sabinam viridem adiecto paucis croco contusam, eamque linteolo obuolutam pelli instar, & oleo liliaceo immerfam, iussi ut in vuluam poneret, & ibidem aliquantulum hæret. A quibus medicamentis vix per quartam partem horæ mulier fœtum mortuum reiecit, & deinde post horas quatuordecim alterum etiam mortuum cum maxima difficultate & labore peperit. Erantque ambo gemelli non solum mortui, sed plumbei atque corrupti, & valde fœtidi, ut vidimus. Sed misera paupercula multis diebus præcedentibus, sed frustra, defatigata, quamvis statim ut accessimus, (sed proh dolor tardius) ad vires refocillandas, insensilis tum aliis resumptivis vteremur, cum vires tamen neque post partum vlllo modo reparati possent, paulo post obiit; nimis nascuta existente obstetrice, quæ Medicum non vocauerat oportune, ita ut multe parturientes, proh dolor, earum negligentia perdantur.

tur. Etiam altera rustica mulier, anno 1552. ad Mosam pagum per quinque dies etiam partu difficili laborabat, ex fœtu non solum mortuo, sed eodem malè posito, quæ erat vxor rustici illius Petri cognomento Diutis. Ad hanc quoque vocatus, obstetrici imprimis mandavi, vt ad naturalem situm, quantum possibile esset, fœtum deduceret, partim flectendo leniter, partim pellendo sine vehementia, & partim in rectum ducendo. vbi igitur dixit, rectè caput ad ostium vteri lapsum esse, & nunc partum expectare, hanc potionem propinaui: & decoct. fabinae, verbenæ, artemisiæ in vino Rhenensi ℥ij. aquæ liliorum alborum ℥j. pulueris dominarum ℥j. syr. artemisiæ ℥ss. misce, sumpsit vnica vice. Interim nostro iussu ventrem inferiorem inungebat obstetriz oleo amygd. dul. sesam. cheyrino, liliorum, butyr. recenti, & pinguedine gallinæ, simul commixtis, & digitis inunctis oleo amygd. dul. & oleo liliaceo, vt commodius arte obstetricandi vteretur, & infantem mortuum susciperet. Post duas horas, cum pro deplorata parturiens haberetur, ab assumpta portione, magno cum meo honore, à fœtu mortuo liberata est, cum animam agere videretur. At hîc, proh dolor, ex crassa ipsius obstetricis rusticæ imperitia, cum violenter partum ederet agra, anus & vulua vi fœtus magni ac mortui perrupta sunt, ita vt vnum foramen factû sit. Solet id enim aliquando in difficili partu, & valde violento, & in fœtu mortuo, eoque magno existente, fieri, cum vehemēti

menti & magno enixu partum reiiciunt. Quod
equidem sæpe ob imperitiam obstetricum eue-
nit; vti in hac parturiente rustica primipara
contigit, quamvis duæ adessent obstetrices, sed
rusticæ & parum in arte obstetricandi peritæ.
Hac etiam de causa, ne illud amplius fieret, &
vt hoc periculum euitetur, consulo semper an-
tequam fœtus reiiciatur, aut enixus contingat,
vt pannum lineum molliusculum, instar pilæ
oblongum & contortum paratum habeant, &
vt in anum ponant, mando: idq. ob hanc cau-
sam vt in quolibet conatu infantem eiiciendi,
firmiter obstetrix eundem pannum in anum
imprimat, ne eiusmodi continuitatis solutio
fiat. Estque hoc consilium Eronidis seu Tro-
tulæ, lib. De pass. mulier. cap. 20. De iis quæ
post partum accidunt. At bona fortuna hæc
rustica nacta medicastram & chirurgi viduam,
quam nos monuimus quid agere deberet (nam
obstetrices negligentes, quanquam post lotio-
nem à sordibus & purè puerperam repurgas-
sent, per aliquot dies illud inconueniens seu
graue symptomata subtricerunt) filo serico par-
tes solutas vniendo, vt moris est, fuit tandem
probè curata. At anno 1566. mense Decem-
bri feliciori successu Elizabetha Henrici, Iaco-
bi cereuisiarij vxor, in cuius cupis gallus pro
insigni erat, filiam cum peperisset, & secundam
prolem parere non posset, his infrascriptis per-
me, nutu Dei, aliam femellam priore multo
maiores, nempe secundam peperit: & cinna-
momæ puluerisati ℥ iij. cassiæ lignæ, doronici
Roma-

Romani, añ. ʒ. ꝑ. nucleum vnum dactylorum,
 fabina ʒ. j. perlarum finissimarum ʒ. ꝑ. fiat pul.
 partiatur in duas partes; detur cum vino mal-
 uatico: ꝛ olei amygd. dul. liliorum, sesami-
 ni, butyri recentis, ping. gallinae, anaui, añ. ʒ. ꝑ.
 misce, inungatur venter inferior: ꝛ manus
 Christi cum perlis ʒ. j. ꝑ. detur cum panata ce-
 reuifiaria, pro debilitate. Sumpto puluere, &
 prius vna dosi, & hora post altera, post horas
 quinque peperit secundum foetum, nempe se-
 mellam. Verum vxor Cornelij Iacobi pictoris
 in octauo mense, anno 1571. coemiterium tran-
 siens prolapsa, post casum domum reuersa fo-
 tum non sentiebat. at 14. die prius post casum
 subsequuta sunt partus conamina, & ingens
 mentium fluxus; vnde obstetrix accita fuit, vt
 a partu, qui etiam credebat mortuus esse, li-
 berari posset: sed adeo debilis erat, vt ex nimio
 illo fluxu lipothymiam incurreret, & quasi syn-
 copem. tunc prius sub noctem ad eam vocatus
 sum 22. die Februarij. Sumpserat autem eodem
 tempore panatam cereuifiariam cum nuce mo-
 schata, ex obstetricis tum astantium consilio; &
 valde angebatur, etiam deliquio animi subse-
 quente, ob fluxum, enixu partus cessante. Ob de-
 liquiu animi dedi sequens: ꝛ syr. de limonibus
 ʒ. ij. perlar. subtilissimè tritaru ʒ. ꝑ. misce, statim
 euomuit. Post vomitu paululum recreata hanc
 puluerem sequentem vt vna hora post alteram
 exhiberent mandauit: & deinde peperit foetum
 mortuum; cuius brachium etiam ruptum erat
 ex casu precedente: alioqui erat foetus optimè
 forma-

formatus, sed octimestris; qui partus vivere non solent: & rasuræ dactylor. nucleor. ʒʒ. sem. viol. ʒ j. cinnamomi ʒ j. perlatur. gra. v. fiat pul. subtilissimus; diuidatur in duas partes. accipit cum vino maluatico; interim digitis obstetricis tum ventre inunctis oleis sequentibus. Et puluere exhibito paulo ante 10. horam noctis, & deinde hora 11. altera dosi sumpta, & circa 12. horam noctis peperit fœtum mortuum, sed ipsa salua euasit, quamuis ab omnibus pro deplorata habita. Anno 1576. 12. Augusti paupercula cum per octo dies in difficili partu hæssisset, & fœtum mortuum haberet, neque parere posset, & obstetrix de vita parturientis desperaret, his sequentibus etiam à partu mortuo, Dei nutu, liberata, peperit fœtum mortuum, & sana euasit; quæ adhuc uiuit nunc uidua, uti & altera præcedens etiam nunc uidua mense Decemb. anno 1589. cum hæc rescriberetur: & olei sesamini, lilior. cheyrini, añ. ʒʒ. uenter inferior sub umbilico ad inguina usq. iis inungatur: & rad. dictamni albi ʒ ij. ʒ sem. viol. ʒ j. sabin. ʒʒ. cinnamomi elect. ʒ ij. rasuræ dactylor. gr. v. pulueriscentur subtilissimè, & diuidatur in duas partes, una dosi sumpta, & deinde altera, post duas horas fœtum mortuum corruptū reiecit. Alia quoq. mulier ex infima plebe, Delphis in vico facis cerenisiaræ dictæ, anno 1591. 22. die Aprilis cum in difficili partu esset, fœtu etiā per 4. dies mortuo, duabus præsentibus obstetricibus, manu extra uterum propendente, nullo nixu adiuta, viribus destitutis, pro deplorata cum haberetur, his sequentibus reme-

528 DE MULIERVM MORBIS,
 remediis per me descriptis fœtum mortuum
 reiecit: & sabinz viridis ꝓ ij. artemisiæ ꝓ ꝑ. ebul-
 liant semel in aqua artemisiæ, & lilior. vnica
 vice; & huius expressionis accipe ꝓ ij. ꝑ. pul-
 sem. viol. rad. dictamni albi, cinnamomi, añ.
 ꝓ ꝑ. misce. & butyri recentis, olei liliorum, añ.
 ꝓ j. ꝑ. pingued. gallinæ, anseris, caponis, añ. ꝓ
 ꝑ. misce. per totum ventrem ab vmbilico vsque
 ad pubem & inguina inungatur. Ad vires de-
 biles capiebat sacch. perlatum cum cereuisia.
 Et, Deo adiuuante, præter omnium spem reie-
 cit fœtum mortuum: deinde bene purgata re-
 cte habuit, & conualuit.

SCHOLIA.

Quæ par-
 tum mor-
 tuum edu-
 cit.

FŒTVS autem viuus suo motu nisi q̃ partum &
 adiuuat & accelerat. At mortuus prorsus cessat
 à motu: adest ventris frigiditas, vt antea diximus,
 & dolor iuxta vmbilicum grauis, spiritus exhalat
 fœtidus, faciei q̃ parturientis color prauus est. Et
 quia non se mouet, multo difficilius prodit quàm vi-
 uus: ideo & fortiora adhibenda sæpe prasidia. Inter
 simplicia betonica ꝓ j. bibitur in vini cyathis tribus:
 & partus mortuos extrahunt radices panacis appo-
 sitæ. & dictamno vis est partus emortuos vel trans-
 uersos eiicere, nec potu tantum, sed & illicitu & suffi-
 tu valet. Ex Harmonia Gynæciorum part. priore,
 cap. 16. De pessariis fœtum mortuum expellentibus:
 Latiridis ꝓ ꝑ. cum succo porri conteres, & facies
 pessarium duorum digitorum & subiicies: citò edu-
 cit. Citri folia coques in aqua, & bene inde fomen-
 ta vuluam intus, & partum educet, etiam si mor-
 tuus

tuus sit. vide Bonacium muliebrium lib. 1. Suffitu
vngula asinina, vt abortus euocetur: nec aliter adhi-
betur, quoniam viuentem fœtum seu partumocy-
sime interrecat, cum mortuum educat. Alij addunt
hunc pessum ad fœtum mortuum educendum. Ari-
stolochia rotunda, myrrha, ellebori, añ ʒss. excipian-
tur succo pulegij, linteis deinde raro inuoluantur,
fingatursq; pessus, qui in vterum demittatur. Suffitus
præterea ex simo equi, aut asini, aut ex vngula co-
rundem. Alij vtuntur trochiscis ex gummiis, inde su-
migia parantes; vel ex truncis caulium, myrrha, &
felle tauri, pessos conficientes. vel ex myrrha, elleboro
nigro, opopanace, felle tauri, p. e. Et si istis non pella-
tur, ad sectionem veniunt: de qua postea. Nunc hi-
storiã adducamus, quomodo mulier quædam fœtum
corruptum paulatim excreuerit, quæ & hoc tempo-
re adhuc viuit, nempe anno 1593.

OBSERVATIO LXXVII.

*De muliere fœtum corruptum paula-
tim exonerante.*

MULIER prægnans, quæ extra fossam
aqueam habitabat, cum ad 15. septima-
as grauida fuisset, ab eo tempore menses non
uxerunt. Sed cum ex onere subleuato dolo-
rem in ventre sentiret, aperti sunt menses anno
1564. circa Natiuitatem Domini. Cum autem
yems asperrima esset, mensesque fluere, ge-
næ quoque intensum, ita vt tutum non esset am-
ulare per plateas glacie concretas, non sine me-

L I

tu ca-

tu cadendi; hæc tamen eo tempore in forum
prodiit: sed, curru occurrente, prolapsa in ter-
ram, & rota currus circumacta sese eleuare su-
bito non potuit, atq. femur fractum fuit: quin
ipsa referebat (ac alij quoque qui idem vide-
rant) rotam ipsam currus molitoris (qui graue
pondus, & sarcinas frumenti vel farinæ multas
sustinet) pectus ventremque ipsum transisse.
Ceterum hæc ipsa per chirurgum à fractura fe-
moris curata fuit: sed menstruæ purgationes ab
eo tempore paulatim stillabant: non tamen co-
piosè, ventre tumido permanente, etiam mam-
millis magis accrescentibus & in maiorem mo-
lem eleuatis ac extuberantibus. Postea quoque
à fractura femoris probè curata denuo incede-
bat. Verum cum curru in Hagam Comitris cir-
ca 26. Februarij diem anno 1565. veheretur, do-
mum rediens ex concussione currus maximè in
ventre dolere cepit, & 27. Feb. die menses aper-
ti admodum copiosè fluxerunt. deinde cum
mamillæ duræ essent, & quasi sanguis ab iis
distillaret, nouitate rei obstetrix quæ aderat
commota me in consilium adhibuit. postea
etiā lac è mamillis fluebat. Ego verò iudica-
bam fœtus corruptelam adesse, vel quòd in in-
fantiā verteretur; vt postea latius in Scholio.
Ceterum cum omnia mihi referrentur quæ au-
tea mulier passa esset, femur fuisse ruptum,
deinde curatum, & curru per ventrem tran-
sisse cum grauida foret; ego fœtum corruptum
adesse iudicabam, obstetrix verò molam car-
neam esse existimabat, ventre ipsius gravidæ
duro

duro permanente. Sentiebat quidem modò in hoc, modò in aliud latus, cùm sese volueret aut moueret. Eo autem tempore quo vocatus eram, lecto incumbibat, & facies ei alba & exsanguis erat, mammillæ durissimæ, & valde dolebant, vt obstetrix abscellum quasi in iisdem expectaret. 28. Februarij ad eam accitus, vt ventrem durum obstetrix inungeret sequenti linimento iussit: & pingued. gallinæ, anatis, porcinæ, mucilag. fœnugr. alihææ extract. cum aqua maluæ & lilior. olei liliorum, butyri recentis, añ. ʒ β olei sabinæ ʒ iij. misce. mammæ inungebat oleo amygd. dulcium; & potum sequentem sumsit: & syr. artemisiæ ʒ ij. aquæ artemisiæ ʒ iij. aquæ lilior. albor. ʒ ij. pulueris parturientium ʒ iij. pul. dominarum ʒ j. pul. sabinæ ʒ β. diuidatur in duas partes. Vna ebibita manè, & cùm post meridiem redirem, mensibus fluentibus, incepit particulas carneas ipsius fœtus corrupti excernere paulatim, tum ossa quasi cartilaginea & mucosa, vt non compacta & vix ossa apparerent, quæ obstetrix reseruauerat, & nobis ostendit. Mammillæ ex inunctione iam dicta molliores euadebant, postquam fœtum ita corruptum paulatim excerneret. Hora quarta pomeridiana (quanquam ægrè admittebat) reliquum potionis cum altera parte pulueris propinaui. Nocte valde angebatur (non tamen febricitabat; quod mirum est in fœtus corruptela) & euomuit sanguinem per superiora, vt idem etiam per os & nares exiret. At à vomitu multo melius habuit, & alleuiata est

532 DE MULIERVM MORBIS,
 ab illo tempore, & sanguis ex mammillis am-
 plius non exibat, omnisque durities mammi-
 larum cessauit, quamuis effluerit per aliquot
 dies lac corruptum ex mammillis: deinde pau-
 latim, præter multa putida sanguinolenta &
 saniosa, particulæ foetus seu embryonis, ex vic-
 ro emanabant, vt deinde viribus refocillatis
 tandem curata fuerit.

SCHOLIA.

Historia
 Alexandri
 Veronenſis
 Medici de
 fortu mor-
 tuo corru-
 pto, & pau-
 latim reie-
 cto.

ALEXANDER, Benedictus Veronenſis, Medicus
 doctus, refert lib. 25. cap. 33. hiftoriam que-
 que mirabilem de Veneta matrona, cui, cum par-
 tam leguminum excluſiſſet, aliter inter viderum man-
 ſit mortuus; qui in magnis puerperæ difficultatibus
 tabeſactus, fluore quodam profluuit ex naturalibus oris:
 demum oris in ventre tribus fiſtulis, ex vna, qua
 omnium maxima erat, integra infantis caluaria ex-
 tracta eſt, cunctis mirantibus; deinde ſingulis diebus,
 reliqua offa demta ſunt; vnde mirabili opere naturæ
 ſanitati reſtituta eſt. Ac in noſtra muliere, licet cor-
 ruptela foetus ad eſſet, tamen cum viderent lac in
 mammillis exiſtere, non ſolum grauidam eam eſſe ar-
 bitrabantur, ſed foetum adhuc viuere, quod motum
 antea ſenſiſſet priuſquam ex eleuatione poderis men-
 ſes aperti fuere, quanquam poſtea & curruſ ven-
 trem eiufdem tranſiſſet, etiam femore rupto, dein-
 de ſanato. Solent enim quædam in tertio, alia in
 quarto menſe foetus viderum ſentire; imò nonnullæ
 velant (quod tamen puto admodum rærum eſſe) in
 ſeptem ſeptimanis, vel duobus menſibus, foetum poſſe
 ſentiri. At tamen, teſte Hippocrate lib. De pueri na-

tura

tura (ut antea quoque diximus) plurimae mulieres paulo ante trigesimum diem perdiderunt informem: sed quae post 30. diem perdiderunt, conformatas iam comparuit. At de motu fœtus prius dictum est, ut non opus sit ea repetere. Quod lac habebat prius grauida, eoq; effluente cum fœtus corruptus esset, minus mirum; cum & in mola saepe sint visa mulieres lac habere; quod & à multis obstetricibus & mulierculis obseruatum intelligo. quamuis pleriq; authores dicunt mamillas quidem intumescere & indurescere, ut fit in pregnantibus, tamen de lacte mentionem non faciunt. Noui Medicum qui eius erat sententia, iuxta Auicennam, & molam posse fieri non solum ex semine viri corrupto, sed & mulieris, & quibus menstrua deficiunt; etiam lac generari posse in virginibus; quas & mola laborare fieri posse contendebat. De lacte verò in virginibus, Hugo Medicus, cum inter nos hac quaestio oborta esset, semel se lac in virgine vidisse affirmabat. Et Ericius collega meus se id hoc ipsum vidisse referebat; iuxta illum aphor. Si mulier qua neque grauida est, neque peperit, lac habet, huic menstrua defecerunt. Sed ibi loquitur Hippocrates de mulieribus, & non virginibus. Mola tamen, ut dictum est prius, iuxta Gal. 14. De usu partium, non fit sine viris. Quod mulieribus verò sanguis per mammas effluere possit, id quidem certum est ex Hippocrate. Quibuscunque mulieribus sanguis ad

aph. 32. lib. 1.

aph. 40. lib. 3.

iam peractorum pluries me vidisse fateor, & talis de-
 fipientia optimam moliri curam, testimonium per-
 hibeo, quoniam verum est, & tanto id verius censeo,
 quanto quòd ab Hippoc. antiqua medicina magistro
 sapius relatum est. Amatus quoque centur. 2. curat.
 21. affirmat vidisse se sanguinem per mammarum
 papillas effluere in duabus nobilibus; altera Lusitana,
 altera Itala, quarum nulla in insaniam aut furorem
 deuenit; sed potius sanguine ex saphena misso, ilico
 restituta sunt. Hac etiam Antonius Musa Brassauola
 vidit in muliere gemellos nutriende, qui ita exuge-
 rent, vt sanguinem in lac conuerti non sinerent; scu-
 ri in coitu nimio, cum sanguis in semen conuerti non
 potest. Ita hic, sed in corruptela fœtus, primò san-
 guis ex papillis emanabat, postea & lac: quale etiam
 antea dictum est, signum esse, si vltro effluat in graui-
 dis, quòd fœtus sit imbecillus. hic verò non tantum im-
 becillus, sed mortuus erat & corruptus. Mulier hac,
 de qua nunc agimus, agebat annum 20. at curata
 postea alios infantes sanos peperit. Quo exemplo
 admonentur grauidæ ne pondus eleuent graue, & vt
 se custodiant à casu.

OBSERVATIO LXXVIII.

*De muliere ex partu mortuo simul occum-
 bente, & de altera vna permanente.*

RVSTICI Vxor, ex infima plebe, prope flu-
 men Sciam dictum habitans, cum qua-
 tuor diebus ex partu mortuo difficile pàreret,
 & brachium propenderet, quod obstetrix li-
 benter

benter abscidisset; exhibito nostro pulvere parturientis, peperit quidem fœtum mortuū iam corruptum; at viribus antea ex longo partu exhaustis, etiam ipsa exspiravit. Verū cū rusticus postea alteram duxisset uxorem, ipsa quoq. nono mense duos gemellos mortuos, sumpto pulvere parturientium ad 3 j. cum aquæ lilior. 3 ij. & vini Rhenensis optimi 3 j. partibusque vteri relaxatis cum vnguentis emollientibus & relaxantibus, reiecit, in vita permanens.

SCHOLIA.

SI istis validioribus secunda vxor non peperisset, vel fœtus mortuos excussisset, consulissem embryotomiam vel incisionem, quā Albucasis & alij docent, & Aërius lib. 16. cap. 23. De fœtus extractione siue sectione ex Philumeno. Interea admonet Medicum, ut in eiusmodi sectionibus peragendis prius spectet nam febricitet mulier, nec ne, num prasidiū capax sit, an deplorata. Sic & Paulus lib. 6. cap. 74. Aliis remediis non iuuantibus, si quidem salus adhuc speratur, tunc manū admoliemur: sin contrā, attingi non debet. Quæ igitur perniciem sui portendunt, inexpugnabili dormiendi necessitate premuntur. Lethali enim affectu periclitantes, teste etiam Aëtio, lethargico sopore occupantur, febricitant, propeq. muta euadunt, & dum maximis clamoribus vocantur, vix incertum quippiam susurrantes, rursus in soporem deferuntur: quadam & vibratim conuuluntur, aut nervis conturbantur, aut tremunt, aut alimentum non sentiunt; ac pulsus creberrimus debilissimusq. percipitur; vel validè incurgescens, iuxta

L 1 4

Paulum,

Paulum, deprehenditur, sed languidus. quæ incolum-
 mes futura sunt, nihil eiusmodi patiuntur. Sic anno
 1590. mulier cùm in partu esset, & foetus mortuus,
 brachio extra pendente corrupto, cùm adhuc valida
 esset, consului ut obstetrix brachium amputaret,
 quo sic melius pareret. quod cùm facere nec aude-
 ret, nec veller, post duos trésvé dies adhuc permanens
 in difficili partu, miserè mulier obiit. Quomodo fiat
 sectio, docet Aëtius loco citato. Puerpera igitur, in-
 quit, in lecto supina recumbat declinæ capite, erectis
 diductisq; cruribus, detineaturq; utrimque à peritis
 robustisq; mulieribus. Si verò non adsuerint, mulie-
 ris thoracem vinculis quibusdam lectulo adfirma-
 bunt, ne corpus attrahendo, attractionis vim dissol-
 uat. Ac primò dua vel tres panis buccellæ vino ma-
 defactæ ad arcendum animi deliquium offerantur, tu-
 giterq; in ipso opere vino facies respergatur. Chirur-
 gus autem prius difficultatis causam speculo inspi-
 ciens, sit ne thymus aut callosa eminentia vel quisp-
 piam eorum quæ prædiximus, videbit. quicquid fue-
 rit, volsella arreptum scalpro polytomo amputabit;
 si tunica os uteri obstruxerit, eam quoque secabit.
 Si verò tunica abrumpenda soliditas obstabit, hanc,
 si fieri possit, ensiculo hastato, (scolopomachærium
 vocant) vel alio simili incidemus; quam deinde inci-
 sam dilatabimus, locumq; idoneum prodituro foetus
 preparabimus. At si caput infantis locum obstruxe-
 rit, in pedes vertendus est, & ita educendus. Quod
 si adeò inhaeserit, ut nullo pacto ad profundum im-
 pelli queat, vncus instrumētū attractorij in oculo, ore,
 aut mento figendus est, & ita infans extrahendus.
 Instrumentum autem attractorium dextra manu
 deten-

detentum immitti oportet; vacuum verò eius sinistra
digitis occultatim sensim deduci, quousque ad vteri
cavitatem pervenerit; postea cuiuspiam prædictorum
locorum insigi; deinde alterum instrumentum ex al-
tera parte oppositum, simili prorsus modo imponi, &
insigi, ut æqualis & in neutram partem attractio, imò
& tutior fiat: forte enim vnum tantum instrumen-
tum in attrahendo elabi posset, & foetum dimittere:
æqualiter verò, nec recte tantum sed & obliquè at-
trahemus; digitumq; aliquo pingui illitum intra vte-
ri os & membrum obstructum immittimus, orbicu-
latimq; circumducimus. Dimidio autem foetu pro-
deunte, primum instrumentum peculiariter superio-
ribus partibus, inde secundum alternatim figendum
est. Quod si caput vel natura, vel hydrocephali mor-
bo plus æquo intumuerit, ensiculo, quem polytomum
vocant, vel communi scalpro incidemus, deinde con-
tractum extrahemus. Quod si ne ita quidem prodie-
rit, totum sinciput conteremus, & ossa digitis educe-
mus. Si verò aliquod os eminuerit, ossario aut radi-
cario forcipe auferemus, ac tum demum instrumen-
tum attractorium insigemus, & infantem eripie-
mus. Prodeunte autem capite, si thorax vteri ostio
impingatur, hastatum ensiculum, aut scalprum po-
lytomum duobus digitis occultentes, intercostalem
membranam circa clauem pectoris vsque ad profun-
dum secabimus, ut, excretis humoribus, moles thora-
cis concidat. Sed si egresso thorace, venter mortui
foetus intumuerit, & hydropis formam imbuerit, ea-
dem regula vtentes, ventrem incidemus, & intesti-
na eximemus. Sin manus altera ad sinum pudoris
exierit, prope humerum articuli excidetur. Oporte-

hic igitur linteo manus prodeunti implicato violenter
 attrahere, ut humeri articulus exeratur, tunc q³ pu-
 dendiplicas digitis hinc inde deducere, & postea arti-
 culum scalpro secare; deinde sinistram manū immi-
 ttere, & capitulum dirigere, atque ita fœtum educere.
 Vtrinque verò manu prodeunte, utramq. secabimus;
 deinceps caput conteremus; itum demum infantem
 extrahemus. Quod si venter locum obstruxerit, linteo
 artibus inuoluto violenter attrahemus, ut loca pubis
 & sumen efferantur, quod tamquam mollius incide-
 mus. Sin alterū cras in sinum pudoris deciderit, linteo
 implicato valde attrahentes & pudendiplicas didu-
 gentes ad inguen crurum abscindemus. Si duplicatus fœtus
 occurrat, neque dirigi possit, si capitulum magis para-
 tum fuerit, eius ossa conteremus, cuti nequaquam dis-
 secta; deinde cuiusdam eiusdē capituli parii attractoriū
 instrumentū insistentes attrahemus, tum crura diri-
 gemus, & ita fœtū educemus. Sed si crura magis ex-
 posita sint, coxa articulum abscindemus, & ita coxas
 transcendemus, ut caput relinquatur facili cōtritioni
 paratū. Si verò obstructio duplamenti perinacior fue-
 rit, pedibus magis procidentibus, caput in articulatione
 vertebrae amputare oportet, deinde thoracem transcen-
 dendo, pedes attrahere; & si reliquis membris capitu-
 lum relabens detineatur, sinistram manū oleo illitam
 in intimos recessus immittimus, caput q³ perquiren-
 tes sensim ad os vteri deducemus, cui deinde manu de-
 rento vnum vel duo attractoria instrumenta insige-
 mus: erunt q³ loca figendo instrumento maximè ido-
 nea in capite, oculi, meatus aurium, os, pars menti in-
 ferior, in thorace, axilla, clauis, hypochondria, pectus,
 vertebrarū articuli, iugulum; in cruribus, ossa pubis
 femina.

feminae infantis pudendū. Ostio tamen vteri inflammata nulla vis adhibenda est, sed perfusionibus pingui-
bus affatim vtendum, eiusdemq; natura in seſſionibus,
irrigationibus, cataplasmatibus; vt inflammatione qua-
dantenus remissa, & valua ostio dilatato, fœtus, sicuti
diximus, deferatur. Vbi verò integram sectionem fœ-
tus perfecimus, omnia eius membra sunt compo-
nenda, diligenterq; spectandum an quodpiam desit, vt
nullum prorsus interius omittatur: deinde localū pro-
tinus educemus. Eadem ferè habet Paulus loco citato.

OBSERVATIO LXXIX.

De secunda relicta.

Vxor Andreæ Cloethij, cognomento Ant-
werpiani, puerpera annos nata 40. Alcmā-
riæ eo tempore habitans, anno 1554. mense
Martio, secundam relictam cū reddere non
posset, binæ obstetrices ad eandē accitæ fuere.
Verūm iis nihil proficiētib; me vnā consulta-
runt. Cū satis adhuc robusta esset, vt sternuta-
mentū ex elleboro albo fieret mandavi: deinde
vt obstetrix digitos inūctos oleo liliaceo immit-
teret; lentè quidē, ne vterus procideret aut sub-
sequeretur, primū in obliquū deducendo, huc
illuc circumagendo, deinde paulo validius attra-
hendo. Hoc enim pacto, vt Pāulus docet lib. 6.
cap. 75. à connexu solui solet: sicuti etiā, Deo ad-
iuuāte, factū est. verūm cū 4. diebus puerpera
secessum non habuisset, antequam hæc fierent
balano imposito, vbi aluum exonerasset, obste-
trix melius suo officio fungebatur. Postea ra-
men hæc ipsa incidit in quandam febriculam,
sed leuem: sumebat rob cerasorum & ribes
ad

540 DE MULIERVM MORBIS,
ad alterationem & suum. At quinque postea
diebus interpositis ventre dolebat; qui dolor
cessauit inunctione olei chamæmelini & ane-
thini. Febris iam aberat: ideo adhibito deco-
cto cicerum cum hordeo mūdato in vino Rhe-
nensi, bene purgata fuit. quanquam diebus
aliquot intermissis crura inflata fuere; sed vn-
ctione vng. popul. & alabast. detumuerunt. Sed
oborta quoque leui inflammatione gutturis,
aluo cum foliorum senæ infus. soluta, ex garg.
aquæ plantag. viol. exiguo adiecto sem. coton.
facta ebullit. & colaturæ immiscendo diamori
& mell. ros. paululum, ea ipsa cessauit. Con-
tra vigilias, quibus & tunc afficiebatur, præ-
scripsi oleum pap. & mandrag. añ. 3 ij. opij
thebaici gran. ij. croci gran. vnum: & bene
dormiuit. Sed post duas septimanas dolore
ventriculi accedente, ex ʒ. pilul. ex aloë, tri-
bus assumptis pilulis, cum facilis solutionis
esset, hic dolor quoque sopitus est, & bene de-
inde habuit.

SCHOLIA.

Ex secundis interiorem Empedocles Animam vo-
cauit, exteriorem Chorion; sed ambas alij hyste-
ras nominant. Dum enim fœtus adhuc utero geri-
tur, ipsum natura conformans, machinata quoque
est loca, per quæ alimentum ac spiritum posset à ma-
tre suscipere, & reliqua quoque eiusdem fœtus ex-
crementis idonea comparauit. Etenim toti ipsi mem-
brana tenuis (ut anatomia docet, & à Donato quoq.
annotatur) vndique est circumiecta, quam æpior,
id est,

id est, amiculum appellant, fœtus velut sudorem ex-
cipiens: huic extrinsecus tenuior alia incumbit, quam
αἰμαρ τοιδὴν, id est, intestinale nuncupant, in ipsius
vesica perforata, quæ & hæc in se ipsa colligit vsque
ad partum ipsum, velut fœtus lotium. His autem
extrinsecus in orbem altera membrana circumiecta
est, totum vterum intrinsecus subiungens, qua me-
dia fœtus vtero connectitur. Nam in singulis orifi-
cii vasorum quæ intrinsecus in vterum pertinent,
per quæ etiam sanguis menstruus in ipsum, quo tem-
pore vtero geritur, fertur, aliud vas gignitur; arte-
ria quidem in arteria, vena verò in venæ orificio, ve-
sint ea quæ generantur numero equalia in orificio,
quæ intro in vterum desinunt: colligatq; ea membra-
na hæc, tenui quidem sed fortis, ita ut simul in mu-
nimentum, & ligamentum eorum sit, cum inter sese,
tum cum vtero. Et quoniam exiguum est vasorum
quodq; cum primum ab vtero exoritur, cuiusmodi
sunt arboris radices extrema in terram defixæ, quæ
tamen paululum progressæ per coniugationem co-
alescant, ita ut ex duobus unum procreatur, rursusq;
eorum singula cum singulis eiusdem generis coale-
scent, fitq; id perpetuò quoad parua omnia in duo
magna coeunt, quæ velut stipites quidam fœtus, per
locum umbilici inseruntur. Quatuor itaque omnino
hæc vasa sunt: duæ scilicet arteriæ, & totidem venæ,
nulli diuersi generis inter se commixti, sed venis qui-
dem semper cum venis, arteriis cum arteriis in idem
coeuntibus: per quæ vasa, velut per truncos quos-
dam fœtus ex vtero sanguinem & spiritum trahit.
Verum inter hæc omnia, & vasa exigua quæ dicta
sunt, media est iam dicta membrana, quæ veluti
man-

ῥαφίον, seu
secunda,
quod sit, vn-
de nomen
sumpserit.

ῥαφίον nuncupatur, quod nihil aliud est, quàm vaso-
rum multitudo membrana tenui connexorum, quæ
haud facîle numerari queat, Gal. auctore 15. De vsu
parte. Interim ὤσερον seu δούτερον appellatur, Com-
ment. apb. 49. lib. 5. à Gal. & cap. 75. lib. 6. à Paulo.
Latini Secundam & Secundas nominare solent: sic
quidem appellantes, quòd velut secundũ domicilium,
ac receptaculum sit ab utero, & velut fœtus indu-
mentum, ut inquit Aëtius cap. 24. lib. 16. Hæc secun-
da quoniam ex umbilico pueri hæret, & umbilicus po-
stremus ex utero exit. Namq; si primus exiret, non
accederes per ipsum puero nutrimentum, quoniam ex
ipso dependet, Hipp. auctore lib. 1. De morb. mulieb.
Pars affecta. Propterea fœtu excusso foras prodire debet in natu-
rali partu. sed quoniam contingit interdum, ut fœtus
in lucem edito, ipsa præter naturam detineatur; inde
quòd eius detentione uterus quodammodo afficiatur,
& quòd eadem detenta morbus sit in numero atque
in excessu, nemini in dubiũ venit. Detinetur autem,
aut propterea quòd fundo uteri connexa est, aut licet
seiuñcta fuerit, tamen circa aliquam uteri partem in-
statur pile conuoluta est; vel propterea quòd os uteri
clausum sit, ita ut foras prodire non valeat. Hoc est
quòd Aëtius refert ex Philumeno: In loculorum de-
tentione, qui etiam secundi appellantur, interdum
uteri os clausum, interdum apertum reperitur, ac
nonnunquam inflammatum, nonnunquam infla-
matione carens; atque locus ipse interdum uteri
fundo adhuc coniunctus, interdum seiuñctus est. Ita
edito tandem partu, secundas leuiter interdum hæ-
rere vidimus, quas non minus quàm abortiuas re-
formi-

Affectus
quis sit.

Causæ.

Prognostica

formidamus : corruptionem enim accelerant . pro-
 pterea protinus eximendas procuramus : astate præ-
 sertim , vnde facile mulieres exanimari videntur ,
 vbi putridi vapores cordis vitalia , stomachum , cere-
 brumq; subeunt . Vidimus , & furore perexas non-
 nullas insanire , ac furere . Quomocunq; tandem
 ipsa detineatur , neque statim ac violenter extrahen-
 da est , neque eiuseductio parui facienda , seu negli-
 genda erit . Ob eam rationem vasa obstetricis est
 umbilicum protinus femori puerpera adalligare , ne
 temerè retrocedant secunda . tum sternutamenta
 concitantur vtiliter : illa quoque spiritu intensa se-
 cundas deprimunt : siq; umbilicus apparet , subitò
 corripendus est , atq; deligandus ; cui fini filum prom-
 ptum habere necessum est . Iuuant crebra vel inanes
 vomitiones : os & nares obthurentur , Hippoc. præ-
 cepto aph. 49 lib. 5. præsertim si mulieres imbecille
 non fuerint . Quòd si nec sic exciderit ; si ergo os (inquit
 Aërius) vuluæ apertum est , & loculum seiunctum in-
 teneris , qui alicui vuluæ parti pile modo conuolutus
 inhaeserit , facillima curatio est : manum enim fini-
 tram calidam , & pingui illitam , seu oleo , in abditi-
 uum immittere oportet , totumq; loculum extra-
 here . At si vteri fundo cōnexus sit , simili quidem mo-
 do manū calidam in pingui illitā immitteremus ; sed ap-
 prehensum loculū non statim rectā attrahemus , vul-
 ua procidentiam verentes : sed placidè , nulla violentia
 adhibita . primò in obliquū sensim ducemus , huc & il-
 luc circūuerentes ; postea aliquanto validius attrahē-
 mus . Hoc enim pacto obediet & à cōnexionē soluetur .
 si verò os vteri clausum fuerit , perfusionibus viemur ,
 & sinistra manus digitis leniter aperire ac paulatim
 dilata-

GURIEL

544 DE MULIERVM MORBIS,
 dilatare conabimur. quod nisi successerit, mulieris
 iacentis summi cuiusque lumbi illinere oportet, rursusque
 loca persundere, & impinguamenta fomentaque ad-
 hibere: & si pariens robusta sit, eo tempore etiam
 sternutatoria à castorio & pipere confecta naribus
 admovebimus, & portiones aliquas earum quæ men-
 ses cient propinabimus. Quæ quidem omnia primo
 & altero die peragenda sunt. Præterea suffitu utemur,
 decoctis in olla aromatibus, qualia sunt, casia, nar-
 dus, iunci odorati flos, artemisia, iris, sabina, dicta-
 mnus, pulegium, & huiusmodi, olla selle supposita,
 cui mulier insideat, vestimentis undique circumse-
 pta. Postea pertentabimus: & si os vteri apertum
 inuenerimus, manum immitemus, & sicut dixi-
 mus, foetum enitemur educere. qui si parum obediat,
 dilacerandus non est: haud multis enim postea die-
 bus marcescet & in saniem solutus excidet. Hæte-
 nus Aëlius. Atque hæc ipsa ut rite fiant perita obste-
 trici mandabimus.

OBSERVATIO LXXX.

*De secunda relicta in quibusdam puerpe-
 ris: & quibus medicamentis ab
 ea liberata sint.*

MULIERI cuidam Delphensi, honestæ ma-
 tronæ, cum secunda relicta esset post
 partum, mulierculæ astantes pro communi re-
 medio quo uti solent, exhibuerunt horminum
 satium cum sale, sed nihil profecere. Nos ad
 eam acciti dedimus ℞ j. trochis. de myrrha cum
 ℥ iij.

℥ iij. artemisiæ in vino Rhenano coctæ. Et cum
obstetrix diceret, secundam solutam esse, &
quodd tenderet ad exitum, facta quoque inun-
ctio est per eam ex olei amygd. dulc. lilior.
cheyrini, ping. anatis, gallinæ, porcinæ, butyri
recentis, añ. ℥ β. tam intus quam extrâ. Alio
deinde Medico mox superueniente, ex elleb.
albo, pipere nigro, sternutamentum præscri-
ptum est: sed ab eo non sternutabat, lassata
prius. Et ideo ut vires resumeret, accepit ius
pulli cum ouo molli, pauco insperso cinna-
momo & pul. nucis myristicæ, totumque ven-
trem & inguina inungendo ut dictum est. A
potione ex trochis. de myrrha sumpta, post qua-
tuor horas probè à secunda liberata fuit. Altera
quoque puerpera anno 1559. mense Octobri
cum ℥ j. trochis. de myrrha, vini Rhenensis ℥
ij. & aquæ artemisiæ, sumpsisset, etiam secun-
dam reiecit. Ut super sellam collocarent impe-
trauimus, quo ita obstetrices melius suo mune-
re fungerentur. Alteri quoque mulieri quæ
extra portam fossæ aquæ habitabat, à partu
difficili & periculoso euadenti, secunda post
partum relicta fuit. Duæ obstetrices præsentis
eandem pro deplorata habebant, & in lecto po-
suerant. Vocati nos de nocte, cum ex difficili
partu & longa mora debilis esset, exhibuimus
confectionem manus Christi perlatam (ut vo-
cant) & hunc puluerem propinauimus: & pul.
parturientis ex radice dictamni parati, cassiæ
lignæ, pul. seu rasuræ lapidis dactylor. añ. ℥ j.
aquæ artemisiæ ℥ ij. vini Rhenensis ℥ j. ebibit.

M m

&

& tertia obstetrix magis perita superueniens manu pingui intincta, è lecto muliere in sede leniter collocata, eduxit secundinam. Atque ita perfusionibus adiuta, & potione ac linamentis relaxantibus, tandem & à secunda hæc quoque liberata fuit. Sed paucos post dies incidens in febrem & fluxum ventris, nec me aut alios Medicos consulens, postea, vt mihi relatum fuit è vita decessit. Verùm textoris vxor, mulier parua staturæ & tenera, cùm bis fœtum mortuum peperisset cum magno periculo; ac tertia vice cùm rursus páreret, ac sex diebus iterum in difficili partu esset; 29. Octob. 1581. ad eam accitus sum. Cùm igitur fœtus dudum esset mortuus, hunc puluerem exhibui: \mathfrak{z} . rad. dictamni albi, cinnamomi añ \mathfrak{z} j. sem. viol. \mathfrak{z} ss. fiat pul. subtilissimus: sumebat cum \mathfrak{z} iij. aquæ artemisiæ, quòd febricitaret. Die sequenti cùm fœtus, seu partus, quasi dimidius vsque ad humeros in exitu foret, nec foras prodire posset, pul. rursus exhibitus est cum vino Rhenano, quòd minus febricitaret, fœtusque mortuus planè corruptus subsequēbatur. At obstetrix cùm non posset habere secundinam, & puerpera pro mortua quasi haberetur, non sine febre; mandauimus vt obstetrix inum ventrē totum inungeret linimento sequēti: \mathfrak{z} olei lilior. cheyrini, lini, axungie gallinæ, caponis, caninæ, añ. \mathfrak{z} j. misce. Iterum hic pul. ad secundinam expellendam, & cùm non purgaretur, exhibitus est: \mathfrak{z} pul. rad. dictamni albi \mathfrak{z} ij. ss. cum aqua flor. chamæmeli \mathfrak{z} iij. detur. at nihil subsequū-

tum.

um. Mulierculæ muscum pruni arboris por-
antis cærulea pruna, tanquam in his synpa-
hia esset, cum vino colatum dabant, quibus
multas adiutas dicebant, licet muscus restrin-
gat: sed nihil his iuuantibus, tandem per partes
corruptas, vt prædixeramus, excidebat. & rur-
us exhibito puluere sequenti cum vino, magis
putrefacta per partes prodibat: & rad. dictamni
℥ j. ꝑ. sem. viol. cinnamomi selecti, añ. ʒ
℥. rasuræ dactylorum gra. iij. Quarto Nouemb.
deinde & sexto rursus puluerē propinauimus;
quibus perfectè, partibus omnibus corruptis
mutilatim excidētibz, à secundina liberata fuit;
semum bene purgata rectè deinde valuit. At
Antonia vxor Iohānis Musij Pedemontani cū
secunda post partum liberari non posset, imo
ventre tum muliebribz per obstericem oleo
oliaceo & amygd. dul. pinguius inunctis ac fo-
tis, post ʒ ij. ꝑ. pul. parturientium ex dictamno
exhibitos, & decoctum rad. schœnanthi & di-
ctamni in aqua lilior. & artemisiæ, etiam bala-
no immisso vt aluum redderet, secundam mox
iecit, & deinde bene purgata optimè habuit.
Helyla vulgo, seu salutaris, obsterix valde ex-
erta apud Delphēses, cuius opera multæ mu-
eres in difficili partu viebantur, in obsterican-
ti arte gnara, dum praxin Delphis exercerem:
ex ipsa ad secundinam depellendam capiebat
mum equinum, & ponebat in puppa, & cum
vino insciis puerperis expressum dabat, cū
nulla alia remedia iuuarent: atque eo modo
ulimæ à secunda liberata fuit.

SCHOLIA.

QUOD si istis remediis iam dictis, & sternutatione, tum sabina decocto, & trochis. de myrtha vel borace, (quibus etiam foetus mortuus reicitur) secunda, vel, ut alij vocant, secundina, non expellatur, verendum est vtero eam esse affixam & alligatam. Id deprehenditur his coniecturis, quod neque medicamentis, neque vehementissimis illis conatibus mulieris, vel sternutatione, sit reiecta, & quod ante tempus puer emissus fuerit, idque aliquando sine doloribus magnis precedentibus, ut aliquando obseruauimus secunda reiecta. Dolores enim qui praecedunt partum, fiunt, dum disrumpuntur vena & arteria cotyledonibus vteri alligatae. Itaque si dolor non praecesserit, fracta est tantum secundina, & vtero adheret: ideo manu comprehendenda, aut vinculo, & leniter trahenda, ne disrumpatur in partes, maxime quo diutius retenta fuerit. Memini cum apud puerperam Schiedami essem, secundam fuisse retentam: sed cum quadam obstetrix nimis audax subito ad se secundinam attraheret, illico puerpera in deliquium animi cadens, statim expirauit. Quare si ita adhereat ut vnguibus non possit extrahi, immittantur medicamenta suppurantia: nam eadem non est dilaceranda, ut quae intra paucos dies putrefacta, ut & Paulus censebat, in saniem dissoluta excidet; quemadmodum & paulo ante ex Aetio diximus. Vt etiam euenit uxori textoris de qua etiam nunc in Obs. praecedente egimus. Interea illo tempore, ut & Paulus tum Aetius admonent, quia secunda ita emarcescens nimio suo foetore caput replet, & stomachum euerit.

Cautio.

euertit, odoramenta iugiter suffiendae sunt, quae possunt huiusmodi calamitatibus repugnare, & loculum subducere. Ad quos vsus excellunt, cardamomum & caryca, si apertè suffiantur, & bdellium cum sabina, thus cum styrace, vnguis aromaticus, ladanum, iisdem castorei & pulegii tantundem, ex mulsa propinato. Conueniunt & leniora ex his quae menses ducunt; artemisia decoctum, lauri bacca, myrrha & cyclamine cum vnguento mixta, ouis & caprae loculi arefacti è vino triti, & propinati, aut cum vnguento impositi, aut pro amuleto gestati. Verum, ut paulo antè diximus, fieri potest ut in ea parte putrescat: ut & nos vidimus puerum putrefactum: quod & Rondeletius testatur se vidisse, & frustra reiectum. sed, ut ille vidit, relictis magnis osibus in utero per longum tempus, quae post in utero matris mortuae reperiuntur. Vxor fuit chirurgi Monspeliensis, qui post mortem, ut causam alicuius affectus interni cognosceret, passus est illam diffecari. Quia verò odoris grauitate (ut paulo antè diximus) caput replet, stomachum putrefacta euertit, & alia inducit sepiissime symptomata grauissima & sauisima, ad id necesse est per intervalla iniicere ea, quae vim habent detergendi quod putrefactum est. Ad id valebit (teste Rondeletio) vnguentum basilicum in multo oleo li-
 lior. vel amygd. dissolutum, vel in decoct. sequenti:
 R rad. mal. viol. añ ʒ ij. rad. aristoloch. longa vel
 rotunda añ. ʒ j. sem. lini, saenugr. añ. ʒ ss. flor. cha-
 memeli, & centaurii minor. añ. p. j. frum. p. ij. fiat
 decoct. in aqua & oleo, & in eadem dissoluatur vng.
 basilicum: vng. Egyptiacum ad detersionem etiam
 iniici potest. Atrodit enim & potentissime abstergit,

Historia
 Rondeletij.

M m 3

& sua

& sua acrimonia facultatem expultricem mouet.
 Periclitantur mulieres, si adhæreat & contineatur,
 & moriuntur: vel ob vsum medicamentorum acrium
 vlcus in vtero fit. Quamobrem optimum erit ante-
 quam adhibeantur remedia, id prædicere, ad vitan-
 dam calumniam. Potio sequens sæpe danda est: R. sa-
 binæ, artemis. añ. m. j. fiat decoct. in aqua: in lib. ss. de-
 cocti, adde vini albi vel clari lib. ss. arom. cum cinna-
 momo, & detur frequenter, si sine febre est. Vel, R.
 boraci ʒj. capiat cum ʒij. vel iij. prædictæ deco-
 ctionis, aut cum vino albo. Aut detur tantundem
 trochis. de myrrha, vel ʒj. carabes, maximè si cum
 magno fluxu sanguinis sit. Nam vrinas mouet, se-
 cundas dencit, & sanguinem fluentem retinet. Deco-
 ctum vel aqua sabarum distillata, vt & aqua flo-
 rum croci, detergit, secundinæ pellit, & dolores illos
 sedat. Quare non est omittenda in hoc negotio. Me-
 mini Mariam Francisci, in foro frumentario Delphis
 habitantem, 6. mense peperisse scetum mortuum, &
 post partum relictam fuisse secundinã. ad quam 27.
 Septemb. die anno 1578. accitus, valde debilem rep-
 peri, cum insigni satis profluuiis sanguinis. Quare hanc
 mixturam sequentem sæpius sumpsit: R. conser. viol.
 borag. citri conditi (scilicet cort. eius) añ ʒij. frag.
 lapidum precios. vt alcohol puluerisatorum ʒj. ma-
 nus Christi cum perlis ʒss. syr. de limonibus ʒj. fiat
 mixtura, & solis auri cooperiatur. Deinde sumptio
 hoc pulvere cum cereuisia: R. rad. dictamni albi ʒj.
 sem. viol. ras. dactylorum, añ ʒss. fiat pul. & in-
 uncta vulua intus & extra oleo lilior. amygd. dul. sexta
 hora à quo sumpsisset puluerem, hora diei 10. à se-
 cundina liberata fuit. Post aliquos dies in suffoca-
 tionem

tionem vteri incidens, cum neque ex odoratu foetido-
rum ad os, tum aliis praesidiis ad se rediret, quasi pro
deplorata habita, hoc assumpto puluere à suffocatio-
ne curata, probè deinde valuit, satis bene in puerpe-
rio repurgata: & gran. iuniperi, calami arom. incisi,
añ ʒj. rad. ostrutij (eius loco pharmacopæus sum-
psit semen eius, cum radix ad manum non adesset)
rad. gentianæ, añ. ʒß. sem. pastinacæ ʒj. fiat pul-
subtilissimus in duas partes diuisus: ac vna parte as-
sumpta cum cereuisia, miraculi instar suffocatio
vteri cessauit.

OBSERVATIO LXXXI.

De dolore post partum eueniente.

Ad dolores post partum (quos vulgares mu-
lierculæ nostræ suo idiomate, *nae-weeden*,
vocant) magna cum laude vtor sola flor. cha-
mæmeli decoctione in cereuisia communi: mi-
raculi instar dolores post partum compescit.
Matrona quædam cum peperisset filios, quot-
annis post partum per sex dies, diebus inter-
polatis, bibebat ʒvj. olei amygd. dul. recenter
expressi, cum saccharo, & ita dolores miti-
gabat, & irritabat purgationes sopitas. Sic in
Italia, ut ex præceptore nostro Romæ Gissiber-
to Horstio accepimus, rusticæ mulieres oleum
commune, (sed minus rancidum ibi quàm hîc)
accipiebant: quod & laudatur. At matronæ
ibidem potius accipiunt ʒiiij. olei amygda-
lorum dulcium expressi. hoc ilico vidi à do-
lore post partum liberatas; & commodè eo in

M m 4

multis

552 DE MULIERVM MORBIS,
multis vſi ſumus. Valuit & decoctum florum
chamæmeli & artemiſiæ cum iure pulli, etiam
pro clyſteri, cùm fæces etiam retentæ eſſent in
vxoꝛe puerpera Beroaldi, cum oleo lilior. & vi-
tello oui. Vbi ventofitas adefſt, commodè da-
tur vinum decoctionis cumini, vel paulum cu-
mini puluerifatũ & inſperſum, modò febris
abſit.

SCHOLIA.

Dolores
poſt partũ.

ANTEQVAM puerpera rectè purgentur, dolores
poſt partum ſæpe iis oboriuntur. Matrix enim
tunc (inquit Erotiſ) tamquam fera ſilueſtris, pro-
pter ſubitam euacuationem quaſi vagando huc il-
luc declinat, vnde vehemens efficitur dolor. Pro do-
lore exhibet vinum calidum in quo cuminum bullie-
rit. Ceterũ oportet in omnibus cauſam quoque do-
loris animaduertere. Sic mulier quadaſ Eliſabet ha
Gellij cùm pateretur enormes torſiones in venire poſt
partum, Iohannes Tiengius, Medicus inſignis, bis
terve ſubſequentem portionem dedit, & omnis dolor
evanuit: & verbenæ, calendula, viol. cñ. p. j. ſchæ-
nanthi ꝓ j. ſem. dauci, gentianæ, fœnugr. ſem. al-
thææ, añ ꝓ j. fiat decoct. pro lib. ꝑ. (nempe in aqua,
ſi adſit febris: alioqui in vino, quamvis non expreſſe-
rit) exprimatur, addendo ſyr. de artemiſ. ꝓ j. miſce.
Sed & alia, Magdalena dicta, poſt partum graues
dolores matricis & totius ventris incurrebat, cum re-
tentione omnium ſuperfluitatum & menſtruorum,
& ventris ſtipticitate. exhibita fuit hac portio: & rad.
paonia ꝓ j. ſchænanthi, gentianæ, flor. chamæmeli,
añ ꝓ ꝑ. ſolior. ſenæ ꝓ ꝑ. fiat decoctio in aqua artemi-
ſiæ

fia pro ℥ iij. colatura adde cassia recens extracta ℥ iij.
 misce. Vesperis sumpsit, & curata est ab omnibus ac-
 cidentibus iam dictis. Memini ipse, dum Alcmaria
 praxin adhuc exercerem, uxorem Iacobi Themistoc-
 cli nauta, paulo antequam pareret, Amsteldamo
 una cum marito Alcmariam venientem, in dorsum
 fortiter cecidisse supra scapham: ex quo casu, altero
 die peperit. Post quatuordecim dies à puerperio dolor
 ita intendebatur in dorso, & adeò vrgebat, ut mul-
 tis diebus dormire non posset, subsequente febre, sed
 non adeò vehementi. Potionem sequentem dedi: R.
 cassia recens extracta ℥ vj. diacathol. ℥ ij. dissolvantur
 in aqua scabiosa & scolopend. q. s. mummya ℥ j mel-
 lis ros. colati ℥ j. qua medicina copiosè aluum depo-
 suit, dolore cessante, una & febre, etiam loco dolen-
 te inuncto linimento sequenti: R. vng. dialibæ, olei
 anethini, chamamelini, axungia vituli, añ ℥ ss misce.
 rectè deinde valuit. Si dolor post partum sit à vento-
 sitate, dentur semina ventositatem carminantia. Va-
 lent & ea quæ ad inflationem uteri diximus. sed vi-
 dendum num adsit febris, & nunquid dolor ille sit
 ex frigore, ut magna ex parte contingit; raro enim
 ex calore, ut videre licet cap. proprio De dolore post
 partum apud Gilbertum Anglicum, tum alios, & in
 libro de Harmonia Gynaciorum. Ideo & rectè nos
 admonet Alexander Benedictus Veronensis, quòd
 mulierem à puerperio ipso, à frigore & vento, clauso
 cubiculo obscuro tuebimur, à strepituq; ac clamore,
 vestimentis bene operiam, atque iubebimus si vel mo-
 lam enixa sit, aut emortuum infantem, ut somno
 moderato quiescat, alta ceruice, sine vlllo iniucundo
 odore. Etiam hac conveniunt omnibus post partum,

M m 5 etiam

etiam si bene pepererint : & sunt tractanda non aliter quam si febricitarent, ne in febrem incidant : eam enim aliquando incurrunt, ut quibusdam exemplis in lib. nostris De febris demonstrauimus. Ideo cibus in initio sit prae parcus, crapula enim facile febris excitatur, ac sitis validior. propterea prima die ius gallinaceum damus pingue, ac ouum sorbile, vel carnem in coena ac prandio duntaxat. sed modus etiam seruandus est, ne inconcoctis cruda superingerantur. Confectionem interdum damus diamargariton, aut dianisum. Vinum vile est quod modicas vires habeat, subdulce, hyeme tepidum; frigidum enim vulua sentatur. Ea victus ratio ad decimum vsque diem seruatur vtiliter. Vitamus carnem assam, & quicquid astringit. Alius si nihil reddit, injectis clysteribus mollienda est; uti nos fecimus in illustrissimi Principis Aurai uxore. si uero non iuuant, vel si clysteres abhorreant, ut saepe euenire solet, mannam damus cum casta. Si partum purgationes sequuntur, bonum est; si haerent, non est bonum, sed tunc promouenda sunt, ut postea dicemus. Ita ex Moschione: Ponenda est in lecto, cum prius post partum sponsa longa detergsa fuerit, in cubiculo obscura, modice patentibus pedibus, ut quicquid ex ea foras exire ceperit, non impediatur, pannis loca ipsa contegantur, ita ut frequenter mutantur. Sed & lani mundu & ventrem & pectinem tegi oportet; & si sine quassatione partus effectus est, oleo viridi cum medico vino admixto ipsam partem irrigari; si vero laboriosus partus praecesserit, oleo dulci & calido ipsa loca calefieri: deinde biduo eas à cibo abstinere. Hic tamen ratio habenda ut pro viribus parce alantur: nostra enim puerpera

peræ omnimodam inediam non sustinent: cum astantes muliercula nostra quadam pessimè faciunt, quæ ad multos cibos tum pulres sumendas eas cogunt, dando cercuisariam panatellam iuncto caseo, qui tamen obstruit. Id in Frisia muliercula faciunt, sed pessimè, quamvis dicant lumbos roborare. Utantur simplici cibo, oui sorbilibus, & pultribus, primis diebus. & si levis suspicio adsit de febre, vinum interdicator. septimo die vinum exhiberi poterit aquæ exiguo temperatum. Addunt & has alij, ut si pepererit masculum, quod 30. diebus sese in lecto contineat, nec foras prodeat, si feminam, 40. Nonnullæ tamen statim à partu resurgunt, sæpe tamen suo damno. Cuius enim crudelis partus est, & exitus tardus, in primis tenuem victum huic exhibere oportet. Symptomata post partum plura esse possunt, de quibus mox agemus.

OBSERVATIO LXXXII.

*De quibusdam symptomatibus puerperis
cuenientibus.*

In puerpera febricitante ex mēstrua purgatione suppressa rectè usus sum decocto hordei mundati, glycyrrhizæ & schœnanthi, in hunc modum: R hordei mundati m. j. glycyrr. rat. ʒʒ. schœnanthi ʒ j. β. coquantur in aqua communis pro lib. j. id quidem vel in febre non obest, & simul purgationes sopitas aperit, ut enenit puerperæ in Gryphone aureo decumbenti. Debilioribus ʒ j. schœnanthi in iure pulli bullire iubeo. Hoc modo Florentiola, Medicus Bono-

Bononiensis utebatur. Valet & ius cicerum. Mulieres Bononienses dant ius columbæ in quo bullierit schœnanthum, ad purgationes promouendas, si febricitent; estque remedium Nicolî. At in robustioribus puerperis si menses diu retineantur, vena tali incidenda. vt in puerpera in insigni follis è regione domus ciuicæ, cum maximo successu fecimus, menstrua purgatione subsequente; etiam sumendo ʒj. pul. dominatum cum aqua artemisiæ. Puerperæ verò Alcmarianæ, cùm aluus restricta esset, valde debili existenti, ius sequens exhibitum fuit: & follic. senæ ʒvj. tamarindor. num. ix. prun. damasc. q̄r. j. vuar. passul. ab acinis repurgat. ʒj. seminis anisi, anethi (nam in ventre etiam maximè dolebat) ʒj. β. flor. viol. bugloss. borag. añ. m. β. sem. petros. p. j. confusa in gallina pingui, prius mundata à fecibus & intestinis & interaneis, collo pedibusq̄. abscissis confuta, coquantur in aqua, ad dissolutionem carnis ab ossibus: omnia cum iusculo contundantur, & postea colentur vnà cum iure, adiecto pauco vino & sacch. pro sapore delectabiliore. Ex eo iure cyathum subinde sumens & restau-rabatur, & simul secessum habebat. At Mariæ Teylingiæ in puerperio febricitanti ʒj. β. man-næ selectæ cum iure pulli propinata, probè aluus soluta est, febrisque cessauit. Puerperæ Del-phensi cùm lotium retentum esset, sola inun-ctio olei scorpionis profuit. Noni & aliquas puerperas melancholicas factas, & quasi insa-nientes, si filiam peperissent; si masculum, co-malo

malo non afficiebantur: sed paucis adhibitis remediis sanæ euadebant, quemadmodum & illa apud Amatum centur. 2. curat. 52.

SCHOLIA.

VARIA symptomata aliquando puerperis post partum eueniunt, & præter dolores, qui aliquando post partum contingunt, innumera alia contingere possunt. Præcipua verò hæc sunt, sanguinis retentio, aut eius fluxus nimius, & ulcera, & immittes dolores. Si enim non repurgantur, & sanguinis fiat retentio, alij morbi quoque oboriuntur. Sic ex retentione sanguinis vertigines oboriuntur, syncopes, febres, & vniuersaliter agitudines ex repletionem; quemadmodum de retentione mēstruorum diximus. Utere iis quæ menses leniter educunt; sed videndum num adsit debilitas. Sic puerpera debili existenti tali vena aperta non fuit, ut alteri robusta: sed summitates schœnanthi, capill. ven. melissa, rad. apij in iure decocta fuere, & vrina apparente turbida, mox leni adhibito fumigio sub vestibus ex pilulis dictis: R. bdellij, myrrha, gallia moschata, añ. ʒ j. trochis. de myrrha ʒ j. fiant pilule cum melle ros. & vna supra prunas iniecta sumus recipiatur per vuluam, cauendo tamen ne nares attingat. menses fluxere. Si verò nimia purgatio subsequatur, & vires deficient, leniter constringatur cum iis quæ de nimio prefluuio mēsum diximus. Sic istis diebus noctu vocatus sum ad puerperam quæ ex nimia & continua purgatione inciderat in syncopen: frictione digitorum ac manuum reuocata, factis etiam ligaturis membrorum superiorum, ex hac condito, meo iussu, sape capiebat: R. conser. ros.

Sanguinis
retentio.

Superflua
purgatio.

ros. antiq. ℥ j. diacydon. sine spec. ℥ β. fragment. lapid. precios. ℥ ij. manus Christi cum perla ℥ β. cornu cerui vsti ℥ ij. trochis. de carabe ℥ j. syr. de ribes, cydonior. menthacei, añ. q. s. fiat conditum. At altera qua post abortum nimio sanguinis fluxu laborabat, sumpsit commodè has pilulas: ℞ pilul. de bdellio, trochis. de terra sigillat. de carabe, añ. ℥ j. cum syr. myrt. fiant pil. dentur manè. Sed & istis diebus vng. comissa cerati instar super ventrem inferiorem posita profuit. Reliqua vide loco de iis qua menstrua superflua constringant; quæ non opus est ut repetamus. Ita quoq; si febres eas apprehenderint, subtilia regimen, & aqua hordei in potu dato; deinde reliqua secundum exigentiam febris administra. sed quia de his copiosè diximus in libro nostrarum Obs. De febribus, eosdem consulito. Si contingant post partum ulcera, de his quoque prius dictum est. volunt interea ut ex ros. axungia recentis & albumine oui fiant pess. Si vulneretur vterus, vel vulua accedat ruptura, quidam vulnere adhibent pessos ex succo arnoglosse, succo portulacæ, & oui albumine; ulceri verò ex cera, oleo ros. spuma argenti, ac cersa, & alumine vng. conficiunt. Ad rupturam Eris pul. rad. consolide maioris inspergit. Vide apud eundem quid sit faciendū si ruptura fiat in ano & vulua. Ad dolores vteri, ut precedente Scholio & Obs. Si etiam ex parte diximus, cataplasmata anodyna vntionesq; & alia remedia mitigatoria administranda. Aliqui exhibent trypheram opiatam in potu. Vbi dolor immitissimus est, hoc electuario vitur Guainetius: ℞ piper. longi, sem. hyoscyami alb', añ. ℥ x. opij ihebaici, croci, añ. ℥ v. pyrethri, castoreij, añ. ℥ j. ammeos, baccarum lauri, cumini, folior. ruta siccor. calamentiba,

Puerpera si febricitent.

Ad ulcera & vulnere.

Ad dolores.

thæ, añ. ʒiij. margaritar. hyacinthi, ñ ʒj moschi fini
 ʒ β. cum melle despumato q. s. fiat electuar. eo non
 viendum nisi ad minus sex menses praterierint ipsius
 preparationis. datur autem à ʒ β. vsque ad ʒj cum
 vino calido, decoct. artemisia. quamuu tamen istud
 statim dolorem sedat, non est viendum eo nisi magna
 cautione, si reliqua non iuuerint: cum alia habeamus
 anodyna. Huius alij addunt contra rugas in ventre post
 partum remanentes: axungia enim caponis inungunt
 ventrem. Si post partum difficilem uteri prolapsus fiat,
 curetur vt prius dictum est. Si mamilla doleant ex
 lacte, Erotis apponit argillam cum aceto, mamilla prius
 aqua calida fota. alij mamillis dolentibus apponunt
 panem in melicrato infusum cum oleo dulci contritum.
 Si lac ad mamillas confluat cum tensione, grauedine,
 dolore & feruore, ex Mosch. primo impone spongas
 molles cum posca, vel panem in posca infusum cum pal-
 mularum tritu. Et si lac stringere velis, apponatur pulica-
 ria seu psyllium, vel coriandrum viride: si adsit feruor,
 relaxentur cum oleo & aqua calida: Si lactare non
 velit, lac stringitur pyrite lapide trito cum cerato. Vi-
 de ea que scripsimus Obs. 18. lib. 17. de lactis exsica-
 tione. At vna passa trita lac euocat. De defectu lactis
 diximus Obs. 14. & 16. lib. 17. Vide in eodem libro de
 illis affectibus mamillarum; & de fissuris papillarum
 in eodem libro sub finem; & que Aërius lib. 16. cap. 35.
 id caput 50. De mamillarum affectibus scripserit.
 Vide & de lacte grumoso vel vitiat. Addemus autem
 quedam, antequam hunc librum finiamus, de regimi-
 ne infantis, & de regimine nutricis, ex diuersis aucto-
 ribus. eo quod Medici de his rebus aliquando consu-
 antur, vt ita tirores etiam ea ad manus habeant.

Contra ru-
gas ventris
post partum.

Mamillæ
si afflictae
sunt post par-
tum.

DE

DE REGIMINE INFANTIS.

Erosi de re-
gimine in-
fantis cap.
18.

AVRES infantis (inquit Erosi) premenda sunt statim: & hoc multoties est faciendum. Postea observandum ne lac subintret aut nares cum ab-lactatur. Et ligetur umbilicus tribus digitis à ventre mensuratis. quia secundum retentionem umbilici, erit virga virilis maior vel minor. Ut verò rectius lo-quatur, unge palatum cum melle, & nares cum aqua calida; & factis vñctionibus, semper mundifi-cetur, & mucilagines semper emungantur & emun-dentur. Puer praterea sepe est fricandus; & quali-bet eius membra in vnaquaque parte fascia sunt re-tinenda, & iungenda: & rectificanda sunt eius mem-bra; caput videlicet, frons, nares, venter, & renes temperentur, ne multa ex eis exeat vñctuositas vel humiditas. Quod si aliquid istorum appareat, diu-tius à solita fasciatione cogatur abstinere, & diutius dormiat. Postea verò in aqua calida balneetur, & ad suam consuetudinem reducatur: & si opus sit de me-dicinis soporiferis, parum detur, ut dormiat: (non tamen opium, ut nostra muliercula pessimè faciunt.) Curis eius aqualiter est movenda: quod etiam con-suevit fieri post mammillarum susceptionem. In prin-cipio natiuitatis, oculi cooperiendi sunt, & summo-pere cauendum ne sit in loco lucido. Ante ipsum sint diuersa picturae, panni diuersi coloris, margaritæ. Co-ram eo cantilenis & facilibus vtendum vocibus, nec asperis vocibus canendum: & rauci soni vitandi, sicut bombardarum. Postquam hora loquendi appropin-quarit, nutrix eius linguam frequenter cum melle & butyro vngat. Et hoc maximè faciendum est, cum

am loquela tardatur. Caram eo frequenter est lo-
uendum & facilia verba proferenda. Cum verò
tempus natiuitatis dentium venerit, gingiua singulis
diebus cum butyro & axungia gallinae saepe fricanda
sunt, & aqua hordei linienda; gula & spondylia in-
genda. Quòd si venter eius laxabitur, superpona-
tur emplastrum quod sit ex cumino & aceto: & ad-
misceatur saccharum, gummi Arab. bol. Arm. & si-
milia. Cum tempus aduenerit in quo comedere inci-
piet, dandi sunt infanti magdaleones ad modum
plandis facti de saccharo ac lacte, & similia, qua
possit in manu tenere, & cum eis ludere, & de eis
sugere, & aliquid transglutire. Caro quae est in pecto-
re gallinarum & phasianorum, est ei tribuenda. Et
postquam bene capere coeperit, mamillarum substan-
tiam maturè incipiens, eas in nocte sugere permittas.
ita & in die ordinatè ducendus est, bene obseruando
ne tempore calido à lacte remoueatur. Si vnum
membrum pueri sit maius alio, ad bonam habitudi-
nem sic potest reduci, si talis dispositio fuerit recens;
quia inueterata nullo modo reducitur. Fomentetur
ergo primo cum decocto brancae vrsinae, rad. althae,
foliorum apij, petroselini & marathri, diutius bul-
liendo in aqua, & membrum patientis ponatur su-
per vas, & cooperiatur panno lineo vt sudet. Postea
chamamelum & althaea incoquantur. & in illa visco-
sitate malaxetur cera, & totum membrum inde coo-
periatur. postea ligetur fascia lineae strictè, & ita
membrum patientis sudet per noctem vnā: manè
verò fricetur, vt spiritus excitentur, & fluant ad lo-
cum dolorosum. Quo facto, fricetur statim cum
dialthaea ita composita, vt sint duae partes dialthae,

N n

&

& tertia de oleo laurino: commisceantur, & vngatur membrum pradiſto modo ter vel quater in die. Tunc quoque accipe diaceraſeos, ceroneum oxycroceum, & adinuicem pulueriſentur. Deinde decoquantur alibea, & puluis ille malaxetur cum illa viſcoſitate, quouſque bene adhaereat: & membrum totum patientis cooperiatur, & ſaſcia ligetur. Et ſic ſomentando, & emplaſtra ponendo, poterit allenuari. Quibus factis, iniungatur requies & otium, & utatur calida & humida dieta, optimo vino, & mediocriter rubeo, quod bibat quouſque curetur. Insuper & balneo aquae dulcis utatur. Haecenus Erotii. Moſchio autem hac dat: Ex quibus probabis infantem aptum eſſe ad nutriendum? Ex hoc videlicet quod illa, quae illum in utero habuerit, omnibus menſibus ſana fuerit. vitali etiam menſe ſi ſit ſanus natus ipſe paruulus. Si omnibus partibus fuerit integer, omnes poros patentes habeat, vocemq; ſolidam ſtatim ut cadit, emittat. Haec omnia integra ſanitatiſ ſunt teſtimonia, & pleno tempore natum infantem oſtendunt. Quoties in die lauandus infans eſt? Semel. Neceſſitate vero aliqua occurrente, bis: frequens vero lauacrum flaccidum corpus facit (liber Matricis habet, capiti eius nocet). In quali loco lauandus? In obſcuro, & temperate calido. Quibus rebus infantis ſuperficiem lauare oportet aut aſpergi? Antiqui vino cum aqua ſalfa abluebant. Alij vero lorium pueri & puluerem gallarum vel myrtae aſpergebant. Nos autem ſalem tritum & aphronitrum aſpergimus: praediſta enim res odore ſuo infantem feriunt, nec tutum eſt infantem nimium adſtringi: inde enim denterius habet. Si vero multum mollis eſt infans, ad-

mixto

Harmon.
gynæciorū
part. prior.
cap. 20. &
ſeqq. de in-
fante, &
quomodo
tractandus.

exto sale (aliàs, melle) vel oleo, vel succo sœnugr.
erge, aut line per totum corpus, ita vt neque ocu-
neque ori ex his aliquid incidat. Deinde cùm sic-
ur corpus, aqua frigida eum abluere, & aqua ca-
a ipsum lauare debes. Digitis verò in naribus, vel
inmissis, omnia purgare, & oleum oculis infan-
infundere. Deinde minimum digitum in ano in-
itis inmissum, meconium (in Græco πύπρ) tollat,
vmbilicum lana ligatum immediatè sui praece-
& lindeolo oleo intincto contegere. Propter quam
usam oculi infantium oleo irrigantur? vt tunica
ibus constant, emolliantur, extergantur, vt inte-
um visum habere possint. Quare iubentur ma-
es post lauacrum infantum auriculas & nares ex-
care? Ne remanente ibi humore, graciles aurium
ri, perfrigescent, & malè accipiantur. Quomodo
ortet infantes ungere? Primò ad dētes positos, dein-
etiā supinos femoribus suis ante supposito lindeolo,
vt aliquando singulatim manus iungat. Aliquan-
virasq; iungat, & extendere etiam iuuat. Simili-
r etiam pedes, singulasq; corporis partes formare.
qua concauae esse debent, premantur: qua verò gra-
lia, constringantur; & qua exstantia, adducantur.
eulorum etiam ipsorum folliculos frequenter fri-
re, caput verò diligenter rotundum facere, Patel-
s etiam in genubus mouere, deinde omne corpus
ciendere & remittere, & vniuersas partes suis offi-
is commemorare. Quomodo fasciandus est infans
post lauacrum? (in margine annotatum erat: Fortè:
Quomodo disponendum est lauacrum?) Sedere debet
utrix, & genubus iunctis femoribus suis, in lindeolo
infantem accipere, & sublatiis fasciis oleo tepido vni-
gere:

564 DE MULIERVM MORBIS,
gere: & in pelui grandi aqua calida limpida, & sine
odore missa temperata. Deinde manum sinistram
sub axillam infantis sinistram tenere, ita vt pectus
supra cubitum iaceat. Deinde in aquam positum le-
niter fomentare. primò dorsum, deinde supinum
conuersum, & partes ipsas fouere, ita vt omnes sor-
des, quæ in collo sunt, & concava loca, sicuti sunt
axilla, & inguina, diligenter extergantur. Immis-
soq; digito intra os, saliuas omnes tollere, & leniter
gingiuas & linguam confricare. deinde leni manu
supra pectinem premere, vt vrina officium comme-
moret. Sed cum viderit corpus eius aliquantulum
calefactum, sufficienter obruisse, lauare, & in tepida
aqua deponere, vt ad vsum frigida assuescere possit
infans. Quomodo oportet infantem fasciare? Super-
posita femoribus eius fascia munda, & lata sufficien-
terq; longa è lana, vt singulas per partes voluere va-
leat, ita vt omnia loca, quæ sunt gracilia, constrin-
gantur, & antè laxius circumcingantur. Deinde
coniunctis genibus, & talis lana interponatur, ne ita
coniunctis aliquid de membranulis cassetur. Caput
pannis aut lanis mundis contegatur. Vbi oportet &
quomodo infantem iacere? In locis mediocriter ca-
lidis, ita vt nihil oleat, & nec valde sit lucidus locus,
stratumq; eius sit concuum, nec valde molle, ne
multum iacendo, spina infantis aut collum contor-
queat. In mediocri mollitie collocatum etiam caput
infantis iacere debet. Quanto tempore fasciandus est
infans? Apud quosdam diebus quadraginta: apud
alios sexaginta. Apud nos quamdiu in integro sui
corporis infans coaguletur & solidetur: quòd si citius
soluatur, euenire ei solent languores, dum sano cor-
pore

pore sunt nati. Tardius verò solui debet qui imbecillus est. Semel omnis fascia, & non delapsos solui-
mus, sed per partes paulatim. Si verò semel solueri-
mus eos, & corpus mundauerimus, nouitate ipsa per-
cutitur, & malè accipitur. Post quot dies umbi-
licus infantis cadere solet? post tres vel quatuor. Vul-
nusq; quod remanet, plumbi puluere bene curetur.
Quomodo concauitates umbilici formantur? Fru-
stum plumbi ad similitudinem denarij factum appo-
nimus, quod possit pondere suo concauum facere.
Quando oportet infantem cibum accipere primum?
Cum post omnem commotionem (aliàs, commuta-
tionem) quietus fuerit effectus; hoc est, post nonam
(aliàs, octauam) vel x. horam, talem cibum pri-
mum accipiat, qui stomachum & ventrem purgare
possit, & eum nutrire, sicut est mel modicè decoctum.
Si enim crudum fuerit, & austerum est, & inflat: si
verò paulo plus fuerit coctum, constringit. Quomodo
mel ei dandum est? Nutrix debet os eius illinire, &
mulsam tepidam instillare, & sic secunda die lac of-
ferre. Cuius lac accipere debet infans? Maternum
lac dare oportet: aut extraneum, non maternum, si-
quidem adhuc ex labore partus & turbatione, &
purgatione, lac eius malum est crassum (aliàs, pin-
gue) & indigestibile. Quod verò est lac bonum? Bo-
num lac est mediocriter candidum, nec subliuidum,
nec gypso simile, nec subacidum, sed moderatè coa-
gulatū & stillatim in vngue leniter dilateretur, nec se-
citò diffundat. Reliquæ autem differentia malum lac
ostendunt. Maternone lacte nutriendus est infans,
an nutricis? Amabilius quidem potest à matre nu-
triri; verum matrona ut post partum sana esse possit,

Nō 3, melius

melius à nutrice potest nutriri. Unum enim lac maturum sufficienter duobus infantibus ministratur. Post quod spatium lauacri ad mammillam applicandi sunt? Post modicum, donec omnis turbo lauacri digeratur: quicquid enim prius accipitur, corrumpitur & non nutrit. Nam & ipsa nutrix si non digesserit balneum, & exsiccatis antea mammis infantem applicet, malè habebit infans. Quomodo lactari debet? Manibus acceptum infantem aliquantulum in latus ponere, & ad utrasq; mammillas conuertere, ut modò dextram manum infans, modò sinistram liberam habeat, & de ambabus mammis accipiat. Deinde ori eius appositam papillam teneat, & quasi latenter lac exprimat, ne cum labore infans didam sugere incipiat. Quoties in die infans lactari debet? Frequenter in die lactandus est, modò ex sinistra, modò ex dextra mammilla; quoniam semel, quod ei sufficiat, accipere non potest. Lassatur enim diutius lactando, aut de bono lacte citò satiatur. Non ergo determinandus est modus, sed cum visus fuerit velle, oportet eum accipere. Ita tamen ut ante lauacrum, nec in lauacro vnquam accipiat didam, ne ledatur corpus (aliàs, cor) eius. Qui enim ante lauacrum, vel in lauacro lactantur, scias eos variis & multis languoribus detineri. Quibus signis intelligere possumus, infantem debere cibum accipere? Eo quòd præcordia eius concaua sunt, vel etiam tantum tempus transiit, ut cibum accipere debeat, os etiam aperiat, & labia frequentius moueat, & cum in lacte intinctum digitum labiis eorum applicuerimus, sugant cum quodam ploratu. Quomodo verò apprehendimus an propter cibum ploret, an non? Fasciam principaliter

ipaliter inspiciamus, ne stricta sit, ne iacens pedem
aut manum contorserit, aut aliqua re puncturam
inveniat, aut de abundantia cibi aut lactis ploret, in-
spice: & ne à plurimis coopertoriis granatus; aut ne
varuitate eorum perfrikerit, aut nimio sole aestuaue-
rit. Si verò aliqua re punctus est, subito plorare in-
cipit. si coopertoria plurima vel parva, id visu pro-
batur & tactu: aut enim frigidus esse debet, aut
multum calidus. Si autem abundantia lactis vel ci-
bi premitur, huc atque illuc se proiicit, & plena
præcordia habet. Si aestuaverit, cum anhelitu rubet:
si verò aliqua causa inæqualitatis est, & ille languet,
& lac accipere non vult, & macrior effectus est. Ex
predictis signis omnes ploratus eius separari possunt.
Quomodo infantem à lacte deducere debemus? Post
annum & sex menses, aut suppleto biennio, denti-
bus iam abundantibus & firmis, quod possint non
tantum cibum diuidere, sed etiam diligenter eum
manducare. Quem cibum primum infanti dare
debemus? Panosum, hoc est, micas in mulsæ vel in
condito, vel in lacte infusas, vel succum alicuius, vel
pultes. Deinde bibere quid ei dabimus? Aliquando
aquam, aliquando vinum aliquantisper per vascu-
lum vitreum ad imaginem papillæ formatum & per-
tusus, quod rusticitas * Vrula appellat. (Nostris da-
tur cerevisiola tenuis, & recte.) Ante paucos ve-
rò dies, paulatim cibum offerre convenit, & raro ad
didas applicare, & novissimè ex toto lac negare, &
quæ amara sunt mammillis illinire. Quando gestan-
dus est? Ante cibum gestandus est: nunquam statim
post, ut non quod accepit rumpatur aut reiciatur.
Quæ sunt exercitia quæ facere possunt infantes? In-

Quomodo
tractandus
nuper natus
infans, ex
Bonaciolo.

primis ad pilam ludant, vt alius manus extendant.
Hac exercitia vtilia sunt infantibus. Addit hac Bonaciolus lib. 1. Mulieb. cap. 8. quomodo infans recens natus sit tractandus. Recrementum (quod papauer- culum vocitant) plus quàm pro partus magnitudine, colore cruentum atque admodum atrum piccūmve deiecit: quāmobrem quia valde tenellus est, muris pauci salis, cui admista sint, costus, sumach, fœnugr. origanum, eundem præter os & nasum, circumlinire diligentiores iussere. Demum lauatrix manu dextra, lauo brachio eius pectori adactō, eum prehendat, tepida aqua æstate, hieme calida, meraciore generosoꝛe remeto, ouorumq; vitellis binis adiectis, à prolu- uie quacunque nares digitis, vnguibus excisis, per- purgando, anum minimo digito adaperiendo, exqui- site pelluat. Quod plerumque bis aut ter in die (astu potissimum) facere conducit atque expedit. Dein- cept verò leuigato lintealo madidum infantem desic- cet; singulaq; membra leuibꝛis pressuris efformet, ac excultius effigiet. Vesicam, vt lorꝝ egressus facili- or sit, deprimat: leuibꝛis pannis extensus, brachiis ad costas porrectis, obuoluat: institisq; caput capite operto, peruinciatur. In ipsius nares oleum coniciat- ur. Denique capite eleuato super latus, quo melius pituitosa materia ex capite expurgetur, cunabulo suauiter semicirculari motu quasso, succent ante qua- piam, obdormiat: mellis per diem (primum scilicet) suctu contentus, nec nisi flenti propinetur. Demum vsque quò parentis temperatura pristina natura re- stituatur, eundem nutrix interdū bis aut ter lactet. Tantisper enim puerpera lac in pumicis modum coit, quod colostrum appellatur, ac propterea infantes qui hoc

hoc lactauerint, colostrati: sed iis nutricis potius lac exhibere conuenit, quando matris exitiosum sit. Maternum tamen preferatur si bonum sit; ut mox de nutrice dicturi sumus. At cum umbilici exesa veller pars ceciderit, (quod post tres aut quatuor dies iugiter accidit) cochlearum cinis vtiliter imponitur. Paulus verò Aegineta lib. I. cap. 5. hac de educatione pueri paucis scribit: Primum infans recens natus melle nutriri debet; mox lacte: idq; bis in die, aut plurimum ter. Cum autem promptè & alacriter puer assumit, ac spes est eum posse quod oblatum est concoquere, tunc & cibus solidior rectè datur qui non ipsum repleat. At si fortè imprudentibus nobis puer repletus fuerit, somniculosior autem statim & torpidus magis euadat, venter intumescat infleturq;, & vrinae aquosiores reddantur, quæ repletionis notæ sunt, nihil exhibere oportet, donec cibos prius ingestos consumpserit. Abunde autem fuerit duobus annis lacte puerum enutrire, inde ad cibos solidiores transgredi. Conuulsione plerique ac præcipuè corpulentissimi, (ut de morbis pauca adiciamus) habitissimiq;, & lacte copiosiore crassioreq; vefcentes, atque astrictas aluos habentes (quippe qui satietate vexentur, & recrementis squalescant) ac potissimum plenilunio, corripi assolent. Quo morbo omnes ferme ante septimum solem pereunt: ob id die septimo (iis superstitibus) tanquam eorum saluti magis credamus, nomina imponuntur. Proinde iecur asini, panace modica admixta, in os instillatam à comitialibus morbis & aliis, quadraginta iugiter diebus factitatum, puerperia tuetur. Cerebrum capra per annulum aureum traiectum, priusquam lac detur infantibus,

Educatio
pueri ex
Paulo.

Bonaciolus
iterum.

N n 5

tibus,

ribus, contra comitiales ceterosq; infantium mor-
bos instillatur. Ceterum præcox illis risus atque celer-
rimus, lachrymæ ante quadragesimum solem ma-
xima ex parte haudquaquam conceduntur, quan-
quam die eodem quo satus esset, Zoroastrem vnum
risisse lecti animus: sicuti & Crassum, Crassi in Parthia
interempti auum (ob idq; Agellum appellatū) nun-
quam risisse ferunt, quomodo & plurimos nunquam
flesse: alios quoq; multos, quod ratum sit, maxima sa-
pientia auctores, veluti Socratem, Diogenem Cyni-
cum, Heraclitum, eodem semper vultu, nec aut hilari
magis aut turbato (quales apathes Græci nominant)
extitisse. Qui sanè animi tenor in rigorem quandam,
naturaq; duram atque inflexibilem toruitatem sum-
mopere exit, humanos etiamnū affectus proculdubio
adimit. At quoquo modo res se habeat, si ante quadra-
gesimum diem risus eruperit, ominosum id atque ti-
morū plenū vulgo iudicatur. Cuius temporis partem
plurimum obdormiunt. Etenim homini animalū vni
per aliquot menses somno confestim genito premi so-
piriq; datū est. Subinde iam longior indies insomnia.
Somniare etiamnū eos cominus comperitū est. Nam
& pauore expergiscuntur, & suctum imitantur. Ple-
rosq; verò nunquam: quibus exitiale contra somniorū
assuetudinē indicium fuisse, multorū exemplis veteres
inuenere. Insuper recens natus vertex adeò mollis est,
vt cerebrū palpitare perpēdatur; qui sanè serius dura-
tur. Quinimo Zoroastri ita palpitasse, vt impositam
manū valentissimè repelleret, futura scientia præfatio
constat. Pueris primores 7. mense dentes gignuntur:
priusq; his superiores, illis inferiores; at omnibus ferè
prius parte supera haud dubiū est. Ex quibus qui pri-
mus

mus ceciderit, ut terram non attingat, in armillā inclusus, in brachioq; assidue habitus, muliebriū locorum dolores efficacissimè prohibet. 7. eosdem anno decidere, ac alios suffici, dilucet. Quosdam & cum dentibus (tamen si rarenter) nasci, sicut Marcum Curtium (qui ob id Dentatus cognominatus est) & Cn. Papiū Carbonem, præclaros viros, inclaret. Id quidem in viris mali fuisse auspicij, antiquitas negavit. At in mulieribus ea res infausi ominis atq; inauspicati exempli Regum temporibus extitit, quādo Valeriam, ita natam, civitati Sessapia, ea tempestate florentissima, in quam deportata fuit, aruspiciū responso vaticinante, veridico exitio fuisse, dignissimi authores scriptitauerunt. Aliqui etiamnū dentium vice osse continuo superna oris parte gignuntur; sicuti Prusiæ regis Buhynorū filium fuisse tradunt. Sed ex dentibus quaterni primi ^{τετράδοντες} à Græcis nominantur, ij exinde quatuor caninus dentibus ex omni parte cinguntur. Ultra quos utrinq; serè maxillares seu molares quaterni sunt; præterquam in iis, in quibus tres vltimi, qui serò gigni solent, non increuerunt: horum utrinq; bini caninis proximiores, columellares vocitantur. Quare viceni omnes erunt. Ex quibus primores singulis radicibus; maxillares utiq; geminis, quidā etiamnū ternis quaternisve nituntur. Atq; ex radice eadē in pueris novus (altero deciso) dens subit, qui multo sapius priorē expellit. Interdum verò aut supra aut infra eum sese ostēdit. Sed non desunt, quibus tricenos binos viris dentes attribuere, feminis numerū minorē (excepta turdulorū gente) placuerit. Quibus non plures fuere, lōgioris vitæ promissi spatia putant. Paulus de dentiū ortu inquit: Dentiū 7. mense

Ex Paulo
lib. i. cap. 9.
de dentium
ortu.

&

& tendinum, aliquando conuulsiones etiam, eueniunt. Tunc igitur puero nihil dandum, quod mandipostulet; digito autem in lauacro gingiua continenter contrectari, & gallinaceo adipe vel leporis cerebello emolliri debent. Vbi iam dentes prodierint, ceruix, caput, & maxilla delicatis lanis puris contigentur, oleoq; dulci & calido fouebuntur: idemq; meatibus auditoriis instillabitur. Ceterum plenius infantem tunc alere & calida lauare oportet: & si alui profluuium experiat, tentabimus eum epithematis, quae praecipue sistunt, contrahere, inspergendo lanae cumivum, aut anethum, aut apium. Salutare est etiam semen rosarum admiscere, & summatim calidis desiccare. At si venter nihil reddit, melle in glandis figuram coacto, inferius leniter irritabitur: aut nepita detrita cum melle illinetur. Porro conuulsionibus puerorum optimè videtur auxiliari heliotropium in aqua elixum, si puer in hac lauetur. Confert & irino, aut cyprino & sicyonto perungere, & vniuersum calefacere. Cum autem exorsis dentibus, digitos mordet vulneratq; bene fuerit radicem iridis detrasam, nec admodum siccam, ore continere. Hoc remedium vlceribus quoque opitulatur: butyrumq; cum melle illitum adiuuat. Gingiuarum autem pruritus, veteris salsamenti caro lenit. Quibus autem in hoc primo dentitionis rudimento impatientissimis, difficulter nascuntur, iis qui dentes, qui primi cadunt, alligati facilem (efficacius si terrā non attigere) dentitionem praestant. Lacte caprino, aut leporino cerebello, adipeq; gallinaceo gingiua perfricentur, cerebrum pecudis in vino potu detur. Dentium delphincinis ex melle gingiuis illinitur. Eius quoque dente
gingi-

Ad facilitandam dentitionem, iterum ex Bonaciolo.

gingiua tanguntur. Canicula dentes eundem habent effectum. Infantibus tamen nihil butyro vtilius per se & cum melle, priuatim & in dentitione, & ad gingiuas, & ad oris vlcera. Dens quoque lupi adalligatus infantium pauores (quos etiam lapis stellatus arceat) dentientiꝫ marbos prohibet; quod & lupina pellis praestat. Cinis caninorum dentium cum melle pueros tardè dentientes adiuuat. In cochlearum corniculis arenacea durities inueniuntur, ea dentitionem adalligata facilem reddunt. Cerebrum viperæ pellicula illigatum. Ad idem & serpentium grandissimi dentes valent. Bouis capiti lapillum inesse produnt, quem ab eo expui si necem timeat; inopinatis tamen capite praeciso exemptū, adalligatumꝫ dentitioni mirè prodesse: eiusdem cerebrum ad eundem vsum alligari iubent. Limacisꝫ lapillum oficulūve in dorso offensum. Dehiscenſibus gingiuis, caput & collum oleo ex aqua calida abluto fricentur. Quando incipit infans dentes habere? Non omnes equaliter. plurimū verò à quinto mense nasci incipiunt. Quae sunt signa quae infantes ostendunt dentire? Gingiuarum prurigo, & feruor maxillarum, & in ceruice neruorum dolor. Vnde frequentius sanguinolentus humor per os aut nares (aliàs, per aures) exire solet. Quibus vtendum est rebus tunc infantibus, vt non laboriosè & cum tormento dentes eiiciant? A quinto mense oleo dulci, & adipibus gallinaceis, & cerebellis leporis, gingiuas frequentius fricare, nouissimè mediocriter decocto melle illinire. Cùm verò feruor emerſerit, vaporatone & cataplasmatibus vtī; ita vā nutritrix eius vinum non accipiat, & parciū cibos sumat. Ad feruorem faucium quibus vtendum est? Omnibus quae relaxare possunt;

Harmon.

gynæc. part.

prior cap. 14

de his quae

infantibus

accidunt.

Ex Paulo
lib. 1. cap. 8.
ad pruritu-
m gingiuarum.

Ad prurigi-
nem cor-
poris, ex
Mosch.

Ex Paulo
lib. 1. cap. 6.

Ex Mosch.

possunt; sicuti melle modicè cocto, & ex eo mulsa,
& succo ptisanae, & ceteris his similibus. Ad pruri-
tum gingiuarum, fomento viendum est, & liberali
vntione ex oleo discocto in quo cera momentum eli-
quatum sit. Ad pruriginem corporis eorum quid fa-
ciendum est? Vaporatorem lauacri calidi, & perun-
ctione olei cum quo modica cera soluta est. Si verò
exanthemata & pustulae cum humectis vulneribus
exierint, quid faciendum? Viuimus illis quae con-
stringere & siccare possunt. post lauacrum autem
perfundentes aqua calida in qua decocta est rosa,
lentiscus, celsa agrestis, myrtus & coria mali gra-
nati. cataplasmatibus autem misce folia plantagi-
nis, intyborum, portulacae, & vuae lupinae. Illini-
mus oleo rosaceo vel myrcino, cum cerusa, spuma ar-
genti & alumine. Pustulis (inquit Paulus) quae
puero per cutem eruperint, primum sanè multum fa-
cescere negotium oportet. vbi verò probè decreue-
rint, tunc iam curare tentabimus balneis, quibus ini-
ciantur myrthi aut lentisci folia, aut rosa. deinde
rosaceo lentiscino viendum: ceratoq; cum cerusa:
adhuc nitro abstergere lenius expedit: nam valen-
tiora non sustinebit. Optimum verò est, nutricem
dulciori victu vri. laudatur item maximè si puer ip-
se neque pleniore, neque nimis tenui cibo alatur. At
si venter ipsius non respondeat, tunc mel cibo infu-
sum simul coquere oportet. Si ne sic quidem descen-
derit, terebinthina instar ciceris iniicies. Humecta
aluo, milium potissimùm offerre conducit. Et au-
thore Mosch. si venter infantis solutus fuerit, quid
faciemus? Si adhuc lactet, omnia quae stringere pos-
sunt nutrici damus: epithema quod est de palmu-
li &

lis & lenticula inducimus. Contrà, si plurimis diebus non fuerit assellatus, mulsam & olera, quæ ventrem mouere possint, etiam nutrici demus. Sonitum verò narium & oris strepitum, quòd frequentius de humoribus occurrit, quomodo sanamus? Mulsam ex modico melle cocto factam, frequentius infanti- bus damus. Ad tussiculas verò eorum, semen lini, amygdalas, succum liquir. & tragacantha; vtuntur & electuariis. Quòd si quando tussicula aut graue- do puerum, inquit Paulus lib. 1. cap. 7. affligat, lin- Ex Paulo. ctus ex melle, quos Græci melitissimos vocant, adhi- bentur. Conuenit igitur, puero liberaliore aqua ca- lida loto, caput ipsius melle copiosiore illinere, deinde digito linguam leniter premere: multum enim hoc pacto pituita vomitu egeret. Oboritur (lib. 1. cap. 10.) puero etiam vlcus quod aphtha vocatur, nunc subalbidum, nunc subrubrum, aliàs crusta modo nigrescens, quod omnium periculosissimum & le- thale est. Remedio erit iris cum melle, & sicca in- spirata, item rosarum folia contusa, earumq; flos, crocum, myrrhæ exiguum, galla, lachryma thuris, & cortex eiusdem, & simul & priuatim singula melle tincta: ad hæc mulsa, & mali Punici dulcis succus proficit. Ad femorum intertrigines myrtus arida, iuncus angulosus, & rosa inspersa iuuant. Ad aures humentes. Aurium humiditates lana ex alumine imposita, aut mulsum, aut vinum vetus in- stillatum, aut crocum ex vino detritum siccant. De siriasi lib. 1. cap. 13. Siriasis, quæ Latinis Aduſio infantium dicitur, est inflammatio partium cir- ca cerebrum eiusq; membranas. Concauum in ea sit sinciput, concaui itidem cum pallore oculi; accedit & corpo-

Hippocratis
Aphorismi
nouiter na-
torum mor-
bos enarran-
tes.

corporis totius siccitas. Succurrit huic malo vitellus
oui sincipiti cum rosaceo linamenti impliciti modo
impositus, sic tamen vt continuè renouetur. Opor-
teret eidem loco imponere folia herbe quam Graci He-
liotropion, Latini Solarem nuncupant, curcubitæ
ramenta, cucumeris, quem peponem dicunt, cutem
carni adiacentem, aut hortensis solani succum cum
rosaceo. Et, teste Moschione, Siriasis cerebri est ser-
uor cum meningis, ita vt occipitium infantis conca-
uum fiat, cum igneis & frequentissimis febribus. De
aliis puerorum affectibus, morbis atque vitiis, passim
in nostris libris Observationum diximus: quibus bre-
uiter & Hippocrates hos morbos nouiter natorum
adiungere possis. In ætatibus autem, talia contingunt,
paruis & nuper natis puerulis, oris vlcera (quæ aphthæ
vocantur) vomitus, tusses, vigilie, pauores, vmbilici
inflammationes, aurium humiditates. In progressu
verd cum iam dentire incipiunt gingiuarum prurigi-
nes, febres, conuulsiones, alui profluvia: & maxi-
mè cum caninos edunt dentes; & iis præsertim pue-
rû qui crassissimi sunt, & aluos duras habent. Cum
verd iam magis adoleuerint, tonsillæ & vertebra quæ
in occipitio, ad interiora luxationes, crebri anhelitus,
quos Graci asthmata vocant, calculi, lumbrici rotun-
di, ascarides, verruæ, quas Graci acrochordonas vo-
cant, satyriæ, strumæ, & alia tubercula, & præci-
pue antiè dicta. Grandioribus autem, & iam acce-
dentibus ad pubertatem, plurima ex his, & febres
diuturnæ magis, & ex naribus profluvia sanguinis.
Plurimæ autem passionēs puerulis iudicantur: non-
nullæ quidem in quadraginta diebus; nonnulla in se-
ptem mensibus, quedam verd iam ad pubem acceden-
tibus.

tibus. Quæ verò permanserint, nec in pubertate finierint, puerulis, aut feminis, cum menstrua erumpunt, consenescere consueverunt. Sed & isti de infantium, siue puerorum, tuenda bona valetudine aphorismi, ex autoribus vndiquaque congesti, viles censentur. I. Quoniam eius naturam quo nutrimur sapimus, bonorum morum nutritrix, bonaque eucrasie ac mediocris ætatis semper est eligenda. II. Bono cibo nutrices si nutriantur, boni chymi lac generant, quod crescendo dat bonos ipsi nutritio succos. III. Solo lacte pascendus est infans, vsque quod dentes anteriores producat. IIII. Cum ex eodem simus & nutriamur, lac maternum sanguinis consueti atque cogniti alimonia genitum, lactibus ceteris natura infantis cõformius existit. V. Ut hædi lacte ouino nutriti, pilum gignunt teneriorem, & agni lacte caprarum aliti, lanam ferunt duriores: sic nati nutricibus alienis educati, à propriis matrum naturis multum discrepant. VI. Qui suos partus deserunt, ablegantque à sese, & aliis nutriendos dedunt, vinculum, coagulumque animi atque amoris, quo parentes cum filiis natura consociat, intercidunt atque diluant. VII. Infantis aliorum educationi dati facta est ex oculis eius amolitio: vigor enim ille materna flagrantia, sensim atque paulatim exstinguitur; ipsiusque affectio animi atque amoris, in ea sola vnde alitur, occupatur; & matris quæ genuit neque sensum vllum, neque desiderium capit. VIII. Moderatus fletus ante pueri lætationem ad membra spiritalia dilatanda ceteraque confortanda & ad caput purgandum conuenit. IX. Pueri mense septimo dentire incipiunt: dentiunt verò citius, qui lac calidius sugunt. X. Cum ignem

Aphorismi
de infantium
vnde puerorum
tuenda
bona valetu-
dine.

O O

igni

igni addere non liceat, eucratu: puer ad plurimum
vsque, aut eius nutrix, nequaquam vinum gustare
debet: quoniam sufficienter calefacit corpus, caputq;
vaporibus replet, atque in his furiam quoque & ma-
niam irritat. xi. Puer à septem annis ad quatuor-
decim vsque, nec multis nec violentis promouendus est
gymnasiis, ne eius augmentum talibus impediatur:
tunc enim animus bonis moribus & honestis ornan-
dus est disciplinis. xii. Animi mores corrumpuntur
malis consuetudinibus, ex cibis ac potibus & gymna-
siis, inspectionibus, auditionibus, & à mala musica.
xiii. Multi multis annis agrotantes, propter ma-
lam animi consuetudinem, contraria motuum ipsius
anima immoderatione curantur. xiiii. Diligentia
multa studendum est, ne vllum animi immoderatum
motum, ad tertium annum vsque cum corpore par-
uuli patiantur: ea propter nutricem oportet esse pru-
dentem, & consuetudinis pueri expertam. xv. Ne-
cesse est calere corpus quod adolescit, & ad vires &
incrementum tendit: vice versa, illud supra modum
frigere, cum coeperit aboleri, & tanquam maturum
atque caducum in ruinam præceps festinare. xvi. Vi-
num & cereuisia inimica sunt pueris: nam eorum
capita malo vapore replent, & calefaciendo mentem
eorum perturbant. xvii. Infantium dolores tribus
modis leuantur; nutricis papilla ori eorum apposita,
motuq; mediocri, & vocis modulamine. xviii. Qui-
bus infantibus alius siccata est, hanc, quantum est
cicer vnum terebinthina, aut mellis vncia soluit.
xix. Rubrus corallus infantium lactentium collo ap-
pensus ad os vsque ventriculi deueniens, lactis vomit-
um prohibet, roboratq; horum coctionem. Postea-
quam

nam in lacte nutriri (inquit Paulus) infantes desie-
runt, liberiore eis modo & suo ingenio hilariter vive-
re permittemus: exercitia autem & alimenta lenio-
ra praescribentur. Ab anno sexto & septimo, tum pue-
ri, tum puellae, literatoribus blandis humanisq; tra-
dentur. tales enim cum animi remissione & gratia
loquuntur. Animi autem remissio ad probam corporis
educationem plurimum adfert momenti. Duodeci-
mum annum egressi, ad grammaticos, & geometras
mittendi sunt; corpusq; eorum exercere oportet. A
quarto decimo usque ad primum & vigesimum, ma-
thematicis disciplinis, & sapientiae studio incumbunt:
exercitiis pluribus propter corporis robur creduntur;
ut & animo & corpore laborantes, à libidinis impetu
coerceantur. Hic etiam vinum circumcidendum est.
Aetate florentibus educatio absoluta tum animi tum
corporis congruit, eoq; exercitiis omnibus, praesertim
quibus quisque assuevit utendum, cibo item pleniore
& valentiore. Declinantibus autem moderata com-
petit animi & corporis educatio. Exercitia enim qua-
vis acunq; fuerint pro horum ratione imminuere oportet:
alimento detrahendum, ut quorum habitus iam
rigescere incipiat. Sed hac de Regimine infans, &
etiam puerorum affectibus ac morbis, dicta sufficiunt;
tum & de iis passim in nostris Observationibus dix-
imus. Quod si quis pleniorē de puerorum morbis
& symptomatis tum dignoscendis, tum curandis, do-
ctrinam desideret, his adiungere poterit libellum il-
lum Sebastiani Austrii Rubeaquaensis, De puerorum
morbis. Nunc de Nutrice tam ex veteribus, quam
Neotericis pauca adiciamus.

Ratio victus
infantium
atque reli-
quarū deinceps
aetatum
ad usque de-
clinantes,
ex Paulo
lib. 1. cap. 14.

DE NVTRICE, VEL REGIMINE
NVTRICIS.

De nutrice
ex Mosch.
cap. 18. in
Parte 2.
Harmonia
Gynaeciorū.

Paulus lib. 1.
cap. 2. de
nutrice.

Erotis de
pass. mulier.
cap. 19. de
electione
nutricis.

Vitanda nu-
trici ex
Paulo.

QVAenam sit ad nutriendum apta *ocet*
Mosch. nempe Adolescenta, quae pulchra etiā
sui corporis sit colore, & iam bis pepererit, & pectus
latum habeat; ipsasq; mammas neque nimium la-
xas & rugosas, neque interim valde tensas papillas,
neque multum graciles, neque valde breues, & quae
non multas cavernas habet: neque iterum parua &
breuis, animosa, & quae cum integro affectu puerum
amare possit, & quae nunquam irascatur, si fieri po-
test, grata & munda sit. Eodem modo & Paulus.
Deligi nutrix debet nulli morbo obnoxia, atate me-
diocri, ita ut iunior quinque & viginti annos com-
pleverit, grandior quinque & triginta non excedat:
pectore sit amplo, magnis mammis, papillisq; neque
connuentibus, neque auersis: reliquo corpore nec ad-
modum obeso, nec nimium gracili. Praeterea ma-
gnus est infanti commodum, si nutrix non mul-
tum antè pepererit, magisq; si masculum. Ita quo-
que Erotis: Iuuenem oportet esse nutricem, clarum
colorem cum albedine & rubore permixtum haben-
tem, quae non sit partui vicina, neque multum à
partu remota. Non sit maculosa: neque infirmas,
neque nimis grossas habeat mamillas: pectus gros-
sum & amplum: pinguis sit mediocriter. Vitanda ei
sunt (inquit Paulus loco citato) admodum siccanti-
a, salsa, acris, acerbis, & validè calefacientia. Item
odores tum fædi tum suaues prater modum, condi-
menta aliq; acris nocent. Ad hac Venere nutrix
abstineat: manus humerosq; molendo texendoq; ex-
erceat:

erceat: puerum vlnis gestet, vbi tres iam menses quatuorve excesserit. Ita quoque Erotis: Non comedat Ex Erot.
 sal, nec acuta, nec stiprica, nec porros aut cepas, neq. ceteras species quæ admiscuntur cibariis pro sapore, vt piper, allium, erucam: & præcipuè vitet allium, sollicitudinem, ac sibi à menstruorum prouocatione caueat. Qua vita agenda est nutritrix? Communiter sicut omnes homines vt sana esse possit. Exerceri ergo debet lauacro, vel perunctione corpus reficere, cibumq. sufficienter sumere, semperq. ebriositatem & indigestionem vitare. Quæ sunt exercitia quæ manibus nutritrici fieri possunt? Exercere se debet nutritrix in aliquo opere, præsertim partibus supernis, vt lac plurimum & digestum habere valeat: & si fieri potest, ad virum suum non accedat, ne per vsum Veneræ purgatio se commoueat; qua superueniente, copiositas lactis exterminetur aut extinguatur. Primis verò diebus quibus lactare incipit, simplicem cibum & leuem accipiat, & aquam bibat, ne solidum lac mox natis infantibus cum difficultate per angustos gutturi meatus descendat. Et cum paruuli, accedentibus diebus & mensibus, solidantur, & fortiores fiunt, iam etiam solidiorem & fortiorem cibum capere nutritrix incipiat. postea verò vinum sic vt & conditum subiungat. Et si ita per ordinem actum fuerit, vt docuimus, infans sine læsione & sine indignatione saluus custodiri potest. Nam si nutritrix ebrietati deseruiat, infans infirmabitur. Infans namq. separatus à matre non præualet hæc & his similia sustinere. Sicut enim ramusculi, dum adhuc in eadem arbore consistunt, vnde nati sunt, sustinent tempestates & ventos; separati verò ab arbore, inserti in
 O O 3 alia,

Ex Harmon. Gynaeciorum.

Paulus lib. 1.
cap. 3. de la-
cte nutricis.

Erotis.

Quomodo
lac vitiatum
corrigatur,
ex Paulo.

alia, non praevalent sustinere, quousque radicem in-
figant. At laudatissimum lac est, moderatum spissi-
tudine, copia, colore, odore, & gustu. Commenda-
tur & quod in unguem pollicis instillatum, eo incli-
nato ad lucem, neque subito neque tarde videtur
defluere. Iam vero in hunc modum probari potest:
infuso lacti in vase vitreum, coaguli exiguum admisce-
tur, digitusq; agitur: in quo postquam concreuerit,
inspicietur, num casei portio minor quam serum fue-
rit. hoc enim lac inutile est: contrarium huic, conco-
ctu contumax: probatissimum, quod utraque habet
mediocritas. Et si lac minuat (inquit Erotis) pulvis
de farina fabarum, & similiter visi, & de pane si-
mila cum lacte & sacch. facta dentur ei ad sorben-
dum: quibus augmentetur lac: in quarum decoctio-
ne parum de semine feniculi admisceatur. Si autem
lac eius fuerit grossum, nutrimentum ipsius subtili-
andum erit; & ita etiam cogatur laborare. Cui in-
super dandus est syrupus acetosus, & vinum subtile.
Si vero lac eius fuerit subtile, nutrimenta sint grossa
& fortia, & somnia utatur longioribus. Quod si
venter pueri solutus sit, dentur nutriti qua consti-
pant. Quomodo lac vitiatum corrigatur docet etiam
Paulus lib. 1. cap. 4. his verbis: Lac vitiatum corrigi
debet. Si crassius fuerit, pituita vomitu elicietur, qui
optimè oxymelice potio citatur: laboribus cibum prae-
cedentibus eadem extenuabitur. Tunc nimirum in
cibo conducunt, origanum, hyssopum, satureia, scan-
dix, & thymus, item radícula exigua, vetusq; sal-
samentum cum oxymelice. At si acrius tenuiusq; lac
euaserit, multis quidem laboribus nutricem leuare,
sorbitionibus autem & carnibus suillis, saepeq; & vini
dulcis

dulcis potu reficere conuenit. Si lac fuerit imminu-
tum, sorbitionibus & pleniori modo sustendanda est;
vinum dulce potui dabitur: pectus & mammillas
perfricare oportet. Quibusdam cucurbitula quoque
defixa abundè præsinit. Medicamenta verò eisi lacti
generando proficere quidem aliquid sciam; non tamen
frequenter ipsis vti præceperim, ut quæ violentius con-
sumant. Est autem sceniculi radix, & semen prisa-
næ incocta; item cythi solia ex vino nigro aut prisa-
næ: melanthion dulce & anethum, pastinacæ radix
atque semen. quæ calida prius irrorata, admoenda
sunt. Omne verò lac vitiosum, siue crassum, siue acre
fuerit, & fœtidum, puerum qui prius suxerit, eadem
qualitate inficit. Lac autem acre nunquam ieiuno
exhiberi debet, fœtorem eius vinum odoratum &
cibi dulces emendare possunt. De caseato lacte ipse
3 lib. cap. de mammillis idem tractat. Quid est facien-
dum si nutricis lac fuerit exterminatum? Si hoc con-
tigerit, alterius mammillas accipiat: vel si non sit alia,
illi cuius lac exterminatum sit, competentis diligencia
prouocandum est; & si lapsus est, cibis & potionibus
competentibus confortetur. Secundam authorita-
tem etiam antiquorum, vbera omnium pecorum
manducata, sicut vespertilionum etiam combusto-
rum cineres, & noctuæ cum vino bibere dabant, vel
cum aqua soluta mammis illinebant. Quæ nos om-
nia reprobamus: importunitas enim hac stomachum
exterminat, & cibum corrumpit. Illus verò quæ plus
quàm debent lac habent, fortioribus exercitiis &
laboribus, & stipticis rebus minuatur. Si verò spissam
est, accipiat cibum digestibilem, & qui modice nutri-
re possit, neque siccus sit; aquam libat; & quotidiana-

Ex Harmon.
Gynæc.

no lauacro vtatur. Nam & nutriti cibos falſos accipere non permittimus, quoniam paruulum corrumpunt, & lac & vires infantis minuunt. Nutrix verò cibos bonos & ſuccos, qui facile digeruntur, accipiat. Poriones, quæ ſtomachum cuſtodire valeant, & lac augere, bibat. Illam verò quæ aquoſum lac habet, rarius oportet lauare; & vinum bibat, & cibum accipiat ſolidum, ſicut ſunt pulres duræ, oua elixa, frixa; & porcina caprinæve carne vtatur. A ſomno expergeſactam, quid facere oportet nutricem? Deambulare modicè, mammæ fricare, vt lac quod ſomnus conſtrinxit, ſoluatur; & ſic infans applicetur. Subinde (vti diximus antea De regimine infantis) maternum lac potius ſugat: quippe quod alimonia, qua dum in vtero infans erat, alebatur, perquam ſimile exiſtat: muliebria namq; in vbera delata concoctione lacteſcunt, & ob id eidem vel maximè conueniens: quod etiamnum quotidiano experimento compertum eſt, propterea quod maternis mammillis puerperi ori admoti, alliceantur, ac deniq; quæq; eidem officerent, arceantur. Etenim à partu purgationibusq; lactis copia excitatur; aded vt pleriq; non modò de papillis, ſed & paſſim per vbera, aliquibus etiam per alas, effluat: in poſterum quoque quoties nec concoquatur neque exeat, ſed redundet ſupra modum ſuccis, globuli obdureſcunt intumeſcuntq; quas murinum ſinum aqua pluuiæ dilutum, reficit. Eaſdem à partu adeps anſeris cum roſaceo & araneo, cuſtodit. Mammis puerperis vexatis, otidum adipem vtilem eſſe inuentum eſt. Anſerino adipe mammis perunctis, dolores mulceri exiſtimant. At vbi lactis putreſcentis vbertate atque affluentia mamilla re-
bore

Maternum
lac præfer-
tur ex Bo-
naciolo.

lore suffusa obduruerint inflammanturq³, quod die
 tertio omnibus maxima ex parte obuenerit; muricum
 vel purpura testarum cinis cum melle efficaciter sa-
 nat. Atque aduersum eas quæ eam fortunam inci-
 derint, plerique Medici se medicos non inueniunt.
 Ego (inquit Bonaciolus) certè scio (pace ac venia
 dicere liceat) rarò quampiàm, quæ se illis credidisset,
 huic pesti ereptam. Verùm ita nos eius curationem
 iis quæ infrà perscripta sunt intra quartum diem ex-
 pediuimus: Abrotani, menthae, apij, añ. m. j. psillij,
 acacie, gallarum, añ. ʒj. cumini ʒß. rad. alth. m. ij.
 castorij ʒß. sem. lini ʒij. rad. brassicæ rubra vsla-
 tum ʒxiij. cancerorum fluuiatilium exustorum toti-
 dem: hæc cum in aqua menthae quod sufficit subfer-
 buerint, donec pars tertia decesserit, mammae sepius
 foueantur. Mox à somento emplastro tali illinan-
 tur: Acacie ʒij. cyclaminis ʒj. mucilag. sem. lini,
 psillij añ. ʒj. ex succo apij quod sufficit, emplastrum
 molle confice. Subinde, tempore procedente, sanda-
 racha, myrrhaq³ adicienda sunt, sandaracha præ-
 ponderante: quæ si mammæ obdurent, fetu florum
 maluarum ac radicum althææ ex aqua fontium ad
 tertias decoctarum præstanter succurritur. Hercules
 à partu ob dictas causas duritiàm iis accidere in con-
 fesso est. Quandoquidem vbera tota fungosa exsunt:
 adeò ut si casu aliquo pilum mulier poculo hauserit,
 dolor in mammis (quod malum pilare vocitant) ni-
 mirum moueatur: neque aptius sedatur, donec vel
 sponte, vel mulëtra pressus pilus egrediatur. Cancri
 etiamnum fluuiatiles illi, vel marini, pilos in max-
 ima, vel muricum carnes appositæ tollunt. Sed quo-
 niam natura non ita fert, ut succus idem pluribus vnâ

locis crumpere possit, hinc quàm diu è mammis lac emanauerit, magna ex parte menstrua purgationes astringantur; assiduè dixerim, haud perpetuò, quando & iam quibusdam lactantibus (vt nos ipsi nouimus) muliebria proruperint. Lac autem donec mulier conceperit asseruari, tum autem desinere atque aboleri, tam in homine, quàm in quadrupedum viuiparo genere, inclaret. Quanquam feminis partum alentibus, si ex eodem viro rursus conceperint, lac minime corrumpi, Nigidius auctor est. At si quid (vtpote quia lac integrum non sit, aut quia parens vieta, languida, aut nobilis, admodumq; deliciosa sit,) matrem puerulum lactare inhibuerit, nutrix eligenda, cuius etas inter viginti quinque & triginta quinque annos: sit viuidi coloris, fortis ac robusti colli, pectorosa, musculosa, dura ac multa carnis, non obesa, non gracilis: cuius etiam mammae solidae ac firmæ sint, mediam magnitudinem modicamq; duritudinem obtinentes. [Noui & ego nutrices, quæ magnas mammas habebant, & valde somnolentæ erant, cumq; noctu lactarent infantes, ac statim somniculose dormirent, eos oppressere, ac suffocationis causam procul dubio dedere. Ideo præstat nutricem, postquam infanti lac exhibitum fuit, eundem in cunabulis ponere.] Sit autem iisdem lac plurimum, odoratum, candidum, perdulce, æquabile, neque admodum crassum, neque tenue, cuius super vitreum umbonem rectè probatio sit, si neque prorsus fluat, neque umbone reclinato omnino constet: aut si in vasculo illius portio emulgeatur, myrrha tantillo adiecto, sero pariter atque casco pars aqua detur. Probatissimum etiam si in vngue hæreat, nec defluat, at-

que

que quod à partu quadraginta & quinque, sexagintaue solibus abscesserit. Si marem iusto partu illa pepererit, neque abortiri assuetæ. Si laudatorum motum extiterit, quæ neque ocysimè anima passionibus afficiatur, neque penitus obtusi sensus aut stolidi sit: quæ lactare prohibent. Quæ nihilominus admonenda est, ne concumbat, ut probatis cibariis vescatur: ut quaque vice aut lactationem partui mellis pauxillum ex paucis vino lingendum tribuat: item ut lactis quicquam mulgeat, ut mamula pressione puerperij suctionem iuuet, ne fortè vehementi suctu, & gula instrumenta obladantur, & malarum ossa luxentur, quod sæpius contingit: ut singulis lactationibus non vberem lactis copiam, sed parcā exhibeat. Quod si defuerit, remedia adhibenda sunt. Nam suillum lac potum deficientia puerperarum vbera mirè replet. Asininus lien inueteratus ex aqua illitus mammis abundantiam præstat. Terreni vermes cum mulso poti lac deuocant; atque perdici oua sorptui data mulieribus. Glauciscus è iure sumtus, & smarides cum ptisana sumpta, vel cum feniculo decoctæ, lactis copiam faciunt. Item cancri cum lapatho & apio in iure cocti vbertatem præstant. Iis itaque obseruatis, puerulus & bene habebit, & commodè lactabit. Hactenus Bonaciolus. Et ita ex præcedentibus authoribus, quibus modis nutrix regenda sit, constat.

ABSOLVTO igitur hoc libro Vigesimo
o^{cto}avo de mulierum affectibus, superest
adhuc liber Vigésimus nonus, de extremis qui-
busdam partibus corporis; ut ita earum mor-
bos & causas accuratius pariter tractemus.
Transibimus itaque ad sanandas podagras &
chiragras, & articularum dolores, gravissi-
mos plerumque morbos; quiq; nonnullis saepe
ut peculiares adherent. Ita tota cyclopaedia
nostrarum Observationum de morbis prae-
cipue ad Medicum spectantibus absolvasur.

FINIS LIBRI XXVIII.

CATALOGVS OBSERVATIONVM MEDICINALIVM,

quæ in hoc libro vigesimo octauo
continentur.

*Primus numerus notat Observationem;
Secundus paginam.*

- I. **O**BSERVATIO, de mensibus seu men-
struis purgationibus retentis. pag. 1.
 - II. De menstrua purgatione subito retenta. 13.
 - III. De mensium suppressione, sanguine ad alias
partes delato. 20.
 - IIII. De suppressione mensium, plenitudinis ra-
tione. 27.
 - V. De medico imperito, qui menses nitebatur
euocare in puella planè extenuata. 35.
 - VI. De puella ex sola refrigeratione vel nuda in-
temperie frigida menses restrictos habente:
& de altera muliere mensium suppressione
laborante à succo pituitoso ora venarum
uteri obstruente. 42.
 - VII. De vidua longo tempore menses suppressos
habente ex pituitosiore sanguine. 50.
 - VIII. De muliere utcumque biliosa, ex bilioso san-
guine menses detentos habente. 56.
 - IX. De menstrua purgatione retenta ex melan-
cholia. 60.
 - X. De muliere ex longo mensium profluuiio la-
borante. 65.
 - XI. De superfluo mensium profluuiio cum insi-
gni virtutis debilitate. 72.
 - XII. De insigni menstrua purgatione ex abortu
lethali. 79.
 - XIII. De superflua menstrua purgatione ex ana-
stomosi. 83.
- De

- xiiii. De mensibus superflue fluentibus ex aper-
tione vasorum. 91.
- xv. De purgatione menstrua ultra nouem men-
ses perdurante lethali ex reseratione vaso-
rum vteri. 95.
- xvi. De mensium profluuiio venis vteri perruptis,
ex graui pondere subleuato. 98.
- xvii. De menstrua superflua euacuatione ab arro-
sione. 102.
- xviii. De immodico mensium fluore ob sanguinis
tenuitatem, caliditatem & acrimoniam. 107.
- xix. De fluore muliebri, aut menstruis albis. 113.
- xx. De menstruis albis per modum consulationis.
117.
- xxi. De fluore muliebri, post naturalem mensium
purgationem. 128.
- xxii. De profluuiio muliebri in muliere admodum
biliosa. 136.
- xxiii. De fluore muliebri aquoso & pituitoso. 140.
- xxiiii. De muliere laborante Gonorrhoea. 148.
- xxv. De vteri suffocatione in vidua ex semine re-
tento. 151.
- xxvi. De vteri praefocatione, partim ex menstruis
retentis, partim ex semine intus remanen-
te. 158.
- xxvii. De muliere praefocata & pro mortua habita,
tandem ad vitam restituta. 168.
- xxviii. De muliere, quae ex ira frequenter praefoca-
tionem vteri patiebatur. 176.
- xxix. De praefocatione vteri ex semine retento le-
thali. 185.
- xxx. De praefocatione vteri in praegnan- te, & de al-
tera in ipso partu eueniente. 187.
- xxxi. De vteri suffocatione post menses fluentes
orta. 189.
- xxxii. De vteri suffocatione ex semine retento. 198.
- xxxiii. De vteri vehementissima praefocatione ex se-
mine retento. 205.
- xxxiiii. De vteri praefocatione ex menstruis reten-
tis. 209.
- De

xxxv.	De vteri procidentia, per modum Consultationis.	213.
xxxvi.	De quibusdam vteri præcipitatione laborantibus.	226.
xxxvii.	De vteri stillicidio cum imbecillitate & intemperie frigida & humida eiusdem.	232.
xxxviii.	De spiritu in vtero collecto cum grauissimo dolore.	234.
xxxix.	De vteri inflatione cum insigni dolore post abortum oborta.	238.
xl.	De intenso vteri dolore.	241.
xli.	De vteri inflammatione.	244.
xlii.	De inflammatione seu apostemate vteri calido.	251.
xliii.	De oris vteri inflammatione.	260.
xliiii.	De apostemate vteri frigido in abscessum transmutato.	269.
xliv.	De vteri scirrho.	276.
xlv.	De vteri cancro ulcerato & lethali.	283.
xlvi.	De cancro vteri.	287.
xlvii.	De ulcere matricis.	295.
xlviii.	De antiquo vteri ulcere & lethali.	305.
xlvi.	De pruritu vulvæ.	309.
li.	De vulvæ excoriatione.	312.
lii.	De vteri rhagadibus ac fissuris.	314.
liii.	De condylomatibus vteri.	316.
liiii.	De sycosi vteri.	319.
lv.	De vtero imperforato.	323.
lvi.	De puella ab Hernia inguinali si nupserit, num sterilis sit futura, per modum Consultationis.	326.
lvii.	Num vir aut mulier sterilis sit, per modum Consultationis.	337.
lviii.	De difficultate imprægnationis in duabus mulieribus: vna pituitosa, altera biliosa.	352.
lix.	De dubia cōceptione vel imprægnatione.	364.
lx.	De vteri mola.	375.
lxi.	De mola reiecta, quasi oculos multos habente; & de aliis diuersa forma.	383.
	De	

- LXII. De Mola instar accipitris caput rostratum habente, electa. 397.
 LXIII. De mola post fœtum perfectum reiecta. 406.
 LXIII. De mola, aut sanguine crassiore, quem hydrops subsequatur, deinde mors. 416.
 LXV. De cissa, pica, malacia prænantium. 447.
 LXVI. De muliere quinto mense menstruas purgationes habente grauida, in qua merus erat de abortu per modum consultationis. 451.
 LXVII. De prægnante vomitum enormem habente, unde abortus metuebatur: & de Altera alui profluuiio laborante. 466.
 LXVIII. De fœtu mortuo cum intensissimo dolore ventris inferioris cum straguria & dysuria. 472.
 LXIX. De partu facilitando in nobili Domina etiam ictero laborante. 480.
 LXX. De partu difficili ex magnitudine fœtus. 481.
 LXXI. De partus difficultate ob innaturalẽ positionem fœtus ac humore elapso. 490.
 LXXII. De parru valde periculoso: & de primipara ex primo partu moriente. 497.
 LXXIII. De quibusdam mulieribus in partu periclitantibus & egregiẽ liberatis. 500.
 LXXIII. De muliere obela in hieme difficulter pariente. 508.
 LXXV. De partu difficili ob geminos. 514.
 LXXVI. De quibusdam mulieribus, quæ ob mortuos infantes ex difficili partu laborarunt. 522.
 LXXVII. De muliere fœtum corruptum paulatim exonerante. 529.
 LXXVIII. De muliere ex partu mortuo simul occumbente: & de altera viua permanente. 534.
 LXXIX. De secunda relicta. 539.
 LXXX. De secunda relicta in quibusdã puerperis, & quibus medicamentis ab ea liberatę sint. 544.
 LXXXI. De dolore post partum eueniente. 561.
 LXXXII. De quibusdam symptomatibus puerperis euenientibus. 565.
 De regimine infantis. 560.
 De Nutrice seu regimine Nutricis. 580.

ERRATA.

Pag. 3. linea 10. ana. ij. lege ana. m. j. 7. 6. abmē
 eg. uti. 9. 10. sanguini leg. sanguinis. 9. 17. canillo
 eg. alij. 17. 12. duritia leg. durities. 18. 16. imper-
 orate leg. imperforata. 55. 9. oreofelini leg. petrose-
 vi. 57. 14. R. acetosi, leg. syrup. acetos. 84. 3.
 luvia leg. pluvial. 138. 5. medicum Amsterda. leg.
 medici Amsterdamensis. 164. 3. pulsus leg. pulsus.
 27. 8. ana. 3 vj. leg. 3 vj. 236. 16. tumefactio sequi-
 ur leg. tumefactio. 254. 5. annexo leg. annexus.
 61. 10. cibo leg. cibi. 261. ultima. composita leg. compo-
 sum. 267. 2. contrario leg. contrarium. 272. 13. exhibi-
 us leg. exhibitus. 348. 2. ferilis leg. sterilis. 407. 6. instar.
 eg. instar. 407. 26. Leydius leg. Heydius. 474. 16. &
 g. 2. 545. 1. 3 ij. artemisia leg. 3 ij decoctionis artemi-
 2. 549. 27. vel leg. &. 580. 2. adolescenta lege ado-
 lescentula.

pp

NOMI.

NOMINA AVCTORVM

*quorum testimonia
in hoc*

VICESIMO OCTAVO LIBRO

De mulierum morbis,
citantur.

AETIVS.

Altomarus.

Amatus Lusitanus.

Apuleius.

Archigenes.

Aristoteles.

Artius.

Aspasia.

Auicenna.

Azuranus.

Bayrus.

Barsdorpius.

Benedictus Fauentinus.

Benedictus Veronensis.

Benedictus Victorius.

Bertrutius.

Bettus.

Bonaciolus.

Capella.

Cleopatra.

Cronenburchius.

Dioscorides.

Dodonaeus.

Elidens Bononiensis.

Empedocles.

Ericius, siue, Heydins.

Eroris.

Fernelius.

Florentiola.

Fontanonus.

Fuchsius.

Galenus.

Gassarus.

Gatenaria.

Gemma.

Gellius.

Gilbertus Anglicus.

Gordonius.

Gradus.

Guainerius.

Hertogius.

Heurnius.

Hippocrates.

Hollerius.

Hollerij interpres.

Horstius.

Iacchi n s.

Ioannes de Boys.

Leonellus

conellus Fauentinus.

Amberchius.

Marthius.

Montagnana.

Montanus.

Moschio.

Nicolus Florentinus.

Nieuuenius.

Nigidius.

Paulus Agineta.

Philagrius.

Plinius.

Rhasis.

Rocheus.

Rondeletius.

Ruffus.

Sauonarola.

Sebast. Austrius.

Siluius.

Soranus.

Tiengius.

Valeriola.

Valescus de Taranta.

Pp 2

RERV M

RERVM AC LOCORVM MEMORABILIVM ET

INSIGNIVM QVÆ IN HOC

xxviii. libro de Mulierum

morbis continentur,

INDEX COPIOSISSIMVS.

Numerus paginam notat.

- A.
- A**BORTVS causæ varix 456. 457.
458. 465. 468.
Abortus ab immensitate partus.
464. à nidore candelæ extin-
ctæ. 452.
Abortus differentix à corruptio-
ne, effluxione & eiectione. 458.
Abortus signa. 459. prognosti-
ca. 462. differentia à partu na-
turali. 485.
Abscessus quomodo rumpendus.
375.
Aegidij versus de procreatione
hominis in utero. 369.
Agarici drachma vna sumta vteri
strangulatum perfanat. 208.
Agrestes mulieres profluuium mu-
liebri raro detineri. 127.
Alcmariana mulier empiricorum
opera in erosione & ulcere vte-
ri vsa in cachexiam prolapsa.
105.
Alcmariana puella naturalibus
clausis nata quomodo curata.
323.
αλμαρτανισ. 541.
Amati Lusitani consilium super
mola in monacha. 397.
Amati Lusitani historia curatio-
nis prolapsus vterini. 231.
Amati Lusitani opinio de mis-
sione sanguinis è cubito in reten-
tis mensibus ex plenitudine. 31.
Ambra & moschus gestata inui-
tant ad venerem. 359.
αμμοσ membrana. 540.
αμμοσ diapedesis, dixeris,
arroso quomodo differant. 70.
71.
Anethum molam eiicit. 386.
Animæ creatio à Deo, sed quo
tempore infundatur, furor ac
stultia est inquirere. 370.
Anus & vulua vi fortis vnum
foramen facta. 524.
Aphorismi aliquot de infantium
bona valetudine tuenda. 377.
Apostemata vuluæ quomodo tra-
ctanda. 274.
Aquisgrani balnea. 445.
Aquosa materia quomodo per
nucham descendat ad vterum.
116.
Aromata non rectè adhiberi na-
ribus in suffocatione vteri. 151.
Asininum lac fluorem rubrum sa-
nat. 135.
Asininum stercus proprietate san-
guinem constringit. 99.
Auctoris literæ ad Pensionarium
Delphensem. 442.
Auctoris vxor menstruorum pro-
fluuium ex apertione vasorum
laborans. 91.
Auraci Principis vxor ex florum
odore in vterinum valum in-
currit. 193.
Autumni tempore cur mulieres
magis obnoxix vteri præfocatio-
ni. 163.
B.
- B**ALNEA Aquisgrani. 445.
Balnea Caldariana. 228.
Balneum ad fluorem album. 147.
Balneum

- alneli pro cedemate cruris. 437.
 atauæ mulieres munditiei dedi-
 ta. 14.
 ayri ceratum ad vteri prociden-
 tiam. 230.
 benedicti Veronenſis historia de
 muliere hysterica. 160. eius-
 dem historia de foetu mortuo
 extracto. 532. de duabus lu-
 dæis apostemate vteri laboran-
 tibus. 253.
 eniuenij historia de muliere quæ
 decennio sine vtero superuixit.
 222.
 etti historia de mola edita anno
 MDXXXVII. 532.
 oethi vxoris curatio per Gale-
 num. 119. 120.
 oethi liberalitas erga Gale-
 num. 145.
 rutorum famellæ cur molam
 non concipiant. 392.

C.

- CALDARIANA balnea. 228.
 Callus in quo differat à scir-
 rho. 278.
 Canceri cura palliativa. 294.
 Canceri vlcerati & non vlcerati
 signa. 285.
 Canceri vterini differentia ab in-
 flammatione. 286.
 Candelæ extinctæ nidior abortus
 causa. 452.
 Caprarum stercore cinis cum
 aqua pluuiali haustus sangui-
 nis ex vtero impetum sinit. 99.
 Ceratum Bayri ad procidentiam
 vteri. 230.
 Cereuiffa Gedana mulier Alc-
 mariana ab hydropē liberatur.
 113.
 Chamæmeli florum decoctum in-
 signe ad dolores relictos à par-
 tu. 516.
 Citta, pica, malacia. 447. 448.
 quando incipit. 448.
 Claretum ad facilitandum par-
 tum. 414.
 Conceptio. 368. 369.
 Conceptio an fieri possit absque
 delectatione in coitu. 333.
 Conceptio dubia quomodo in-
 uestiganda. 364.
 Conceptio quomodo procuran-
 da. 354.
 Conceptionis aut imprægnatio-
 nis signa, eaque diligenter me-
 dico inuestiganda. 367. 368. 372.

- Conceptioni aduersatur corporis
 exsiccatio. 38.
 Conceptionis tempus idoneum
 incipientibus aut cessantibus
 mensibus. 7. 336.
 Conceptionem comitantium va-
 riorum accidentium curatio-
 nes. 449.
 Cornelij Gemmæ epistola. 421.
 Corui ouum grauidis fugiendum.
 464.
 Cucurbita radicibus mammarum
 in profuuiio menstruorum affi-
 genda. 88.

D.

- DELPHENSIS mulier octies ab-
 orsam passa. 117.
 cum Dentibus qui nati sint, &
 quid hoc portendat. 571.
 Dentionem in pueris quæ adiu-
 uent. 573.
 Diapedesin minus periculosam
 anastomosi.
 Diogenis Cynici sordidum fa-
 ctum. 153.
 Diuretica per accidens menles
 euecare. 49.
 Diuretica quomodo differant à
 cientibus menstrua. 48.
 Dodonæi historia de muliere quæ
 tredecim annis in vtero gesta-
 uit foetum mortuum. 477.
 Doloribus à partu relictis opti-
 mē mederi decoctum florum
 chamæmeli. 516.
 ad Dolores post partum quæ con-
 ferant. 568.
 Domina cui sanguinis ex ruptura
 venarum vteri fluxus restringi
 non potuit. 714.

E.

- ELIDET medici arcanum in-
 signe contra fluxum immodi-
 cum mensium. 66.
 Elizabetha Daciæ regina. 416.
 Embryo. 369.
 Empedocles secundam interiorem
 animam vocauit. 540.
 Empiricus quidam in extenuata
 menses ciere studet. 35.
 Emplastrum ad fluorem album. 147.
 Equinum finum e vino exhibi-
 tum secundam expellere. 547.

F.

- FERNELII historia de muliere
 vteri hydropē laborante. 379.
 P P 3 Finis

Fimum equinum secundam expellere, vino exhibitum. 547.
Fluor albus aut muliebris quid & unde 114. 115. quomodo a profuuo menstruorum differat. 122. quomodo differat a gonorrhœa 124. copiosus est si hat a vitio viscerum, patior si vteri. 126.
Fluoris muliebris causarum signa. 125.
 pro Fluore muliebri sanando secretum præceptoris Auctoris. 137.
Fluor muliebris abortus in puella octo annorum. 126.
Fluor muliebris rarissimè puellis contingit. 126.
Fluori albo commodum balneum, suffumigium & emplastrum. 147.
Fluxus criticus non sistendus. 82.
Fœcundæ feminae qualis esse forma debeat. 336.
Fœcunditatis exploratio. 339.
Fœcunditas ab æqualitate temperamentis & naturæ. 332.
Fœminæ purgantur quadrato Luna motu pro ætate. 4.
Fœtui unde alimentum. 541.
Fœtus præteri causæ. 488.
Fœtus septimestris cur vitalis esse possit, non octo in ætate. 372.
Fœtus mortuus tredecim annis in utero gestatus. 447.
Fœtus mortuus quomodo extrahendus. 536.
Fœtus mortui inuestigatio. 336.
Fœtum mortuum eductio. 528.
Fœtum mortuorum gestationis exempla. 477.
Fœtus motus quando sentitur. 532.

G.

GABRARA procerus. 489.
Galeni historia de præfatione muliebri. 182.
Gatenariæ historia de vipera per anum expulsa fumo corij combustis. 161.
Gemelli. 374.
Gonorrhœa quid, & quomodo curetur. 148. 149.
Gonorrhœam confundi cum exulceratione pudendorum. 150.
Gradi historia, quomodo ipse deceptus sit falsa imprægnatione suæ uxoris. 401.
Gradi historia de muliere absque

matrice Papiæ viuentis. 222.
Gradi historia de Medico quibrevi molam se curaturum promittebat. 385.

H.

HÆCICA febris mulieri biliosa menstruorum profuuo laboranti superueniens. 97.
Hippocrates altera rebus humanis a Deo data lux. 369.
Hydrops singulis mensibus per uterum expurgatus. 116.

I.

IACCHINVS decocto ligni Indici & dictamni mulieri toto quinquennio non purgatæ & sterili menses euocauit. 5.
Imaginatrix facultas moderatrix formæ. 377.
Imprægnatio. 369.
Infantis regimen ex Erote. 560.
 ex Moschione. 562.
 ex Bonaciolo. 568.
 ex Paulo. 569.
 ex Hippocrate. 576.
Infans quo tempore mouetur. 370.
Infantem ante 40. diem ridere. 570.
Infans os. 570.
Infessus ad sistenda menstrua. 109.
Ioannes Capella medicus Francisci Regis. 9.
Ioannes de Boys pharmacopœus Parisiensis. 199.
Ioannis Matthij Medici epistola. 428.
Ioannis Tiengij uxor a fluore muliebri per ipsum curata. 138.
Italas mulieres pessimè viuere, & optimè vestiri. 380.
Ius restaurans & simul aluum subducens in puerpera. 556.

L.

LAC colligi crescente Luna. 2.
Lac probatum in nutrice. 587.
Lactucam menses prouocare quomodo intelligendum. 50.
Leporis coagulum cum acetopotum ad profuuium muliebri. 135.
Leporis vulua in cibo assumpta conceptum accelerat. 335.
Literæ Auctoris ad Cripium Pens. Delph. 442.

M.

MARES an in dextra, facellæ in sinistra vteri parte concipiantur. 374.
 Maris

I N D E X.

- Mariae Sanfuerinae Comitissae Nole mirabilis vrina. 23.
Medico non esse turpe loqui de partibus naturalibus. 361.
Melissae conserua ad palpitati- nem cordis. 449.
Mensis Lunaris. 371.
Menstrua cur Flores & Tempo- ra vulgo dicantur. 20.
Menstrua moueri decrescen- te Lu- na. 9.
Menstrua quando fluere incipiant, quando desinant. 8.
Menstrua per oseiecia. 21.
Menstrua purgatio cur quibus- dam citius, quibusdam tardius procedat. 8.
Menstrua purgatio in pregnanti- bus à quarto ad septimu men- sem tuta. 470.
Menstrua purgatio qua mensura in muliere sana. 80.
Menstrua purgatio quibus ante xiv. annum non procedat. 11.
Menstruas purgationes frustra saepe prouocari. 37.
Menstrua quae ducunt quomodo à diureticis differant. 48.
Menstrua quomodo prouocanda post partum in febricitante. 565.
Menstruis euocandis sanguinem tribus diebus ante tempus pur- gationis solitū mitti debere. 30.
Menstrua retenta aut etiam ni- mium fluentia hydropis causa. 30.
Menstruorum fluxus aestimandus pro quantitate & qualitate. 31.
Menstruorum retentionem impe- dire conceptionem. 364.
Menstruorum profluuium quid propria. 68.
Menstruorum profluuii signa prae- sagientia 75. demonstratiua. 76. 78.
Menstruorum profluuii in ana- stomon curatio. 87.
Menstruorum profluuium cura- tum quomodo. 112.
Menstruorum profluuium expi- tuita. 143.
Menstruorum profluuium quod sequitur abortum periculosius quam quod fit à fœtu gran- diori. 80.
Menstruorum profluuium obnoxia mulieres vegetae. 126.
Menstruorum profluuium per ana- stomon quae conueniant. 89.
Menstruorum profluuium sistendo experimentum muliercularum 100. 101.
ad Menstruorum profluuium in- signe secretum Elidei. 66.
in Menstruorum profluuium non tutò vtēdum localibus in prin- cipio. 128.
in Menstruorum profluuium cu- curbita attingenda radicibus mammiarum. 88.
in Menstruorum profluuium an in- guina vinciri debeant. 88.
Menstruorum suppressionis cau- sa. 16. 17. 25.
Menstruorum suppressionis signum. 22.
Menstruorum suppressorum pro- gnostica. 26.
Menstruorum suppressioni tem- pestiue succurrendum. 27.
Menstruorum suppressio an omnis ab utero. 116.
Menstruorum suppressionis ob- pinguedinem, curatio. 39. ob sanguinem biliosum. 58.
Mola uterique. 375. 377. 380. 382.
Mola diuersimodè à barbaris Me- dicis nominata & descripta. 39.
Molae variae species. 377.
Molae causa in facultate forma- trice posita. 376.
Molae quae causa materialis. 393.
Molae distinctiua signa à vera conceptione, ceterisque simi- libus affectibus. 400. 404. pro- gnostica. 405.
Molae curatio. 409. 414.
Mola quot modis generetur. 396.
Molam cur nulla prae- ter homi- nem animalia gignant. 392.
Mola non nisi concumbentibus mulieribus contingit. 392.
Mola pluribus oculis plena. 387.
Monacha quae per os menstrua euomebat. 21.
Monstruosi partus. 493.
Mulier cur partes naturales gi- gnendi intus habeat. 6.
Mulier quomodo tractanda si de conceptione dubitetur. 364.
Murium stercus manibus indu- ratas relicere. 584.
Murium stercus venerem stimu- lat. 356.

Narium

N.

- N**ATIVUM venæ incisæ menses retrahunt. 88.
 Nati mense decimo vel undecimo qui. 398.
 Natura vniuscuiusque propria à Medico exploranda. 204.
 Nepita menses prouocat. 54.
 Nonagenarius prolem suscipit. 332.
 Nutricis regimen. 380.

O.

- O**BSTETRIX qualis esse debeat, & quomodo se gerere debeat. 502. 504. 548.
 Obstetrices culpatae. 522.
 Obstetrices consilium abhorrendum pro muliere grauida. 366.
 Obstetricis sella. 503.
 Opiatae variae contra sterilitatem pro varietate causarum. 358. 359.
 Opium suspectum remediū. 288.
 Ostrutij radix liberat ab vteri praefocatione. 203.
 Ouum foetidum mirifice conferre ad procidentiam vuluæ. 229.

P.

- P**AGVS prouinciæ in quo pleræque mulieres vteri procidentia laborantes nihilominus concipiunt. 223.
 Parere posse mulierem post decimum & undecimum mensem. 397.
 Partientibus quæ obseruanda. 506.
 Parturientium dolor quomodo differat ab inflammatione vteri. 495.
 Partus naturalis quis, & quis in naturalis. 487.
 Partus naturalis quando & quomodo fiat. 485.
 Partus naturalis differentia ab abortu. 485.
 Partus quomodo facilitandus in mulieri pingui. 509.
 Partum facilitantia. 414. 481. 507.
 ad Partum bonum opus est vigore duorum corporum. 500.
 Partus xxx. diebus integrè conformatur. 533.
 Partus difficilis causa. 492. 505. curationes. 510. 511. 513. 517. 522.

- Partus difficilis signa. 495. prognostica. 498.
 Partus difficilis mulieribus quarum viri latos habent humeros. 483.
 Partus difficultas quale symptoma. 487.
 Partus granditas causa abortus. 464.
 Partus monstrosi. 493.
 Partus numerosi. 464.
 Partum subsequantium variorum accidentium curationes. 599.
 ad dolores post Partum quæ conferant. 563.
 Passerum cerebella iuuant conceptum. 359.
 Pastinacæ erraticæ folia & semen conceptum adiuuant. 355.
 Perdiciæ plumæ ad vteri praefocationem. 202.
 Pessi ad inflammationem vteri. 265.
 Pessi ad molam seu grumum sanguinis. 439.
 Pessus ad conceptionem. 355.
 Pessus ad sistendos menses. 109.
 Pilulæ ad molam educendam. 413.
 Pilulæ de bdellio Rondeletij. 146.
 Plato vim olfaciendi vtero tribuit. 152.
 Portulaca ad profluuium mestrurorum. 134.
 Praefocata ante tertium diem non sunt sepeliendæ. 186.
 Praefocata à semine paratissima ad imprægnationem. 185.
 Prægnanti quæ ratio vitæ instituenda. 452.
 Prægnantibus quando contingat fauidium. 494.
 Prægnantium error in computatione mensium. 403.
 Prægnantium symptomata. 448.
 Præsidis Hollandiæ Corn. Susij vxori grauidæ sanguinem ex vtero fluxisse sine abortu. 12.
 Pudendorum exulceratione confundi cum gonorrhœa. 150.
 Puella nouennis vterum gestans. 9.
 Puerpera quomodo se regere debeat. 564.
 Puerpera quot diebus se in lecto continere debeat. 565.
 Pulegium menses prouocat. 54.
 Puluis ad vteri suffocationem. 561.

Puluis

I N D E X.

Pulvis dominarum ad euocandos menses. 15.
 Pulvis faciliens partum. 501.
 Pulvis feminarum Delphensium ad praefocationem vteri. 204.
 Pulvis in febre ad purgationem in partu. 408.
 Pulvis insignis ad fluorem album. 142.
 Pulvis matricis. 206.
 Pygmæi in extremis Indiæ finibus. 289.

R.

RHOTOMAGENSIS Praefidis filia ridere solita ante vteri praefocationem. 160.
 Ritus infantis ante diem 40. omnifidus. 570.
 Rondeletij historia de pueri frustulim reiecto. 549.
 Rustica venam sibi incidere impetrans fluentibus mensibus. 20.
 Ruta molam elicit. 386.

S.

SANGVINIS fluxum quæ sistant. 98.
 Sanguinis impetus non confestim localibus reprimendus. 54.
 Sanguinis per vterum immodici fluxus differentia. 69.
 Sanguinis profluvio post abortum mulier extincta. 79.
 Saniei à semine differentia in fluxu. 150.
 Scarificationes erurum conferunt ad suppressa menstrua in corporib. albis & pituitosis. 4.
 Scire omnia nemo potest. 404.
 Scirrhus in quo differat à callo. 278.
 Secunda vnde dicta. 542.
 Secundarum interior ab Empedocle Anima dicta. 540.
 Secunda relicta quomodo extrahenda. 539.
 Secundinae retentione causa. 542.
 curatio. 543-549.
 in Secundinae retentione quæ pars afficiatur. 542.
 à Secunda relicta quomodo aliquæ euaserint. 546.
 pro Secunda depellenda secretum. 103.
 ad Secundam repellendam secreta muliercularum. 547.
 Secunda quomodo extrahenda. 548.

in Secundæ retentione prognostica. 542.
 Sella obstetricis. 508.
 Semen maris cum semine feminæ necessario misceri ad generationem. 329.
 Semen non putrescere in vasis. 172.
 Strialis quid. 575.
 Spadanius fons acidus. 441.
 Spiritus erumpere ex pudendo. 235.

Sterilitas quid. 330.
 Sterilitatis causa. 331. chratio. 350-360.
 Sterilitatis causarum signa. 343.
 Sterilitas in biliosa quomodo amouenda. 355.
 Sterilitatis accidentia varia, & eorum curatio. 362.
 Sterilitatis occasio à forma inepta mulieris. 335.
 ad Sterilitatem variae opiata. 358.
 Suffragium ad fluorem album. 47.
 Superfoetatio non symptoma sed res naturalis. 450.
 Superfoetationum aliquot exempla. 451.

T.

THAPSI barbari succus cum oleo sem. lini mixtus sanat verrucas. 322.
 Thymus in vuluam immixtus mulierem excitat à praefocatione. 169.
 Tonsor Haganus quinta essentia se curaturum virorem M. Adriani Vermij frustra pollicetur. 96.
 Tryphera magna pollens ad praefocationem vteri. 239.

V.

VALESCI Tarantini historia de quadam cuius vulneratam vuluam menses resistere. 25.
 eiusdem opinio de mulieribus habentibus ingentes vteros ob flatum in eo collectos. 237.
 Vena secatur in cubito in mensibus retentis ratione plenitudinis. 28.
 Venæ sectio quando conueniat in suppressis mensibus. 4.
 Venæ sectionem in brachio materiam

- riam ad uterum fluentem de-
 tinere. 87.
 Venenum pro sui natura varias
 corporis partes afficit. 167.
 Viduis cur familiaris vteri stran-
 gulatio. 156.
 Vinum non rectè adhiberi in suf-
 focatione vteri. 151.
 Vinum uterum ascendere facit.
 204.
 Virga virilis secundum præfio-
 nem umbilici maior erit aut
 minor. 560.
 Virgæ vitia quæ conceptus ad-
 uersentur, & quomodo arte
 subueniendum. 361.
 Virgines aliquando lac in mani-
 mis habere posse. 533.
 Umbilicus infantis quando &
 quomodo præcidendus. 505.
 Urina mirabilis Comitissæ No-
 læ. 23.
 Uterus quare mater dicatur &
 hystera. 56.
 Uteri situs. 6.
 Uterus cur tetros odores refu-
 giat. 197.
 Uterus an à suo loco dimouea-
 tur. 166.
 Uterus in coitu deorsum moue-
 tur. 223.
 Utero an vis olfaciendi. 152.
 in Uteri morbis primò totius
 corporis ratio habenda. 129.
 Uteri apostematis secundum va-
 rias causas signa. 254.
 Uteri canceri varia exempla. 292.
 Uteri cancer unde 283. eius
 curatio. 286.
 Uteri condylomata quæ & quo-
 modo curanda. 316.
 Uteri dolor à spiritu conclusio.
 234.
 Uteri doloris causæ variz & cu-
 ratio. 242.
 Uteri excoiatio. 313.
 Uteri fistulas sanari non posse.
 308.
 Uteri flatibus oppleti curatio.
 237.
 Uterinus furor. 175.
 Uterus inflammationibus obno-
 xius. 247.
 Uteri inflammationis variz cau-
 sæ. 247.
 Uteri inflammationis signa. 249.
 Uteri inflammatio & cancer quo-
 modo differant. 286.
 Uteri inflammatio quomodo dif-
 ferat à dolore partus. 495.
 Uteri inflammationis curatio.
 244.
 in inflammatione oris vteri an va-
 na cubiti secari debeat. 264.
 Utero inflammato cur dolor in-
 cipit potius quàm aliam par-
 tem capitis afficiat. 250.
 Uteri oedema quid. 279.
 Uteri os aperiri in omni pro-
 fluvio. 126.
 Uteri os post conceptum contra-
 hi. 373.
 Uteri præfocatio, suffocatio, vel
 strangulatio. 151. 154.
 Uteri præfocatio à quibus cau-
 sis. 179.
 Uteri præfocationis varij affe-
 ctus. 164.
 Uteri suffocationis differentiz ab
 aliis affectibus. 172.
 in Uteri suffocatione quæ pars
 affecta. 155.
 Uteri præfocacionem signa præ-
 sagientia. 163. signa eiusdem
 demonstratiua. 164. progno-
 stica. 184.
 Uteri præfocacionem quæ acci-
 dentia comitantur, & eorum
 causæ. 167.
 Uteri præfocatio in prægnante &
 in ipso partu. 187.
 Uteri præfocatio ab aëre uterum
 implente post menstrui pur-
 gationem. 162.
 Uteri suffocatio ex iracundia. 175.
 Uteri præfocacionis à mensibus
 retentis curatio. 209.
 Uteri suffocatio à retentione
 menstruorum mitior, quàm quæ
 à semine retento. 181.
 Uteri præfocatio quomodo to-
 tum corpus inficiat, à similitu-
 dine ictus phalangij ac scorpio-
 nis. 157.
 Uteri præfocacione an vellicandi
 pili vulvæ. 135.
 pro Uteri suffocatione secretum.
 103.
 in Uteri præfocacione qualis pur-
 gatio. 212.
 Uteri præfocacioni cur mulieres
 autumnno magis obnoxie sint.
 163.
 in Uteri præfocacione cur quæ-
 dam non loquantur. 159.
 Uteri præfocacionem raro pa-
 riuntur quæ dulcia ferre pos-
 sunt. 176.
 Utero

I N D E X.

Vtero quæ immittenda in suffo- catione.	195.	Vteri stillicidium.	232.
Vteri procidentia.	213.	Vterum suppressis menibus ex- siccari, falsum.	254.
Vteri procidentie causæ.	222.	Vteri thymi quomodo curentur.	321.
Vteri procidentie prognostica.	222.	Vteri tumores quomodo à scirrho distinguantur.	278.
Vteri prolapsus ouo Scruthio- cameli similis.	221.	Vteri venarum obstructionis cu- ratio.	40.
Vteri præcipitationis varia ex- empla.	226.	Vteri vicerati signa distinctiua.	301. 302.
ad Vteri procidentiam topica va- ria.	230.	Vulvæ ulcerationis causæ.	300.
ad Vteri procidentiam ceratum Bayri.	230.	curatio.	303.
Vterus quomodo & quot modis imperforatus.	324.	Vulvæ pruritus causæ.	311.
Vteri rhagades.	315.	ad Vulvæ pruritum topica.	312.
Vteri scirrhi causæ.	280.		
Vteri scirrhi curatio.	277. 280.	Z.	
Vterus faciliè scirrhum incurrit.	248. 276.	ZOROASTREM eodem quoniam die risisse.	279.

F I N I S.

